







BIBLIOTECA NAZ.  
Vittorio Emanuele II  
**XXIX**  
**F**  
**31**











*Extrait du Privilège du Roy.*



OVIS parla grace de Dieu Roy de France & de Nauarre. A nos amez & feaulx conseillers les gens tenans nos Cours de Parlemens, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Bailiffs, Senechaux, Preuots ou leurs Lieutenans, Et a rous autres nos officiers, quil appartiendra, Salut, Nos chers & bien amez les heritiers de feu Mathieu Merian de Francfort, Nous ont fait remonstrier quapres le decedz dudit defunct, ils ont trouuè dans ses effectz, vn Liure contenant quatre Tomes Intituléz, *Historia naturalis Iohannis Ionsfon*

*Med. De quadrupedibus, De avibus, De piscibus & Cetis, De Insectis, serpentibus & Draconibus.* Que les exposans desireroient faire Imprimer, Vendre & distribuer en nostre Royaume. Mais parce que cét oeuvre ne se peut faire sans nostre permission, & quelle est de long travail & de grandz frais, ilz craignent d'en estre soultrez par d'autres, si ne luy est furee par nous pourueu de nos lettres necessaires. A Ces causes desirant faire parr a nos subjects d'un oeuvre si considerable, Nous auons de nostre grace speciale, Permis & octroyé ausdits Exposans de faire Imprimer, Vendre & debiter ledit Liure par les Libraires & Imprimeurs que bon leur Semblera, pendant le temps de cinq ans, faisant rtes e. prestes Inhibitions & deffences, a tous autres Marchands Libraires, & Imprimeurs, d'Imprimer vendre ny distribuer Ledit Liure sans la permission des Exposans, soubz changement de Tiltre, faulee marque ou autrement, apcine de confiscation des exemplaires, & de Trois mil liures damende aplicable moirié à l'Hostel Dieu, & l'autre aux exposans. A la charge d'en mettre deux exemplaires en nostre Bibliotecque Publique, & vn en celle de nostre tres cher & feal Chlier le Sr. Molé Garde des Sceaux de France. Mandons au premier nostre Huissier ou Sergent surce requis, faire pour l'entiete execution des presentes, rous exploits & actes requis & necessaires, sans demander autre congé ny permission, Car relest nostre plaisir. Donnè a Paris le xij Iour de Feburier, L'an de grace mil six cens cinquante cinq, & de nostre regne le douzieme.

*Par le Roy en son Conseil  
Coupeau.*



ILLVSTRISSIMO AC CEL-  
SISSIMO

PRINCIPI ET DOMINO,  
DOMINO

WILHELMO  
VI.

HASSIÆ LANDGRAVIO,  
COMITI

CATTIMELIBOCIÆ, DIEZÆ, ZIGEN-  
HAINII ET NIDDÆ, &c.

MAGNORVM IMPERII PRINCIPVM, ET  
LIBERTATIS GERMANIÆ VINDICVM,  
POSTERITATI,

MAXIMORVM REGVM FOEDERATO,  
LITERARVM MECOENATI,  
OMNIVM BONORVM DELICIO,

PRÆMISSO, DE FELICI AVSPICATISSIMI  
CONIVGII INITI CVM CELSISSIMA PRINCIPE  
BRANDEVBURGICA SVCCESSV, VOTO:

DEVVM SIMVL PRECATVS, VT CELSITVDI-  
NEM SVAM IMPERIO ET ILLVSTRISSIMÆ DO-  
MVI HASSIACÆ DIVRNARE ET PERENNARE VELIT:

HANC HISTORIÆ NATVRALIS  
DE PISCIBVS PARTEM

Humillimè dicat & offert, utque Sua Celsitudo qualescun-  
que hos conatus vultu Celsissimæ Familiæ erga literas  
fueto, excipere, & se, suaque studia commendata habere  
dignetur,

*Demisse orat*

CELSISSIMO PRINCIPI  
Devotus Client

JOANNES JONSTONVS M.D.

A : PRÆ-



## PRÆFATIO

## AD LECTOREM.



**E**CCE Tibi Historiæ naturalis specimen, studiose Lector. In piscibus id exhibere voluit Typographus: ego non multum interesse arbitrabar, in quibus daretur: modò & reliqua, quod Deo volente fiet, prodirent. Suscepi laboris rui mihi commodum causa; cui fortè per diffusa volumina hætenus incumbere molestum erat. Taceo iucunditatem, quâ melioribus ingenii, dum in exhaustam speciem naturalium varietatem, & stupendum eorundem genium exhibet, allabitur:


*Deum, eruditionem, conversationem, & naturæ imitationem, si te spexeris, summè eam necessestariam comperies. Deum dico. Cultor quotidianus infinitæ Dei Potentiz & bonitatis esse teneris. Hic Naturæ liber tibi eius post factum codicem admiranda aperit. Machinam hie tantæ vastitæ inuenies: tantæ & eius partes molis, ut difficile sit iudicare, quid magis in stuporem nos agat, infinita partium à se invicem distantia, an tantæ earundem in se magnitudo. Videbis aspectu villâ, & tantæ subtilitatis corpuscula, ut nulla planè esse appareant: sed quarum virtutes maximis illis controversiam faciant. Sol centies sexagies, vel ut alii, centies quadragies maior est Historico naturali terrâ: tantæ velocitatis idem, ut unâ horâ decies mille miliarium conficiat. Proximum estis terris Sydius, Luna: ab iisdem tamen, dum minimum distat, L. 11. terræ semidiametris, hoc est, miliarium astronomicorum 178698. remove-  
tur: quæ si in nostra miliaria per 52. reduci deberent, quanta quæso distantia non exurgeret? Terra & aqua in unum globum redactæ, ætæ gravia corpora, ita tamen in medio aëre suspensa librantur, & ad polos mundi disponuntur, ut ne latum quidem unguem, vel ab oriente in occidentem dimoveris: aut à septentrione in Austrum, vel vice versâ, propelli possint. Pisciculus est Eche-neis, quem Remoram dicimus. At idem, gubernaculo navis affixus, immobilè eam reddere creditur. Ferruginea gleba Magnes. At quæ non miracula eius beneficio patramus? Imbellis populus formicæ: tamen iis Reip. ratio, memoria, cura. *Semina erosa condunt, ne rursus in fruges exeant à terra. Madefacta imbre proferunt & siccant. Et quoniam ex diverso convolvunt, alteri alterius ignarâ, citi dies ad recognitionem mutuam, velut mundinis, dantur. Exiguum insectum Apis, ne quilius si solo aspectu æstimari debet pretii. Ars earum naturâ, Remp. opera excusseris, exclamabis: rerum naturâ nusquam magis quàm in minimis totam esse. Infinitæ hæc potentiz argumenta, quæ Historicus naturalis suggerit. Remitatem si attendas, grande illius documentum, quod nulla re natura ad conservationem sui destituitur: quod omnes huius universi partes, singulari ne-  
xu inter**

se inter se colligentur, & sibi mutuum ad conservationem rotius præstent subsidium: quòd superiora, etsi mole, loco & qualitatis nobiliora videantur, inferioribus quasi inserviant; & denique, quòd cuncta homini tanquam regulo suo famulentur. Rem scita habere, per universam corporum naturam seriem, in Historia deducitur. Bona eruditio nostræ pars naturalium peritia, in eo desudat intellectus noster, ut quænam sit sublimitum, elementorum, subterraneorum, plantarum, animalium, hominis dentque ipsius conditio, penitus cognoscat. Spinozæ illæ de materia primâ, infinito, loco, tempore, motu, generatione, &c. quæstiones huic desiderio non sufficiunt: historia, si ex æquò instrui velis, consulenda est. Generalia sunt quæ præcipiuntur, & isagoges primò vicem tenent: in adyta, per singularia inducimur. Ab his illa abstrahi, per eadem restringi, confirmari, refutari, nemini ignotum. Nullæ nobis metallorum, lapidum, terrarum, succorum, florum, plantarum, &c. differentie essent, nisi à singularibus, eorundemque inrer se comparatione peterentur. Non poterat Aristoteles & ex eo Plinius scribere, *Capita piscibus proportionem corporum maxima: Nulli animali tui cornua exteros dentes; sed omnibus concavos, piscium omnibus serratos præter scaræ: volucres, nullo præter vesperilionem: Quibus longæ crura, sive longa colla: Cornigera una parte dentata, & quæ in pedibus habent, sive pinguescere, bisula, fissisve in digitos pedibus, adipem* &c. nisi Historiam consulisses. Inde ergo tibi & in hoc puncto necessaria: quod fortè accuratissime explicatum, ut omnia solent Excellentissimus D. Sperlingius Amicus noster singularibus in specialioribus. Physicæ, quas adhuc ptemit, partibusque dabit. De *Conversacione* res clara est. Eo sæpius de naturalibus miraculis inrer familiares sermones agitur, quo magis ingenia oblectant. Quam olim apud veteres in convivio in usu, Plurarchi symposiaca, & Athenæi Dipnosophistæ docebunt. *Natura imitatio* summus sapientie nostræ apex est. Hæc indigentia humanæ subvenit, opes auxit, ingenium supra fortem mortalem extulit. Deo quasi similes reddimur, dum ipsius naturæ machinamentis uti, eandem generando, corrumpendo, transformando, provebendo; impendendo, divertendo, resolvendo, seducendo, &c. nobis quasi subici & famulari cogimus. Ausum est hæc ingenium humanum, cælum perpetuo & uniformi morum æmulari: signes perpetuos, deducta quasi aëtris facie, accendere: ventis, pluvias, iridibus, fulguribus, tonitribus, minari: aërem in unum coactum librare: aquas in declivem solitas, in sublime propellere; monstra & novas species formare: lapides preciosos fundere: corpora in sua principia, plumbum in hydrargyrum, setrum in liquorem rubiginosum resolvere: arbores argenteas & aluminosas subito producere: plantarum libereamenta retardare vel accelerare; eisdem in seipsas transmutare; ex cineribus resuscitare; facultate purgativa, & venenata imbueri: ex stupidis, lignis, & mineralibus, Deos, cœlites, heroes, Aquilas, columbas, muscas, mundum adeoque ipsum efformare, iisque animam inspirare; oculum syderibus inferre; exilibus stupendam molem adaptare: Musica affectus varios excitare & sopire: dæmonum denique apparitiones, spectra, & nescio quas *visusque* ad instar Morganæ Rheginæ in freto Mamertino, de qua Ingeniosissimus Kircherus, Artis Magnæ Lucis & umbræ l. 10. c. 1. agit, mentiri. An hæc absque naturalium cognitione peracta? Falleris. Non potest agricola suum agrum bene proscindere, effringere, tertiare, occare, runcare, sarrire: non hortulanus suum horrum plantare, opilio ovibus prospicere; pecuarius pecori subvenire; venator feras sectari; piscator squamigero gregi insidiari; aucups aviculas allicere; &c. absque huius subsidio si fuerit. Huius beneficio convenientia animantibus. Adamus nomina imposuit: & Caini posteris artes fabriles invenit. Non est ergò mirum, & Salomonem tantum huic studio impendisse, ut de plantis & animalibus libros, quos nos perisse dolemus, Urreta in Bibliotheca Preteganis habere nugatur, scripserit tan-

tum & Alexandrum M. indagandi Animalium per Aristotelem naturæ sumptum, ut summa ad plura talenta excreverit tantum & præterito seculo Franciscum I. Gallorū Regem, ut *Gylsum & Bellonium*, viros eruditissimos, & quorum quædam in hac materia scripta extant, in remotas Europæ partes, quin Asiam & Africam miserit. Huius etiam sine dubio admiratione factum, quod præter Reges & Principes, præcipui Philosophi in eam inquisiverint, & posteritati commendarint. Habemus præter eos, quos in Bibliothecis, Alexandrina, Constantinopolitana, Pergamensi, & aliis perisse, dolemus, quique fortè adhuc cū blattis & tineis conficiantur, inter veteres Geographos, Aristotelem, Theophrastum, Dioscoridem, Ælianum, Oppianum, Columellam, Varrohem, Palladium, &c. & qui omnium instar est Plinium, cuius Solinus simia appellatur; inter recentiores, Gesnerum Germaniæ Plinium, Aldrovandum, Wottonum, Turnerum, Mouffetum, Aretæolam, Boërium, Baccum, Ruveum, Schönfeldium, Freygiū, Mathiolum, Tabernmontanum, Bauhinum Ximenem, Bustamantium, Rondeletium, Bellonium, Cesium, Theverum, Murggraviū, Pisonem, ab Horro, &c. & qui utriusque Indię Navigationes scripsere. Hinc fit, ut sæpè mirari solem, quòd nullam huic Historiæ in Academiis, Bononiensem si excepias (in Wirtembergensi quoque eam expiturgere. Cl. Sperlingius) Professionem assignatam videam; & malum sæpè inter quæstiones de generalib. motis consensescere, nulli vitæ generi prompti, quam naturæ abdita scrutari, quæ omni intersunt. Et tantū de Historiæ naturali, De *Labore* meo hæc paucis habere. Totam me naturalem historiam pertexere constituisse, simihi ad tantas curas Deus vitam producere voluerit, eamque ex vastis illis tam recentium quam antiquorum, Plin. in primis, Aristotelis, Oppiani, Gesneri & Aldrovandi, voluminibus excerptam, & brevioribus gyris inclusam, ut te quasi scripta introduce emissa præcipue quæ ad naturalium cognitionem spectant omnis alicui attingere, ne te distraham: ordinem qui mihi videtur commodissimus sequi, ut memoria tua inveniat: Paralipomena ex recentioribus illis in primis qui Indica nobis dedere, addidisse, ne quid omissum esse conqueraris: in descriptionib. authorum ipsorum plerumque verbis uti, sæpè & breviora capita inferere, ne quid secus acceptum occurrat: Authorum loca etiam ab istis neglecta adieciisse, ne te ab his abduci per compendia, imaginis: Figuras & quidem elegantes ut Chalcographus adjuiceret persuasi, ut descriptiones facilius conceperes, & impressam memoriæ imaginem, specie ipse visâ depromere posses. In hoc de Piscibus volumine adjectos quosdam ex Schönfeldio, habebis: Liber verò quartus ex Murggraviū, in cuius nimis matura morte, ingentem Resp. literaria jacturam fecit, Historiæ Brasiliæ naturali totidem verbis depromptus est. Cur ad suas classes reduci non potuerint, dixi, His inrerim frui, studiose Lector, & ad sequentes nondinas, Avium, Quadrupedum, & Aquaticor. Exanguium, quæ jam parata, Historiam expecta. Bene vale, & studiis nostris fave. Dabam Lipsiæ Polonorum ex Museo, in curatōre Nativitatis Salvatoris nostri, Anno M. DC. XL.



[illegible]





## HISTORIÆ NATVRALIS

De

## PISCIBVS,

LIBER PRIMVS,

DE PISCIBVS MARINIS.

## Titulus I.

## DE PELAGIIS.

## CAPUT I.

## DE PELAGIIS SQUALIOSIS.

## ARTICVLVS I.

## DE ASELLIS.

TAB. I.  
TAB. II.  
I.

ISCES, qui Latini  
Aselli dicuntur,  
Graeci *ἀσέλ* & *ἀσέλι*,  
seu ab asinino colo-  
re, quod a Varroni  
placet, seu a tor-  
pore, ut b oppiano,

ventre albicante, capite amplo, ore;  
anre quod cirrum habet, ( radiolū &  
virgulam quidam vocant ) grandissi-  
mo. *ἀσέλιος ὁ μόνος τῆς γαλιᾶς*, & Aristot. & Aristot.  
teles dicit, ventre non variegato (ma-  
H.A.I. 9.  
lē Epicharmus apud Athenzum *πυ-  
καλῶς* vocat) sed tumido, ut *πυκαλῶς*  
*σοφ* legendum sit, jecore maximo.  
Degit in alto mari, in aliquo latibulo  
sub f Sirti maximē exortum latitat, f Plin. H.N.  
cum alii per summum hyberni tem-  
I. 9. c. 17.  
poris frigus seabdant, sæpē se avenā *ἀσέλι*  
obruit, unde forte *Sandi* apud Boruf-  
H. A.  
fos nomen. *Edan.*

Vfus eius in cibis apud Romanos  
post Acipenserem commendatus,  
hodie apud Septentrionales frequē-  
tissimus. Carne est alba & friabili,  
quod si mari puro & alimento probo  
utatur, carnis bonitate cum saxatili-  
bus contendit, si Galeno credimus. *Galen. de*  
Difficilem tamen esse concoctu, vi-  
de *Alim.*  
rosūq; aliquid habere Diphilus a-  
facit. I. 3.  
pud Athenzum prodidit. Exsiccatus  
osseam duritiem contrahit, nec nisi  
fustibus verberatus coquitur; unde  
piscis fustuarii, & Germanor. *Etod*  
*fisch* nomen. Sale inveteratus, & sal-  
sugine abluta ex nova aqua elixus,  
*Laberdanur*; (*Laberdan*) in Germa-  
niam superiorcm devehctus. *Rheni*  
*fisch* seu Rheni piscis, vocatur.

Callarias seu *Clarias*, *Galaria*, *Galeri-  
da* & *Galaxia*, Hollandis *Etchisch*/  
Mur-

a. Varro

l. 4. de LL.

b Oppian. vocant.

L. 3. Habent.

Genera eorum duo &amp; Plinius, &amp;

d Dorion, faciunt, *Callariam* & *Bac-*chum seu *ion* quem *Gadan* alii dicunt,& *Calleridam*, *ἀσέλιος*, & *μαλόνος*; tria

Oppianus, nisi Oniscum pro parvo

sumpserit: Nos eis *Asellum nigrum*,*Molvam*, *Morhuam*, *Gobergum*, adjici-mus, iisdemque *Musclum*, & *Tineam*

socios quasi damus.

Onos, qui nonnullis *ἀσέλιος*, *Asel-*

lus, Plinio, seu quod Libeto Patri sa-

cet, seu obtumidum ventrem *Bac-*chus, Dorioni *Gadus*, Hollandis ju-venculus *Bolek*, a dultus *Cabellian*, di-

citur, magnitudine est insigni, tres e-

nim cubitos sæpe excedit; colote in

tergote, nigricante, ad latera &amp; in

**TAB. I.** Murelio *Pisces capiteus*, Gallis *Mor-*

**2. 3.**

**TAB. II.** *lucius*, longitudine plerumque est cu-

**2. 3.**

bitali, teres, ventricosus, squammas habet minutas, in lateribus & dorso ad cineritium colorem vergentes. Caput maiusculum, & in eo lapillos duos oblongos, larum, pressum. Oris

tistum maximum. Oculos maximos, branchias utrinque quaternas, duplices; in interiore oris parte post linguam ossa parte inferna, superna, aspera, & in gula, regione cordis duo alia reliquis longiora, quæ obstant ne pisces dum devorat, in gulæ angustias compulsi, aculeorum asperitate cor vulnerent. *Ventriculus* est magnus, crassus, superiore parte latus, inferiore in acutum desinens, albus, in intercapacitate tenuissima ac nigerrima membrana obducitur. Pinnis natat quatuor, quæ in supina parte, ori sunt propiores, quam quæ ad branchias. Unicam habere spinam ex dissectione dedit Salvius prodidit. *Interiora* si species, cor, quod inter branchias situm est, pericardio involutum, figuram ossis dactylorum exprimit. *Jecur*, cui tel committitur, est album, *intestina* rubent, *sternum* bifidus nec admodum longus conspicitur. Ex vertebrarum extremitatibus, quæ admodum recula sunt, crassa utrinque membrana, scapulæ formam dissecta ad amissum representans, suboritur; quæ capacitatem insignem intus vacuum, extuberantemque adeo efficit, ut pilcis ipse ventriosus reddatur. *Dentes* plerumque circa cænosâ ac herbola littora. Gobionibus, atherinis, & marinis reiectamentis vescitur. Carne est candida & friabili.

Huiusmodi est quidam, quem *Veneri* *Piscem mollem*, Romani vulgo *Ficum*, Galli *Merlangum* vocant. Albus est, argentei coloris, mollis, squammis ram parvis, ut visum fugiant, rectus, oculus magnus, argenteis; ore medioctri, dentibus in maxillis, parvis, albis, acutis, ordinatis. In capite calculos oblongos habet. *Pinnæ* ipsi tres interiore, duas ab ano ad caudam, in lateribus ad branchias utrinque unam, Bellonius tribuit. Spina tergoris sexaginta vertebris constat, linea à branchiis ad caudam sinuosa ducitur.

*Aldrovand.*  
*l. 3. de*  
*Piscib. l. 3.*

*Ventriculus* habet magnam cum multis appendicibus. *Epar* ex candido rubescens, vulvam bifariam secundum Rnndeletium, quadrifariam secundum Bellonium divisam. Ascendit sæpè ex alto ad littora, & *Aphysis*, *Caridibus*, *Gobionibusque*, quos integros devorat, pascitur.

*Gallia* tam frequens est, ut à carnis levitate, vulgari proverbio in eum fecerit. Hominem duodenis merlangis probè passum, minore ab his pondere in cursu fatigari, quam si senis tantum *Zonæ* appensos gestaret.

*Afellus* *Nigra* Anglis ideo *Collis* *fisch* à carbonibus sic dictus; squamis est latioribus, tergo nigricante, ventre candidiore. Linea à capite ad caudam atra, & ad latera aliquantulum inflexa producitur. *Pinnæ* reliquis sui generis piscibus duriores & robustiores sunt. Parvus carnem habet planè inspidam, profectus habetur in pretio.

*Astellum nigra*, r. Tab. 46. 1. 2. 3.

## ARTICULVS II.

*De Mole, Morhua, Mustela, & Tinca marina.*

**MOLVA**, Rnndeletin *Asinum varius*, & *Molva maior*, doctum habet cinereum multis maculis nigris confectum, ventrem candidum falcatum, *pinnæ* in dorso tres, à podice unicam, duas ad branchias, duas in ventre. *dentes* in maxillis, internas partes *Asino* similes.

*Morhua* seu *Molva altera*, Anglis *Aldrovand.* *Morchuel*, plerumque est sesquicubitalis longitudinis, pedis unius. *Oculi* 6.

ipsi magnum, *dentes* in maxillis, oculi magni. Ex inferioris maxillæ extremo *appendix* carnosa ceu pilus è barba propendet. *Pinna* ad branchias & in ventre binæ, parte prona tres, à podice duæ conspicuntur. *Dorsum* cinereis fulvisque maculis notatur. *Venter* est falcatus. Cato coctione propter humoris tenuis consumptionem, glutinosior, ut farina aqua diluta, & lacharum *dissolutum* evadit, butyrum immersa adnè digitis adhærescit, ut vix inde avelli possit. *Intestina* & folliculi *ichthyocollæ* conficiendæ inserviunt. *Gobet-*

*Aldrov.*  
*Gefner.*  
**TAB. II.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

**3.**

Tabella 1

*Astius Cabrilla*  
—Aaleh.



*Callarua, Astius minor*  
—Eel fish. —Bism fish.



*Astius aller junc. Merinatus*

Ein and. er art. Schellfisch.



*Mutula*

—Eel fish



*Hypopus. Pecten Kopf*

12



*Her. conat*

*Herring*



*Tenax marina*  
—Mor. Schlegel.



*Sparus* Schellfisch.



7



*Spar. Merocope*



*Schypus. Meer Schlegel*



*Clavus. Meer Schellfisch*



*Monacorus*  
—Mor. Linhorn.





*Afellus.*

*Cabeliau.*

*Tabella. II.*




*Afellus minor.*

*Gualleken.*



*Afellus molles*

*Wistling.*



*Afellus alius*



*Rougeus*

*indus. Anguilliformis.*



*Melina. ein art stockfish.*



*Rubilus*

*Vrf Erle.*



*Coronatus.*

*raplein*




*Salpa.*

*Stockfish*



*Coronatus. raplein andre*







Gobergus duorum cubitorum magnitudinem superat. *Colore* est cinereo, ventre falcato, *ore* sine denticulis mediocri partibus internis Merlucio similis. *Carne* duriore quam Aflinus.

TAB. I.

4.

Quem Mustelam Genuenses vocant. Illyrici *Pegorellam* dicunt. Belonius Aristotelis & Galeni *Callariam*, Rondeletius *Afellum* veterum esse opinatur. Trium interdum palmarum est longitudo, cruris humani crassitiei, colore ex livido inopacum abeunte. Duas in tergo *pinnas* gerit, minimo capiti vicina est, præter has alia ad caudam usque protenditur, ad latera utrinque una rotunda, ut & cauda visitur, sub quibus postremis crassiores ac carnosius quidam cirri bifidi conspiciuntur. Maxillæ ipsi mobiles. *Dentes* confusi in superiore labro, *maculam*, cordis figura, denticulis circumfultam, linguam albicantem & in cuspidem efformatam ostendit. *Branchias* distendit utrinque quatuor. *Interiora* si suspectes, sub *branchiis* *cor* delitescit triquetrum, bursâ suâ involutum. *hepar* pallidum ac ferè lacteum in tres lobos divisum, diaphragmati appensum. Sinistra eius pars, cæteris maior, vesiculam fellis oblongam admittit. *Lien* prægrandis sanguineus, gracilis, oblongus, pastorum instrumentum, cui cornutus *Musæ* nomen refertens, à ventriculo dependet. In *pylora*, triginta & aliquot apophyses numerantur. *Intestina* tribus revolutionibus circumflectuntur, priusquam rectum attingat. *Vesicula* quædam cæteris Afellis communis, gemino velut folliculo tergori coniuncta, commodum nationis usum exhibere creditur.

TAB. I.

5.

Tinca marina, propter corporis cum palustri similitudinem sic dicta, *Pesce sic* Irælis quòd passi ficus instar mollis sit, vocatur. Salvianus *Afellam* *Callariam* esse sed falsò, contendit. Vix pedalem mensuram excedit. *Corporè* est roto oblongo, latusculo, squammis minutis contexto, coloris cinericii. *Capite*, in quo duos lapillos gerit, lato & pressò. *Ore* magno, &

valdè denticulato. *Oculis* æreis. Ex inferiore maxilla appendix cum barba propendit. *Branchias* habet utrinque quaternas, & ad eas binas latiusculas pinnis, unam scilicet utrinque. Ex anteriore ventris parte pinnarum vice bini longi admodum atque rotundi cirri propendunt. In primo dorso pinnæ parva erigitur; post eam alia una nascitur, per dorsum totum ad caudam usque extenditur. Inferiori ventri singularis pinna abano orta, ad caudam etiam usque producta, subnectitur. Cauda in unam rotundam desinit. *Hepar* magnum & subalbidum visitur.

Caro concoctu est facilis, sed excrementitia.

## ARTICVLVS III.

## De Harengo, &amp; Lipari.

Piscis, quem Germani HAREN- aldreund.  
cvm fortè à Græcorum *μαρμαρίδι* mar. 3. 1. 10.  
quod falfamentum sonat, alii Halecem vocant, qui apud antiquos sit & vocetur, ignoratur. *Chalcids* marinæ seu Sardinæ quidam congenerem faciunt. *Thrisfis* sive Alofis nonnulli.

*Dorsò* est quodammodo czruleo, TAB. I.  
*ventre* albo falcato, *squammis* acutis 6.  
pertinaciterque hærentibus. *Branchiarum* scissuram, quia pro corporis ratione magnam habet, citissimè aqua extractus emoritur. Jeiuno duntaxat inrestituto instructum Albertus author est.

In Oceano Germanico circa Britanniam, Hiberniam, Scotiam, Norvegiam, Daniam inveniuntur, in Mediterraneo quoque capi, & Romæ, Massiliæ, Venetiis proflare falsò Belonius prodidit, formæ similitudine, quam cum Trisfis habeat deceptus. Puro aquæ elemento *Nutriri* voluerunt quidam, quod in aërè protracti in momento expirent. Magnis simul agminibus natant, & tanta ipsorum copia, ut ad c. m. coronatorum in singulos annos caputuræ precium ascendere Cardanus prodiderit: In terra sancta Oceanici maris Insula *IRM.* hominum vitam harengis sustentabant.

B

Cura

Cum per petulantiam unam ex capris vitgus cecidissent, adeo eorum numerus est imminutus, ut post illa vix centum ex eo quæstu vixerint. Lucent in aqua, ventribus versus summum æquor, obversis. Imò tantum de se splendorem, squammis maxime quæ circa oculos, emittunt, ut mare fulgurat videatur. Lucem emorientemori, credidere quidam, per aliquot post mortem superesse dies, quidam experti sunt. Semel anno teste Alberto pariunt.

*Caradenus in Britannia.* Mira de eorum natatu prodita sunt. Ptoæorum tempore ad Norvegiæ suæ quasi stativa habuerunt, nostro tempore Britanniam totam immentis exercitibus circumnatare. Circa solstitium æstivum ex alto Scotia littora petunt: inde Anglica littora adeunt, & ab Augusto medio ad Novembrem à castro Scarborough ad Thamefin capiuntur. Postea aliqua vehemētiore procella in Britannicum mare deferuntur, & in eo ad Christi natalitia piscantibus se offerunt. hinc Hiberniam utrinque petnantes, in Septentrionalem Oceanum, circumnavigata quasi Britannia, se transferunt. & ibi ad Junium occultantur, postquam fretificavere, redeunt.

*Fusus* ipforum in cibis, apud Septentrionales frequens. Recentes, muria conditi, & exsiccati; mensis inferuntur Solent & salina aqua macerati: salugine depolita, in craticula afficuntur. Consectam novo orbe volantium nubes. *Miserahorum*, inquit

*Thuan. Hi. 17.* Thuanus, conditio, quibus nec in mari natantibus, nec in aere volantibus, tutus unquam receptus, naturamque in utroque elemento novercam experti, eum ut se à perniciæ cognatorum piscinum afferant, in alius evolunt, mox ab avibus circumvolantibus rapiuntur: quarum si rostrum fugiendo evaserint, arescunt alii deficientes, rursus se in aqua præcipitant, & volando fessi, à piscibus in fessum glutuntur. Itaque mediam sortem eligentes plerumque in obvias naves involant, & præda hominum sunt.

*Plin. H. N. 1. 31. c. 12.* Liparis piscis à Plinio memoratus, à pinguedine, quasi *Liparis* nomen in-

venit. Capite terrestrem curriculum TAB. I. refert. Os ei parvum, sine dentibus, 7. maxillis asperis. virga à capite ad caudam satis lata. *Squamma* parva. *pinna* ad branchias & in ventre binæ. alia à podice ad caudam, alia à cervicis loco ad eandem continua sine aculeis.

Caudam duas definit. Adeo *pinguis* est, ut sub cute pinguedinē loco carnis habeat, altervatus, totus in oleum abiverit.

## ARTICVLVS IV.

*De Apro Scolopace & Monocero.*

**A**PER Rondeletii, quem ille cum Apro veterem eundē, se falsò ut Aldrovandus ostendit ponit, piscis est iquammosus, scēte rotundus, compressus corpore prædūro, & aspera veluti ac villota cute prædito, rostrum suis intar, oblongo & obruto, line dentibus. *aculeis* præacutis, duris, longis, rectis. setas inæquales esse diceret, qui mox à capite secundum dorsum longitudinem decurrunt. *Pinna* habet ad branchias duas, in ventre duas alias, multis firmitq aculeis & à se disjunctis constantes. à podice tres aculeos breves & acutos. Cauda in unam pinnam definit.

*Iconem porci supini Salviani tradit Tab. XXXI. 3.*

Qui Rondeletio SCOLOPAX, seu ASCOLOPAX est, hunc alii Elephantem, sed perperam. rostrum enim rigidum est: Cielnerus *Serram* Plinū quod radium caudam versus serratū habeat, nominat. Semper ferē parvum esse, exinde conicit Rondeletius, quod tres eiusdem magnitudinis ovīs distentos viderit.

Corpore est rotundo, Erythriini modo rubescens. rostrum prælongo, & gido. In dorso habet aculeum longū durum, præacutum, altera tantum parte serratum. denticulis serrā referentibus, utpote contiguis basibus quæ latiusculæ sunt. Cauda habet tenuem.

Caro ei substantia Pagro similis. boni succi & facili confectionis. Cum rarus sit, exsiccatu potius servatur, quam editur.

Monoceros Clusii, ob consimilem TAB. I. potius 10.

TAB. I. 3.  
Aldrovand.  
1. 3. c. 12. de  
piscibus.

TAB. I  
Rondelet. in  
Hist. Pisc.  
Gefnerus  
de Aquatil.

porus cum Sclopace formam, quam  
ut quod inter squammofos cenferi  
debeat; afpero enim corio eft: priori  
fubiungitur. Ex orientali India alla-  
tum Clufius ita defcripfit. Ab extimo  
ore ufq; ad caudæ pinnas, paulo lon-  
gior erat tribus uncias, mediõ corpo-  
re paulo plus uncia latus, &c.

ARTICVLVS V.

De Glaucõ veterum & Hip-  
puro.

TAB. I. GLAVCYS pifeis à colore cæruleo  
II. seu Cyaneo ita dictus, cuiusdam  
interdum à Græcis teftè Euftachio,  
dicitur, & bene à Glaucifca, cum ille æ-  
ftate lateat, fi Aristoteli & Ouidio  
credimus; hunc æftate & hyeme Da-  
moxenus Comicus in cibis laudet, di-  
ftinguunt. Mneftitheus apud Athe-  
næum inter Volarettanos, fcr-  
rarorum & carnivororum genera, cum  
ponit; Aristoteles squamofum facit,  
& paucas appendices fuperne circa  
ventriculum exeuntes habere adji-  
cit. Plinius auftro & irafcenti mari  
fimili colore, effe prodit.

Apud Rondeletium tres ipfius ha-  
bemus fpecies. Prior provincialibus  
Cabræ dictus, tribulitilis quandoq;  
corpore eft longo, ventre compreffo,  
dorso falcato, cæruleo, cute nitida,  
squammis vix apparentibus, ni cutis  
exficceat. ventre cadidiffimo, maxil-  
la afperis porius quàm dentibus mu-  
nitis. Statim à capite aculeos habet,  
quorum duo qui juxta anum funt, ve-  
luti in vagina conduntur. Aculeos  
pinna fequitur, ad caudam ufq; conti-  
nua, initio magna, maculâ nigrâ nota-  
tâ, fude brevis & tenuis, tenuibus  
quafi villis confans. Ad branchias  
pinnae aurei funt coloris, pro pedice ti-  
mam porius quàm formam fortitus  
eft. Ventriculum habet magnum cum  
uno appendice. Vefica felis intestino  
adhaeret. Splen parvus, caro candida  
& pinguis vifitur. Salviaus Amiam  
veterum effe credit, Jovius centri-  
nam quibndam videri dicit.

Alter minor, unde prævidetur apud  
Athenæum effe conjicit, feptem acu-  
leos in dorfo, ad caudam pedantes  
habet; à fuperiore branchiarum par-

te ad mediũ corpus linea tortuofa  
admodum dimittitur, hinc rectâ ad  
caudam protenditur.

Tertio quem finnofum vocat, quod  
linea à branchiis ducta, ferpentium  
corporis flexibus gradientium inftar  
tortuofa fit, dentes funt acuti, dorsum  
ex cæruleo nigrefcit,

Locum in petris etiam & arenis  
pafei Oppianus fcripfit. Numentus a-  
pud Athenæum, idem à jure præcipue infus, id  
id, per algas molles, fluctibus minimè a-  
giras & mufcum verfari, tradit. Ar-  
istoteles, & Athenæus pelagium fecit.  
Cibus quidem ipfi, catnes. Sed nec  
algam vel mufcum contemnunt. Unde  
Tarentinus efcæ ad Glaucos capien-  
dos præfcribens, partem ex mufco &  
farina, partem ex pifeium carne com-  
ponit. Fœtum fuũ ore, ubi metuit re-  
cipere, itetũ emittere, tradidere qui-  
dam: quia finnofus eft, de Glaucõ Ga-  
leo fumendũ id videtur: fanè folũ ex  
Galeis Acanthiæ fortis fuos propter  
spinam non recipere; author eft Ar-  
istoteles. Æftat & circa 12. dies nõ con-  
fpicitur. Plinius alibi dicitur. imme-  
mor, nunquam apparere fcripfit.

Vfurpius expectatus in cibis, five u-  
terum gerat five non. Caput tamen  
potiffimũ, apud Anaxandridem, So-  
radẽ Comicũ, inprimis in Olyntho,  
& Meotis captus effet, commendaba-  
tur. Euftrabius palmâ oculis radit ut  
ut fir, difficulter fi Tralliano & Mne-  
fithæo credimus, concoquitur. Con-  
coctus permultũ alimentum præbet. Ex  
jure fumpfit fœn Glaucum feu Glau-  
cifcum, copiam lactis mulieribus fa-  
cere, Plinius Author eff.

ARTICVLVS VI.

De Hippuro & Reverso In-

dicto.

HIPPURUS feu à fimilitudine egnæ  
caudæ, feu à jure præcipue infus, id  
id, & quod equi more feratur & fa-  
liat, ita dictus, aliis ab agnis fal-  
tus urinantibus fimiles exegere nobis,  
Dorioni & Epenero nequiffimo, à pinna Rondelet. an  
quæ à vertice incipit, in equi veluti  
crista erigitur, Hicelfo Hippuræ, Hi-  
spanis Lápugo, Gazzæ Equulus vocatur.  
Glaucõ colore inernitq; paribus fi-



*Quoy's Indian  
Squid*

Latish. Tab. III



*Thurston's*

*Thurston's*



*Pelago Caruba*



*Thurston's*



*Thurston's*


*Thurston's*

*Pelago*



*Thurston's*

*Amu*



*Thurston's*





I Oppian.

H. N. l. 9.

l. 3. s. 610.

H. N. l. 9.

c. 15.

Strabo.

Geogr. l. 7.

Aristotel.

H. A. l. 8.

c. 19.

Rondelet.

Plin.

H. N. l. 9.

c. 15.

Strabo.

Geogr. l. 7.

Aristotel.

H. A. l. 8.

c. 19.

Rondelet.

Plin.

H. N. l. 9.

c. 15.

Strabo.

Geogr. l. 7.

Aristotel.

H. A. l. 8.

c. 19.

Rondelet.

Plin.

H. N. l. 9.

c. 15.

Strabo.

Geogr. l. 7.

Aristotel.

H. A. l. 8.

c. 19.

Rondelet.

Plin.

H. N. l. 9.

c. 15.

Strabo.

Geogr. l. 7.

Aristotel.

H. A. l. 8.

c. 19.

Rondelet.

Plin.

H. N. l. 9.

c. 15.

Strabo.

Geogr. l. 7.

Aristotel.

H. A. l. 8.

c. 19.

Rondelet.

Plin.

H. N. l. 9.

c. 15.

Strabo.

Geogr. l. 7.

Aristotel.

H. A. l. 8.

c. 19.

Rondelet.

Plin.

H. N. l. 9.

c. 15.

*Locus* Thunnorum varius pro-  
prietate videtur. I Oppianus, qui eos  
piscib. pelagii annumerat, ex Oceano  
in mare Mediterraneum, cum ve-  
read sobolis propagationem instiga-  
tur, venire, ideoque tum plurimos in  
Tyrreno & Iberico capi, auctor est  
mense Maio Xiphiis cogentibus ir-  
rumpere, Jovius adiecit. Pelamydes  
æquora furio aut paludi vicina inco-  
lete, ideo in Pontum ad dulciora pa-  
bula gregatim intrare, ex Plinio  
habemus, ibidem, ut & in Mæoticis pa-  
ludibus nasci, \* Strabo retulit. te-  
pore gaudere ideo per summa maris  
natare, aliquando flumina subire, ex  
Geogr. l. 7. Aristotele dicimus; Visos qui Aga-  
thopoli ad pontem usque, qui aliquot  
millib. passuum à mari distabat, con-  
scenderent, & Rondeletius prodidit.  
sed & in Rheno, Nido, Pado, Platina  
scripsit, in algosis quibusdam locis.  
Gaditanis extra Hercules columnas  
sub folano ventro eò delatis, ingenti  
numero, magnitudine & crassitie in-  
credibili, occurrente, Admiranda A-  
ristor. p. vèdiant. Vix credidit Thyn-  
norum multitudinē in Indico mari  
tantum, ut Magni Alexandri classis  
haud alio modo, quam hostium ac-  
cie obviam contritū agmen adversa  
fronte direxerit q. apud \* Pliniū legi-  
mus. Græci scriptores enim Cete  
& Phyliteres fuisse innuunt. De eo-  
rum circa Byzantium & captura &  
mora ita q. Strabo, &c.

*Cibus* eis aliquando r. alga; sæpè,  
circa Hispaniam imprimis, (ex ante-  
riore \* ad columnas delati pelagi-  
esca deficiente macerantur) glandes  
ex quæcibus ad mare nascenti-  
bus / delatæ quibus vehementer  
pinguescunt. & ex harum ubertate,  
ubertas Thynnorum colligitur: ut plu-  
rimum caro. Tepore sæturæ & quic-  
quid attigerint, liguriunt. quin &  
partu soluto, ne propriis quidem par-  
cent natis, sed læti tempore veris a  
Ora vorant subire, & lacerant sub  
dentibus atros, aliquando præ pingue-  
dine tumpi & Aristoteles auctor est.

*Fisam* ad biennium duntaxat pro-  
ducere, quod & Plinio ex Aristotele  
placuit, vix verisimile videtur.  
Ad tantam enim excrescunt magni-

tudinem, ut xv. talenta pendear, caudaque duo cubita seu ut apud  
Aristotelem extat, quinque palmum  
latitudine, expleat, & visi capi, quos  
corporis magnitudine, squamarum  
crassitie & corporum duritie bien-  
nio multo provectiores fuisse. ferri  
oportuerit.

De Generatione habemus, Thun-  
nos coire mense \* Februario post idus  
Junij initio parere a semel, & quidē b  
in Pōto Thunnos, bis credi, quia par-  
tim tempestivus partim cordus eius  
fecerit est. prius soboles mense De-  
cembri ante brumam exit, posterior  
vere. Ova edunt quasi in uterulo. Ex  
his sunt, quas Scordulas vocant, By-  
zantijs Auxiadæ quod paucis diebus  
augeſcant.

Exeunt Autumno cum Thunnis  
simul, verno autem tempore repe-  
tunt, jam taçæ Pelamydes. Quan-  
tum ad animales functiones, concessit  
& istis singularia quædam Natura.  
Dromades esse, seu ut Gaza reddit  
cursores, ex superioribus cognosci  
potuit. Non vagantur tamen a bru-  
ma ubique deprehensi usque ad  
æquinoctiam, ibi hybernant. Ex Pon-

to exiunt lævam tenent, & Aquilo-  
nem operiuntur, ut secundo fluxu  
exceant. ingressi i eundem, ad dex-  
tram flexuntur, quia dextro oculo  
plus ætenuat, utraque natura hebe-  
te. Eadem b debilitas in causa, quod  
ad fixum illud miri candoris, a vado  
ad summa perlucens, quod in Europæ  
Thraci Bosphori, quo Propontia  
Euxino iungitur, in ipsa Europam A-  
siamque separantis freti angustis,  
juxta Chaleedonem in Aliz littore  
visitur, exhortescant, & sic repente  
territi, adversum Byzantijs promon-  
torium, ex ea causa appellatum Auri-  
eotum, præcipiti perunt agmine. No-  
ctu proficisci & vestigium Am-  
phyliti vatus apud e Herodotum ora-

culum, & nummus a d Bellonio il-  
lus, in quo altera parte spica, altera  
Thunnus cōspiciebatur, & supra hūc  
Luna cū inscriptione PHILIPPENZE,  
innuit. nec de nihilo est, quod Plinius,  
postquam o. dixisset, capturam illo-  
rum a vergiliarum exortu ad arctū  
ri occasum durare, reliquo tempore

B 3 hybet.

hybernolaterē in gurgitibus imis, nisi tepore aliquo evocatos, aut plenilunius, adjiciat. In natando figuram cubicam, si gregatim vagantur, servant, atque sex lateribus cōprehensī, soliditatem ex semetipsis constituunt. Ad promontorium g Bubonicum, maximi, suum instar, soli vagantur. alii more luporum bini proficiuntur. nonnulli more caprarum, gregatim pascuntur. Ex oriente eanacula, in Euxinum natatē contendunt & marinis fluctibus, & fervidē radiato sole calefactibus, inter se velut contexti, confertis turmis sese invicem opacant. Dormire h in imis gurgitibus, sub saxo aut litore abdiros, Aristoteles prodidit; & quidem tam profunde, ut ne jacti quidem fuscini, moveantur. Sub Canicula exortum cestro exagitantur. Hæret ille ubi cutis tenuior, sub pinna, & ita miseros divexat, ut sæpe in terram derivantes saliant, sæpe in naves se conjiciant.

De *Sympathia* & *Antipathia* non est quod multa dicam. Dicuntur Cephus habere comites, qui carunculas pisculorum, à Thunnis disceperunt, aquis innatantes, depascuntur. Cum gregatim præter Italiam adit elabuntur, à Sicilia prohiberi, in majores ineunt belluas. Majo Mense à Xiphis ex Atlantico Oceano in mare mediterraneū pelluntur. Non aliter ab his gregatim in fugam agi, quàm ovium greges à lups Mathiolus auctor est. De captura Thunorum agere aliterius loci est.

*Pompeius* repere in *Cibis*. Olim membratim exi à eervice & abdomine (vāq̄ exarctat Arhenzus vocat) commendabatur, arque elidio (elidia Thyum Festus; Perimen ex Navio Perimen piscinū, quod est inter duos armos ad pectus; claviculas Medici vocant) salitis, Omotariehi nomen impostum est; recenti duntaxat, & rum quoque gravi rusticæzera parte plenis pulpamentis allervabantur. Melandria vocabantur, cæcis quercus assulis, similima. Villissima ex his, quæ caudæ proxima auge dicebatur, quæ pingui carenti hinc amirum nomen, probatissima, quæ faucibus, Pelamides in apolectos, particularim

que confecti, in genera Cybiorum (sic dicuntur seu salsamenti frusta quæcunque in formam mōstis dissecta; vel quæ ex dorſi partibus cerviciclidloque proximis) dispertiebantur. Alexius caput, cōmendabat, caudam Antriphanes. Falconius Hetruscus eruditioris gulæ ganeo; novum & supidissimum obsonii genus ex his commentus est. Arhenzus *Expositio* (intritum hoc, ex aliis & aliis condimentis) aliis piscibus prætulit. Alii salsamenta, quæ *Somaia* seu *divina* potius, quàm recentis piscis quamlibet partem præferunt. Sunt quippe Xenocrati apud Orbiſiū stomacho inepti, mali succi, flatulenti, ad excernendum difficiles. Galeno, duræ carne præditi, & insuaves. Arheſtratus tamen nobilem Thunum circa Byzantium, Caryſtum & Sieliamp præstantiorem circa Cephalē & Tyndatidem oram; præstantissimam circa Hipponium Italiæ, nasci, citra Samum ingentem, & deorum coavis viis dignum capſi, prodidit.

Præbent & *in Medicina usum*. Sanguis, in fel, & jecur, si recentia siue servata, vim pūlothri obtinent. Non pubesciturum, qui in pueritiâ is illius est, & *Alanus* affirmat. Omotariehius & largius sumptus, Presteris serpentis venenum retundit. Cybiorum cinis, cum melle ad Condylomata confert.

## ARTICVLVS II.

De *Pompilo* & *Amia*.

**POMPIIVS** seu *amīa* (transvehendo, fabulantur enim Pompilum hominē a porrito, vel ut Athenæo placet a porritore, vel ut Apolline\* quod Ocythoen puellam trajecisset, in sui nominis piscem b Athen. transmutatum) seu quod navigantes in alco mari ad continentem usque comiteretur; aliis scæter piscis, aliis Thunnos\* reputatur. Athenæus d Pelamydi similem & varium esse inquit. Rondeletius pro eo eundem, piscem squamis carentem, in dorſo varium & maculosum, in quo à branchiis ad eandem lineam magna

TAB. III.

S.

A. H. A. 15.

A. H. A. 15.

A. H. A. 15.

A. H. A. 15.

A. H. A. 15.

A. H. A. 15.

A. H. A. 15.

A. H. A. 15.

A. H. A. 15.

A. H. A. 15.

A. H. A. 15.

A. H. A. 15.

A. H. A. 15.





extubrat. *Corium* caudam versus, ducta manulæve est, os versus asperum. *Squamme* sub cute latent plurimæ, *adepti* in dorso sub more residet. Utraque *maxilla* rostrata est, superior magis ossæ, durior, aliquando bicubitalis, (*Athenæus* *f* totius corporis magnitudini æqualem esse, scribit) inferior brevior & triangularis, plerumque illa habet se ad totam magnitudinem ut tria ad decem, ista ut unum. *Gladius* *g* est ferro acurior, sed extrinsecus pisce corrumpitur. Gellius eius mucrone dura excavavit saxa. *Dentes* ipsi falso *h* *Ælianus* tribuit, non admodum euvros, nec admodum inanes. Nullos enim habet, corum loco ossa oblonga & aspera in palato resident, absunt autem in tanrum gladium materiæ, quæ dentibus cedere debuerat. *Oculi* ipsi orbiculati prominentes, & ante eos foramina. *Branchia* *i* octonæ & duplices, *tergum* ex cinereo nigricans, & serici instar splendens. *Pellis* tenuissima, *venter* argento micans. *Fellis* vesicula intestino committitur.

*f* *Arben.*  
*Dipnet. l. 7.*

*g* *Oppian.*  
*Habent.*  
*l. 2.*

*h* *Ælian.*  
*H.A.L. 14.*  
*c. 23.*

*i* *Aristot.*  
*H.A.*  
*l. 2, c. 13.*

*k* *Plin.*  
*H.N.*  
*l. 32, c. 17.*

*l* *Ælian.*  
*H.A.L. 14.*  
*c. 23.*

*\* Ælian.*

*l. c.*  
*m* *Oppian.*  
*Habent.*  
*l. 2, v. 509.*  
*n* *Plin.*  
*H.N. l.*

*Oppian.*  
*l. 2, v. 509.*

*o* *Ælian.*  
*H.A.L. 9.*  
*c. 40.*

*Degunt* in mari, & *k* raro adeunt littora. Copiosius verò juxta Scyllæum promontorium apud Siculos & Zophyrium quod Italix extremum est, hodieque Spartiventum à nautis nuncupatur, capiuntur. Tribuuntur ramen ab *Æliano* *l* & Danubio, sed & in Dania in lacu Sueriensi notissimi dicuntur.

*Præstant* *\** piscibus, quos rostri incurfu interficiunt, ne prius comedunt, quam speculo *m* transxerint. Exortu *Caniculæ* *n* divexantur ab oestro seu asilo (Animal est parvum, scorpionis effigie aranei magnitudine) tanroque instantur dolore, ut in naves sæpenumero exiliant. Balænam exhorrescunt, eamque conspicati, gladium suum in terram, aut obvium quemcumque vadi locum impingunt, sic infixæ capite sese continent. Nec s tamen sua ignorare arma credendum. Utitur rostro tanquam gladio. Sæpe in mari Indico validissimas Lusitanorum naves, ad sesquipedum aliquando perforant. Visus in mediterranea in juxta navim na-

rantem, medium rostro discidisse. Græcicum sermonem ab Italico distinguere, illum minime reformidare, ad hunc diffugere, Joannes Marius Cætaneus, qui Locrensi in littore Xiphianum piscationi interluit, protulit, & Brutii testantur.

*V* *su* in cibo rarus. Carne enim est arida, & difficulter concoquitur. *Archeostratus* Byzantinum commendat.

#### ARTICVLVS IV.

#### De Remora & Cetorum

#### Duce.

**D**E REMORA, quæ *Echeneis*. *Remi-TAB.* *ligæ*, & *Naufragæ*, dicitur, vix quicquam certi scribere possum, adeo Authores in diversa scinduntur, tria tamen occurrunt, descriptio, facultatis naves retinendi, & causa. Variè à veteribus describitur. Quibusdam est parvus piscis, assuetus petris. Quidam *p* eum pedes ex Aristotele habere opinantur, ita posita pinnarum multitudinem. *Murianus* muricem esse, latiore purpuræ, neque aspero, neque rotundo ore, neque in angulos prodeunte rostro, sed simplice concha, utroque latere sese colligente, quibus in hærentibus, plenam ventis stetit navem, portantem nuncium à Perandro, vrcastrarentur nobiles pucti, conchasque quæ id præstiterint, apud Gnidiorem Vencrem coli, prodidit. Trebius Niger pedalem esse, & crassitudine quinque digitorum credit. Tres eo nomine celebrari, haud perperam inde colligas. Nec inter recentiores de eodem convcnit. *Rondeletius* inter ignotos reponit. *Gillius* nunquam se piscem, vel piscatorem qui ipsum vidisset vidisse proficitur. *Redonius* est totus ex ossis, mollis, lubricus, coloris herbacei, inferiore parte planus, dorso repandus, in gibbo convexus, limacis rubri testa carentis effigiem referens. Eidem ad spatam longitudinè & manubri ligonis crassitiè plerumque excrescit, circa saxa in mari, sed lentè serpit, & iter cornibus præterit, mucaginemque ut limax serpendo relin-

relin-

1  
*Gladus.*

*Schwerdtfisch. Meer Schwert.*

2

*Pomora. Schnitzalter.*

3

*Labrus. Dorschfisch.*

*Myxichthys.*

4


*Serpens Marinus. Meer Schlang.*

*Serpens Farnus. Meer Schlang.*

*Conger.*

*Meer Aal.*

7





relinquit. In Corcyra frequentissimè è verriculis extrahi dicitur. Quam in Imperati Neapolitani Exoticorameio Neapoli vidimus, sic describitur. Capite supino acetabula habet similitudine cirrutorum sive acetabulorum Polypi, quibus naves magnosque acetaceos pisces apprehendens pertinaciter hæret. Cursumque eorum remoratur, & pro arbitratu suo tetinet. Ad magnitudinem corporis Icon expressa est.

Remora Aldrovandi color toto fere corpore ad violaceum inclinat. Latere candicant. medium corpus subviridis linea interlecat. Cauda, quæ unicam pinnam degenerat ad cæruleum vergit. Rostrum canino simile, nisi inferior maxilla superiorem longitudine superaret. Pinna toto corpore sex. Simillimus Embæ in Frisia pisciculus repetus est, referente

q Gesner. in  
Hystor. Pis-  
cium,

Gesnero, quatuor digitorum longitudine. Cuticula sine squamis tenuissima. capite pro corporis magnitudine maximo. Oculis parvis, reliquo corpore turbinato. sub mento quiddam habebat figura acetabuli. Cavitas cum digito premeretur, ita adhætebat ut circumferri posset. Pat

facultatis navigia retinendi ratio. Ruant ventre licet, & sæviant procellæ cogitare navigia secundum Plinium (verba eius sunt. Ventum est ad summa natate, &c.) Plinio Oppianus adstipulatur. Cheremenianus Trallianus

Plin. H. N.  
l. 32. c. 1.

apud Plutarchum impedimentum & moram navigationi inferre, & ut tardius navigia ferantur facere asserit ille puppi, hic lateri navis, Oppianus \* carina adhærete scitibit. Petrus Melara Cardinalis Turonensis

Pl. 2. Sym-  
pos. probl. 7.

tritem cum è Gallia Italiam mari peteret, ab eodem (nisi forte de Lampetra id accipiendum sit) in medio cursu retentum fuisse. Kircherus pro

\* Kircher.  
l. 3. Artis  
Magnet.  
Oppian.  
Hærent. l. 1.  
p. 221.

fabulosis omnia ista habet. Nunquam talem à Plinio ad tempora nostra effectum notatum, etiam totus orbis navigationibus lustratus sit. Non posse potentia majus à minore vinci. Nul- lum magnetis fructum, quamvis efficacissimum, exactissimeque libra- tum aliud majus & gravius al- licere. Frequenter in freto Siculo

ob contrarios æstus, unam onera- tionem extensis velis, secundo vento in mediis fluctibus hætere, vicinis cur- sum tenentibus.

De canis haud cettiora occurrunt. Rondetius \* Aristotelis respon- so, quo cur clavus cum sit parvus, & in extrema navi, tantum possit, ut ab exiguo remone & hominis unius vi- ribus, magnæ navis moles movean- tur, exponit, innixus, minus potius ad contactum Remoræ moveri, quam listi ostendit. Idem de Plutarcho dicendum, dum navim multo musco & alga obductam, aquam obrutius secare, & tardius moveri, hæc Echeneidem adhærete, sic tarditatis non causam, sed causæ accedens esse, pro- dit. Fracastorio y latentis scopuli Echeneidem indicium esse, navi ita ut avelli nequeat propter merum va- culum adhærescere, placet. Scaliger z Plinium secutus, ad occultas quali- tates confugit. Movendi quibusdam esse potestatem, contrariam aliis. Nemini comperta in igne caloris principia. hunc \* Lonicus sequi- tur. Suarczius \* influentias cele- stes addit. nec Basilus b & Ambro- sius c renuunt. Peculiaris d Kecker- manni opinio. Viscosum & frigidissi- mum humorem de se fundere putat Echeneidem. hoc aquam circa gu- bernaculum congelari, ipsum quasi immobile reddi. Vix quicquam veri- simile.

\* Rondel. de  
pisc. marin.  
l. 1. p. 5. 18.  
u Aristot. in  
Mechanicis  
quest. 6.

\* Plutarch.  
Sympos. l. 2.  
probl. 7.

y Fracastor.  
l. de Sym-  
ptom. c. 8.

z Scalig.  
Exer.

a Lonicus.  
l. de Aquæ-  
tr.

\* Suarcz.  
Dissur.

Metaph. 18.  
b Basilus 8.

Hexam.  
humid. 7.

c Ambros.  
Hexam. l. 5.

c 10.  
d Keckerm.  
in probl.

naucis.  
e Plin. H. N.

l. 22. c. 11.  
T A B.

IV. 4.

Quantum ad usum alii è Græcis è lubricos partus atque procidentias contineri ad maturitatem alligato eo prodiderunt: alii sale ad servatum ad alligatumque, gravidis partus sol- vere, ob id alio nomine Odynolyon- tem appellati. Amatoris veneficii infamem esse, indiciorum & litium moram, inter falsa repono.

Cetos ducem habere, tum quod mole corporis oppressi tardè moveantur, & faciliè in cœnuni, brevè & angustias impingant: tum quod pa- rum acutè cernant, f Oppianus g Alianus & alii auctores sunt. desti- tutas, ad tetram delabi & perire, Plu- tarchus & Claudianus prodidit. Plinio, nescio quare Musculus, quo nomine Balenæ

f Oppien.  
Hærent.

l. 3.  
g Alian.

H. A. l. 10.  
c. 6.

C partem

partem Oppiano & Aristoteli dici  
falso opinatur Bellonius, Hermolao  
Julus, alius *Mylicetus* dicitur. Longus  
est, colore albi, capite longo, angu-  
sta cauda, si à liano credimus. Aldro-  
vandus i dodranalem, rostro acuto,  
capite przlongo & plano, cauda an-  
gusta & tenui, toro corpore aspero,  
squammis experte, sed osseo corio  
recto, proponit.

Fabulofum ne id, quod Rondeletius arbitrat, an ambiguum, quod  
 \* Scaliger, natura talem dedit, an  
 amicitiae adscribendum sit, non  
 disputo. *Amicitia exempla sunt Balani,  
 musculus, quando prae graui superciliorum  
 pondere obrutus, cum oculis, infestantia  
 magna vada, praenatis demonstrat, oculorum  
 quae vice fungitur, apud & Plinium  
 legitur. Agnitum, ote vclut anchora  
 in Balani recipi, in faucibus dormire,  
 hoc quiescente, illas non moueri,  
 hoc gubernatore, destituta, ad  
 terram delabi & perire, Plutarchus  
 & m. Claudianus prodidit.*

## ARTICVLVS V.

*De Serpente Marino.*

TABLE

IV. §. 6.

TABLE V.

1.

**2 P.M.**

H.N.f. 32.

6. 1.  
1. 2.

D. J. Nisbet  
et al. 1992

6.28.

с Архивом.

H. A. L. z.

c.15.

d Angler, 2014: 10.

H.A.L.B.  
cult

• Film.

H.N. 1.6.

6.13.

f. Solenites are

**Polybut.**

© 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

People's...

**S**erpens marinus, a Plinio *Draco marinus*, *Æliano* ὁ μὲν & *Hydrus* *Aristoteli* ὁ φασὶν θάλασσαν & dicitur.

Notabilis ipſorum quibuſdam locis magnitudo. Eius ſunt in Africa, ut boves d' infeſtorum, & tritremes apprehenſas evertant. Circa Norvegiam ducentorum pedum longivivi, tantas aliquando ſupra mare ſpinas, erigentes, ut navis per unam tranſire poſſit, ſi Olao Magno ctedimus. Conſpiciunt in ſinu Codano quidam flavicoletis x l. pedum, innoxii, niſi irrita vens. Apud inſulas æquaſdã ante Perſidem, vicenum cubitorium, terruere claſſem. Tales in f Carmaniz promontorium & Arabiam circa treſ inſulas è mari egrediuntur. Baraces ſinus g navigantium pernicioſus, quoad eum è pelago tendentibus prægrandes & nigri ſerpentes occurrant. Maximi cuiuſdam deſcriptionem & in Virgilio b inventes. Iſ de quo hoc loco, terreſtri ſimilis eſt,

capite & corpore congruunt <sup>ἡμωσύνῃ</sup> Aristotelem sequimur. Si Salvanum, habet dorsum subrubrum; latera subflava, ventrem sub albidum. Ronds etiam eū triū cubitorū facit, corpore fulvo, quā Anguilla rotundior, colore quē & skeleton apud Aldrovandum exhibebat, capite congruū, oculis flavescētibz, ventre & rostro cinereis, maxilla superiore longiore. Dentes murzēz modo, sed rariorez habere, addit: pinnulas ad branchias veluti Anguillz duas. A Castelleto ad Aldrovandum missus, colore erat congruū, sed ad cæruleum inclinante. Ore intra rubido, dentibz acutissimis instructo, sub mento apophysibz barbēz modopropendebat, altera ad ani orificium.

*Maris est incola : nec tamen* in mte  
*επιθαλάσσιον*, seu profundissimis, *h. tristes*,  
*virgibus nascitur* : Qui in aquis flu- H.A.L.:  
*uatibus reperiuntur*, Hydrifunt 6.14. ex  
*toto cælo ab istis differunt*. Degit Sest. edit.  
*tamen aliquando & in terra, ut terre-* 17-  
*stris* in quædam species. toto fere die  
*in mari vivit*, somni causâ in terram  
*egreditur*. Vehementior est congruo, in mte.  
*επιθαλάσσιον* ita placet vertere. Captus in observat.  
*atque immisus in arenam, caver-* n Plin.  
*nam sibi rostro mira celeritate exca-* H.N.L. 9.  
*var.* 6. 37-

Pugnare aliquando in Turcia tē-  
pore Bajazetis à solis ortu ad occasum  
cum terrestribus ; Occisorum utrin-  
que octo milia numerata sunt. Aqua-  
tici concessere victoriam.

Comedi quidē potest : sed propter  
similem cum terrestri formam reji-  
citur.

## ARTICVLVS VI.

*De Congro & Ophidio Pli-  
nij.*

**C**ongri, qui Græcis à γῆρι, quod est  
voto; ἀπὸ γῆρι \* γὰρ τὸν πάλαιον αὐτὸν \* Ritters-  
παλιῶνα, ἀγγεῖον & γύγγιον \* alius Gryl-  
lus, quibusdam à corporis & coloris i. habens.  
similitudine, *Anguilla marina*, dicitur, *Oppian.*  
duogenera; *Pinus Album* & *pelagium*, *alterum* *Nigricans*, quod haud  
rectè vel litorale vel pelagium dixe-  
ris.

a Aristot.  
H. A. L. 8.  
c. 13.

ria ambigit enim ut scribit a Aristoteles: recentiores unum duntaxat, in quo omnes notæ congre à veteribus attributæ, reperiuntur.

\* Scaliger.  
ad Arist.  
H. A. L. 2.  
c. 16.

Longus est & lubricus seu lævis, sæpè in quatuor aut quinque cubitorum longitudinem excrevit. Visus à Scaligero quem utraque manu nequissus amplecti, ut non multum multos in Sicyone quos homo vix ferat;

b Eudox.  
L. 6. de rer.  
varietat.  
apud A.  
then.  
c Strabo  
Geogr. L. 3.

aliquos plaustrum magnitudine capi, b Eudoxus; circa Carthagem in exterioribus locis augeri supra minarum octoginta, c Strabo prodiderit. Toto dorso rubet, ventre & lateribus pallescit. Binis naræ pinnis. Linea nigra in exteriori parte membranaceæ pinnae per dorsum extensa conspicitur. Oculi sunt Anguillis longè majores. In extremo rostro duo brevia curacea corniculagere. Dentes habet parvos pestinatim coeuntes, branchias utrinque binas, pinna harum rubent, quæ verò corpus ambit fusca est, & ad exruleum inclinat. Interiora si spectes, Gula d ipsi exigua, qua alii pisces carerent, fellis vesica ab epate pendens.

d Aristot.  
H. A. L. 2.  
c. 13.

In nullo non degunt mari, fluminibus imprimis f vicinum si sit. nam & hos juvenes subire solent: ne de paludibus dicam, quarum illustis alumnus à Matrone g Parodo vocatur. In terram egredi non absolum, cum idem & de serpente marino superius dixerimus, & de Anguillis ex Aristotele colligatur. Vescuntur pisciculis, ideò vehementiore spirante vento, quo tempore numerosiores pisciculi mare intrant, pinguescunt.

h Oppian.  
Haben.  
L. 2. v. 113.

Coitus eorum Anguillar. coitui h comparatur, non quod ex simili spumæ sanie in arena obruta nascantur; sed quod circumplexu mutuo supinar. partium coitum petagant, quod Scindus & pinguet tunc tunc à solenne est: Ova \* longa serie inter se protensa; pinguedine ita obducuntur, ut vix appareant. Si in ignem coniecctis, ab itin vapore pinguescunt, ova exiliunt, & elisa crepant.

i Aristot.  
H. A. L. 5.  
c. 4.  
\* Aristot.  
H. A. L. 6.  
c. 17.

k Aristot.  
H. A. L. 8.  
c. 13.  
Plin. H. N.  
L. 9. c. 16.

Latent hyeme, & nec, eadem, præterquam statis diebus paucis, & indecm semper, capiuntur. Gregales ne sint, an solitarii ambigitur. Causam

l Mnesitheus præbuit. Modò gregarios esse posse dicit; modò nec inter hos nec inter illos recenset.

l Aristot.  
L. 2.

Inimicitias cum Polypo, Locusta, & muræna exercet. Polypum devorat. Neque enim oblatvitare ac eodem apprehendi potest. A Locusta laceratur, licet valido sit corpore. Ipse & Muræna caudas inter se prærodunt.

m Aristot.  
H. A. L. 8.  
c. 24.

n Plin.  
H. N. L. 9.  
c. 62.

Vsui ipsius apud Græcos in cibum laudatus, inprimis si è Sicyone adferebatur, italum tantum cæteris præcellere putabant, quantum pinguis Thyennus vilissimis coracinis. Tandem denique æstimatus, ut Nereus quidem Chius Diis cum elixasse legatur Dorion verè opophagus, cum puer optimor. piscium nomina dicere iussus, Congrum inter cæteros recensuisset, piscium se non Deorum nomina dicere iussisse, reposuerit: Nunc in vili admodum sunt, apud omnes, Hispani excepti. Angli pullos cum aceto & linapi comedunt. Congener congris est, qui in mari circa Canibales infulas capitur. Cute intensè viridi & elegantissimè variegata, ridu patenti, & dentibus acutissimis. Caro detracta cute candidissima est; sed qualitatatis adeò virulentæ, ut sæpe in mortem gustantes coniciat.

De Lact.  
Ind. Ovid.  
L. 1. c. 18.

TAB. V.  
2.

Ophidion Plinii, quem Salvianus & Bellonius cum serpente marino confundunt, quemque Tragum Oppiani quidam esse opinantur, duorum est apud Rondeletium generum. Pnum est barbarum, quod penna barba à maxilla inferiore pendente instructum sit: Alterum imberbe & flavum, de cætero superiori simile. Bellonius palmum non excedere, pelle lubrica esse, pinnas carnosas habere, integram in gyrum caudam ambire, & multa nigredine perfundi, restatur. Linguam habet parvam, acutam. Corytrigonum ruberrimum, hepæ ad sinistram latus exportectum, stomachum oblongum, pylorum permultis apophysibus circumdatum, à quo tres intestinorum revolutiones ad anum percingunt, lienem rubrum, & oblongum. Cætera ad ipsos Ascellos accedit.

## ARTICVLVS VII.

## De Muræna.

TAB.  
V. 3. 4.a Enflach.  
in Hamer.  
b Macro.  
Saturnul.

**M**uræna, quibusdam *Draeo mari-*  
*nus*, quod corporis specie serpe-  
tes æmulatur, Græcis *μυρæνα*, *εμ* *εγνα*  
& *εμυρνα* (multæ n. dictiones quæ ab *εμ*  
incipiunt, olim per *εμ* scribebantur) a  
iniquitate vel iniquitas, quod, b præ pin-  
guedine in summa aqua fluitent, & à  
sole terrefactæ, qua curvare se ne-  
queant, mergi non possunt; quod ta-  
men de optimis quæ Latini *Flutas*,  
Græcis *πλωται*, quali navigabiles vo-  
cantur, potissimum sumi debet, quæ-  
vis & *rhadas* pisces *Flutas* Gaza ver-  
tat, dicitur.

*Externa* si attendas, ad duorum cu-  
bitorum longitudinem accedunt;  
circa Carthagem locis exterioribus  
minarum supra octoginta reperiri, c  
Strabo, ad decem libras augeri ne-  
que maiorem se vidisse, Salvianus,  
prodidit. d Longus est, lubricus seu  
lævis, & serpentis speciem referens.  
Cutis quæ e tenuissima diversis colo-  
ris, qui nec in omnibus sibi respōdet,  
seu quod alius vivis sit, alius in mor-  
tuis (sanè Plinius, s in Gallia septen-  
trionali, Murænis omnibus, in dexta  
maxilla septenas maculas ad formam  
septentrionis aureo colore fulgere,  
duntaxat viventibus, pariterque cum  
anima exingui restatur) appareat.  
Mæ paucioribus maculis distingui-  
tur, & quibusdā veluti stellis cōspē-  
gitur, *femina* plurib' vcluti aureis gut-  
tis, quas Ovidius auraras notas dixit,  
variatur: g Bellonio; eidemque ut  
plurimum fulvescunt. Rondeletius  
colore fusco, idēd *αλμυρ* ab Oppiano  
dici; Massurius maculis luteis & ni-  
gris; Gillius alium colore subnigro,  
luteis alium, albo nigris quasdam co-  
lore distinctas, prodidit. b Aldrov.  
fœmina varia est, blattariz floribus  
similimis, hinc ardens Ovidio dicitur.  
*Caput* habet rotundum, tenue,  
& acuminatum, nictum *orū* latissi-  
mum. *Dentes* acutissimos, serratos,  
solidos, non in maxillis solum, sed &  
in ima quoque faucium parte dispo-  
sitos. Catnolum *palatum*, quod linguz

loco obtinuit. *Maxillam* superio-  
rem aquilinam in cuius extremo duz  
sunt breves apophyses seu verrucæ  
*Oculus* magnos. *Dorsum* cultellatum,  
ut Pytheas ait, hoc est, spino acuto,  
& pinnulam ferè constituente. *Pin-*  
*nas* & *branchias*, adimitipiss; Plinius,  
sed malè. Quarernas enim has ha-  
bent. Sed k parvas, utpote ex quater-  
nis minutis osculis, sive foraminibus  
paulum modo se exferentes; seu ut l  
Aristoteles dicit, non *διπλοειπρας*, id l  
est explicatas, sed præter alior. pi-  
scium morem confusas. Illas non ad  
latus sitas, neque tales ut natare  
possint.

Quantum ad *Interiora*, carnem ha-  
bet candidissimam, sub cute obliquis  
& transversis ductibus dispositā, vari-  
is musculis hinc & inde abeuntibus  
munitam, multis spinulis brevi-  
bus & recurvis conspersam. *Hepar* sub-  
fulvum, oblongum, stomacho incumbens,  
longiusculum; *fel* Cyaneum,  
magnitudine avellanæ, quod Bello-  
nius jecoris Aristoteles intestinis in- m  
hære, à jecore meatibus quibus. l. a. *Esoph.*  
dam dependere, scribit. Haber & lie- c. 15.  
nem oblongum nigricantem, stomacho  
annexum. *Ventriculum* longum,  
à cuius medio intestinum sine spiris  
ad anum protensus, iuxtaque cum  
cellulæ, instar intestini coli, habentur.  
*Ventrebræ* quæ minus frequentes,  
sed oblongiores quàm Anguillæ, pro-  
cessus insunt transversus actursum spe-  
ctantes præter aliorum piscium mo-  
rem Aristas Scaliger \* vocat, quæ si \* *Scalig. ad*  
corium inversum detrahatur, cum eo a. H. l. 2.  
simul omnes educuntur. In Octophag. c. 16. l. 108.  
qui latus, & à rictu incipit, orificio,  
hamuli leviter uncinati, ad gulam ci-  
tra fauces spectantes, linguz vicem  
supplent, ac statim à branchiis folli-  
culus teres, spinæ incumbit, statum  
rigidus, commodioris natationis usum  
præbens.

*Vivunt* quidem in mari, circa pe-  
trosa n loca; videntur tamen & flu- n Syno.  
viorum ostia petere. In Oceano ra- Epif.  
rissimæ sunt. e Tartariz & è Siculo p o Clem.  
freto, unde ad piscinas Romæ ac- Alex. in  
cersebantur, antiquis in pretio fuere. *pedagog.*  
minus ex Tarsensi & Carpathio mari p *Varro de*  
probabantur. Exeunt & in terram fre- R. R. l. 2.  
quenter,

g Bellon.  
Hist. l. 5.  
c. 10.h Aldrov.  
de Piscib.  
l. 34. 27.




Serpens

*Marinus Norwegicus.*

Norwegische

Meer Schlange



*Ophichon Pliny.*



*Marina mar.*

Meer Schleie



*Marina mar.*

Meer Schleie



*Marina mar.*



*Meer Schleie*





q. *Arist. H.* quenter, in eademque q. capiuntur.  
*A. L. 3.* & diu, quod parvas branchias ha-  
*c. 10.* beant, parum aquæ admittant, nec  
 multum refrigerii desiderant, vivunt.

*Cibus* ipsis caro, ideo in petris quæ  
 Channis, & Patellis plenæ domici-  
 lium. Nec ab humana abstinent. Cuius  
 \* *Plin. H. N. l. 9.* rei gnarus Vedius Pollio, Eques  
 Romanus, & ex amicis Augusti, inven-  
*c. 33.* nit in hoc animali documenta sevit-  
*Tertullian.* tiz, vivarius earum immergens dam-  
*de pelio.* nna servitia, non tanquam ad hoc  
*Seneca L. 1.* feris terrarum non sufficientibus, sed  
*de Clem.* quia in alio genere totum pariter ho-  
 minem distrahi spectare non poterat.

Cum rabie agitantur, sævissimè per-  
 sequuntur squamosos; ita verò  
 morfu valent, ut partem nisi tota am-  
 putetur, ab ea liberari posse neget,  
 Rondeletius. In Sicilia \* in summa  
 \* *Marrob. Sarracul. l. 2. c. 11.* aqua præ pinguedine flurantur. Un-  
 de manu capi murænas flutas Papi-  
 nius apud Varronem prodidit.

De Muræna cum vipera congress-  
 u, si à multis r. sparsa opinio. Muræna  
 inquit libidinis, impetu plena, la-  
 tibulum viperæ intrat. Vipera mas-  
 stimulis concitata ad mare accedit,  
 & sibilo edito amaram evocat. sic am-  
 bo invicem colligantur. Falsitatem si  
 discrepantia (aliæ marem cum vipera  
 foemina congressi, aliæ foeminam cum  
 viperamare produunt) non ostendit,  
 at certè illud, quod Nicander famæ,  
 Plinius & Ælianus vulgo eam tri-  
 buant. Andreas f. apud Athenæum,  
 quod vipera nemor. secreta amet,  
 nec à quoquam vel observatum esse,  
 vel piscatore vel littorū ubi frequen-  
 tes muræne, accola, neget, ostendere  
 potest. Coeunt autem more s. ser-  
 pentum, & ova parva, eaque s. utaq;  
 seu arenacea, numerosa \* & quocun-  
 que tandem tempore patiunt. \* Muræ-  
 nula recens prognata, celeri ado-  
 \* *Arist. H. H. l. 1. c. 10.* rescent incremento,

Latitant hyberno tempore, quo,  
 paucos dies si excipias, non capiun-  
 tur. Quia s. pinnis carent, sexuoso  
 corporis impulsu moventur.

Ad Ingenium & Mores pertinet,  
 quod, è vivariis a egressæ piscatores  
 adoriti, & è navibus in mare pronos  
 dejeceros; reti circumdatæ b macu-

las appetere ipsas, conscire ceteris ac  
 lubrici tergi, cum multiplici sexu  
 laxari donec evadant; ut hærere in  
 hanc amplius devorare quàm ha-  
 mum, admoveereque denribus lineas,  
 atque ita erodere; infixas hamo,  
 quod sint cultellato dorso, sese inver-  
 tere i. cauda ictas, celeritimè exani-  
 mari, capite ictas difficulter unde a-  
 nimam in cauda habere certum c. *Plin. H. N. l. 32. c. 1.*  
 Plinio concentu & tintinnabulis, q. *N. l. 32.*  
 ex fabula de viperæ sibilo narum el-  
 se ctedo, à piscatoribus evocari; di-  
 cuntur. Docilitatis argumentum,  
 L. Crassi, qui cum Cn. Domitio Cen-  
 sor fuit, Muræna Inauribus d. & gem-  
 mis distincto monili ornata, tan-  
 quam eximæ pulchritudinis puella,  
 vocem Crassi cognoscebat, ad eum  
 adnarabat, & porrecta cum gaudio  
 accipiebatur. in piscina mortuam, arra-  
 tus tanquam filiam luxit. Idem de  
 Antonii Drusi in villa apud Baulos  
 , in parte Bajana, Muræna, di-  
 citur.

*Amispathiam* ipsarum cum Locu-  
 sta, Polypo, Ozæna, Congro, Aceto,  
 & Ferula notantur authores. e. *Fin-  
 cunctur à locustis.* Ad carnes f. Po-  
 lyporum Ozænarum g. in primis præ-  
 properæ feruntur. Pugnas Ælianus  
 descripsit; addidit Kiranides incre-  
 dibile, evanescere Murænam, si cum  
 Locusta coquatur. Cum Congro  
 sæpissimè congressam Puteolis, i. spe-  
 ctavit Perottus. Aceti gustu præci-  
 piunt h. in rabiem aguntur. Licinius  
 Mæter pinguescere iactatu, (alias  
 iactatu) fuisse non interim, eadem e.  
 ferulâ protinus, prodidit. Murum  
 quod ex i. Æliano habemus, cum  
 plagam unam acceperit torpescen-  
 tem persistere i. sin plures inferas, i. 37.  
 funditis ira accendi.

Summis olim apud Romanos fue-  
 re in deliciis, seu ut gulæ irritamen-  
 ta, seu quod diutissimè & magna co-  
 pia in variis servari possent. vel  
 unus C. Hirrius duodena è mil. k. *Varr. de  
 l. l. 3.* lia festertia, ipsi alendis insume-  
 bar; & uno tempore Cæsari  
 vi. M. Murænarum mutuo dedis-  
 se in pondus dicitur. nam permutare  
 pretio vel aliâ merce noluit.

C; Huius

Macro.  
Saturn. l. 2.  
c. 11.  
I. Phil. II.  
M. J. 31.  
c. 12.  
m. Lam.  
prod. in H.  
logab.

n. Macro.  
Saturn. l. 2.  
c. 11.  
O. Horat.  
L. 2. ferm.  
Sary. 8.

p. Galen. l.  
de cibis bo.  
m. 4. mal.  
L. 2. ferm.  
de Alim.

Huius villam intra quam modicam quadragies piscinæ venerant. Tripatinus lumina cenarum laetitia, ex Fenestella l appellatur: unaque fuit Murzenarum, altera Luponum, tertia Myxonis piscis. Helioabalus m eandem lactibus in locis mediterraneis rusticos pavisse creditur, ut totum Romanum imperium perderet.

Piscis n æstimum Licinius Murzenarum nomen imposuit, ut Sergio Oratz. Commendatas maxime prægnantes ex o Horatio potest colligi. sed & à lactibus summam obtinuisse carnē. Nam sive molles illar. carnes st atuas, sive duras, opprobrium virare non poterunt. Illæ inflationes, hæ eruditates difficiles concoctu pariunt. Galenus p tamen mediocres posuit, si in puro mari versentur.

Reperere & in Medicina usum. Nam Marcellus pellium cinerem ex aceto fronti illitum, prodesse adversus capitis dolorem prodidit.

#### ARTICVLVS VIII.

#### De Myro, Reverso Indico Anguilliformi & Tania.

TAB. V. MYRUS, seu *μύρος*, *μύριον* sive *μυρίον*, fluere, quod præ nimia pinguedine mari supernater, dicitur. Volaterranus, falso Plinio & Gaza Oculatam, Plauto Ophthalmiam vocari scripsit. Alicubi Myrinus, sed perperam, enim legi debet, vocatur. Sine Murzenarum mas, quod Plinius, Helychius & alii perdidit, ex descriptione colligetur. Aristoteles concolorem, muræna robustiorem, colore piceo, dentibus intus & extra instructum prodidit. Athenæo *μύρην* seu colore leonis & *μύρην* seu torquillæ, esse creditur.

Duo eius apud Dorionem b generis. 1. *Nigrum*, quod Galli piscatores serpente vocant, & *Rufum*, quod deterius. Ille serpenti magis similis est quam Murzenæ, corpore nigricante, rotundo, sine maculis, sine squammis. Carne tenerissima, sine ullis c spinis. *Pinnulas* habet valde exiguas cutis substantiæ, unam à cervicis loco ad anum usque, & alteram ab ano ad

tandem, quarum ora nigra est: unicum utrinque branchiarum imperfectarum foramen, *punctum* utriusque latere aliquot aurea, quæ magis in viventibus quam mortuis apparent. *Gulam* ventriculo præpositam, *intestina* longa, recta ad podicem porrecta. *Jecur* longum, rubescens, sine felle. *Splenem* longum, tenuem.

Alter serpens rubescens Rondeletio (Dorionis Myrū *μύριον* sive *μύριον*, nō absurdè dixeris) piscis est rarissim⁹, corporibus specie serpētū, terrenis similis, colore rubro vel phæniceo, lineis obliquis & sinuosis à dorso ad ventrem ductis, eam lineam quæ à capite ad caudam protensa est, secantibus: scissura oris non admodum magna. *Dentes* habet acutos, serratos, *branchias* squammosorum piscium instar operatas. in *dorso* à capite ferè ad caudam capillamenta tenuia à sese disiuncta, in ventre similia. *Cauda* in pinnam unam desinit.

REVERSI INDICUS Anguilliformis, inter Pelagios non squammosos. ab Aldrovando referitur, inter Galeorum genera ab Hernando. Instar Anguillæ Columbus facit, nisi grandiusculum caput haberet. Capite autem pelliculam quandam erumenæ similem gestare scribit. Si Hernandum sequimur, d tres spithamas est longus. Corio nigro, figura mirabil: vix possis divinare an natet supinus vel pronus, imo iudices, cum supinus est pronum jacere, & cum pronus supinum. Rostrum habet acutum, labrum interius superiori longius, latius, & ad superiora contortum. Caput compressum, ac rostellum spinifero octo uncias longo, tres lato insigni, quo tuberoni & aliis piscibus adherere solet, pinnas circa branchias quaternas, linguas, juxta ventrem & dorsum, caudam nonnihil lunatam. Vivit in Oceano Septentrionali. & piscibus vescitur. Vfus eius in piscibus capiendis, Viso fulgore aëris statim prædam deserit. e Martyr. Modus piscationis à e Martyre descriptus est.

TANIARUM, quæ à similitudine fasciæ & vittæ ita dicuntur, Gaza vit-

TAB. II.

d. Niren.  
berg. Exot.  
Nat. l. 2. c. 12.  
c. 12. ex  
Hernando.

e. Martyr.  
l. 3. Decad.  
Oron.

TAB.  
VI.  
l. 2. c. 12.

*Tania niera.*

*Mer-hub*

*Tania.*

*Tania Ballova.*

*Tania falcata Imperat.*

*Canis Carcharias*

*Grosier Marmon*

*Canis Carcharias ferox alba*

*Ein ander art.  
Mer oder Walhunde.*

*Canis Carcharias, alba*





tate dedit, tres apud scriptores *descriptions* sese offerunt. Una est corpore longo, tenui, stricto, flexili; tenuitatis tantæ, ut ossa vertebrarum spinæque quibus firmatur, carne non tecta, appareant. Caput eide presens, ossibus multis constans. Oculi magni, rotundi, pupilla exigula ad branchias pinna utrinque unica ad notandum data. in prona parte villos habet ad caudam usque, in quos & cauda terminatur. Flammæ modum natat mouetur; inde nomen Flambo à Gallis accepit. Altera corpore est priori similis, eoque argenteo, ad tres interdum cubitos excresecit. branchiæ ei, præter quæ ad pinnas, sub maxilla inferiore duæ rursus eius coloris dactyli villi & cauda, maculæ in parte prona purpureæ, rotundæ, certo spacio à se distantes. Venter magnus & longus. *Intestina* sine ulis gyris. Cor compressum, hepar ex albo uiscescens. Lien, & fel adeo parua, ut semè uisum essent.

Tertia Falce nuncupatur, quod fallacem messem referat. Est ulnam longa, palmum lata, tora in gyrum quibuscumque veluti crenis serrata. Capite deformi, ut simiam dicas oculis magnis. In lateribus linea uisitur aspera. pinna in tergore unica, continua, sub rubra, duæ sub branchiis eodidemque sub sterno. Polypi modo molli est. & perfrixus vel assus in quoddam veluti gluren resoluitur. Huc pertinet Piscis, quem *Iridem marinam* non abscondè dixeris. Solis quodammodo arctis & cute constat, & rubro, amethystino, cæruleo & aureo colore variat. quin rectius quàm præcedens *Teniasulcata* dicitur.

## CAPUT III.

## De Pelagiis Cartilagineis.

## ARTICVLVS I.

## De Cartilagineis ingenere.

Cartilaginei pisces dicuntur, qui pro dorsifina spinea Cartilagine habet Græci *Χαλδανια* olim dixerit; Aristoteles *εὐλαχίαι* & *εὐλαχίαι* primus,

a à splendore cutis, ut testatur Galenus, quanoctū lucent, vocavit. Duo a taliū sunt genera. Planū unū, in quo alii aspera, alii læuicæ sunt præditi; alii spinis carent, quidam iis armantur: Alterum longum & rotundum, qui Galeno *γαλινί* & *γαλινίμοι*, Aristoteli *γαλινί*, *γαλινίμοι*, aliquando & *γαλινί*, *γαλινί*, id est, mustela terrestri, seu quod corporis similitudine eam referant, seu quod quædam communia habeant, inter quæ *jecur* adiposum, in oleū resolubile, dicuntur. Tribuitur hoc nomen & Canicularum generi, quod b. *Alhanus* secundum & varium, Oppianus e tertium ponit, utrumque in cæno volutari, addit. Magnitudo etiam minorum inter mares ultra cubitum. Spinam Cartilagineam a branchias directas, quod cartilagine tegumenta earum consistunt, pinuas duplices & utrinque quidam habere, nullo diserto adipe car. ni ventrive adhærescente pingue. re, ova ea specie, qua aves habere, cōmune omnibus. *Locus* uero variat. Plana parte inferiore lupinaque habent; oblongis in lateribus adhærent, & regumeri loco quinque habent foramina. Cor pentagonum, jecoris & eius gemina substantia e adipæ, fel in jecore situm, appendices supra ventriculum exeuntes, Galeis propria sunt. Vulvæ, quas qui ova pariunt, in binos sinus partitas, & sub præcœdiorum septo constitutas habent, ad avium naturam vergunt. ad easdem in gravidis veluti mammæ albidæ uisuntur. Os supina parte esse, non omnibus conuenit, in extremo quædam rostro habent. quibus ita situm est, cibum corripere, nisi uersis resupinētur, nequeunt sic & pisciū quos insectantur saluti, & ipsis cōmodo cōsuluit Natura. Immodica fatietate isti intereunt. illi, dum moram sese convertendo neunt, effugunt. Sexus duplici dignoscitur nota. Maribus bina quædam circa extremitati ostium propendent: minores uidem. Fœminæ maiores, illis destituuntur. *Locus* cartilagineis mare est. sed alii in pelago, alii in profundo cœno morantur. Cum pariendi tempus instat, vada & litorea petunt.

Cibus

*Cibus* ipſis piſces, hos reſupinati, ut diximus, ꝑ capiunt. Quantum ad Generationem, ore parere per ram ſibi Aegyptii perſuadebant. Coitus diverſus, viſa ex cartilagineis nonnulla, quæ g averſa canum terreſtrium more cohzerebant. Plani qui caudam habent, non ſolum admo- nis ſupinis, ſed etiam terga ſœminarum, marium ſupinis ſuperpoſitis, modo caudæ craſſities nihil impe- diat, coëunt. Quia ſemine non abun- dant, nec ſœminæ ſuos conceptus, nec marcs ſuū ſemen ſpargere, quod generis non vivipari piſces facere ſole- rent, viſuntur. Ovis. h eodem tempo- re & ſuperiore parte ad præcordiorū ſeptum omnibus, cum maiora tum minora multa, & inferiore iam exclu- ſi ſœtus, diverſitas inferius patebit. quod non omnia ſimul, ſed ſæpè nu- mero ac diu edunt; inrerim quæ in i- ma matrice ſunt, concoquūtur; eodē menſe ſæpe & parere & coire crediti ſunt. Superſœtare, & ſenis complu- rimum uterum ferre menſibus, au- thor eſt i Ariſtoteles. Ex alto terram repetunt, ubi pariant. Sic teporē ca- pant, & proli provident. Patiunt autem vere animal. hinc partus vi- perino k ſimilis. ſi quid in quibuſdam differentix occurrat, in ſequentibus dicetur. diſcrimen ſanè ipſi piſces in- ter ſe oſtendunt. ſenos vel oſtenos, undecim interdum ſi Rondeletio credendum, ſœtus ſuis partibus ab- ſolutos pedali longitudine diverſis temporibus parere ſcribit Bellonius. perſæpè vivo emergente ſœtu, ovis adhuc crudis, ſcatere uterum, ſupe- riorem eius partem, quæ ad ſeptum eſt occupantibus, eorūque alia dextro alia ſiniſtro matricis cornu concludi, adiciit. quod Galei meru inſidiarum catulos devorent, his l e- vaneſcentibus revocent, prodidere antiqui, & ad Ingenium referri poteſt Antipathiam cum Paſtinaca, quæ nihil venenatius ex mari, exercere, apud Plinium m invenies. Tanta eſt avidi- tas ipſius veneni.

Vſus Cartilagineorū in cibo rarus. Caro eſt concoctū difficilis, diutur- no uſu, viſum hebetare, proditum à

Diphilo. Exenteratos quosdam abſ- que ſale inſolari ex Ephippo colliges. nuncjms ipſi eſt.

## ARTICVLVS II.

## De Cartilagineis Longis.

## PUNCTVM I.

De Cane Ariſtotelis, ſeu Car-  
charia.

PRIMUM inter Cartilagineos lon- TAB.  
gos locum Galei ſeu Muſteli inter VI. 4. 5. 6.  
hos kius ſeu Canis, vel quia hoc inge-  
nere maximus, ſibi vendicat. Galeus  
hic ſimpliciter a Ariſtotele; Galeus Ariſtot. II.  
Canis; b Oppiano; Canicula; c Plinio, A. I. 5. 6. 11.  
Carcharias, quia dentibus plurimum b Oppian.  
valet Theophaſto: d aliis Scylla. Per- c Plin. H. N.  
peram Rondeletio, ex Nicandri au- l. 13. 4. 35.  
thoritate, Lamia. Nam & interpla- d Theophr.  
nos Cartilagineos e à Plinio refer- d Theophr.  
tur, & incredibile eſt tantæ magnitu- Hyſt. Plant.  
dinis piſcem, qui loricatos etiam ho- l. 4. 6. 8.  
mines devoret, planis ab eo accenſe- c Plin.  
ri poſſe. Potuit Nicæder Carchariam H. N. I. 9.  
Lamiam propter aliquam naturæ ſi- c. 24.  
militudinem vocare, & Siculis Ra-  
na marina Lamia dicitur. Cete non  
eſſe, vel ex inde colligas, quod &  
branchiaſi habeat, & ova concipiat.

Magnitudine Galeos omnes ex-  
cedit. Viſus mille librarum pondere  
mediocris. Captus, qui ad quatuor li-  
brarum millia accederet. Inventus  
in quodam loricatus homo eſt. alter,  
curtui impoſitus, vix à duobus equis  
trahi potuit. Cute aſpera inregitur.  
Oſiſi non in roſtro, quod in mucro-  
nem exporreſcū, ſed ſupina parte eſt.

Caput ampliffimum. Dentes trian- TAB.  
guli forma, duriffimi, acutiſſimi, u- VII. 1. 2.  
trinque ſerrati, ſeno ordine diſpoſiti.  
Prioris ordinis extra prominent, & in  
anterior em partem vergunt. ſecundi  
rari ſunt. tertii, quarti, quinti, & ſexti,  
in os maxima ex parte recurvi, in u-  
traque maxilla carne molli conte-  
guntur. quælibet maxilla duos & ſe-  
ptuaginta comprehendit.

Oculus habet maximos rotundos in  
quibus tunica cornea parte anteriore,  
poſte-

l Plinarch.  
libro VII.  
animal.  
Tzerzes  
Chelad l. 3.  
c. 12. 6.

m Plin.  
H. N. l. 32.  
c. 2.



posteriorequis ducta est, quæ humorem crystallinum involvit, telas artium tenuitate superat. *nervi optici* ex substantia cartilaginea & dura constant, miscendi qui eos quodammodo intra trahunt, & fixos tenent, non radicem nervorum opticorum ambiunt. sed à superiore ossis regionis oculorum parte orti, in longum extenduntur, quem situm in humanis quoque videmus. Latetum & tergotis *pinna* longè quàm in sui generis maiores sunt, binæ earum hauri procul à cauda, binæ aliæ ad branchias & podicem, aliæ in medio ferè dorso. Cauda duabus constant pinnis cubitalem longitudinem æquat, & eius pars superior, quæ vetere communis, alius attollitur quàm inferior, hæc crescentis lunæ figuram exprimit, quarum inter capedinem dimidia linea explete potest. *Hepar* adipatum, in duos maximos lobos dividitur. *Degit* in alto, sed ad litora refugit. Amnes nonnunquam adire, fortè dum prædam insequitur, *Worrenus* author est. *Vesitur* carne, & pisces adoritur ex insidiis. benè *aliqui* *Oppianus* vocavit: quia *Atchestrato* *delicium* *est*, carne humana delectari, facillè crediderim. Pugnam cum *Utinantibus* apud *Plinium* flegimus. Cum caniculis, inquit, atrox dimicatio. Inguina & calces omnemque candorem *Thunnos* inprimis persequitur, & ex eorum venatione cum gregatim præter Italiam acti elabuntur, Siciliamque attingere prohibentur, pinguescit. Vidit *Bellonius* undecim foetus uno partu edidisse, non tunicis involutos, sed umbilicali tantum in ea cum utero matris coniunctos. Caput ut in aliis animalibus primò probat. In *Cibis* non ad eò expetuntur. Divinum quidem *g* *Archestratus* cibum vocat, & *Mnesitheus* is qui facillè concoquuntur annumerat, *h* *Galenus* ramen, excrementitiæ carnis esse, asserit. Facillè in apparatu peccatur. Dentes argento inclusi, sub nomine dentium serpentis, dentitione juvare, & puerorum pavores arcere, vulgo creduntur. Denticidia optima exus parari *Rondeletius* tradit.

## PUNCTUM II.

## De Galeo Aristotelis, &amp; Catulis.

**Q**uem *Oppianus* *galeo* *voca* seu *TAB.* Mustelum seu Galeon Canem *VIII.* 4. vocat, is *Aristotele* simpliciter *galeo* est. Quia apud Latinos nomen non habet, poterit vel simpliciter Mustelus, aut Galeus, Mustelusve Canis vocari. Fortè est *Græcorum* *mustelus* *est*. Corpore est oblongo & rotundo cinereo, à podice ad extremam usque caudam gradescit. Centenas aliquando libras excedit; nec squammis, sed corio tegitur. Oculos habet oblongos: retrò eos bina foramina auditui interuentia, ex parte inferiore tunica nascitur, quæ palpebræ avium modo, totum oculum operit. Os ipsi in supina parte, denticulatum, ante ipsum duo alia foramina olfactui dicata. Branchiæ utrinque quinæ detestæ juxta quas duæ pinnae, aliæque rursus duæ supina parte nascuntur, præter has maribus duæ appendices, ex podice pendent. *Hepati* bifido & pallido, vesicula fellis subnectitur. *Splenis* subrubescit. In cœnosis maris locis habitat. Ova vitellis ovorum Gallinæ similia, ex quibus foetus, donec foras prodeant, nutriuntur, parit. Quia Carne *vesitur* gregalem ne credas. Natantes homines adoritur. In cibis plebi inservit.

**CATULI** à *Aristotele* *galeo* *voca*, à *Aristotele* *Athenæo* & *Oppiano* *catuli*, alius *in H.A.L.* *Belus* *galeo*, Hinnulos vertunt nomen *catuli*, quibusdam Caniculæ dicuntur. *TAB.* *Bellonius* *Nissolas* *Massiliensium* *est* *VIII.* *se*, quod albas maculas per dorsum *12.3.* dispersas habeant, putat. Galli deos pro iis, *Rouffettes* dictos ponunt. *Maiores* ad cubitalem magnitudinem excresecere solet, interdum binos superat. *Cure* est adeo aspera & dura, ut eâ ebur perpoliri possit. *Dorsum* & latera subnigricant, nigerrimisq; & latissimis maculis insigniuntur. In peris & alto mari frequentius degit. hinc *Saxatilis* *Canicula* *Rondelotio* dicitur.

*Minori* cubiti aliquando magnitudo.

*Plin.*  
*H.N.* *19.*  
*c. 46.*

*g* *Athenæo*.  
*Oppian.*  
*1.4.*  
*h* *Galen.*  
*13. de*  
*Alimentis.*

tudo, dorsum & latera subrubent, notisq; liventibus, & multò quàm in maiore minoribus, consperguntur. Cutis, siâ cauda sursum ad caput macrum ducas, aspera; siâ capite ad caudam, minimè. Oculis, ore, branchiis, pinna, caudaque similes, ab aliis parum differunt, *Generationem* si attendas, *b* ovis ipsi in medio matricis circa spinam hærent, aucta circûdueuntur. In binosenim partita sinus matrix cum sit, atque sub præcordiorum septo constituta, in circumstantem utramque partem abscedunt. Gerunt testacea quædam, in quibus ovi specie, humor inest, quem colore & perspicuitate cornu, figurâ pulvinaribus quæ capiti dormituri supponimus, similem, facit Rondeletius: Ova nulla contingunt secundina: à venosa umbilica parte ipsi nutrimentum est. testæ facies similis tibiærum ligulis, atque in ea sunt meatus, capillamentorum tenuitate. Testa intus rupta dilapsaque fœtus exit; & ex ovo vivum protruditur animal. Caro Maioris ferèrunt edit odorem. Uterque etiam à plebe rejicitur.

## PUNCTUM III.

*De Mustelo Lævi & Asteria.*

**TAB. VIII. 6.** **M**USTELVS seu Galeus LÆVIS, non à cutis Lævore, sed ut ab Acatia cui per q̃ similis est, distinguatur ita dicitur. Romæ *Pesse Columbo* vocatur. Vix ad viginti libras pervenit. Colore est albicante, *Corio* lævi, ore edentulo, dentium vicem asperæ maxillæ obtinent, foramina pro naribus habet; quibus minora sunt alia post oculos, rostro, branchiis, pinnis, caudâ, intereanisq; cum Cane Galeo convenit. *Piscibus* piscibus, et si inter gregales habeatur. *De Generatione* sic Aristoteles. Ova in medio matricum continent, ubi circumfretæ in utrumque matricis sinum descendunt, & evadunt annexa per umbilicem ad matricem ani-

malia, ita ut absumptis ovis, non alio modo quam quadrupedes fœtus habere videantur. Annexus est longus umbilicus ad matricis partem inferiorem, unusquisque tanquam apensus acceptabulo. Et ad fœtus medium qua jecur habet, quem si feces, intus alimentum quasi ex ovo deprehendas: etiam cum amplius ovum non est. Tamen secundæ membranæque sua cuique fœtui, more quadrupedû. Fœtus p̃ mutia caput in superiore parte habet; adultus autè atque perfectus de vexit. In læva mares generantur, in dextra forminx, qui eadem in parte simul tum femina, tum mas. Dissecto fœtu, quot habet viscera, puta jecur, ea interius magna, & sanguine constantia, sicut in quadrupedibus. Propter duram insuavemque carnem plebi relinquitur.

**GALÆUS ASTERIAS**, Oppiano **TAB. VIII.** nisi Galeos omnes maculatos vocet, *8.9.* Bellonio *Mustelus stellaris*, qui etiam Oppiano *Pardalim* dici et edit. Lævi mustelo internis & externis partibus est similis, cute tamen læviore. Dorsum maculæ alix stellarum speciem referunt, alix sunt rotundæ. Locum vitæ, partum, Ingenium, & Mores, communia cum cæteris habet. Itceus Galeorum optimos & tenerrimos esse opinatur.

## PUNCTUM IV.

*De Glaucio Eliani & Maltha.*

**G**LAUCUS Eliani vel ideo inter **TAB. VIII. 7.** Galeos refertur, quod sit Cartilagineus, tota corporis figura cæteros Galeos referat, & parvulos periculo instante, ore hiantè excipiat, præterito, revomat. *a* Plicis est quatuor aut quinque cubitorum magnitudinis. Cute lævi. Dorsum cæruleo *Pisces*, exsaturato, ventre candido. Rostro *Aldrov.* acuto. Ore in supina parte posito. *H. Pisces.* Oculis magnis, ex quorum inferiore parte nascitur membrana candida, quæ ad oculum sursum attollitur, cuique

*b* Aristot.  
*H.A.L. 6.*  
*c. 30.*

*a* Aristot.  
*H.A.L. 6.*  
*c. 30.*

*a* Rondeletius *Hist.*

*a* Aldrov.

*H. Pisces.*

*l. 2. c. 37.*



*Galax Cantharus  
terrestris ferax.  
Morhunde gebas.*

*Morhunde gebas  
Morhunde gebas*



*Galax  
Centrona. idae*

*Sarland.*



*Urophycis Marina.*

*Fish Hund. Morfuhs*



*Galax  
Centrona*

*Sarland. ander art*



*Simia Marina*



*Moraff*



*Simia*

*marina Danica*



*Zigana Merichkogel*

*Morvoo.*



*Zigana fcu Libella*

*alter a.*





*Cetolus major*. großer Hundfisch.

Tab. VIII.



*Cetolus*. 2.

*Cetolus Strigat*.

Kleiner Merlund.



*Cetolus*.

*Marinus*.

3



*Cetolus*. 4

*Cetolus canis*.

ein art der Kleinen Merlund.



*Mustelus Spina*. 5

Stachelhund.



*Mustelus Linn.* 6

glatt. Stachelhund.



*Galeus*. 7

Hundfisch.



*Galeus Asterias* für *stellatus*. Stachelhund.



8

*Galeus Glaucus*. *Galeus Stellatus*.



9



*[The main body of the document is extremely faded and illegible. It appears to contain several paragraphs of text, possibly in a list or table format, but the characters are too light to transcribe accurately.]*



eisque veluti nubes caliginem offundit. Dentium acutor. latorum, quodammodo ferratorum, ad latera spectantium ordines sunt duo, in palato substantia fungosa & mollis, quæ supernam inferamque oris partem replet. *lingua* crassa & aspera. Branchiæ detectæ: propè has *pinna* duæ magnæ, ad podicem totidem minores. duæ in tergoris. *Cauda* ex duabus constat. superior multò longior est quàm inferior, sursumque spectat. *Interna* si attendas, videbis *ventricululum* amplissimum & longissimum; *splenem*, qui ventriculo annectitur, longum, ex multis particulis carnosissimis rotundisque tacemi instar compactum. *Hepar* adiposum, in duos lobos dissectum, quor. alteri vesicula fellis adhæret. *Fel* viride. parte ventris infima in maribus feminis vasa in duas partes divisa, in feminis *vulvæ*, in maribus substantiam carnosam, digitali magnitudine, penis specie. *Intestina* primo sunt gracilia, dein lata, sine ullis spiris. Ex venis træsferæicis rami duo oriuntur; quorum alter ad hepar, alter ad ventricululum tendit, & in multos ramos diducitur. *Cor* quoque angulatum est. Carnis humanæ avidissimus, & ad litora deambulantibus inhians. Exemplum militis cuiusdam præbuit, à quo cum calces apprehendere frustra tentasset, occisus est.

Oppian.  
Hæbent.  
L. 1. v. 371.

MALTHAM inter belluas marinas numerat Oppianus. Suidas cum Presti aliquando eandem facit. aliquando ab eodem distinguit, *δυσκολογιστος* belluam appellans, Rondeletius Ceraceum esse piscem, & ex Galeorum numero colligit, quod carissimi sit laxa, mollisque. Pinnis, cauda, internis partibus, à Cane Galeo non differt, nisi quod alba oculor. macula destituatur. Rostrum est brevis, dentibus latis & acutis. Orabet in supina parte, non multum infra rostrum. *dentium* multos ordines.

3

## PUNCTUM V.

De Vulpecula marina, &  
Galeo Acanthea.

Piscis, qui Græcis ἀλάντεις, Oppiano TAB. VII. 3.  
*ἀλάντεις γαλίου*, Bellonio *Simia marina* a Rondelet. Hist. Pisc. Bellon. L. 1. de Aquat. c. 7.  
*Larinis vulpecula marina*, vel à caudæ a longitudine, vel insuavi b Diphilus apud Athen. L. 8. c. Argyl. H. A. L. 9. c. 37. in Scaly. dist. Alian. Hist. Var. L. 1. c. 5. d Athen. L. 1.  
ingratoque gustu, vel ab e astu ingenioque, nomen sortitus esse videatur. Distinguatut ne ab d Archestrati vulpecula, quam circa Rhodum sapidissimam, & alio nomine *νύκταμον*, id est canem pinguem appellari scribit: an cum eoisr eadem, ignoro. Piscis est aliquando ad centenarum libras excrefcens. Cum Cane Galeo, oculis, foraminibus auditur, & olfactui infervientibus, & branchiis conveniens. Crassior & brevior. Cute rectus. Dorsum habet cineraceum, ventrem candidum, *caudam* falcatam, & quodammodo ensi formem, quæ magnitudine reliquum corpus supererat, & in cuius exortu pinna conspicitur, ac tunc deletius ita eam exprimit, ac tibi binis pinnis constaret, quarum illa, quæ sursum abigit, toto corpore longior est, altera decuplo minor. Pinnas ad branchias & anum quam in dorso longiores. Ventricululum amplum. intestina lata, jecur pallidum & in duas fibras divisum. Iconem apud Aldrovandum vide. nos hicalterius cuiusdam subicimus. *Locis*, in marigaudet cœnosis à littoribus magis remotis. Pisces etiam grandiores pro cibo. In Conceptu & partu spinacem imitatur. Sobolem metu periculi intro recipere, præterlapso emitte. Rondeletius oculatus testis est. Cauda, longitudo ob mollitiem quæ in tenellis facillimè e Pinn. H. N. L. 9. c. 43.  
fleat, impedit. Hamo e de Oppian. Hæbent. L. 3. v. 144.  
linæ, quæ facillè protrudunt. Caro virus testis.

GALEUS ACANTHIAS GAZZ M. TAB. VIII. 5.  
*Stelus Spinax*; Scaligeto *Musellus Spinus* D a est,

est, *Æliano Centrinus* nomine venit. Nunquam viginti libras implet. Corpus sensim gracilescit. Dorsum cinereum apparet, venter albicat. Rondeletius in mari argenteo colore esse, cum expiravit ex cinereo rubescere, author est. *Rostrum* ipsi primò latum, mox in acutum desinens. Retro oculos, qui mediocres, bina foramina auditui dicantur. Anteos, quod in supina parte, & dentibus validissimis armatur, bina alia olfactui inserviunt. Branchiæ à lateribus utrinque quinque & detectæ, *Pinna* duæ natatui destinatæ branchias sequuntur; in parte supina nullæ sunt, præterquam expodiciis utraque parte, quæ in formina minores, in mare maiores sunt. hac nota, quia in cæteris omnibus Galeis inter podicem & caudam, imò ventri singularis commissura conspicitur, ab aliis, ut mas appendicibus parvis, quas illic obtinet, à formina, distinguitur. Utraque in dorso pinna, aculeum longum, triangulare magis, quàm rotundum annexum habet. *Cauda* est gemina, superiore parte longior, inferiore brevior. *Cæteris* partibus cum aliis convenit. *Locus* ipsi cænosa maris receptacula, flumina nunquam subit: nec in Euripo Pyrhæo reperitur. In septo præcordiorum supra mammæ ovis continere; ubi ovum descendit atque absolutum fuerit, in eo catulum fieri, author est *f* Aristoteles. Sex in ventre fœtus perfectos observatos, multis aliis ovis non exclusis, pendentes, qui ex ovis per venam umbilicalem excludantur. Ova nullo vinculo alligata esse, observavit Rondeletius. Ex ovis alimentum trahere, donec perfecti foras emittantur, haud malè colligi potest. *Gregalem* esse, quod multi simul capiuntur, certum est. Quod fœtus suos nec recipere, nec emitte possit, *g* spinæ faciunt. *Carne* est dura & insipida s. minus tamen quàm vulpecula virust respicit.

*f* Aristot.  
Hist. A. L. 6.  
c. 8.  
*I. Scaliger.*

*g* Arist.  
Hist. A. L. 6.  
c. 10.

## PUNCTUM VI.

## De Centrine.

NOMINE CENTRINES, *Ælianus* TAB. VII. 4. 5. Mustelos aculeis præditos intel-  
ligit, cum duo Canum genera, in Galcos & Centrinus dispescit: nos cum intelligimus, quem *a* Aristoteles *μυσχολος*, *mustelam*, esse, *b* Athenæus ab Epæneto *Τεννιδία* vocari, docet. Romæ & tota Italia *Pesce Porco* dicitur. Plinius nusquam eius meminit, nec apud Aristotelem quicquam invenias, quamvis scripsisse Athenæus prodiderit. Quantum ad descriptionem brevis est, cæcisus & spissus, à capite ad podicem *trianguli* figura. *Cute* integer asperrimâ, brevibus crebrisque aculeis horrida, qui in capite & dorso robustiores sunt, colore ex cinereo nigricante. *Caput* habet exiguum & depressum. *Oculos* splendentes, post eos duo foramina auditui destinata, duo supina rostri parte pro naribus conspiciuntur. *Caput* supina parte, rotundum, magnum, semper ferè hians. *Dentes* latos, acutos, quorum in superiori maxilla triplex, in inferiori simplex ordo est. Branchias utrinque in lateribus quinque, eademque detectas. *Pinna* ptiore à capite statim nascens, aculeo longo & ad caput sese inclinante armata, cristæ instar multum surrigitur, quæ è podicis regione minor, minore & ad caudam vergente aculeo, instructa est. In caudam & podicis pinnas, imò ventri, nulla alia pinnula subnectitur, quod ei cum Acanthia commune. Cauda in pinnam inferiore parte latam, superiore parte in acutum angulum desinentem degenerat. In *partibus internis*, ventriculus est oblongus cæcisus. *intestina* haud multis gyris reflectat. *Hepar* præpingue, magnum, in duos lobos ad infimam ferè usque ventris sedem extensus divisum, albicat. *Locus* ipsi in cænosis pelagi domiciliis potius quàm littorei: idè varius capitur.

OVA



**OS** primum in se gignit numerosif-  
simas, vitellis gallinaceorum ovo-  
rum similia. animal reliquorum  
cartilagineorum more excludit. Ven-  
enum fundere ex e Oppiano disci-  
mus. quos ille *αἰσχροὺς ἰσχυροὺς* vocat,  
hoc *αἰσχροὺς* vocari, verus scholiastes  
adscript. Vix aliquis eius in *esbie*  
*αἴσφι* nervi potius quam carneâ sub-  
stantia constat. In *Medicina* oleum  
ex hepate frixo collectum, ad duri-  
tiem humani hepatis emolliendam  
conferte, & articularum dolores le-  
nite ex Rondeletio habeo. Cinis u-  
rinâs vehementer movet.

## PUNCTUM VII.

De Simiamarina, & Zy-  
gana.

**TAB.** **S**IMIARUM MARINARUM duas  
VII. 6. habemus descriptiones a *Æli-*  
*o* *Æben.* noest bellua in mari rubro, cartila-  
*H.A.L. 12.* ginea, terrestri tum tum colore tum  
*527.* facile similis; in hoc differt, quod  
variè distinguatur, cervicemque  
& branchias rufas habet. Teg-  
men corporis testudinis involu-  
crum est. Cum natat, volare vi-  
detur. *b* Gesnerus piscem sibi ex  
*b Gesner.* Dania allatum scribit, coloris cor-  
*de Piscib.* pore toto viridis, dorso magis fu-  
sci, ad latera pallidi. *Os* sinum ha-  
bebat. *pinnas* tanquam volans ex-  
tendebat, & inter duas in dorso  
pinnas aculeum retrò tendebat.  
branchiarum foramina quina ap-  
parebant, obliquo inter os & o-  
culos descensu. Testudineum in-  
volucrum si accessisset, *Æliani* si-  
miam fecisset.

**TAB.** **ZYGANA** piscis monstrosus, à  
VII. 8. 9. capitis figura, quâ *αἰσχροὺς* imitatur,  
quo transversum librile, ex quo lan-  
ces dependent significatur, no-  
men obtinuit.

**GAZA** Libellam vertit. Massi-  
lienses piscem Judæum à simili-  
tudine tegumenti capitis, quo o-  
lim Judæi in provincia utebantur, di-  
cunt. Galenus, *Ælianus*, *Oppia-*  
*e Oppian.* nus e eosque secutus *Suidas*, cetis an-  
*Hal. 11.* numerant. *Galeis*, quia multa cum

illis communia habet, haud ma-  
lè subnectitur. Corio tegitur.  
Ventre est albo, dorso cinereo, pro  
spinis cartilagineas obtinet. *Cervi-*  
*cem & galam* habere scripsit Ronde-  
letius. *Os* ipsi non rotundum, non  
tostatum, nec in latera compres-  
sum; sed in ea extensum, atque  
transversum habet. Pars frontis  
anterior, quæ utroque oculo, ma-  
no, & deorsum potius quam sur-  
sum velad latera vergente, claudit-  
tur, in semicirculum ferè extube-  
rat, & sic in aciem acuitur, ut ob-  
vios pisces secare posse credatur.  
*Os* subtus, inferiore parte, per ma-  
gnum, dentibus validis sinus planis,  
in latera ferræ modò vergentibus,  
triplici vel quadruplici ordine dige-  
stis armatum, latet. *Lingua* lata, hu-  
manæ haud absumilis. *branchia* u-  
trinque quinquè & detectæ. Pinnas  
icon ostendit. in dorso nullam ef-  
fetradit Rondeletius. *Cauda* dua-  
bus inæqualibus pinnis constat, qua-  
rum superior vertebris fulcitur, æ  
multo longior est; inferior verte-  
bris caret, & brevior extat. *Versa-*  
*tur* d in profundo. Pisces obvios, *d. Ælium.*  
& homines natantes frontis suæ a- *H.A.L. 10.*  
cie subvertit, & Leoni quod ad vites, *52.*  
ab Oppiano e opponitur. Occursus *Oppian. l. 1.*  
eius olim, navigantibus f infansus *757.*  
habebatur. *e Oppian.*

Ab ista **ZYGANA** plurimum ille  
differt, qui ventre candicante, ore l. c.  
minutæ coloris, cætera niger esse,  
scribitur.

## PUNCTUM VIII.

De Mola Salviani, seu Or-  
throragisco Rondeletij.

**M**ONSTROSO pisci monstrosiorem **TAB.**  
subjicimus, sed & istâ toto cor- *IX. l. 1.*  
pore cartilagineum. *Mola* quibusdam,  
seu quod informem molam referat,  
seu quod retunditate corporis molæ  
molendinariz similis sit, ut Ronde-  
letio placet, dicitur. Apud Massilien-  
ses, *Luna*, vel quod extrema cor-  
poris parte, quæ pinnis subest, cre-  
scentis figurâ referat, vel q̄ demptis  
pinnis toto corpore plenè instat sit.

D 3 vel

a. *Alian.*  
H. A. l. 15.  
c. 4.  
b. *lin.*  
H. N. l. 32.  
c. 2.  
c. *Aldrov.*  
*de Piscib.*  
l. 3. c. 44.

vel quod corporis extremū in cornua curvatz respondeat, vel deniq; quod noctu splendeat, vocatur. sed cave pro a *Alian*isumas. Porcum, quem Lacedæmonij *Orthragoriscum* vocant, quemque b *Appion* maximum piscium esse, & cum capitur grunnire, credit *Rondeletius*, nec abluir cōparatio. Nec c longus, nec planus est, sed in lateta comptimitur. brevis aded, ut solum caput potius quā piscem repræsentare videatur. Centenas sæpe libras superat. *Cute* tegitur asperâ nō secus ac *Squatina*, argentei coloris, ventre est subalbido, dorso cineraceo. Os habet exiguum. *dentes* tantum geminos, utramque universam oris partem munientes, quorum inferior retrusior, superior magis acutus ac secans est, latus, continuo scilicet *Rondeletius* facit. *Oculos* parvos ac otibulares. *De branchiis* ita *Salvianus*. Branchiarum internum otificium utrinque, unum est parvum & semicirculare, prope quod etiam utrinque pinna una parva & rotunda sita est, quæ alia ptorsustatione quam aliorum piscium laterales pinnae, moventur. Cum enim illæ in piscibus à cauda ad caput, in hoc nostro à dorso in imum ventrem deducuntur. In extremo præterea dorso propè caudam alia multò major pinna, non rotunda sed sublonga erigitur : è cuius regione altera eiusdem magnitudinis & figuræ imo ventri statim ab ano subest, quæ alio etiam modo quā dorſi & ventris aliarum piscium pinnae mobiles sunt. Non enī mutillæ à cauda ad caput eriguntur, & à capite ad caudam inclinantur, sed in utrumq; latus moventur.

In eandem carneam non degenerat: nam postrema eius æquè ac latera lata sunt: pinnata tamen cauda, non oblonga sed lata, atque omnem postremam piscis partem amplexante, in latereque mobili munitur. Crescentis lunæ figuram referre; superiore parte articulata esse, ut tam in dextrum,

quam in sinistram moveatur, *Rondeletius* addidit.

Quantum ad *Internam*, quæ ob corporis rotunditatem conglobata sunt, Carne est candidissima, nerveam potius, quā carneam substantiam præ se ferente. Cocta gluten ex tetgoribus boum confectum refert. *Adipe* ut in porco, multo carni coriorum firmissimè adhæret, & difficilimè avellitur. *Ictur* habet pallidum, magnum, & tenerrimum, dum coquitur in densam pinguedinem facessit. Nocturno ex internis partibus cæruleus è longinquo splendor, imò ignis splendidissimus enitet. Grunnire dum capitur, dicitur. Pinguedo eius est multa & candidissima; liquefacta, lucernis intervert, solo pisculento odore molesta. *Speciem aliam Gallus quidam Venetiis descripsit*. Iconem exhibeo. Forma, inquit, in orbem vergebat. Corio sine squammis, &c.

An huc *Piscis* *Cadamusti* suem referens dolium crassitudine, duo longitudine superans, formæ obrotundæ, suilla cute, Oculis parvis, edentulus, loripes, branchus brachii mensuram excedentibus, cauda longa, & lata spectet, aliis iudicandum relinquo.

### ARTICVLVS III.

#### De Cartilagineis planis.

#### PUNCTUM I.

#### De Torpedine.

Abſo'tis Cartilagineis longis, *TAB.* ad Planos progredimur, pri-IX. mus occurrit *Torpedo*, quæ veteribus Græcis *νίπτα* & *νίπτα*, ad differentiam affectus, *βαρύνω*; modernis *νυμίνω*, & Margotir, *Alberzo Stupescit*; mixto barbaris, *Torpedo*, *Torpego*, *Stupor*, *Stupesciens* & *Stupescor*, dicitur. Ex Cartilagineis planis esse, ex

*Mola Torquata*



*Mola Zosterus*



*Torpedo maculosa*  
*aperta Zosterus*



*Torpedo*

*Zosterus*



*Torpedo*



*Torpedo*



*Aquila*

*Adler fisch*



*Noer adler*

*Agvinara*

*Angel fisch*  
*Noer angel*



*Aquila*  
*car alio*



*Noer Adlers unter art.*





ex *a* Aristotele & Plinio habemus. Lavem, apud *b* Athenzum legitur. Corruptus Aristotelis *c* locus ex quo colligitur spinosa. nec vacat errore *d* Cardanus. Duo olim ipsius genera. *Nigrum* quod ad capitis dolorē commendatur, & subrutum, seu ad rubricæ colorem accedens. In *Maculosis*, & *Non maculosos* optimē dispescuntur. Tria illarum genera. *Macula* in quibusdam diversarum figurarum & albicantes, huc & illic sparguntur, in quibusdam quinz rotundæ, nigricantes, pentagoni figuræ locatz, oculos tam egregiē repræsentant, ut *Ocularam* Plinius dixerit; benè dictum Bellonius defendit. Omnium corpus sic caudam exceperis orbiculare est, senas libras vix excedunt, molli & rubrica cute teguntur. Venter est subalbidus, dorsum subflavum, & ad rubricæ fabrilis colorem accedens, partes quæ ad caudam mediis corpulentiores apparent. hæc cartilaginem quandam tabidam in seipsis habere videntur. Ore sunt in supina parte parvo, ante quod foramina duo odores deferunt, dentibus minutis & serratis. Oculis in superiore parte antèius exiguis, quos retrò foramina duo, ipsis grandiora, patula, & in palatum pervia. Cerebro non carent. *Lingua* destituta: *Branchia* in medio sunt corpore (ob ipsius tenuitatem ad lareta locari non poterant) utrinque quinz & detectæ, quarum ostià parva & semicircularia, renui quadam curricula conteguntur: *pinna* juxta caudam duæ; pro reliquis latitudinè utuntur, & utroque sui corporis semicirculo quasi pinnis natant, podex in caudæ exortu, ipsa brevis & latiuscula. *Intus* Carnosum habent ventriculum: *intestinum* breve & amplum. *hepar* pallidum, & in duos lobos dividit. *Fellus* vesica illaque magna hepatis committitur & dextro annexa lobo, in sinistram quoque venulas quasdam immitit. *Lien* est parvus & subrubens. Uterus oblongus & bifidus. *Habitant* *e* in mari, locis cornosis. reperiuntur & in *f* Nilo, ut haud male in *Marinas*

etiam & Fluviales, distinxeris *Piscibus vescuntur*, quos astu, ut post dicam, capiunt. *Pariunt* circa æquinoctium, & quidem ova intra septem mollia, quæ in alium locum uterî transferunt, & excludunt. Sic animal pariunt, ova concipiunt. *Orogenos* sæterus habens, inventa est. Hyeme propter frigus in terra latent. Latitudine sua quasi geminis pinnis feruntur, natant sed ægrè, nam *b* h *Oppian.* *ruric* *Begditi* *Baqirum*. *pigra tarditate* *Hell. 2.* *gravantur*. idè *hinc* *negadit* *vgi* *m* *7. 58.* *Natura* concessit. Singulari ipsis torporem vel tremorem inferendi, unde nomen habent, facultas. Mersæ in i limo se occultant *i* *Plin. H.* & pisces, qui secuti supernantes obtorpuere, corripunt. *Idem* *N. L. 9.* *h* procul & è longinquo, vel si hâstâ virgave artingantur, quamvis prævalidos lacertos, torpidos, & quamlibet ad cursum veloces pedes, aligatos reddunt. Et illi qui, rete, in quo una ex his capta fuerit, attigerint, torporem patiuntur, quod *i* *Æliani* fide dictum sit: & si inter mortuos pisces vivens Torpedo sese moveat, qui tacti suetint, in eterno quodam motu cientur, ut videantur vivere, quod Godignus de rebus Abyssinis prodidit. Inrotone corpore, quod *Salviano* placet, an parte, quod *m* *Diphilus*, *n* *Oppianus* & *Cardanus* prodidit, incertum. Exiguam plerarumque, quæque quavis corporis excitatione resellatur; nec totum corpus infestantem, *Gilii* & *Kircheri* experienciâ docemur, ut vel inde *Albertum*, qui hoc veneno hominem interfici prodidit, resellere liceat. Causam in eadem facultatem, quod mortua eadem destituitur, coniecere alii in narceticam & insensibilem qualitatē, nervis & masculis contrariam alii. *Vsus* Torpedinis in cibis commendatus *p* à *Galeno* & aliis, quod carnem mollem, jucundam, & mediciter per ventrem subeunt. Item habet: à *Diphilo* & aliis rejectus est. Patres duntaxat quæ circa caput laudantur. *Venetis* ne in foro

*a* *Aristot.*  
*H. A. L. 9.*  
*v. 5.*  
*Plin. H. N.*  
*L. 9. c. 14.*  
*b* *Athen.*  
*Dipn. 1.*  
*L. 7.*  
*c* *Aristot.*  
*L. 4. de part.*  
*trib. 3.*  
*d* *Cardan.*  
*L. 7. de rer.*  
*varietat.*  
*e* *37.*

*Oppian.*  
*Hell. 2.*  
*v. 58.*  
*Plin. H.*  
*N. L. 9.*  
*e. 42.*  
*Oppian.*  
*Hell. 2.*  
*v. 55.*  
*Aristot. H.*  
*A. L. 9.*  
*e. 37.*  
*Plin. H.*  
*N. L. 32. c. 1.*  
*Æliani.*  
*H. A. L. 9.*  
*e. 14.*  
*m* *Athen.*  
*Dipn. 1. 7.*  
*n* *Oppian.*  
*Hell. 2.*  
*v. 55.*

*o* *Kircher.*  
*neru. L. 3.*  
*Magnet.*  
*art. p. 6.*  
*L. 4.*  
*p* *Galien.*  
*L. 3. de A.*  
*diocrit.*

foro

q. Diosco-  
rid. l. 2.  
mater.  
med.  
c. 17.

Plin. H. N.  
l. 32. c. 10.

foro piscatio vendatur, præfesta-  
nitatis autoritate cautum est. Ge-  
nux, Massiliz, & alibi à tenuiore for-  
tuna expetitur. In *Medicina* diuturnis  
capitum q. doloribus admoveatur: &  
sedem prociduum coërcet, idem apud  
Marcellum Empiticum invenies.  
fortè & arthriticos demulcet;  
eodemque modo Anteroëa Cæsaris  
libertum supra fidem podagram cu-  
rassè. Scitibonius Largus testatur. &  
Diatrypænos cetatum apud Ægine-  
tam ad podagram habemus. Mitum,  
si verum, quod ea Plinius si capiatur  
cum Luna in libra fuerit, triduoque  
asservetur sub dio, facilis partus face-  
re postea, quoties inferatur. fortè  
quod velut induciis dolorum datis,  
natura ad excludendum sæctum fir-  
matur. Corium nuper decorticarè, si  
parti matricis prolapsæ involvatur,  
ipsam reducere, Aëtius ex aliis ha-  
buit.

## PUNCTUM II.

### De *Pastinaca marina*.

TAB.  
IX. 7.

QUEM Græci *παρανία*, seu ut D.  
Ambrosius vertit, *Turturæm*, ab a-  
larum expansarum similitudine vo-  
cant, is Latinis *Pastinaca marina*, seu à  
colore, seu quod radio suo ceu pasto-  
no instrumento fossorio fodiat &  
pungat: Gallis Raja, ob similitudi-  
nem quam cum Raia habet, dicitur.  
Duas eius species Bellonius & Ronde-  
letius agnovere. hic capite tantum  
& rostro differre ait: ille in *levem*, cu-  
ius cutis perpolita, dorsum livet in  
corticis platani modum, ventet albi-  
cat, plurimis veluti stris, per carnem  
hinc inde deductis; & *Asperam*, quæ  
tota aculeis horret, atque ad caudam  
perfertim permultis uncinis in gy-  
rum dispositis scaret; dispescit. Ma-  
gnitudine vix denas libras superant.  
Corporatur quadrilatero, ventre  
albicant, dorso livent. Superiore par-  
te aliquod capituli vestigium ante-  
rius cernitur, capiti palustris ranæ  
non ab simile: in eo non nisi oculi ob-  
longi & grandiusculi, à quibus fora-

mina bina, oculis maiora, semper pa-  
tula, in palatum deducuntur, pars  
oculis anterior in tostrum carnosum  
acuitur. Os habet parvum & eden-  
tulum, (mendum in Dioscoride, si  
dentes habere innuit) & laque ma-  
xillæ asperitate illorum vice utitur.  
*Pinnis* carent circa caudæ exortum  
unam orbicularem si excipias, idèò  
latitudine sua \* natant. *Branchias* in \* *Arist.*  
medio ferè venite quinz, in partibus *H. A. L.*  
flaccidis & carne vacuis, (partes a c. 5.  
circa caudam mediis partibus car-  
nosiores habere, catralagineis planis *L. 3. Ab-*  
commune est,) sitæ sunt. *Caudam* *ment.*  
habent longissimam, spinosam,  
muris caudæ perisimilem, Crassa  
primum, paulatim in magnam tenui-  
tatem stringitur. super eam, in medio  
ferè a culeus ossis, longus, acutissi-  
mus, & ferratus, quincunciali magni-  
tudine, Dioscoridi *αίχμη*, Horo A-  
pollini *αίχμη*, Plinio radius eminet.

Quantum ad *interiora*, Venticu-  
lum habet parvum, augustum, cui,  
quia satis ab ore distans est, *stoma-*  
*chus* præponitur: idem in ecphylin à  
quæ breve & gracile intestinum de-  
pendet, quod aliud initio angustius,  
mox sensim latius, dein priusquam  
maximè dilatetur, angustum postre-  
mum in rectum intestinum desin-  
ens, & unde excrementa porracel  
coloris rejiciuntur, desinit. *Secur*  
amplum, ex albo flavescens, in duos  
lobos, quorum dexter latior & ma-  
ior, sinister brevior & minor, divi-  
sum. *Fel* hepatis adnexum, ex viri-  
di flavescens. Uterum oblongum,  
quo ova continentur.

*Degunt* in cœnosis maris locis. Car-  
nibus vescuntur \* & latrociantur \* *Plin. H.*  
ex occulto, transeuntes radio (quod *N. L. 9.*  
telum est eis) hgentes; nec quen-  
quam \* attingunt, nisi telo suo vul-  
neratum. *Oppian.*  
*Halicut.*  
*L. 7. 472.*

Ex insidiis venari, quod Mugilem  
velocissimum piscem assequantur,  
argumento esse potest. *Cottus* b. *Aristot.*  
ut Raja, ad motis invicem non so-  
lum partibus supinis, sed etiam tergo c. 3.  
sceminarum supinis marium, super-  
positis. Fœtus aliorum cartilagi-  
neorum more non recipiunt. *Id H. A. L. 6.*  
enim c. 10.

d. *Elia.*

H.A. l. 8.

c. 26.

e. *Elia.*

H.A. l. 9.

c. 40.

f. *Idem* l. 1.

c. 30. l. 17.

c. 18.

g. *Elia.*

l. 1. c. 56.

h. *Elia.*

l. 1. c. 50.

i. *Galen.*

l. 3. d. 10.

k. *Diaga-*rid. *Mar.*

lib. 1. 2.

c. 22.

enim acuties caudæ pibet. *Palatum* d quoq; exercere, falsò apud *Elia-* num dicitur: sed e radii sui veneno se tueri, tam certum, quam *Mulicæ* dieteriis & saltationibus f delectari; ambiguum videtur. De ejusdem radii venenositate non est quod dubitemus. Nullum usquam exetabilius, arbotes, infixus radici, necat, arma, ut telum perforat, visceri & veneni malo, non tamen, ut nulli temedio, quod *Elia*nus g prodidit, succumbar; & necesse fuerit h *Leonidam*. Byfantiumm occumbere: Benè radii cinis cum aceto vulneri admo- vetur, feliciter fursutes in eodem cocti auxiliantur. Lauri decoctum, Thetiaca *Andromachi*, Galeus, cum quo inimicitias gerit, haud frustra adhibita. Cauda, quæ idem inculit, in arbotem, quercum inprimis, infixa, autde eadem suspensa, emarci- dam eandem evadete, sanari ægrum, *Aëtius* prodidit. De *Pfu* in cibo, ne falsò i *Galenus* mollem & jucun- dam carnem eius faciat, vebemen- ter metuo, gustus in suavem & feti- numquid respicientem, restatur. In *Medicina* mitigat k dentium dolores radins, quos frangit & extrahit, Torteri eum, mox conterì resina- que excipi, debere, apud *Celsum* legimus.

## PUNCTUM III.

## De Aquila.

TAB.

IX. 8. 9.

a. *Plin.*

H.A. l. 9.

c. 24.

Q Uid per Aquilam piscem, seu *Quintus* veteres voluerint, difficul- ter sciri potest, planum a duntaxat, & cartilagineum, animalque pa- rere, ab omnibus proditum est, ra- dium aliquem in cauda habuerit, nec ne, reticere. Non mirum itaque in diversa recentiores tra- hi, & unam à *Salviano*, quam *Rondeletius* altetam *Pastinacæ* spe- ciem facit, duas ab *Aldrovando*, monstrosam à *Bellonio* & *Parzo* describi, *Salvianiana* magnitudine trecentas libras non superat. Lævi & molli cute tegitur, inferiore

patte alba, supetiore livida. *Caput* habet exertum, capiti bufonis simili- mum: oculos magnos, rotundos & prominentes, post quos bina, ma- gna, & patula foramina insculpta sunt. Os supina parte mediocre & denticulatum. *Latere*, quæ acu- ta, expansas volantis *Aquilæ* alas æmulantur. In caudæ exortu u- trinque una patte & rotunda pin- na exoritur, in *meribus* ex utroque podicis latere, una appendix pendet. Cauda *pastinacæ* tenuior & longior; in dorso paulo post prin- cipium pinnatam unam erigit, at- que hac deinceps aculeus ossis, longus, acutissimus atque serratus, eminet. *Intra*. Jecur est subflavum, lien subater. *Aldrovandi* prior vi- detur *Antipater*, latissimis alis, qua corpori hærent cartuleis, in ex- tremirate rubris. *Altera* supra o- culos & in fronte aculeata est, in cauda binos gerit radios. Cænosa hi pisces in mari loca incolunt, re- supinati piscibus aliis vescuntur, quos ex occulto figunt. Vivos fœ- tus cartilagineorum mote pariunt. Radio lædunt, idè publicè cum eo non divenduntur. Caro quia tetrum & gravemspirat odorem, à mensis exulat. Quæ de lapide in capite eius à *Kiranide* scribuntur, fabulosa sunt. *Bellonii* verè monstro- sus est, descripsit eum *Gesnerus*. *Piscis* hic rarus ( inquit ) & ignotus omnibus, & *Parzus* volantem facit, contro. *Vitidi*.

TAB.

XII. 2.

## PUNCTUM IV.

## De Rayjs in genere.

R Ajarum nomen fortè à radendo TAB. X. Latini sumere. Græci à qua- 12. dam cum rubo similitudine, sunt dorso asperæ, ut recurvas supina par- te rubus, spinas gerit; *Bæm* marem, a *Plin.* H. 2. *fœminam* *Basilida* dixere. *Plinius* a N. l. 23. Græco vocabulo utitur. Ex cartila- c. 11. gineis b & planis esse nullum du- b. *Argost.* bium. *Albertus* in pectinum ge- H. A. l. 2. nete posuit. Tria verò illarum c. 13.

E apud

Plin. H. N.  
L. 9. c. 24.

Ælian.  
H. A. l. 13.  
c. 4.

TAB.  
XII. 1.

apud antiquos *genera*. *βένι*, unum simpliciter, *ἀνθρακί*. Alterum Aristoteles & Galenus vocaverunt, *stellatū* Arhenzus addidit. Rondeletius postquam in *leves* & *asperas* eandem divisisset, mox stellulis notatas, iisque carentes addidit; & ex *asperis*, alias modicè tactum vellicante lanugine, alias robustis sed raris aculeis; quasdam robustissimis & densissimis asperari dixit. Magnitudine inter se differunt, bicutibiles aliquando *Salvianus* vidit, haud minores *c* Aegolico clypeo in India nasci, *Ælianus* prodidit. Ciculari reguntur operimento, omnibus membranula, quam nebulam vocant, *oculus* obtenditur. juxta oculos foramina sunt magna ampla, ad oris usque intima patentia, quibus operculum interiore parte à natura additum est. Ore aperto dilatantur, clauso magna ex parte occluduntur. *Cauda* omnibus proceraque aspera, in eius dorso duz pinnulæ, rotidemque, sed exiguz & orbiculares ad ejusdem exortum. Quod cartilaginei generis plana, pinnis destitui scripsit Aristoteles, illas quibus natando corpus impellunt, intellexit, quæ ad caudam, dirigendi trinetis gratia data sunt. Si quid in contrarium apud eum occurrit, mendum in causa; *βένι* pro *βένι* legendum est. *Interiora* si lostrinus, *fellis* omnibus in hepate vesica. *Splen* in verticuli plexu; intestina crassa; in ecphyli & recti intestini extremo angusta, generale vitulæ marinæ simile. Circulatores ex exciscatis Draconū & Basiliscorum signas effecerunt, sic plebeculæ imponunt.

Commoda Raiis in cœnosis maris locis, non procul à littore *habitatione*. Hyeme latent, & quia numerosæ capiuntur, gregales haud malè colligas.

*Cœnæ* d non rantum ad motis invicem partibus spinis, sed etiam tergo seminarum lupinis mariū superpositis, nec inrer suum duntaxat genus consistunt. Cum Squatina quoque scripsit Aristoteles. Gerunt utero restacca quædam, resta ribiatum ligulus similis est. Pariunt animal, cum

primum ova intra se pepererint. *Ova* quæ flava, sine testa primam in superiore vulvæ conspiciuntur, quædam magnitudinem ovorum gallinæ æquant, alia his minora, nonnulla cicernæ magnitudinem nō excedunt, pluracentenis in singulis aliquando numerantur. Quæ à perfectione propius absunt, in inferiore matricis partem dimissa, testā, & in qua albumen & ovum continentur, operiuntur, quadrati formæ hz, demptis angulorum, quæ variz sunt appendicibus. Unius lateris appendices longiores, sunt foliis gladioli herbæ similes; alterius, breviores, latiores, replicatæ, quibus undique summotis, laterum anguli, tibiæ repræsentant ligulas. Unū aut ad summū duo pariunt, quod maximè earum in matris provenus, in finira ovorum in superiore vulvæ parte series facit, ex quibus tempore perfectis, iterati fortis excluduntur. Abditas, pinnas exertas movere specie vermiculorū, allapsos ad eas piciculos capere, sic tarditatem motus astu compensare *c* Plinius author est. Aristoteles radiolos vocat. Mendum tamen hæc locis subesse, suspicio est, cum nec pinnas nec radiolos habeant, vel pinnas Plinius improprie vocavit, & radiolis ab Aristotele tributum, quod rostri acuminis cōperere viderur. Olaus quondam depingit; quæ homini in septentrionali Oceano circumvenro superpetas tulerit. *Vis* etiam in *Cibis*. Copiosioris nutrimenti & concocti difficles *f* Galenus facit. Rondeletius de Rajæ bonitate quæritus, perinde ac si quis pallium elixum comedar, respondit. Arcestratus scapulas & liyeme laudat. Laterum extremas partes à divitibus comedi, reliquas plebi relinqui, ex Gesnoro habemus. Apud Hollandos porissimum elixantur, butyrum, acerrum, & sinapi condimenti loco sunt. Cæseo & Silphio veteres condebant. In *Medicina* autibus felis est utilissimum, hepate ad pruritum feliciter Rondeletius usus est.

Pun.



## Рангстун V.

*De Raijs Levibus, & in spe-  
cie de Levi Raja, Vndu-  
lata, & Oculata.*

ТАВ.  
X. 1, 2, 3.  
45, 6.

**R**ajæ in Leves & asperas optimè distinguuntur : Inter illas quarum alæ acutæ, alæ obtuso rostro sunt, prima est quæ *ειδωτα* simpliciter Græcis, *LEVIATA* Latinis, *Mucosa*, & à lata fascia quæ mucus seu potius coryza in laborantibus excipi solet, *Sarxsa* Romanis dicitur. Omnium est sui generis piscium post bovem maxima.

Corporē quidem tenui, sed in amplissimas alas expanso. Cute abaculeis nuda. Uterque oculus, mediadorsilinea, & cauda tenuioribus & raris aculeis muniuntur, sed & in supina parte quidam in os quod latum est, cibi leni dubioretinenti causā, recurrerunt. *Rostrum* tenui & pellucida cartilagine, constat. Alæ utrinque expansæ tennes sunt, & prona parte nigrescent. *Cauda*, quæ tribus aculeorum ordinibus, instruitur, tota supina parte alba est. Rima quæ podici, pudendum muliebri refert. Quam Aldrovandus describit, maculis supina parte nigris undique variabat. Rostri pars in obtusum angulum, figura depressa, & quasi quadrangula tendebat. Branchias quinque detectas, habebat. Inter eam & peritonæum alba carumosa, panniculi carnosii vicem obtinebat. *Intera*, hepatis erat in latitudine ventris, ex albo rufescens, tribus lobis, linguarum figuram referentibus, quorum medius brevissimus, distinctum. Sub hepate figuræ planæ ventericuli, pars convexa ad sinistrum vergebat laevis, concava in spinam. *Mesenterium* ad connexionem ventericuli & intestini medio hepatis lobo colligabatur, sub ventericuli caro cernebatur rubicunda, lienis fortē vice fungens. *Corythoracis*

sinu exiguo triangulari, exiguum.  
trunco unico veluti pediculo appen-  
sum continebatur.

**RATA UNDEULATA** à maculis flexuosis ita dicta, a colore *Cimerea* dicitur. Corpus ovipotius est, quam *Rhombi* forma, & pronè patte multis sinuosis lineis descriptitur. *Aculei* in linea dorſi pauci, parvi, & rari circa oculos vnulli; in cauda majores & dentiores triplici ordine disponuntur.

**RAIA OCLATA** & lævis, Aste-  
tias quibusdam, sed perperam dicitur.  
Nam & *Galeus* à maculis, Aste-  
tias à maculis stellatim dispositis ab  
Aristotele nominatus est: quales in  
istamini me deprehenduntur; & Aste-  
tias veterum tenacior est bonique  
sucui; quod de hac dici non potest;  
& Galli hoc genus Miralet non specu-  
lorum parvorum similitudine vocare  
solent.

## PUNCTUM VI.

*De Oxyrincho majore &  
Raja stellari.*

**D**UO OXYRINCHORUM genera TAB. X. 8.  
(à costri acumine ita dicuntur)  
Rondelertius facit. *Maiorem* unum,  
*Attiorem* alterum. Bos ille Bellonii  
est; non quod quadrupedem repræ-  
sentet; sed quod Rajarum generis  
maximus, ad Bovis magnitudinem  
excreseat. Liqueus *vaccam* vocant, in  
quibusdam Gallis locis *Eleno*, quasi  
subulam, quod piscis ostium tale sit,  
dicitur. Ex *a* planis catilagineis Bo-  
nem esse dubitari nō debet. Ad duo. *H.A.L.3.*  
decim ulnas latitudinis excreseat. *c.5.*  
*b* Oppiani auctoritate affirmo. In  
descriptione non conveniunt Au-  
thores. Dorso, facie, lateribus admo-  
dum niger est. Supinæ partes albi-  
cant, si *Aliano* credendum. Bel-  
lonius toto corpore lividum facit. *H.A.L.1.*  
Eidem dentes habet teretes, hami in-  
modum inflexos, triplici ordine in  
maxilla dispositos, cosque mobiles.  
*d* Oppiano sunt obscuri & exigui. *d* Oppian.  
*Aliano* ad eō indusi, ut in conspe-  
E 3

TABLE  
X. 8.

1

• *Arifler*

H.A.L.G.

PLW, H.

b Open

Haber,

C. A. Chapman.

H. A. J. 10.

10

Office.  
C. F. 142

1998

Atum non veniant. Rondeletio Major Oxyrinchus minori similis est, alis amplis & extrusis, ipso corpore strictiore, acutioreque dorso longiore. *Aculeorum* in sola cauda unicum haber ordinem. Pelagii sunt & Ovioboves; in cœnolis locis degunt Oppiano; Æliano in lutosiis gignuntur. Piscibus *vescuntur*, sed humum maximiè apperunt. *Parvum* statim animal. Corpore etsi sint magno, idco quibusdam inter Cetaceos, imbelli ramen, mollitie consci, sola corporis mole feruntur, sic & piscentes pondere suo opprimunt, & capri, renituntur. Carne sunt quam ceteræ molliore, & sale fumoque conditi exsiccantur, exsiccati diu incorrupti remanent.

c Ovid. in  
Halien.

Æ Aristot.  
H. A. L. 6.  
6. 12.

TAB. X.  
9.  
TAB.  
XII. 7.

OXYRINCHUS Minor corpore est maximo, & maculis multis lentis specie, notatur. *Dentes* habet in os vergentes. Ad oculos quatuor aculeos; in cauda tres eorum ordines, diversos & inæquales; primus medii ordinis maior est secundo, tertius primo, quartus secundo respondet. Utrinque per transversum recti sunt, ad latera conversi, qui per hos sequuntur in cauda extremi, in caput recurvantur. In supina parte rostri, alii sunt ad capiendos pisces recurvi, alii acutiores. Cæteris partibus cum reliquis conveniunt. Ad Oxyrinchos referri debet ille, quem Gessnerus Venetiis accepit, corpore cinereo, maculis distinguendis fuscis, ambitu corporis subrufo, Normannis Hal, Lusitanis Huga dictis.

*Teonem hic vide.*

TAB.  
X. 7.

RAJA STELLARIS lævis, Græcis Asterias, quam Gellius Rajam ocularam esse vult, capite, dorso, & cauda ab aliis distinguitur. Dorsi pars prona alæque expansæ, stellulis, elegante, depictæ conspiciuntur. *Aculei* in eodem mox à capite incipientes, in priorem caudæ pinnulam definunt. *Caput*, quia crassius & latius, Pastinacæ quàm aliis Rajis similis est. Cauda tenuis, & quàm reliquis brevior.

# PUNCTUM VII.

## De Rajis Asperis: & in specie de Raja aspera Stellari, Oculata, & Clavata.


RAJA ASPERA STELLARIS tota aculeis horret. In oculorum intervallo multi sunt, breves, frequentes, peracuti: in mediis dorsi lineæ alii magni, in cauda tres magnorum ordines, alii plurimis & minoribus distincti, infiniti alii sine ordine per totum corpus resperguntur, pro dentibus ossa dura & aspera gerit. Dux huius generis esse videntur. Una quæ stellulas habet in medio albas, sed quas ambit circulus ex nigris punctis constans, eorumque corpus aculeis horridum est. Altera, stellulas prorsus candidas, cum multo paucioribus aculeis obinet.

OCULATA lævi maculis similis est. *Aculeos* in alis extensis regione macularum utrimque habet, alios in lateribus capitis utrinque, alios in dorso, in cauda, maiores, frequentiores, & validiores visuntur.

RAJA CLAVATA duplex est. Una quam Massilienses Clavade, Gallii Raye bouclier vocant. Corporis specie reliquis est similis, sed multo brevior minusque acuto, &c. Colore nigricante, alis valde expansis. *Hepar* habet flavescens in duas partes dissectum, in quo vesica, fel aquenm & tenue continens. Pingue est illud, & inter cibos delicatissimos, in oleum resolutum, hepatis dignitatem resolvit. Carne est durum. Possent Aquilæ confecti.

Alter a superiore differt (Verba sunt Rondeletii, cui multas Rajarum species debemus,) &c. Congener hisce est & illa. Cuius icon Venetiis ad Gessnerum missa est. Maculis distinguitur fuscis, reliquum corpus obscure subluteum est, reliqua apparent.

PUN-



*Pisces exsecrati et conuulsi ad formam.*

*Monstrum Piscis Volantis. Tab. XII.*



*Piscis Latus. Spargel. Poch.*





Rana Reche. Tab. XI

Rana Clavata Reche.

Rana Clavata alia



Rana spinosa. Doren Reche.



L.avis Rana  
du species.



Squatina  
Angelus  
maior.



Mar Engd.



Pana.  
Piscator  
Sudo.

Mar Frotte  
Mar Michel  
Fischer Pott.



Aldrounuk.





*Rana*



*Rana*

*Rana*



*Rana line*

*Glatte Raie*



*Rana*  
*Glatte Raie*



*Glatte Spindel Raie*

*Rana*  
*Cristata*  
*alba*



*Glatte*

*Leier Raie*

*Leier Raie*

*Rana*  
*Sperma*

*Rauder Raie*

6

*Rana*  
*Atheria*  
*di zorra*



*Fisch*  
*Raie*




*Rana*  
*Anguiformis*  
*maior*

*Der Gr. Stiz*  
*Stiz*  
*Maier*

*Rana*  
*Anguiformis*  
*maior*

*Kleiner Stiz*  
*Raie*





## PUNCTUM VIII.

De Raja spinosa, Aspera,  
Fullonica, & Asperri-  
ma.

TAB.  
XI. 5.  
Aldrov. de  
Pisib. l. 3.  
c. 59.

**R**AJA SPINOSA Gallis Cardaire, quasi *Lanifica*, à spinis seu aculeis quorū multi infixi sunt instrumentis quibus lana carminatur, figura corporis lævi rax similis est, si longas cutis spinas excipias. *Spinæ* non in alis solum habet, ut clavata altera, sed etiam in lateribus circa caput, duo oculis præfixi sunt, & in media dorsi linea, & ad priorem usque caudæ pinulam continuus est aculeorum ordō unicū. Carnis substantia & succo ab aliis non variat.

TAB.  
X. 7.  
Aldrov.  
Ibraut.  
cap. 60.

**ASPERA**, illa à Rondeletio cognominatur, quæ à cæteris eo differt, quod *aculeis* parvis latera conspersa habet, corporis verò truncum nullis. *Rostro* est acutiore. In cauda tres sunt longorum & firmissimorum aculeorum, ad extremum usque caudæ ordines.

TAB.  
XI. 4.  
Aldrov.  
ib. cit. 61.

**RAJA FULLONICA** ab eodem inditum est, quod ubique in alis, corpore, capite, cauda, tota frequentissimis aculeis conspersa sit, instrumenti illius, quo fullones pannos poliunt instar, quod totum aculeis ferreis confectum est. *Rostro* est satis longo & acuto. Caudæ aculei incurvi sunt, triplici ordine dispositi. Rara est, & pugnacissima esse creditur.

TAB.  
X. 6.  
idem c. 62.

**RAJA ASPERATIMA**, à præcedente eo tantum differt, quod non solum prona, sed etiam supina tota aculeis peracutis ita horret, ut manu tolli non posset, nisi pinnulis cauda apprehensis, ideo supina in icone exhibitur; pro dentibus maxillas habet asperas & osseas.

## PUNCTUM IX.

## De Rana marina.

TAB. XI.  
8.  
Pisib. de  
Idol. l. 4.  
c. 28.

**R**ANAMARINA, Græcis βαταρχία dicitur, Plutarcho βαταρχία ἀνδρὸς nomen ranæ ex eo forte meruit, a quod gyrtinas sive ranulas recens editas, & imperfectas, oculis quidem & cauda notabiles, sed quibus postea demum accessuri sint pedes & cau-

dz notabiles, sed quibus postea demum accessuri sint pedes & caudæ fissura, referat. Avenando solertia *Præfatrix*, quod & à Plutarcho factum; ob formam corporis monstrositatem *Diabolus marinus* Dalmatis; ob oris hiantis amplitudinem, *Lamia* Siculis; ob carnis molliem *Maltha* Bellonio; sed perperam dicitur. Magnitudine est ubique ferè pedali & cubitali, alicubi tricornitalem inveniri, *Salvianus* auctor est. Cute capitis, *aculeis* exceptis, lubrica & molli, infernâ parte subalbida, superna verò ex nigra flavescente tegitur. Unde molles, *Ovidio* tergo *Ranæ*. *Caput* habet toto corpore longè grandius, ut nihil in eo præter caput & caudâ conspicias aculeatū, asperū, orbiculatū atq; depressum. *Orin* promptu, seu anteriori parte, secus ac alis cartilagineis, variatum, pro corporis proportionem grandissimum, ac quam maximè hians.

*Dentes* permultos magnos, acutissimos, in os recurvos, utrique maxillæ, duobus palati ossibus, & linguae radici infixos. *Bellonius* mobiles, albos, & confusis ordinibus dispositos facit. *Maxille* ipsi tetuli, semicirculares, quarum superior brevior est, inferior longior & prominens.

*Lingua* maxilla superiore longior. Membrana quædam gingivanum interiori parte enata, & in os complicita, quæ à maxilla separari non videtur. *Oculi* ampli in capitis vertice potius quam in temporibus siti, *aculeis* septiuntur: Ante eos duæ propendent appendices, tenues, albæ, cetri odoris, si *Oppiano* credimus. In medio nasi *pinna* oblonga prædura, & versatilis, visitur: à cuius extremo mu-

sculus quidam ceu cirrus instar fili subtilissimi deducitur, per eius cavū humorem certum in fundum usq; circumferitur, ubi coacervatus ad vivi vermiciuli similitudinem rumer. Omnia hamum piscatoris ex ætate exprimunt.

Parvæ ex rostro albicantes caruncule, & eminentia sub oculis cotinula *Plinio*, fila capilli speciei referentia, postremis quibusdam præpilatis, *Aristoteli* & gracilia quædam cornua *Bellonio*; pilli *Gilio*; geminæ rigidæ albæque setæ *Salviano*, dicuntur.

b. Argyl.  
l. 3. de ge-  
nerat. c. 3.  
Alian.  
l. 13. c. 2.

Kircher.  
l. 3.  
Art. Ma-  
gnet. p. 6.  
Oppian.  
Habent.  
l. 2. v. 90.  
d. Argylar.  
H. A. d. 9.  
c. 37.

cuntur. *Branchiæ* neque detectas, *e* neque iupina parte cæterorum planorum cartilagineorum more, sed in lateribus, non spineo operimento, sed cuticulari intestas habent. *Pinnæ*, contra cartilagineorum planorum morem, in medio corpore, ubi cauda capiti iungitur, membranasceas & crassiusculas duas, propter amplitudinem patris superioris: in superiore caudæ parte una non admodum lata, sed longiuscula conspicitur. A capite illico cauda sequitur, rotunda, brevis, carnosâ in pinnam, rotundam, crassiusculam & latam desinens. Ex huius & capitis lateribus, appendiculæ carnosæ, certis intervallis à se distantes, dependent, quæ, natantes rariâ, supernantant. *Intra*, si species, *peritonæum* videbis nigrum, ventrem magnum, carnosum, appendice utrinque unica & brevi instructum; intestina gracilia, multis gyris circumvolata; jecur parvum, rubescens, in quinque lobos, ut Bellonius scribit, divisum. (Rondeletius sectum negat) eorum utrinque binâ ad latera protrahuntur. *Fellis* vesica longo meatu ex hepate propendens, intestinalis annexitur. *Vulva* est bifida, anfractuosa, duas ulnas longa, tribuit & vesicam, sed nescio quam verè Bellonius, & addit, totidem in Rana numeratas cartilagineas, quot in quovis sceletro, ossium animalium terrestrium formas referentes, quæ prorsus medullâ, præter vertebrae careant; totidem item nervorum conjugamenta in eius cerebro, multò tamen liquido, numerari, quot in reliquis animalibus numerantur. *Ventriculus* & interanea, si per os eximantur, corpusque quoad eius fieri potest, distendatur, totum perlucidum, & instar carbunculi fulgens evadit, immissoque lumine, laterna horrendo aspectu apparet. *Locum* ipsi herbolæ d' maris partes & e' littus. *Cibus* carnes humanæ etiam. Natantem aliquando virili mēbro apprehensum in profundum detraxisse, Gesnerus f se audivisse refert. Contra cæterorum cartilagineorum morem, *Ova* non animal g pariunt. Caput corpore

grandius & aculeatum in causa, quod ut aditui sic exitui, ineptum est. *Ovum* unum solidum, durumque ut foris servetur, cum cæterotum cute molli tegantur, Aristoteles h' prodi- dit. *Univerſa* simul juxta terram edunt; ortus cum iis, quæ extra perfriciuntur, & iis, quæ intus, idem. Numerosius i quidem fortificant: sed quia de facili pereunt, pauciores reperiuntur. Aliquando extra aquam vivere, Rondeletius testatur. Vita duos in littore dies inter herbas vixisse, vulpeculæque terrenæ noctu victum queritantis pedem, dentibus attriuisse, & ad aurorâ detinuisse. *Solitaria* esse ex eo, quod plures una capi non soleant, colligitur. *Plana* quamvis, non sola tamen latitudine natar, sed pinnulis etiam, quas in lateribus habere dictum est. Singulati in venando & astuuntur. Inter saxa conditæ, apertæ immanni ritu, mentitum vermiculum musculo annexum, per pinnam in faucium rictum conjiciunt, eo viso pisciculi cœu ad escam accurrunt, rictum, cavitate malleolus saxi reputantes subintrant, piscatores retracto, qui vellitur hamo, orisque rictu clauso, totum pisciculorum gregem devorant. Macilentiores, quæ præpilatis villorū capitibus destituuntur. *Pisus* earum in cibo ferè nullus. Insula, mucosa & fetida saporis carne præditæ sunt. *Anaxandrides* tamē eas in Cotyis Thracum Regis cœviviis teponit. Ventrem inter lautissimos cibos Antiphanis recenseret. In Medicina scil ad versus suffusiones utile est. Quod strumas utiliter pungi, piscis eius qui Rana in mari appellatur, ossiculo de cauda, ita ut non vulneretur, idque fiat quotidie donec percurentur, apud Plin. nium occurrit; Rajarum potius aculeis convenit. Nullum enim ossiculum Rana habet. Diversa est ab istis tum illa castanei coloris, ventre candicante; tum Rana MINORA dicitur. Tota tam supinè quàm ponè aspectu curetegitur, supinè aculeata est, & albicat, pronè colore est cinereo. Os habet exile & planè edentulū. Caput erectum & velut cornu in extremo pro-

d' Ondulus  
Habetur.  
e' Marit.  
lib. 10. c. 37.

f' Gesner.  
de Aquat.  
lib. in Ran.  
g' Arist. H.

A. L. 6. 13.

h' Aristot.  
lib. de ge-  
nerat. 3.

i' Aristot.  
H. A. L. 6.  
c. 17.

k' Aelian.  
H. N. l. 9.

c. 24.

Plutarch.  
L. intr. ani-  
malia.

Aristot. H.

A. L. 9.

c. 37.

Oppian.  
H. A. L. 2.

v. 90.

Plin. H.

N. L. 37.

c. 3.



commisceantur didicerimus. Stant tamen ab Aristotele plerique, Bellonius, Gellius, Jovius, Aldrovandus, Columna præcipui. Castelletus nudum eius sceleron misit & paucis ita descripsit. Neapoli frequens est, quod miror, &c.

<sup>c Athen. l. 7.</sup> LAMIAM, quæ <sup>est</sup> à <sup>gula</sup> quibusdam dicitur. Nicander <sup>c</sup> *Carcharium & Scyllam* vocati scribit, Rondeletius eandem cum Cane Carcharia facit. Plinius inter Cartilagineos planos enumerat. Descriptionem eius nemo veterum suppediat. Maximam evadere, cuti regi scabra os in anteriore capitis parte habere, *dentibus* plus minus ducentis in utraque maxilla per quaternos versus dispositis, ad radicem latis, in acutum & pyramidem delinentibus, ad latera crematis, referunt Bellonius prodit. Verè an falso, non dixerim. Generis Galeorum certè, qui longi pisces sunt, eandem pronunciat.

## PUNCTUM XII.

## De Lumpo Anglorum &amp; Pisce gibboso.

**TAB. XIII. 1.** Piscem qui Anglis Lumpus, quasi massa informis dicitur, sic describitur à Turnero. Piscis edulis est Læpus noster, &c. Dorsum rubicundum, ventrem album habere, & in magnis deliciis reparari Massarias addidit. Nos cum molli & in ore diffuente carne, esse experti sumus, cum Andreadapoli in Scotia studiis operam daremus.

**TAB. XIII. 2.** Piscem GIBBOSUM Græci, <sup>ut dicitur</sup> vocant, reperitur in mari Balthico corii portuncula, quam Fabricius Gesnero misit. Crassiuscula & tenax est, punctis multis seu tuberculis exasperatur. Eminent etiam Spinæ quædam cæci rubi, sed mucrone recto, pyramidis formâ, aliz magnæ aliz parvæ ex fusco albicanres. De sua pictura sic Gesnerus, &c.

\*\*\*\*\*

## TITULUS II.

## De Piscibus Marinis Saxatilibus.

## CAPUT I.

## De Saxatilibus Squammosis.

## ARTICULUS I.

## De Scaro.



Aboluta Pelagiorum natura, Saxatiles sequuntur, XIII. inter hos primos *Scarus*, 3. 4. qui seu *Seri* seu *maquis*, id est, tripudiando, seu quod Athenæo placet, quod inclusus nassis, crebris caudæ ictibus, qui *maquis* seu *maquis* vocantur, averfus, fores laxat, atque ita retrorsum erumpat; seu quæ algam, aliasque herbas depalcatur, <sup>maquis enim</sup> interdum est *viper*, ita dictus, *Meryx* quoque seu *Ruminax*, ut Scaliger vertit, ab Aristotele <sup>hæc</sup> latius utriusque maxillæ dentibus solus ruminet, *Cerebrum* Ennio vocatur. Serò olim Romanis & toti Italiæ visus, idè nec latinum piscis nomen habetur. Duo illius sunt genera, unum quod *seris*, benè ab Oniso distinguendus, quod asino concolor sit, dicitur. *Alterum*, cui *maquis*, ex Nicandro Thiatyrenonomen imposuit & Athenæus. <sup>c Athen. l. 7.</sup> *Oppianus* modò *seris*, modò *maquis* cognominat. *Onias* squammis est magnis tenuibus, colore ex cæruleo nigrescente, ventre candido; Sargo, corporis forma ad rotundam accedente, aculeorum pinnarumque situ, & numero, similis, maculâ duntaxat nigrâ, in cauda, & quod lineis nigris in dorso ad ventrè careat, distinguitur. <sup>c Athen. l. 7.</sup> *Oculi* habet magnos, supercilia coloris indici.

*Dentes* hominis modo planos: imo solus latos, superioribus dentibus carere, quæ Michael Ephesus prodidit, falsum, si *Meryx* est, & habere comperit. *Branchiæ* ipsi binæ, simplices alteræ, alteræ duplices, plura & majora in maxillis ossa tubercula.

Cauda

Cauda lata in duas pinnas non divisa. Cor angulatum, hepatis album interres labos divisum, à quo fellis vesicula intestinis alligata pendet. Felle coloris nigri. Splen ater, ventriculus cum quatuor appendicibus parvus. *Ab. O.* seu *Parus* oculis, ventris inferiore parte, in qua podex, purpurei est coloris, cauda coloris Indici, reliquo corpore partim ex viridi, partim ex nigro cæruleo. Squamis veluti noris obcurioribus aspersis. Ore mediocri, dentibus laris in superiore maxilla densis, in inferiore raris & acutis. *Ventre* in medio duabus purpureis notis insigni. A dorso & cauda ferè *aculei* tenui membrana connexi, æquis intervalhis dispositi, conspiciuntur. In singulotum summa parte membranula pendet vexillimiliter. *pinnæ* ad branchias sitæ laræ sunt, & veluti ovi ea figura. Inrus habet ventriculorum laris capacem, hepatis subalbum, intestina lata & multa, fellis multum, *splenem* magnum. *Quem* *Bellonius* in *Creta* observavit, corpore erat ex livido rubescente, a squamis latis & translucidis. Capite utrinque compresso, dentibus obrusis, quorum incisorii nostris erant persimiles. gulanon valdè magna. Ad caudæ latera appendices transversas atque eminentes, quales in nullo se observasse pisces ait, utrinque habebat Gigantis *Scarus*, dentes habebat utrinque quatuor. Latos in inferiore maxilla, in superiore

brivius capiatur. *A Carpathio* advectus, *Claudio Tiberio Principe*, f (Octavianus Macrobius vocat) è libertis eius præfectus classi, inter Ostiensem & Campaniam oram sparsos disseminavit. E quoque nuncio ferè est cura adhibita, ne capsi redderentur mari. Postea frequentes inveniebantur Italia in litoribus, non ante ibi capsi, admovit, sibi gula sapores piscium satum, & novum innotam mari dedit, ne quis peregrinas aves Roma parere miraretur. Saxatilem esse vix dubitandum. Sig. Oppianus dum inrer litorales recenser, contrarium innuere videtur, vitium est, & benè *emig.* pro *Scaris* legitur. In dulcibus quoque nutritum aquis innuere h. Columella videtur, nisi pro *Scaro* *Squalum* legi debere velis. Sanè haud perperam ex *Varrone* id coniicere, licebit. *Videtur* h. herbis, & algæ pilis, phaeolisque plurimum innhiat *Mercuriali* adeo, ut e. capiat. *Pythagoras* *Pythagoræ* facit, si *Gyraldus* fides est. *Diphilus* *Itamen* carnivorum esse & lepores marinos captare scribit, nisi error committitur. potius namque *Mullo* ista quam *Scaro* conveniunt. Quod *m* solus inter pisces runinet, superius dictum est. *Gregales* esse vel exinde quod sodales & natis liberare conentur, colligas. *m* Caudam capitis mordendam porrigunt. apprehensa educunt. Quod nocturnon capiuntur, vigilantiz ipsorum deberur. malè *Gelepius* adeo solum inter pisces dormire scripsit. Melius dices, *solent*

*Epim. H.*  
*N. l. y. 1. 17*

*Oppian.*  
*Nature.*  
*L. y. 109.*

*h. Columel-*  
*la. l. 8. c. 16.*  
*l. y. 1. 17.*  
*R. R. l. 3. c. 3.*  
*h. Aristot.*  
*H. A. l. 8. c. 2.*

*Plin. H. N.*  
*l. 9. c. 17.*

*Oppian.*  
*Nature.*  
*l. 109.*

*Epim. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*Plin. H. N.*  
*l. 9. c. 17.*

*Oppian.*  
*Nature.*  
*l. 109.*

*Epim. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*Plin. H. N.*  
*l. 9. c. 17.*

*Oppian.*  
*Nature.*  
*l. 109.*

*Epim. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*Plin. H. N.*  
*l. 9. c. 17.*

*Oppian.*  
*Nature.*  
*l. 109.*

*Epim. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*Plin. H. N.*  
*l. 9. c. 17.*

*Oppian.*  
*Nature.*  
*l. 109.*

*Epim. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*Plin. H. N.*  
*l. 9. c. 17.*

*Oppian.*  
*Nature.*  
*l. 109.*

*Epim. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*Plin. H. N.*  
*l. 9. c. 17.*

*Oppian.*  
*Nature.*  
*l. 109.*

*Epim. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*d. Columel-*  
*la. R. R. l. 8.*  
*c. 17.*

*† Plin. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*† Aristot.*  
*H. A. l. 9.*  
*c. 17.*

*† Plin. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*† Plin. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*† Plin. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*† Plin. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*† Plin. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*† Plin. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*Epim. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*  
alicubi somnum nocturnum sub latebris capere, sic insidias vitare. Salacissimum esse *Alianus* prodidit. ideo *n* sexmine capiuntur. *Parere* his in anno fatendum. hoc *o* Saxatilibus commune. *Vocalem* esse, quod apud *Athenzum* *Oppianum* *Tzetzen* c. g. proditur, dubium, cum pulmones non habeat, nisi ore aquam impellendo sonum edere dicamus. *Vsum* si attendamus, in delicatissimis olim apud Romanos eibus erat, & iecino-racorum in *Virelli* Principis patina inter lautiores primitias enumeratur. Primas inter *Saxatiles* tenere, &

*d. Plin. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*  
*o* *Aristot.*  
*H. A. l. 4.*  
*c. 9.*

*Plin. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*Oppian.*  
*Nature.*  
*l. 109.*

*Epim. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*Plin. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*Oppian.*  
*Nature.*  
*l. 109.*

*Epim. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*Plin. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

*Oppian.*  
*Nature.*  
*l. 109.*

*Epim. H.*  
*N. l. y. 1. 17.*

F. mollis

p. Celsus.

q. *Ælian.*  
H. A. L. 14.  
c. 1.

mollis ac friabilis carnis esse, nullum videtur dubium: quamvis p. Celsus & Philotimus aliter credidisse putentur. Insuper esse nisi cum suis facibus edantur, creditum apud Græcos. Jecur in cibo sumptum ictericis prodest, apud q. *Ælianum* legimus.

## ARTICVLVS II.

## De Turdo.

TAB.  
XIII.f. 6. 7. 8. 9.  
10. 11.a. *Athen.* L. 7

**T**urds Græcis αἴζας à macularum similitudine sic dictus, f. 6. 7. 8. 9. olim recte Nicandro & Pancræ apud a. *Athenzum* fuit. *Athen.* L. 7 Duo ipsorum Genera constituit *Salvianus*, *Maiorem* & oblongum, qui vel viridis vel ruber est. *Rondeletius* duodecim species pinxit. *Verribus*, apud *Athenzum* μαυροὺς αἴζας, seu nigris oculis varius. *Eratoſtheni* πικρὰς seu nigro distinctus, *Pancrati* αἰσίδης quali vini colorem referens, *Numenio* αἰσίδης, id est purpureus dicitur. *Phavorinus* μαυροὺς αἴζας vocavit. Mutare tamen colorem dicuntur. b. *Cirea* ver magis exsaturatos, diluros magis æstare videas. Branchias ipsi quaternas *Aristoteles* e tribuit omnes duplici ordine excepto novissima. Quinque sunt ab *Aldrovando* observari, duodecim à *Rondeletio*. *Primus*, qui magna ex parte aureus, amethystino, cæruleoque ac rubro variatur, os inrus habet ruberrimum, dentibus carens. Oculos maximos, quorum auream pupillam circulus ambit niger, nigrum rursus aureus, aureum cæruleus, hunc iterum aureus, ac tandem niger, alias omnes ambit. Habet & duas è mento dependentes, apophyses cutaceas, subflavi coloris, tres præ cæteris lineas sanguineas, & denticulatas. Pinnae ad branchias omnino aureas, in pectore rorae cæruleas, nervos earum aureos. Cuius coloris sunt & illæ, quæ abano, in dorso & cauda, qua uropygio junguntur, maculis duntaxat parvis sanguineis resperfas, cæteras cæruleas conspicias. *Se-*

b. *Aristot.*  
H. A. L. 8.  
c. 11.  
c. *Aristot.*  
H. A. L. 2.  
c. 13.

cundus ad lacerum non nihil albicat. in capite vermicularibus, alibi rotundis, ubique cæruleis maculis insignitur. Tergoris pinna ex aureo rubet, sicuti & cauda, quæ in extremo cærulea est. Utrunque dentatus est. *Tertio* Corpus subviret, venter albicat. Squamarum extremitates cæruleæ sunt. Caput pro corporis proportionem parvum, totum cærulei sed dilutioris coloris, præter branchiarum opercula, quæ candidant, maculisque oblongis & semicircularibus aureis consperguntur. Eiusdem coloris lineæ decussatim & transversaliter per corpus decurrunt. Dentes habet maximos, acutissimos, ingenremque oris rictum. *Quartus* toto corpore sanguineo, aureoque distinguitur. dorsum & corporis maculæ ex cæruleo nigricant. *Quintus* αἰσίδης, totus ruber saturatus. Maculæ in extremo tergo conspiciuntur, orificiis non absumis, sunt nigrae, in capite longæ, & serpentes in morem scære contortæ, cæruleæ. Lineæ à capite ad caudam recta ducuntur, rubrae sunt.

*Turdus Rondeletii Primus* admodum varius est. Unde αἰσίδης dictus, adauratæ figuram accedens, pinnarum situ numeroque cæteris saxatilibus similis, dorso fusco, ventre ex albo livescere. Dentes habet recurvos, labra crassa, & rugosa. Oculos sub quibus pars variis coloribus est illustris, magnos & rotundos. Pinnae ad branchias aureas, ad podicem & in tergo flavas, nigris cæruleisque maculis asperfas. *Alter* colore est ex viridi cæruleo, & quia colorem colli parvus in pinnis & in cauda refert, Pavo dicitur. *Tertius* qui Pulcher dicitur, & à quibusdam *serculum regium*, multas colorum differentias habet. Viridis est magna ex parte, sed punctis purpureis, cæruleis, Indicis, & aliis confusis coloribus conspersus. pinnis ad branchias flavis seu rufis, aliis omnibus partem cæruleis, partem viridibus, partem rufis. Branchiarum operculis punctis & lineis

neis



Pase Meer Pine

Turdu



Atagenn. alus

Atagenn. Lyras. Peter Kramet fish







*Porogadus*

Tab. XIII.





neis rufis, linuofis, certis fpatiis dif-  
fis. Cauda rufa punctis cæruleis,  
notata. Romæ & in Levino Infula  
frequentiffimus eft. *Quartus* circa  
Monspelium Plittacus, ab eadem co-  
lorum varietate dicitur. Dorfo eft  
nigrefcente, pinna eius virefcence.  
Ventre & lateribus flavefcentibus. A  
branchiis ad caudam lineæ virides  
ducuntur. Pinnarum in ventre infi-  
mæ cæruleæ funt. *Quintus* Gobio-  
nem flavum refert, hoc folo, quid li-  
neam albam ab oculis ad caudam  
ductam habeat, & maculis nigris,  
quibus Gobius afperfus eft, careat,  
diftinctus. *Sextus* quinto eft fimilis,  
nifi quod huic rofttrum fit longius &  
aquilinum, & linea ab oculis ad cau-  
dam ducta cærulea. *Septimus* colo-  
ribus variis eft insignis, dorfo aureo,  
viridibus maculis confperfo, ventre  
candicante, lineis rufis & tortuofis,  
nullo ordine difpofitis notato, la-  
bris viridibus. Cauda & pinnis ma-  
gna ex parte cæruleis. Branchia-  
rum opercula purpureum quidam  
habent, forte Scirrhus Wottoni. *O-*  
*llavus* folis lineis in ventre fele in-  
terfecantibus ab ifto diftinguitur.  
*Nono* cnlor eft viridescens & flavus,  
linea ab oculis ad caudam alba, cum  
multis aliis aut coloris confunditur  
& obliquitur. *Decimus* cnlor eft vi-  
ridi. Extrema operculi branchiarum  
& pinnarum ventris purpura funt.  
Oculi funt rufi, os parvum, venter ex  
albo flavefcit. A Monspelienfibus.  
Mcneftrior, hoc eft Tibicen voca-  
tur. *Undecimus* inter Tnrds maxi-  
mus, ad Lupi magnitudinem acce-  
dit. Colore eft rubricæ, qua pro ter-  
ra Armenia utuntur. multis nigris &  
magnis maculis refpergitur. Ventre  
plumbei coloris. *Duodecimo* caput eft  
cæruleum, dorfum virefcens. Linea  
viridis & tenuis, à branchiis ad cau-  
dam porrigitur, in extremitate ma-  
cula rotunda insignis. Quem Gefne-  
rus obfervavit, ita ab eodem defcri-  
bitur. Dorfum & laterum dimidia  
pars fuperior, fufci funt coloris,  
maculis crebris, fubnigris, varian-  
tibus. Lineæ : Inter Saxatiles  
effe Galenus & Diocles nos doce-

re. Non qualibet tamen Saxa a-  
mat, fed quæ propè littorata, mu-  
fco & alga obducantur, nec longè  
ab hoc domicilio recedit. In Pon-  
to cum Merula dèfideratur. Non  
folis herbis vel alga vivere, fed in  
terdum pifciculis, loliginibus, &  
aliis cruftaceis pafci, Salvianus au-  
thor eft. Hyeme aliorum laxari-  
lium more latere aiunt. quo tem-  
pore etiam fortificant. A Merula  
fpecie non differe, hunc marem,  
illam fœminam effe, inter Oppia-  
ni errores poni poteft. Singulare  
idem e in eis conjugalis amoris ex-  
emplum, notat. Mortuo marito  
progreffæ de thalamis fœminæ, et  
runt, communemque cum iisdem  
mortem oppetunt. Carnem habent  
mollem, tenerâ ac frabilem, ut Ga-  
lenus prodidit. Trallianus cibum fa-  
ftidientibus eum commendat, & Pti-  
fannam marinam vocat. Platina quo-  
vis modo enqui, fed allum finapum  
requirere fcribit.

## ARTICVLVS III.

De Pavone Salviani, &  
Leprade.

**P**Avo pifcis, quem Salviano debe-  
mus, cuius & a Ambrofius & Ili-  
dorus Hifpalenfis meminere, di-  
verfus eft à Pavone à Philoftrati,  
qui in Phafide Indiæ flumine re-  
peritur, & cæruleas quasdam cri-  
ftas, fquammas verficolores, cau-  
damque auream in quamcunque  
voluerit partem verfatilem, habet.  
Romæ *Papagalo*, à Lufitanis *Budia*  
vocatur. Bilibris fæpè eft, ad cu-  
biti menfuram petrarò ascendit. fi-  
gura corporis, lacuftri Tincæ abfi-  
milis non eft. Squamis latis tegi-  
tur, & variis coloribus depictus eft.  
Corpus enim ferè totum, inæquali  
varietate viret. Ventris pars pofter-  
ior viret ex albo, anterior ex albo li-  
vet. dorfum & cauda, ex viridi nigri-  
cant. latera ex viridi partim flave-  
fcunt, partim livent. Caput quod cras-  
fum eft ex cæruleo viret, maculis

quamplurimis rubentibus, nonnullisque cæruleis piscem totum nulla habita ordinis ratione pingentibus. *Rostrum* extensum, sed non acutum. *Labia* crassissima, quorum superius duplex apparet. *Oculos* magnos & aureos. *Branchias* utrinque quarernas, & juxta eas *pinnas* latas & rotundas, duasque alias minus latas in ventre. In dorso una satis longa erigitur, cuius anterior pars stricta & aculeis munita est: posterior lario & aculeorum experta. Apodice, qui in medio ferè ventre una quoque, duobus aut tribus innixa aculeis, perimum ventrem ad caudam explicatur. *Cauda* in unam pinnam laram ac ferè rotundam violaceam & maculis atque lineolis plurimis cæruleos insignitam desinit. *Interiora* si spectemus, *ventriculum* habet magnum, appendices multas, *intestina* ampla, *hepar* subalbidum, cui fella vesicula hæret. *Lienem* subatrum. *Viscus* ipsi præter algam, & alia marina excrementa, pisciculi. Solitarius est, & sæpe singuli capiuntur. Verno imprimis & autumnali tempore, fortè quod æstate ab caloris, hyeme ob frigoris impatientiam lateant. Ignobilis inter cibos censetur.

TAB.

XII. 13.

Aldrovand.

de Piscib.

L. 1. c. 5.

*LEPRAS* seu *Pforæ*, quod iidem prædixit sic suggillationibus quibus qui lepra & pfora laborant, sic ut nonnullis, sed metuone perperam videtur dictus, *Lelepru* Latinis, si vera prodit Rondeletius dicitur. Ex Turdorum est genere. Vix addodrantem in mari Adriatico excrecere solet, cum pedem & amplius in Oceano excedat. Totum corpus habet maculis nunc cancellatis, nunc rectis, nunc in obliquo sparsis variegatum. *Squammas* ad oram rubore suffusas, latas. *Caput* non ita multis coloribus cancellatum, quod lineas hincinde ductas, ex cæruleo, viridi, ac rubro mistas, ostendit. *Oculos* parvos, rotundos: iridem oculorum aëri similem, quam si quando in gyrum contorqueat, cyaneum, deinde aureum, tandem argenteum circulum in crystallini coloris fulgorem referre conspicias. *Os* ipsi parvum, *dentes*

albi, acuti. *Maxilla* superior tubi in modum cranio infarcitur, ut penè duobus labia carnosæ esse credas: *lingua* alba & penè soluta. Continuum tergoris *pinnam* gerit, sed eam aculeis munitam, arque aliam sub ventre ano vicinam. Omnes *pinnæ* transparentes sunt, molles, leves, rubro, cæruleo, viridi, & aliis coloribus maculatæ. *Linea* quæ piscibus utrinque latera dividit, nequaquam in hoc pisce recta procedit, sed à superiori branchiæ angulo atcuata, secundum tergus deducta est: mox ubi tergoris pinna desinit, illuc quidem linea reflectitur, & arcuatur, deinde recta per mediam caudam deferatur. Quantum ad *internas partes* petitoneum habet album, *hepar* ex pallido lacteum, ad sinistram magis protensum, tribus lobis, uno tantum longo duobus brevibus, constans. *Lienem* planum, oblongum, minoris digiti magnitudine, rubrum. *Intestina* eiusdem capacitatis, ut propriè stomachus in eo videti non possit, semel à stomacho ad anum revoluta, multisque omentis obducta. *Lactes* copiosas, & vulvam bieornem. Hanc ex Bellonio, qui eundem cum *Marzapani* dici credit, fortè quod æquè in deliciis ob carnis suavitatem appetatur, ac panis *Marius* vulgò dictus. Est tamen alius *TAB.* *Marzapani* piscis, qui *Rosa* dicitur, & *XIV.* totus maxime in dorso rubet, minus in ventre.

## ARTICULVS. IV.

## De Merula.

*MERULA*, Oppiani interpreti & *TAB.* *Apicio Merulus*, Plinio medico *XIV. 2.* prodente Bellonio *Piscis Afrasilis*, Venetis *Tinea marina*, Græcis *αἰνιόφ* & *αἰνιόφ* dicitur. De illius colore dissentiunt auctores. Numerius apud Athenæum a *Nigram* cognominat. Oppianus *αἰνιόφ*. Varinus *αἰνιόφ* vocant. Silviano & Rondeletio ex colore Indico & cæruleo nigricant. Hic & sexu distinguit. in mare, colorem ad violaceum magis accedere, fæminæ ex vario nigrescere, scri-

scitibens. idem colorem Indicum aut purpureum exsaturatum nigrum ab antiquis vocari, quod purpuram nigram. Circæam flore nigro, qui tamen purpureus est, aut Indicus, prodidit. invenitur & quoddam genus dorso nigro, ventre Indico, quibusdam partibus cæruleis. *b Aldrov.* *b Aldrovandus* totum viridem exhibet. Vitentē & Ovidius reliquit. Colorem mutare apud *Ælianum* legimus. Omnes in eo conveniunt Tincas figura eorporis referre, & squammas maiores quam Turdum, ventrebras dorso valde erectas habere. Hoc unum in eius Anatomia dignum occurrit, quod cum *hepar* habeat album, in duos lobos grandes divisum: sed tamen exartenu vasculo inclusum, & revolutio nibus duplicatum, cuius longitudo est sesquipedalis. Quin *Aldrovandus* describit, magis in cauda, obscurius in dorso virefcit. pinnarum extremitates cæruleas, branchiarum opercula in fine rubentia habet. Oculorum pupillam circulus ruber, rubrum cæruleus ambit. Inter Saxatiles inque Petris fluctantes ab *Aristotele* & *d Plinio* referri certum est, quibus & alij accedunt. Pōrum f tamen non intrant. *Vesuntur* iisdem quibus Turdi. Comestum ventro primotenant & premunt, mox de *R. R. L. B.* iacere sinunt. ubi non palpitare viderint, devorant. *Generationem* quod spectat, marium *h* quisque cum multis congregitur sceminis. Medicam aut Persicam vitam agere diceres. Zelotypia semper vehementer laborant mares, cum partus temporis instant maximē. *Fœminis* domi quiescentibus, incubant quasi illi foribus, ne insidiæ tendantur. sub crepusculum vespertinum (nocte fieri scribit *i Oppianus*) intermissa custodia, cibum exquirunt. solæ coniumquæ sunt intus, algas in cavernis & circum petras ad victum reperiunt. Mortuo mare, foras egrediuntur, quæ semper antea domi manebant, fœming. Imperuntur à Squilla. ideo piscatores, cum eos sceminas observare vident, Squillam vivam hamo affixam demittunt. Merulus,

dum se de illo viturum sperat, arripit, sic capitur, & exigui animi volupras fit ultio.

## ARTICVLVS V.

## De Insula.

*I*nsule piscis *Synecio* *insule*, *Hermip-* *T. A. B.* *po Smyrneo* *Hecce*, quo nomine *XIV. 3.* *Hermolaus* *Scurionem* intelligi arbitrabatur, alius *Insula*, & *Insula*, dicitur. Quia non vna ipsorum species, ideo in descriptione variari, non mirum, *Rondeletio* digiti non excedit magnitudinem. Varius est, dorso violaceo. Squammis regitur parvis pinnarum numero, situ, labris. *Insentibus* recurvis, cauda, aliis saxatilibus est similis. A capite ad caudam subauream lineam ductam habet, hinc inde rostri modo dentatam, cui pars quæ subest colore est cæruleo, ventre candido flavescente. Bello-nius addit, corpore esse gracili & oblongo: tanto in tergo *colorum* varietate, ut in eo iridem vtrinque depictam videas. Squammis tenuissimis, multorum colorum, super quibus duæ lineæ rectæ, cæruleæ, virides, melinæ, rubræ ac fuscæ apparent, conregi. Caudam rotundam habere. *Salviani* descriptio ista est. Iulis rostro est acuto, & c. Saxatilibus accenseri ex *Oppiano* & colligimus. *Antipoli* & in toto *Ligustico* sinu frequen-tissimum esse nec *Adriatico* mari infrequenter *Rondeletius* prodidit. *Vesuntur* minoribus pisciculis, & eorum inopia, alga. *Voraces* *Numenius* testatur. Singulares in saxis vivere prodidit cum *Salviano* *Bellonius*, gregales facit *b Arist.* *ristoteles*. Cavent sibi ab hamo, *H. A. L. 9.* *haud* tamen escam sæpè præcipiunt. Os veneno refertum habere, & in piscaru urinatores & piscatores perinacissimè persequi, eorumque sanguinem appetere, & elare ab *Oppia-* *c Oppian,* *no* & *d Æliano* affirmatur. *Lævia*, *habent.* quæ in adversum *Aldrovandus* protulit. *Ægris* in albo iure elixari, *fa-* *d Æliano,* *nis* in tartagine frigi & assari prodidit *Salvianus*, fortè si caput amputatum,

F 3 tum,

*b Aldrov.*  
*L. 1. de Pis-*  
*cib. c. 6.*  
*c Ælian.*  
*H. A. L. 12.*  
*28.*

*c Arist. H.*  
*A. L. B. c.*  
*35.*  
*d Plin. H.*  
*N. L. 9. c. 15.*  
*e Columel.*  
*de R. R. L. B.*  
*c. 16.*

*Ælian. H.*  
*A. L. c. 14.*  
*f Plin. H.*  
*N. L. 9. c.*  
*15.*

*g Ælian.*  
*H. A. L. c.*  
*15.*  
*h Ælian.*  
*H. A. L. c.*  
*14.*  
*i Oppian.*  
*habent.*  
*L. 4. v. 190.*

*a Oppian.*  
*hal. L. 1. v.*  
*124.*

*b Arist.*  
*H. A. L. 9.*

*c Oppian,*  
*no* & *d Æliano* affirmatur. *Lævia*, *habent.* quæ in adversum *Aldrovandus* protulit. *Ægris* in albo iure elixari, *fa-* *d Æliano,* *nis* in tartagine frigi & assari prodidit *Salvianus*, fortè si caput amputatum,

e Dioscor.  
in facile  
parabit.

tum. Ius alvum emollire apud Dioscoridem; urinas apud Plinium tepetio.

## ARTICVLVS VI.

## De Phycide.

TAB.  
XIV. 4.

PHycis, qui forte à Phycene solo sexu differt, *Fuca* Theodoro, dicitur. Nostri temporis Græci *Phycide*, ut Gellius ait, *Phocide*, ut Rondeletius, *Phycem* ut Massarias, *Pephyctis* uenâ ut Hermolaus, *Lampianam* ut Bellonius, appellant. Nomen, quod in musco marino (φύκη βίβας ἰσχυρὴ θαλάσσιος Neophyto & alius) nificet, inuenisse creditur. Idē est cum *Tinca* marina & pisce *Ficu*, Romæ vocato. (nomen huic quod passī ficus instar, carnis sit mollissimæ & succiplena) Rondeletio refragatur Saluianus, & illum ipsum esse, qui ob magnam cum *Perca* marina similitudinem *Percia* dicitur, contendit: nec abluat Aldrovandus. Sane æque repando est uterque tergore, color idem est. Rostrum acuto & extento, pinnatum sinu, numero, & figura conueniunt. Non credendum tamē eisdem prorsus esse. Caput crassius *Phycidi* os maius, maioribusque dentibus in superiore maxilla munitum. Venter non ita prominet. Pinnæ parvis & rufis maculis non insigniuntur. Lineis transversis nigricantibus, quibus *Percæ* latera notantur, caret. In capite & branchiarum operculis, lineolæ & puncta quædam cærulea, conspiciuntur. Marem nigriorem & squammis melioribus dixit a Aristoteles, sed nec idem perpetuo colot. Verno tempore satur, reliquis diluor videtur. Quod ἀκρολεγεῖται apud Athenæum dicit, de aculeis quibus dorsū vel imi ventris spinæ horrent in tellexisse, dicendum est. quia nunquam palmi magnitudinem excedunt, ideo φρυγία ab Aristotele dicuntur. Bellonius non vnum genus esse ostendit. Vidisse enim se fuscus, rubentes, virides, πάλυρνος testatur. Addit, omnes pinnam tergoreis continuam, duodecim aculeis, muni-

tam, rursus ad branchiarum latera utrinque vnam, & sub ventre duas, quarum singulæ squammis tegantur latis, firmis, læpe vliginosis, gere, dentes in superiori maxilla utrinque ad latus unum vel duos videtis in inferiore plures; retro in maxillis molares multos. Omnibus lacteum est *jerur*, ad sinistram magis extensum, fel lateri dextro, oblongo folliculo inclusum, colore subluteum, incumbit. Inter saxatiles Aristoteles, Plinius & Diocles posuere. λυμνὴν Suidas vocat. & Ovidius inter littorales recenset. Luto, alga, & musco, quod ὁ καύων, vocatur, vescuntur: & quanquam cætera abstineant carne: squillas tamen sapissime appetunt; Parituræ, *Nidum* & ex alga ubi construunt, in eoque pariunt. Sic foetus contra tempestates tuentur. † Bis anno parere Aristoteles auctor est, Eunuchos apud Oppianum dictalium. Cynædum enim piscem illis talium, Cynædum enim piscem illis verbis verecundo circumscribit. Laudantur à Xenocrate in cibis, Diphilo etiam ἀπαλὸν καὶ ὑγρὸν καὶ ἰσχυρὸν, tenera carnis pisciculi, ac faciles concocti, dicuntur. Sed & d'Hippocrates inter raram & levem carnem habentes recenset, eūque viri mulierosi, seu ἀνδρῶν & θηλειῶν, & cognomen tum à piscatoribus ferre, innuit. Recensentur & in Coryis Thracum Reges convivio, hodie procerum patinastaro implent.

b Arist. H.  
A.L.8.c.2.

† Arist. H.  
A.L.8.c.vlt

† Plutar.  
de isle.

animal.  
c Arist. H.  
A.L.6.c.13.

d Hippoc.  
2. de vill.  
VALIAN.

## ARTICVLVS VII.

## De Perca marina.

PHycidi *Percam*, quæ Græcis TAB. XIV  
πέρκα, Dioscoridi & Paulo Ægi-  
neræ πέρκα, licet Plinius in piscium  
catalogo pro diversis habuisse videatur, dicitur, & nomen à colore, quæ Græci πέρκα dicunt, sortita est, propter similitudinem de qua superius subiungemus. Nota ipsi cum paucissimis piscibus communis, quod transversis per tergus lineis confertur. Propter istam varietatem Aristoteles est. περκαμμοειδὴς, ut apud Athenæum invenies, quod eadem vivida,

TAB. XIV  
5.6. c. c.  
Aldrovand.  
de Piscib.  
la. c. 9.

a Aristot.  
H.A.L.6.c.  
13.

ἀνδρῶν

*Indigo:* Matrioni Parodo dicitur. Duo vero ipsius sunt genera, *Fluviatile* nempe, de quo posita, & *Marinum*. *Marina* nunquam ad eam ad quam fluviatilis magnitudinem e. crescit. Ex colore veluti sanguineo nigricat, & vnam duntaxat eandemque continuam pinnam in tergote habet. Squammis tegitur parvis. Venter livet, latera purpurant. tergus ex flavo nigricat. Aldrovandus tres proponit. *Prima* caput, pennæ, cauda ex rubro flavescunt, seu potius aureo perfunduntur. Supremum dorsum ferrugineum est, deinceps flavescit, mox per latera & ventrem albicat quidem, cæterum maculæ amethystinæ albedinem operiunt. Pinnarum tergoris nervi argenteo colore, reliquarum & caudæ autem perfunduntur Lineæ transversales quæ à dorso per latera descendunt, ad infra labentis ex alto aquæ, argenteo emicant. *Or* habet intus album, labra rubicunda. *Alter*, quæ Maioris nomine venit, rostro intus & extrarubet, in ambitu flavescit. Tergus rufescit, latera & venter albicant. Squammarum extremitates rubent, dorsipinna tota, & tota serice in extremo crocea. quæ Uropygio hæret, dorso concolor est. Branchiarum opercula flava, latissimè vermiculatisque lineis cineritis conspersis suggillantur. *Tertia* insigniter dentata est. Tergus & caput ex cinereo flavescunt. Pennæ & cauda nigrescant. Latera cærulea. Venter ad amethystinum inclinat. Lineæ laterales obscure rubescunt, quæ vero à branchiis ad caudam feruntur, in dorso rufæ sunt, reliquæ virides. *Degit* a circa mulcosa & algosa saxa. Ad littora Oceani Germanici dum, reperiri Albertus scribit, de petrosis duntaxat & alpestris intellexisse credendus est. Saxatilem esse ex Galeno, Plinio, & Oppiano, & Diole clarum est. Carnibus vescitur. Tam mas quam femina saxatiliu more hyeme conditur, quo tempore e quoque fortificat, Marcellus Ficinus celsissimi cursus esse prodidit. In *cibus* salubritatis laude repletur, hinc proverbium vetus

d. *argenteus caudæ*, cum optima post habentur: sed saporis insulsi gratia reiecitur. Plinius in *Medicina* invenisse usum testatur. Name cinerem è capite salix, addito melle, verendurum pustulas discutere. eundem admixto sale, cunila & oleo vulvæ mederi, & suffitione secundas extrahere prodidit.

## ARTICVLVS VIII.

## De Channe, &amp; Canadella.

**CHANNE** Græcis *χάνη* si femina, TAB. XIV *χάνη* si mas, dicitur: (*χάνη* & 10. 11. 12. *χάνη* corruptū esse videtur) quibusdam *Hiatula* ab hiano nomen indit. *Pisib.* l. 1. tum habet, non quod moriens tantum hiet, ut Beiloonius credidit, sed quod mandibulas ita constitutas habeat, & perpetuo hiare videatur. hinc Epicharinus *μυαλαρχήματα* vocavit. A Spetsippo Perce & Phycidi ob colorum varietatem consertur. Unde Aristoteles citante Athenæo, *ποικίλητος μύδιον*, & *ποικίλητος* appellavit. De figura nihil apud veteres occurrit. Tantam ei cum Perca similitudinem tribuit Beiloonius, ut pisces pene eosdem esse credas, & pro iisdem vendantur. Salvanus rostri acumine, pinnarū situ, numero, & figura, oculis, branchiis, cauda, atque pictorato corpore, Perce & Phycidi similem Channen prodidit mediocritate oris, patuitate dentium, tenuitate capitis, exiguitate Squammarum ovata totius corporis figura, Perce. Colorum varietate, inferiore maxilla, & branchiarum aculeis, manifestè ab utroque distinguitur. Tergus Channæ ex rubro minus quam illarum nigricat. *Venter* & latera violacea quodam albedine notata sunt. Pinna dorsiflavet, quæ vero in imo ventre est, & cauda, rufis maculis insignitur. Ab ore per branchiarum opercula & latera, rubræ quædam lineæ, neque æqualis latitudinis, neque æquis distinctæ intervallis usque fere ad caudā deducuntur.

a Oppian.  
Rel. l. 1. v.  
12.  
b Oppian.  
Rel. l. 1. v.  
12.  
c Arist. H.  
Al. l. 19.  
d Zenob.  
Dogenien.  
e Plin. H.  
N. l. 31.  
19.

deducuntur. Maxilla inferior non solū rubet, sed superiore etiam prominentior est. ideo perpetuo hiare videntur. In posteriore branchiarum operculi parte duo sunt *aculei* albi & acutissimi, non magni tamen, quibus Phycides & Perca destituuntur. Venter & intestina ampla habet, *hepar* subalbidum. *lienem* subrubrum. *Calculus* in capite gerit, quod ex Bellonio habemus. *Lacum* ipsum

† *Arist. H. A. l. 8. c. 13.*  
a *Oppian. Hal. l. 1. v. 124.*

† *Galen. de Natur. facult. l. 3.*  
b *Arist. H. A. l. 8. c. 2.*  
c *Arist. H. A. l. 6. c. 13.*  
d *I. l. c. 11.*  
e *Plin. H. N. l. 9. c. 16.*

pelago † *Aristoteles* assignavit; sed a *Oppianus* in laxosis degere docuit. nec piscatorum experientia abluat. Sola carne *b. vestitur* carnis inprimis, & dum per impetum pisces inleatur, saepe in os ventriculus † procidit. *Sexus* discrimen ambiguum in eis. Omnes enim vulvas habere traduntur. & omnes ovis capiuntur gravidæ. Rem se ita habere, ex plurimarum sectione *Rondeletius* didicit. In usitatumque hunc conceptum plurimarum horum piscium fecunditati adscribendum retur. Mare ova perficit, & vice maris fungitur. De *CANADELLA*, sic Martegue stagni accolis vocatur. Sic Bellonius. *Lagustico* mari cognitissima *Canadella* elegantem ac varium habet colorem, &c.

## ARTICVLVS IX.

## De Hepato.

TAB. XIV. 13.

14.

a *Alban. H. A. l. 15. c. 17.*

b *Alban. H. A. l. 9. c. 38.*

c *Alban. l. 3. c. l. 7.*

**P**isces qui Græcis à colore & magnitudine hepatis Hepatus, à colore rutilo & subobscurato *ab. b. vocatur*, *Hermolaius* *jecur marinum*, *Gaza jecorinum*, *Galenus* interpres *jecorarium* nominat. Diversum ab Hepato *Albani*, pisces à breui & oculis coniuventibus, cuius pupillæ ad cyanæum colorem accedunt, sequentia ostendunt. An ille, qui *b. habet*, quia ad natandum, quāvis magnus, segnis, circa latibula sua sluntaxar volutatur, idem sit, affirmari vix potest. Descriptione si sepe, *Phagrum* & *Erythrinum* & Hepatum pro similibus posuere veteres, sed illud rostro breviorē, ferratis denticulis, colorem nigro, oculis habi-

ta totius ratione maioribus, cauda macula nigra insigni, corde trigono, eodemque quod de suprema forte parte, quam *ab. b. vocat* *Aristoteles*, sumendum est, nisi de hepate potius id dici debeat, albo, felle nullo, additum: nec omissum calculos in capite gerere, solitarium esse, & paucas ventriculi d'appendices habere. Hæ notæ an Belloniano, *H. A. l. 2. c. 17.* undeque semè rubicundus, circa ventrem albeat. in dorso dimidia sui posteriore parte tribus maculis atris notatur, ultima caudam attingente addente Bellonio. Squammis integitur asperis. Dentes habet quā Phycidis obruiosiores, qui pectinatim coeant. Calculos in capite gerit, penes lectorem sit iudicium. Aldrovandus hunc cuius icon apponitur, ponit, & *Rondeletius* Hepatum, qui modernis Græcis *hepatos*, verum Hepatum esse opinatur. Et sane piscis est Pagro similis, oculis maioribus, quam proratione corporis vt *Melanurus*, colore obscuro seu ex cæruleo nigrescente, pinnarum numero, situ aculeisque Pagro similis, latiore maioreque cauda, in qua maculam Melanuri instar nigram habet. Dentes ipsi non lati sed rotundi & ferrati, Branchiæ vt: que quaternæ, ventriculus cū appendicibus quatuor magnus. Intestina tenuia, *hepar* album sine felle, *cor* angulatum, in cerebro lapides duo. Verbo, optime cum illo quem ex veteribus descripsimus congruit. Moribus videtur esse insulsi, & parum ad vindictam pronus, quod apud Arhenzum facere Eubulus inuit. Carnis in medio duræ & mollis esse, apud Galenum legimus. Frixi & pauco sale aspersi in cibo sunt suavisimi. Hepar tritum & emplastrum modo impostum, omnem tumorem & podagram sanare mentitur Kirani-des.



## ARTICVLVS X.

## De Melanuro, &amp; Alpheste.

TAB.  
XIV. 15.  
16.Athen. l.  
7.

**M**ELANVRVS à nigredine caudæ quasi Nigricaudam voces, ita dicitur. falso *oculatum* Gaza appellavit, quia tanquam diversi pisces à Plinio ponuntur. An Plauri Ophitiam recte dixeris, quod Ronderetius fecit, iudicio Tuo relinquo.

*Athen. l. 7. ὀφιδόχρυσος & πιδόχρυσος* à Athenæus dixit, quod nigræ lineæ latera eius pingant. Hicelias Sargo similem seu corporis figuram, seu nigram caudæ notam spectes, fecit: sed hæc & in sparo, qui *ὑπὸ πύλαις*, invenitur. Palmi magnitudinem aliquando superat, nec amplius quam vnam vel sesquialibrampendit. *Squammis* tegitur, latis, nec facile deciduis. Os habet parvum, dentibus parvis minutum. *Oculus* secundum corporis proportionem maximus ex cæruleo nigrescentes, pinnarum numero, situ, & figura, branchiis, & cauda cū Aurata convenit, hæc latam ac nigerrimam notam habet, lateta lineis nigricantibus à branchiis ad caudam deductis pinguntur. Ventre est subalbido: dorso ex cæruleo nigricante. Quantum ad *interranea Hepar* habet magnum, ex quo fellis folliculus pender. Venterculum medium.

Cor angulatum, inventre *vesicam* aere plenam, crassam, & densam. Quæ Aldrovandus depinxit, & cuius hic Iconem damus, totus ex cæruleo amethystinoque nigricat, præter squammarum extremitates & extimorum oculorum circulum, caudæq; initium, quæ auro resplendent, pinnae nigricant. Uropygium supinum candicat, pronum intense violaceū, & velut nigram maculam constituit. *Proficitur*, propellitora in arenosis locis balgæ. Ideo vix vere saxatilis dicitur. *Ælianus* & varias incolere sedes tradit. Bellonius in Oceano Gallico perrarum, in Mediterraneo frequentissimum. Iovius Romæ ta-

to videri, sæpe Neapoli prodidere. Tempestate setvente d' cibis quos è *d' Æliani. H.A.L. l. c. 41.* saxis cruunt vivunt, & abiectissima quoque, quæ alii pisces nisi virgente fame non attingerent, sectantur; sereno mari in solo sabulo pabulum inquirunt, imo quia vagabundi pisces sunt, non vno solo pabulo contentos esse verisimile est. Sane in e Stabia *e Plin. l. 11. Na Campaniæ ad Herculis petram N.d. 32. c. 21.* Melanuri in mate panem abiectum rapiunt. Timidissimos esse piscatores testantur, *f. hinc id est: g. Op. f. Æliani. H.A.L. l. c. 41.* Neque nassa capiuntur, nec ad eum accedunt. Mari quieto, in ima eius sede ad petras & algas quiescunt, quocumque tandem tegumeto proreçti, fluctuante, cæteris ob impetum descendentibus, ad petras adnatant, & spumam ad sui tutelam tum sufficere, ac si natura edocuisse, nec tætarum iratum à piscatoribus mare, arbitrantur. Hepate tamen caprillo, & massa ex pane & caseo facta capi, Tarentino & h Oppiano debemus. *h Oppiani. Hæliar. l. 3. v. 439.*

Laudatur in cibo à Xenocrate, cui Hicelias i accedit: à Matrone Paro do reiicitur, illi forte si alga viscatur, huic si cæno & fordidis maris excrementis. *i Athen. l. 7. Dign.*

**ALPHESTE** est piscis ab inveniendi, **TAB.** nescio quare dictus, *Cynadus* quoque XV. 1. quasi præpostere libidinis studiosus. *2. 3.* (fama est & semper binos capi, & alterum alteri ad caudam comitem videri) vocatur. *l. 7.*

In *Descriptione* variatur ab authoribus si calorem sceleris. Veteres omnino cerei coloris, purpurascens tamen, quibusdam in partibus faciunt. *Plinius* solos piscium luteos esse *Plin. H. N. l. 32. c. 11.* testatur. Apud *Rondeletium* & *Bellonius* corpore est Pagro strictiore, figura *Mœnis* similis, pedali magnitudine, *dentibus* serratis caninis similibus, dorso purpureo, cæteris partibus luteis, squammis in gyrum crenatis, multas cabritic horrentibus. A cervice ad caudam spinas tenui membrana connexas, unde *parvulus* habet.

*Aldrovandus* Cinædum totum fete Pagri modo rubentem, & aureis, argenteisque maculis exiguis, rotundis.

b Colamel.  
la R.R. l.  
16.  
c Æliani.  
H.A.L. l. c.  
17.

dis respersum, quam Illyrici Sebenienses Cagnizam quasi Catullientē vocant, profert: dat tamen & alium tergore amethystino, lateribus ferē cæruleis, ventre candicante punctis cæruleis notato, pinnis tergoris & retroanum viridentibus, illa etiam maculis rotundis viridibus insignita. Cæteræ pinnae & cauda ex aureo rubescunt.

*Rondeletij* Cinxdo similis est ille qui Venetis *Brasvola*, Lusitanis *Salmoneta* vocatur. Rufus est toto corpore, cauda lutea maculis fuscis distincta, extremitate æquali non arcuata. *Macula* nigra ad pinnarū, quæ luteæ sunt, iuxta branchias initia habentur. *Linea* ruffa à branchiis ad caudam tendit, punctis intercepta nigris. Denatura *Alpheis* nihil plane occurrit, *Rondeletius* carne & substantia eadem cum saxatilibus esse dicit, tenera nimirum molli, & minime glutinosa.

## ARTICVLVS XI.

## De Coracino.

**TAB.** **Coracinus**, *Gazz*, *Corvulus* & **XV. 4. 5.** *Graculus*, *Salviano Corvinus*, *Ausonio* † *Corvus*, *Tarentino* forte *negonius*, seu à colore nigro, vt *Oppiano* a placet, qui apud *Vitruvium* *Coracinus*: seu quod *læ nigre xru*, quod pupillas moveat, vt *Athenæo* b visum est, nomen sortitus videtur, nisi forte illud amnico, hoc marino magis conveniat. An idem *εαυλιδος, πλατωνικός*, Nili accolis *πιδων*, *Alexandrinis* *αυινος*, quod *Rondeletius* voluit, dictus sit an vero, quod *Aldrovando* probatur, *Saperda* nomen *Coracino* amnico *Platystici* eidem profectus ætatis, *Pelæ* & *Hemineri*, Nilotico duntaxat sit proprium, in dubio relinquo. *ισιδωρ*, non esse *Dorionis* apud *Athenzum* verba ostendunt.

c *Oppian.*  
d *l.*  
d *Arist.* II.  
A. l. 5. c. 9.  
c *Plin.* II.  
N. l. 32. c.  
5.  
f *Athen.*  
l. 8.  
g *Strabo.*  
*Geogr.* I.  
17.

In eo ponitur à *Rondeletio* census, qui mare simul & flumina frequentant: quod & apud *Plinium*, f *Athenzum*, & g *Strabonem* inveniri credit, sed quia saxatilem esse ab e

*Oppiano* & *Aristotele* proditum, & excitatis authoribus *Coracinum* duntaxat in Nilo esse: quin quod apud *Pliniū* legitur, Nilo peculiares, colligitur: nec vllum piscem ex mari in Nilum ascendere propter *Crocodilorum* merum, præter *Mugilem*, *Alosam*, & *Delphinum* *Strabo* affirmat, duo potius *Coracini* vt *Pereæ* genera dari credendum est, quam eisdem anni & mari communes. Et sane multos in *Mæotide* palude degere & *Dorione*: plurimos in lacu nō procul Oceano ē monte inferiōis *Mauritanie* originem trahente stagnante, quam *Nilidem* vocant, ac *Nili* ortum credunt, ex *Phinio* discimus.

Quis veterum genuinus *Coracinus* sit, haud tuto affirmari potest. *Speusippus* *Melanuro* similem, dixit. *Aristophanes* ob alarum inferiōis *μαλακίαν*, *Numenius* ob varietatem linearum *αἰδων* vocavit, *A rectioribus* quoque diversimode describitur. *Bellonius* pro eo piscem mari & fluminibus communem ex *Glaucorum* genere, *Pesce* *Scarpa* *Comenibus* nominatum, obtulit, *Rondeletius* suum ita describit. *Coracinus* pileis est marinus &c. *Salvianus* duplicem dedit. *Prior* qui Romæ simpliciter Corvo & *Corvetto* dicitur, rostrum habet breve & rectum. Os &c. *Alter*, qui Corvo de *Fortiera* Romæ, *Niger*, iure merito, vt *prior* albus, quia multo minus nigricat, censendus est. *Rostrum*, ore, *Capite*, *oculis*, *pinnis*, *cauda*, totius corporis figura, & interaneis omnibus cum *prior* convenit in eo discrepat, quod totus fere nigricet, aculeum, cui ani pinna inhaeret, maiorem & validiorem habet. Pedale magnitudinem nunquam superat, & saporis suavitare, carnisque teneritudine inferior est. *Gesternus* *Corvulum* colore rubro depinxit.

Inter h gregales ponuntur *Cotaci*. h *Aristot.*  
ni: hyeme i latens, nec nisi statim diebus, iisque semper capiuntur, quod & *Rondeletius* affirmat. Nunquam melle *Tricici parium*, sed autumnofortificant inter algas: longo temporis spa-

h. A. l. 9.  
c. 2.  
i. *Aristot.* II.  
A. l. 8. c. 15.

ris spacio vterum fecunt, & inter minora & genera piscium celestissimo in-  
cremento perficiuntur. Anno squal-  
lente melius valere, quia per siccita-  
tem tepor accidit, ab † Aristot. pro-  
ditum est.

10. An aduersus arborum formicas  
† Arist. H. polleant, quod ex *Palladio Carinus* l.  
A. l. 8. c. 10. *Rhodoginus*, qui pro Coracina pice,  
l. *Rhodogin*. Coracinum piscem legi debere ait,  
*Aniq. Lect.* affirmat, ignoro. Rondeletium cer-  
te experimētum tescellit, sed & huic,  
veto vterum Coracino fidem non  
tentasse, obicitur. Meliores sunt cū  
vterū † gerunt. Nilotici marinis, e-  
lilis assi, præferuntur. *m* Hicelius,  
parum alere, facile excerni, succi es-  
se mediocriter boni, dixit.

*Vsum in Medicina* quod spectat, la-  
pides in capite repertos calculos cō-  
minuere, vel pituitam ex qua cal-  
culi gignantur exsiccano vel pon-  
dere seu pellendo, idque sibi experi-  
entia cognitum, reliquit Rondele-  
tius.

*N. Cuvius iconem refert Tab. 2.*

## ARTICVLVS XII.

## De Exocato seu Adonide.

TAB. XV. EXOCÆTUM, qui *Adonis* & *Cir-  
rhia*, fortē & *αἰγία*, & *αἰγία* & aliis, in-  
ter saxatiles esse Athenæus testatur.  
Squammosus sit an lævis dubium.  
Nomen ab eo invenit, quod in litto-  
re seu siccō dormiat. Subruffum es-  
se, corpore tereti, litoralis & pusilli  
Cestrei magnitudine, cui digitorum  
octo longitudo maxima est, piscicu-  
lo Hirco, (Mcenam matrem, quo tē-  
pore dat operam soboli hunc putat  
Cassaubonus) præter nigram sub al-  
vo maculam quam Hirco barbam vo-  
cant, simillimum facit Athenæus, &  
inque eodem à branchiis in vtraque  
corporis parte lineam albam vno  
continuo tractu ad caudam vsq; du-  
ci addit. Rondeletius sequentem li-  
neam pro Adonide posuit. Piscis  
vero est semipedali magnitudine,  
forma tereti *αἰγία* & secundum A-  
thenæum, secundum Oppianum  
*ἑρμῆς*, seu colore aureo, partibus

quibusdam virecente, magis rube-  
scente aliis, Corpore Mcenis iam fortis  
aut Gobionibus similis Branchias ha-  
bet parvas, à branchiis ad caudam li-  
neam candidam continuam.

Miratur eum Arcadia, tamen &  
in litore Monspellum stercentem,  
sæpissimè vidit Rondeletius. Quod  
vero Exocætum circa Clitorium vo-  
calem & sine branchiis tradit b Pli-  
nius, impossibile videtur, & habere  
ostendimus. Nec quicquam de illis  
c Pausanius de vocalibus in Arcadia  
creditur duntaxat agit, & diversus ab  
Exocæto marino Huvialis *μαῖα* q.  
Diutius in sicco *vita*: quod magna  
aeris copia aqua suffocari possit, ob  
rimæ branchiarum angustiam non  
trahatur, causa, d Rondeletio. Pro-  
pter eandem & Anguillas diutissimè  
etiam sub terra vivere, credit: sed,  
quia in aqua, quæ frigidius elemen-  
tum, suet vivere pisces, & anguillæ  
sine ea senis diebus c Aquilone spi-  
rante, qui frigidior ventus est, Au-  
stro paucioribus; reliqui diutius ver-  
no quam æstivo tempore vivunt, dif-  
ficulter, nimia aeris frigidi attractio-  
ne extra aquas lædi posse pisces, per-  
suadere poterit. *Vide c Scaligerum.*

b Plin. H.  
N. l. 9. c. 19

c Pausan.  
in Arcad.

d Rondelet.  
l. 4. de pi-  
scibus ma-  
rinis c. 9.  
Plin. H. N.  
l. 9. c. 19.

e Scalig.  
Ex. 273.

## ARTICVLVS XIII.

De Sciana seu Umbra, &  
Glaucō Bellonii.

PISCIS qui Græcis vulgò *σκιάνα*, Xe-  
nocratibus *σκιάνα*, & *σκιάνα*. Græ-  
cis modernis *σκιάνα*, nonnullis *μαῖα* &  
q. is alicubi *Ovis marinus*, commu-  
niter Latinis *Umbra* & *Umbra*, seu à  
colore nigrescente, quam umbro-  
sum Isidorus, luteum Ovidius vocat;  
seu à lineis quibusdam obliquis à  
dorso descendētib; aureis & ob-  
scuris, quæ aliarum apparent umbræ;  
seu quod dum movetur adumbran-  
tem quandam oculis colorem Iridis  
in motem rutilet; seu à proverbiali  
ioco, quo *σκιάνα* dicebantur, qui non  
vocati ad convivium veniebāt, quasi  
multi convivas secuti essent, cum de  
hoc pisce edendum erat, dicitur.

TAB.  
XV. 9.

Aldrov. de  
Piscib. l. 2.  
c. 17.

G 2 PISCIS

Piscis est cetaceus, LX. plarum-  
que librarum, quatuor plus minus  
cubitos longus. *Squamma* eius veluti  
oblique apparent, in Oceano nigrio-  
res & quali opacæ; in Mediterraneo  
argentei, aurei, atque interdum ab  
his varii coloris, iridem dum piscis a-  
gitur imitantur, quod Bellonius pro-  
didit. Rondeletius ei lineas obliquas  
quasdam aureas, manifestas, alias a-  
liarum veluti umbras attribuit. Al-  
drovando fere unicolor est, tota vi-  
delicet ferruginea, in dorso, supre-  
mo capite, pinnis, & cauda obcu-  
rioris coloris; in ventre, lateribus, &  
branchiarum ossibus dilutioris, quia  
ad amethistinum inclinat. Salviano,  
dum parva est argentea ferè tota ap-  
paret: maior facta, ventre argenteo,  
dorso verò & lateribus subliventibus  
ac veluti opacis conspicitur. *Caput* ex  
descriptione Salviani habet magnū:  
in dorso duas *pinnas*, quarum prior o-  
donis aculeis, nullis altera munitur,  
ad branchias, quas quaternas utrin-  
que habet, una utrinque enas-  
citur, duæque alix in ventre con-  
spiciuntur, imò ab ano una alia hæ-  
ret. Coracino tam similis est, ut  
ichthyopolæ vnum pro alio substituan-  
t, magnitudine differunt. Sed &  
pro Glaucio supponitur, in eo diver-  
sus, quod *dentes* in oris ambitu ratos,  
firmos, acutos, prominentes, retre-  
tes, caninis longiores, & graciliores,  
quæ habeat; (negant habere Aldro-  
vando & Rondeletius) quorum su-  
periores inferioribus maiores, sic  
maxillæ inhxrent, ut ipsius pars esse  
videantur. De *Ferruca* sub mento cõ-  
troversum: affirmant quidam habere,  
negant alii. *Caudam* in angulos  
veluti desinentem gerit, ut Scari &  
Iulides. *Calculus* in capite habet præ-  
grandes, quorum Aristoteles & Pli-  
nius meminere; *ventriculum* magnū  
& carnosum; *intestina* mediocria &  
pinguia; *jecor* pallidum, ex quo fel-  
lis vesica pendet. Lienem suba-  
trum.

Marinum piscem omnes fatentur,  
sed de loco non conveniunt. Areno-  
sos gurgites melius eas pascere, Co-  
lumbella prodidit, Oppianus petri-

cognominat, & saxa herbosa incole-  
re asserit, hisce & Galenus acce-  
dit.


Quia perrato plures capiuntur,  
*solvaga* potius quam gregalis esse  
credetur. *Carnivora* & agilis, & pro-  
pter lapides in capite frigoris impa-  
tiens. Dum caput recondidere, late-  
re se totas Struthionum & Phasianor-  
um instar, putant. Oppiani id fide  
asseritur. Cibus quod spectat. Inter  
nobiles ab Ennio, Epicharmo, & Nu-  
menio pisces numeratur. Romæ in-  
ter sapidissimos, canicularum in pri-  
mis tempore censetur, & jarium  
cum Siluris precio venundari solet.  
Capita Titum viris rei Romanæ con-  
servatoribus dono dantur, de quo fa-  
ceta est apud Iovium de Ianusio hi-  
storia. Apud Pictones ex aceto &  
cæpis minutim concisis editur. Sal-  
vianus cum Ixucophago comestam,  
caryophyllis transixam, ac verrubus  
assatam laudat. Arcestratus gulæ  
suo tempore procerum princeps, no-  
bilem capitis condituram multis  
carminibus exprefcit. De *Carnis* fa-  
lubritate non conveniunt Autho-  
res. Galenus Philotimum quod eas  
mollis carnis piscibus adnumerat,  
reprehendit. Xenocrates bonum ex  
eo nec admodum copiosum succum  
generari, & saporis esse iucundi scri-  
bit.

Invenit & in Medicina usum. *Inter-* Plin. H. N.  
*vana* & *Squamma* combustæ, pannos 13. c. m.  
teste Plinio discutiunt. *Lapides* ar-  
gento inclusi tanquam colicæ amu-  
letum gestantur. Non emptos, sed  
dono datos gestari debere, nugacis  
vulgi delirium est.

GLAVCYS Bellonii pelagius est pi-  
scis, ex eorum qui plures patinas im-  
plent numero, Lutetix invisus, Ge-  
nuenibus frequens, apud quas *Fega-*  
*rus*, ut apud Venetos Corberus, qua-  
si Corvulus dicitur. Massiliensibus  
& Romanis nullo alio quam *Fm-*  
*brina* nomine venit. Ita  
de eo Bellonius.

Arist. H.  
A. l. 8. c.  
19.  
Plin. H. N.  
l. 9. c. 16.

Colomel.  
R. R. l. 8.  
c. 16.



Tab. XVI.

*Anthias Rondeli: rond kop.*

*Anthias Rond.  
altilis conformis.*



*cin. et. bolch.*

*Anthias latus.*

*Anthias prior.*



*Anthias frondus.*




*Anthias quater.*

*meertroffel.*



*Anthias Cuvier.*



3

卷之三

三




Alphale Cinarus

Steinfisch.

Cinarus Alphale

Tab XV



Ceracurus

Meer-Paff

Cinarus alie



Ceracurus

Meer-Paff

Ceracurus

Meer-Paff



Ammerus Exocetus

Steinfisch

Ammerus Exocetus



Galanus

Meer-Blau

Unbria

Meer-Schall



Orbus

Meer-Gropp

arus

Meerfisch





Gibus

Meer-Gropp

Acus

Meer-Nadel




Acus

Meer-Nadel

Acus

Meer-Nadel



Acus

Meer-Nadel





## ARTICVLVS XIV.

## De Anthiis.

TAB.  
XV.  
L. 2. 4 5. 6.

**A**nthiarum nomen omnibus piscibus latis imposuit Bellonius, sed malè: nec idoneum testem habet: nec omnes lati tam pulchri, ut vel Anthiz, vel Callichthydes, vel Callionymi dici possint. Ex squammosarum esse genere, dubium: à corporis floriditate nomen apud Græcos accepisse, certum. Ἀνθίας enim eundem ipse Aristoteles facit. Athenæo πύλαρχος δὲ καλλιχθυήσας dicitur, ἰσχυρὰ vocavere quidam, quo nomine & ille cui squammæ contra aliorum piscium morem ad os versus tribuuntur, insignitur: *sacrum* ali seu quod magnus sit, ut morbum comitialem, qui magnus est *sacrum* dicimus: seu quod quo loco Anthias est, ibi nullam bestiam esse confessum sit, vocant. Hicæsius Ἀνθίας dicit tradit, quod malè in Ἀνθίας Rondeletius vertit. Hesychius enim ἰχθὺς πύλαρ Ἀνθίας appellari asserit. Quatuor ipsorum genera ab Oppiano ponuntur.

Oppian.  
Habeat.  
L. 1. 7. 154.

Ζωοὶ δὲ γένεσις, πὶ δὲ τῆς αἵματι-  
λατοῦ.

Ἀνθίας δὲ ἰσχυρὰ τε, καὶ αἰσχυρὰ κα-  
λῶσι.

Sunt flava & nivea, sunt atro san-  
guine fusca

Εὐοπὶς ἀγ. Anceps alios hoc nomine  
dicunt.

Totidem & Rondeletius posuit: quorum vix aliquis, cum omnes den-  
tati sunt, Anthiz verò Oppiano e-  
dentuli, probatur. Prior totus corpo-  
re & pinnis rubens, Pagi: aut Cinx di-  
modo, ad imberbes Mullos refert po-  
test. Alter Afelli species est: quod neq;  
salutis, neque vento siccatus, servari  
potest, vel calidiori in Gallia cælo,  
vel occultæ qualitati adscribendum  
est. Tertium ad Turdos pertinere  
stellulæ, quas in pinna ad anum gerit,  
& corporis forma testantur. Oculos  
habet magnos, rotundos, purpureos,  
& rubros. Podicem magnum è quo  
intestinalium rubro viridiq; distinctum  
excidit. Pro quarto, (huius generis

Oppianus ἰσχυρὰ καὶ αἰσχυρὰ vocat, id est  
ισχυρὰ καὶ αἰσχυρὰ καὶ ἰσχυρὰ καὶ αἰσχυρὰ, ut  
Scholiastes meus exponit, *Ælianus* ἔλεγε, ἡ. Α.  
cetacei generis & ore robusto facit, L. 13. c. 17.  
squammolus & latus piscis, quem ex  
eo, quod super cilia oculos ambiant,  
Aulopiam esse colligas, ponitur. *Al-*  
*dræandus* quatuor quoque Anthia-  
rum nomine è diversis locis sibi mis-  
los ponit, sed pro iis non obrudat.

Primi venter totus argenteis (quam *aldræand-*  
mis resplendet: lateribus aureæ in- *de pifistis*  
termiscuntur. In dorso, quod fulgi- *L. 1. 4. 19.*

nosum, unica tantum pinna duode-  
cim armata aculeis viuitur, ventris  
pinnæ ad castaneum vergunt. Bran-  
chiarum opercula ex aureo & viola-  
ceo variant. Labrum inferius tum

intus, tum foris ex flavo virefcit,  
quod peculiaris notæ loco esse po-  
test. Alter toto dorso pinnis duabus  
dorsi & quæ retro anum est, viret.

Vertice capitis aterimo, cervicæ &  
labio inferiore in retina parte purpu-  
rascentibus. Osibus branchiarum

auto resplendentibus, venter toto  
argenteo purpura permixto. Tertius  
ram amplis violaceis toto corpore

variegatur, ut violaceus quasi totus  
videatur. Pinnarum numero cum su-  
perioribus convenit, quæ ad bran-  
chias, vergunt ad violaceum, & in  
extremo roscæ sunt. Iris oculorum

& mentum roseo sanguineove colo-  
re, specificam & ob quam solam di-  
gnosci potest notam, in eo consti-  
tuunt. Quarto in ustrata est oculorum

ac præsertim pupillæ magnitudo &  
pulchritudo: iridem ex aureo roseo-  
que permixtam habet. In capite re-  
tro oculos, cervicæ, & ad branchias,

amethystin, o aureo, argenteo, cæru-  
leoque variat. Labrum superius ha-  
bet viride, inferius cæruleum: *lim-*  
*gnam* maximam candicantem. Ven-

tre primum viridem, dein argenteo  
& auro ad podicem usque splenden-  
tem, ad caudam usque roseum & san-  
guineum. Locis Anthiis in saxis, quæ

tamen aliquando, cum ἀνθίας ὀ-  
φθαλμοῦ, deservunt. ἀνθίας δὲ ὀφθαλμοῦ  
ἀνθίας ὀφθαλμοῦ, † locum absque bellicis † *Ælian.*  
esse ubi habitant: quod fortè inter *Hyl. 1. 10.*

φύσιν ἀνθίας reputandum est. Unde *mal. 1. 8.*

Plin. H. N.  
L. 9. c. 59.

Ælian. H.  
A. L. 12. c.  
47.

lacti, ut superius dictum dicuntur. Cum unum huius tenebris videntur lineam facere asperitate dorsiforè, traduntur, eo qui tenetur extendente, ut secari possit. Capti autem non inapantur, sed solummodo in aqua vivunt. Depressi autem non in aqua. miserabile præbens spectaculum & mortem suam lugere, & quodammodo supplicare videntur.

De ipsorum capiendi modo ita Plinius. De Anthiæ pisco fieri convenit, qua plerisque ad verso credidisse. Chelodonia insulas diximus Asia scopuli maris ante promontorium sitas, ibi frequens hic piscis & celeriter, &c: Censentur ab Eustathio inter eos pisces, qui ætæni pæpæ, quod ob magnitudinem sumptuum, ganeorum opes exhauriant: sed & hæc Dii, quod preciosissimi sint, vocantur. Carnis est solidiusculæ. Unde *χρηστόν* apud Athenæum (malè *χρηστόν*) dicitur.

Fel cum melle inunctum, exanthemata, tubera, scrophulas, & dothienas sanat. Lapides capitis ad colulum ligati, Cephalægiæ domant.

#### ARTICVLVS XV.

##### De Gobius squammosus saxatilibus.

TAB.  
XV.  
II. 12.

Gobiorum historiam loci & regimenti differentia intricatam facit. Nobis de squammosis saxatilibus hæres est, eisdemque littoralibus. Nemo enim, ne de his pluribus in locis agere cogamur. Græcis dicitur *αυλίας*. Numenio apud Athenæum *αυλίας*, quem per *αυλίας* Phavorinus explicat: Latini Gobius, Gobio, Garvius, ut apud Ovidium, & Cobio ut apud Plinium legitur. Parvi sunt tam illi, qui in mari, quam qui in aquis. Tzetzes triebitales fama accepit, quod fortè de illis, qui in rubro mari, prout ab Æliano proditum, sumendum est. Bellonius ex saxatilibus album quendam facit, quem Græci *χρυσός* & *αυλίας*, Rondeletius flavescens seu palidum vocat. Est is palmi longitudine, toto corpore rotundo, non composito & spisso, squamis rotundis cæto, colore vario. Nigris maculis

conspersitur, oculis sursum potius quam deorsum spectantibus. Ad branchias pinnae duas habet, in ventre non duas cæterorum more, sed unicam non divisam, quæ notè Gobii maxime à reliquis piscibus inter noscuntur; à podice aliam, in dorso non unicam velut alii saxatiles, sed duas, prior minor est, altera ad caudam usque extenditur. Dentes ei parvi, os magnum, ventriculus, cum multis appendicibus capax. Aristoteles complures supernè circa eum exire scribit. Hepar ipsi album non sine errore tribuit Hicetius. Qui Aldrovando Venetiis missus est, pinnae habebat intergore binas coniunctas, quarum priora culeis vigeat, altera levis erat, binas item in pectore, totidemque ab ano omnes nigras. Caudam & superiorem partem corporis nigra. Ventrem candicantem.

Ex littoralibus duplices apud Authores invenio. *Albus & nigrus*.

Illos Rondeletius ita vocat, non quòd tam candidi sint, ut cum aliorum piscum candore contendere possint, sed quod candore cæteros Gobios superent.

Negrosita Bellonius describit. Eminentes ac turgentes supra caput oculos gerunt. Cornea tunica alba, & ut serpentibus dura obductos, adversus aquarum impetum, & ut sursum facilius ut Uranoscopus cernant. Vix excedunt duorum pollicum crassitiem aut palmi longitudinem. Rarò enim pedales & brachiales evadunt. Et si antem lubrici sunt, tamen squamis integuntur hirtis, pinnaeque habent unam in tergore continuam mollem & sine aculeis. Pinnae utrinque quatuor latas atque obtusas, ac præter has sub ventre etiam duas: sed ea, quæ caudam constituit, rotunda est. Dentes exerunt parvos, tenues, & subrubros. Corpus teres est, paucis spinis tectum, color varius. Etenim qui Gobiones circa algam versantur ad viridem inclinant, alii ad cinereum accedunt, nonnulli albicant, alii ex folvo in nigrum degenerant. Omnes grandiores sunt capite & lata cervice. At quod

Aristot. L.  
H. A. L. 2.  
L. 2. c. 17.

de bellonius  
descript. L. 7.  
Tab. 10.  
Favos. Æ-  
lian. H. A.  
L. 17. c. 6.

quod ad internas eius piscis partes  
attinet: peritonæum Gobionibus for-  
nis album est, intus nigretimum, *He-*  
*per* dextro lateri magis incumbit, pal-  
lidum, de quo *f* pendet veluti jan-  
thinum. *Intestina* multis circumvol-  
utionibus infectuntur. *Stomachus* est  
oblongus, pylorus multis apophy-  
sis præditus vulva undecunque ovis  
referta.

Facit & Rondeletius Nigritimentonem, quia Venetis Go, à Gallis Boulerot nuncupatur. Dignitas est magnitudine & crassitie, corpore rotundo ferè, non compresso, loco binarum pinnarum, quæ cæteris sunt in ventre, unicam habet nigram, barbani inquit dices; & exinde Athenienses seu hircum, cui Exocætrum confert, esse iudicat. Vivit in littoribus & stagnis marinis.

De Litteris proprio ambiguntur. Ovidio littorales sunt, Diocli faxatiles, cui Synesius accedit, dum circa Africæ quoddam litus, loco petroso capicribit. Aristoteles in fluviis quoque pinguefcere ait. A Theophrasto proditur in Ponto regione apprehendi in glacie Picium maximè Gobilones, non nisi patinarum calore vitalem motum fatentes; quod forrè de lacustribus vel fluviatilibus sumendum erit. Oppiano *φωκῶντων καὶ πικρῶν* gaudet. Pariunt juxta littora, suaque ovalatiuscula & arenida, ut Aristoteles prodidit, lapidum amplexibus mandant.

Ab *Aliano* inter illos ponitur, qui  
*veneni* *causam* *interdixit*. *Venenum* *pungendo*  
*immisit*, *annumerantur*; *Oppianus*  
*quoque* *veneni* *quodam*, *aculeos* *lethales*  
*ipsum* *tribuit*, *quod* *nec* *cum* *Ovidio*,  
*cui*, *spina* *nocivum* *non* *gobium* *ulla*; *nec*  
*cum* *Martiale*, *cui* *in* *terris* *Venetis*,  
*principium* *mensa* *gobium* *esse* *solet*, *con-*  
*gruit*. *Et* *sanè* *invenit*, *et* *in* *cibus* *usum*,  
*etiam* *Iuvenali* *vilissimus* *videatur*. *Alex-*  
*andrides* *in* *Coryis* *Thracum* *Regis*  
*convivio* *eos* *nominat*. *Antiphanes*  
*laudat*, *Phalericos* *in* *primis*. *Arche-*  
*phonti* *parasito*, *qui* *in* *Aegyptum* *ex*  
*Attica*, *a* *Ptolomæo* *Rege* *ad* *cenam*  
*invitatus*, *navigavit*, *Gobiorum* *fru-*  
*sta* *tria* *non* *sine* *stupore* *convivis* *o-*

mnibus visa, apposita sunt. Iovius enim persuavem, & pingui tenetitudine delicatior facit. Galenus ad volupratem, digestionem, & probum succum gignendum præstantissimum, ait. Mnesitheo <sup>inquit</sup> sunt & Hippocrati, Hicetio facile exvernunt, & non multum nutritum, flavescientium substantia rarior & magis putredinis experts. Apud Hippocratem parem in alimonia cum Dracone, Callionimo & Cuculo vim obtinet. Assus & sine sale mansus, nimia egerendi desideria sedat, si Kiranidi credendum, illitum, canum rabidorum, serpentiumque moribus prodesse Dioscorides prodidit. Dorycinii vim, crustum, tostum, elixum infringere, apud Nicandri scholiasten legimus.

## ARTICVLVS XVI.

*De Sphyrana sive Sudi.*

**S**PHYRANA, cuius præter Ovi-  
dium nullum alium meminisse,  
perperam scribit Plinius; nam inter  
Græcos Aristoteles, ex Latinis M.  
Varro meminere; Atticis *αίσα*, ut  
Athenæus affirmat, (significat hoc,  
ut & *επίγειον* stimulum aut stylum item  
reli genus bello Persico inventum)  
Latinis *Spadix*, ut apud Plinium vide-  
mus, Gazæ *Malleolus*, sed malè, Ro-  
manis *Lucius marinus* vocatur, sunt  
qui pro Oxyrincho, quia acuminato  
est rostro, sumunt.

Duas ipsarum posuit *species* Rondeletius ex Oppiano, sed tam dissimiles, ut an ex eodem sint genere dubitari possit. Prior enim squamosa à capite ad caudam lineam habet, altera squamis omnino destituitur. Totidem & Bellonius innuit, quarum una Trachurum colore refert, atque eodem modo sub ventre albicar. Altera senescens Mormyri laterales picturas colore assequitur. Quaternæ vix libram pondent, ut optime Plinius magnitudine inter amplissimos rarum scripserit: visi tamen aliquando bilibres, Colore Acellum æmulatur. *Costro* est foris carlato, in extremo cuneato, nigro. Ore valde rescis-

Plin. H. N.  
L. 32. c. 11.

reſciſſo. *Maxilla* ſuperior quæ obtuſa & brevior, cum inferior, quæ acuta & longior ita coit, ut vix oris roſtative ſciſſuram ullam diceret. *Dentes* utrinque habet, in ſuperiore maiores, in inferiore minores. In ipſo oris hiato unus eſt, cæterorum loagiſſimus & acutiſſimus, qui ore clauſo in foramen anterioris ac membrana cææ partis ita ſuſcipitur, ut extrinſecus etiam paululum emineat. *Lingua* ſcabra eſt, denticulisque aſpera. *Linea*, quæ à branchiis ad caudam uſque per latus deducitur, & initio flavescit cum dorſo, ſquammiſ parvulis & duriusculis, mira arte conſecta eſt. De numero *pinnarum* Authores non conveniunt.

*Aldrovandi Sphyræna* per dorſum nigricat, cætera ad amethiſtinum vergunt, & eiufdem coloris maculis interſtinguntur. *Linea* flavescit, ruberrimis infra ſupraque punctis exiguis notata. *Caput* cæruleum. *Oculi* & *pinnæ* pallescunt. *Cor* oblongum eſt, ſub quadam veſicula alba incluſum. *Pylorus* à ſtomacho conſurgit tam multiplici *apophyſum* ſeu cæcorum cæſarie intertextus, ut penitus ſtomachum contegant; nec à quodam numerari poſſint. *Fel* ab hepatis loco dextro latere in folle oblongo dependet. *Follem* ei natura ventro plenum ob longum, anteriore parte biſidum, utrinque in acutum exeuntem donavit, ne ad inum ſideret. Spina dorſi raris vertebraſ coagmenatur.

De loco non eſt quod multa dicamus. *Ælianus* dum pelagias dicit, Smyrænas potius innuere videtur. Expresſe enim ex quo ille de piſcibus ſerè omnia & πύρρα καὶ ἐκ τῆς φρυγίας γίνονται. Gregatim degere & Ariſtotelès teſtatur, & piſcatotes comptabant. Captis an ὁμασθησὶν μάλιστα δεχόμενοι *lubricis excidere membris*, quod ex Oppiano *Ælianus* prodidit, an comperat, ex ſuperioribus colligi poteſt. Non fallitur, qui pro *Sphyrænas* Smyrænas legerit.

Quantum ad *uſum* Romæ ceu plebeius negligitur, nec peculiarem habet condituræ modum. *Hicetſius* a-

pud Athenæum περὶ τροφῆς congris eſſe, ἀπὸ τοῦ δὲ τοῦ γόβου καὶ ἀπὸ τοῦ ἰχθυὸς διὰ πύρρας guſtui ingratos, ori inſuaves, ſuccum mediocriter laudabilem generare dicit: ſed cum congris ex cartilagineorum ſint genere, Philotimoque δωμαγεύοντες dicantur, & Rondeletius carne eſſe candida ſuavi, quodammodo friabili, & Afelli carnem referente, cuiſimul cum Lupo præcipuam authoritatem fuiſſe Cornelius Nepos, & Laberius Poeta tradiderint; quin Cæſtræ lumbi cum aliis lautisſimis obſoniis ab Antiphanè nominentur, vel librarios, vel Athenæum атаκτὸν ſuperius errorem commiſiſſe, veriſimile eſt.

## ARTICVLVS. XVII.

## De Acu.

## PUNCTVM I.

## De Acu Ariſtotelis.

Piſcis quem Latini Acum vocant, Ταχ. Græcis longitudine & tenuitate XIV. c3. Βολύνη, πύρρα, Athenæo Ἀχαιὸς, quaſi ſine muco, dicitur, ſunt qui βολύνη ut Varinus citat, & βολύνη nuncupant.

*Vnam* eius duntaxat ſpeciem Salviaſus agnoſcit. Bellonius cum Rondeletio *dum*. Nos de Acu Ariſtotelis, Oppiani, & Bellonii agemus. Hinc autem Rondeletius illum piſcem eſſe credit, quem Bellonius *Typhlinen* & *Caciliam marinam* ob corporis figuram, Plinii *Spondylem*, Græcorum vulgo *Hierophilidam*; Maſſilienſes *Gagnolam*, quod quoties piſcantur, ſi alios piſces præcedere viderint, lucrum portendi credant, vocant. Piſcis eſt longus, cubiti longitudine, digiti craſſitudine, totus ſubſavus. *Corpus* utriuſque ſexus anguloſum, oblongum, à capite ad meatum excrementorum ſemper craſſeſcens, ſexangulum, ſed deinceps, ut tenniſ efficitur, pro ſexangula quadrangulam formam induit. *Caput* habet exiguum, *Roſtrum* oblongum, durum, nec acuminatum. *Extrema* pars latiuſcula exſtat, tiſtus in altitudinem dehi-

*Aldrovand.  
de Piſcib.  
L. 1. c. 21.*

*Oppian.  
Habeat. L. 1.  
v. 168.  
Ariſt. II.  
A. 1. c. 2.*

*Oppian.  
Habeat. L. 1.  
v. 120.  
Ælian. II.  
A. 1. c. 31.*

*Athen. L. 7.*



circa Acum indagatote eius non meminuit. *Partes interiores*, ventriculū, hepar, intestina, quæ appendicibus carent, longa habet. *Hepati* vesicula fellis oblonga adhæret. *Cor* angulosum est. In arenosis, saxosisque locis ingratum palato invenitur.

ACUS MINOR Bellonii *Lacertus* est, seu *Saurus Acubus similis*. Rondeletio. Piscis est marinus, pedis magnitudine, Acubus brevior & crassior. *Rostro* acutiore sed brevior & sursum recurvo. *Dentium* loco maxillas serratas habet. *Branchias* quatuor, septem etiam, ut in superiore, quem Bellonius Malorem vocat, supernè ac infernè & in cauda propendentes *pinnulis* his, *oculis*, & ante hos foraminibus, ventrisque squamis ac lineis, quæ ventrè ferè quadratum efficiunt firmatque, Acubus est similis; carnis substantia, & posteriore corporis parte Scombris. *Intestina* longa gracilia, in gyrum convoluta. *Hepar* longum rubescens, *fel* & *splen* nigricantia. Cuius Aldrovandus Leonè dedit, toto corpore subviret, maculis ex amethystino & cæruleo mixtis, in dorso inrensus, in pectore remissius variantibus. Rarus est, & in insula nomine Lissa, olim Phuna assatim capitur. Inde salitus navigis transfertur, & maximo quæstu dividitur.

## ARTICVLVS XVIII.

## De Fabro.

FABER piscis, seu exinde quod omnia fabrilis instrumenta in eo reperiuntur, teste Salviano, seu propter multiformes dorsii ac ventris aculeos atque varia capitis ossa, quibus fabrilis omnia instrumenta representantur seu ab arte fuliginis colore, quod tamen, si ex Oppiano de-

sumptum est, Coracino potius tribui debet, ita dictus est. An *χάκας* sit, quod Salviano placet, dubitatur. Cum eum Gadibus principatum oblinere scribat Plinius; rotundum vel orbicularem, Athenæus faciat. Si *χάκας* est, utique & *ζὺς* seu Jupiter dicitur, nam & hoc *ἑ χάκας* nomen est, seu à *χάκας* formatum; seu quod fortè, ut nunc sit, olim etiam in templi Iovis tanquam sacer suspendere-tur. Quidam *χάκας* nuncupant, an propter maculas laterales, digitorum Divi Christophori ut aiunt vestigia, vel quod eum quem Iussu Salvatoris Div. Petrus cepit (maculæ prædictæ numismatis illius quodammodo figuram exprimere creduntur) opinentur, nescio. Romæ *Citula*, Liguribus *Rotula*, Hollandis *Gallus marinus* dicitur. Qui Chalæiden, Acanthiam vel Cirharum, vel Porcum marinum esse iudicant, falluntur. *Primus* enim inter viles pisciculos à Columella; ab Aristotelo inter fluviatiles reponitur. *Alter* cartilagineus & rotundus. Citharum piscem inferius dabimus. Porcus inter magnos pisces recensetur. *Ζάκας* Hesichii idem fortè cum isto. Cum nec inter *ῥοδάκας*, qui una parte candicant, nigricant altera, nec inter planos, à quibus oculorum situ differt, referri possit, benè inter latos censetur, quamvis maximè compresso ac plano sit corpore.

Coloris est vari. *Caput* & dorsum obscura sunt, *pinnæ* nigricant, latera partim ex cæruleo virent, partim aurea sunt. In medio corpore macula nigra, orbicularis, vel ovata nummi minoris magnitudine, colore cælesti, cum tribus imagunculis, figura quodammodo Hippocampi, colore aureo, visitur. *Squamæ* tam exiguis regitur, tenuibusque ut nisi digito scalpas vix appareant. *Caput* ipsi compressum, extensum, osseum, ossibus quàm plurimis, variis, angulosis, tenuibus, atque perlucidis constructum, maculis quibusdā exiguis purpureis exornatur. *Linea* obliqua à capite ad caudam ducitur. *Oslarissimum*, plurimum hians, edentulum, cili

Oppian.  
Halleri. l. 3  
deg. 1.  
p. 605.

TAB.  
XVII.  
1. 2.  
Aldrovand.  
de Piscib.  
l. 1. c. 35.

etli quodammodo dentatum pinxerit Bellonius. *Oculi* magni, rotundi, aurei. *Branchia* utrinque quaternæ, quarum ossea opercula in aculeos desinunt. *Pinna* duæ mediocres ad branchias, duæque aliz in anteriore ventris parte paulo longiores, ac in quinos velut longos pilos aut setas potenas degenerantes, ab ano tutus duæ aliz quarum prior pars quinque duntaxat aculeis constat; altera multo longior, & ad caudam ferè usque extensa, aculeis caret, in dorso unica tantum & magna, ut quæ paulo ante medium dotium exorta, ad caudam usque ferè extenditur, figura huic pisci propria, & aliorum piscium dorsi pinna dissimilis. Primum namque in longissimos pilos eius ferè modo, quàm in anteriori ventris parte conspici diximus terminatur; deinde plurimis robustissimis aculeis intertextis armatur; postremò aliis etiam aculeis osseis multò brevioribus, bifidis atque recutis, secundum eius exortum in dorso præmunitur. Pars ventris utrinque ossibus instar acuti cultri secantibus firmatur. *Cauda* in unam pinnam desinit. *Ventriculum* habet mediocre, gulam manifestam, intestina parva tenuis in gyros convoluta, inter quæ ova tubalate re Rondeletius ait. *Hepar* candidum sine felle, lienem rubescentem exiguum, mesenterio hærentem. *Cardia* pars infima rubet, suprema & media ex albo rubescit, quod in paucis piscibus spectatur.

livagus est, & erectus, non passetum more in latus conversus natat.

Reputatur inter pisces carne satietem & friabili, concoctu facili, & boni succi. Apud veteres in multa fuisse æstimatione ex Columella dum dicit, *Atlantica piscitur Faber: quæ in nostro Gadum municipio, generosissimis piscibus adnumeratur, tumque prisca consuetudine Zeum appellamus, didicimus.* Cum ob corporis tenuitatem, commodè assari nequeat, aut frictum & omphacio aut aurantii mali succo irroratum, aut in aqua & vino partibus æqualibus, oleo, sale, beneque olentibus herbis atque aromatibus elixum comedi, Salvianus tradit.

Columella  
R. N. L. B.  
L. 16.  
Plin. H. N.  
L. 9. c. 18.

## CAPUT II

De Piscibus saxatilibus  
levisibus.

## ARTICULVS VNICVS.

## De Alaudis &amp; Pholide.

Inter Saxatiles læves, Alaudæ duntaxat, cum is qui ad eas pertinet XVII. 3. Gutturato nempe pisce, & Exocæto Aldrovand. Bellonii, & Pholis reperiuntur. de Piscibus  
ALAUDAM duplicem facit Rondeletius, Crissalam & non Crissalam.

TAB.  
XVII. 3.  
Aldrovand.  
de Piscibus  
L. 1. c. ult.

Illa corporis specie Scorpioidi admodum est similis. Colore fusco, multis maculis partim rotundis, partim oblongis & tottuosis notato, tenui, lævi & lubrico, ore parvo, dentibus anterioribus serratis, posterioribus exertis, oculis parvis cæruleis, in vertice dum vivit erecta est crista, mollis & cærulea. *Pinna* ad branchias latæ sed breves; in ventre parvæ & retnues. *Podæx* non procul à branchiis distat, à quo pinna ad caudam protenditur, alia in cervice ad caudam continua. *Pertinacium* ex nigro vitide est. *Cor* angulatum.

H 2 tum.

Oppian.  
Halient. L. 1.  
V. 333.

In saxis cum degere tradidit Oppianus, in Atlantico & Gaditano genetosissimis piscibus adnumerari Columella. Ita carnivorus est, ut nec alia maris purgamenta spernat. An ei Rridot competat, quem Chalcidi Aristoteles tribuit, ita ut pro χαλιδος χαλιδος legatur, quod Aldrovando placet aliis iudicandum relinquo: mihi, cum brachiæ opercula tam horrida habeat, ut dimota sonitus edant, & verò plurimi ex piscibus qui δεικνύται φωνή τῇ ὀρίῳ τοῦ θορυγγίου (ἀπαρθέναι; ὁ δὲ τῶν) hoc quod vox videtur, atroxu branchiarum quippe leca spinea sunt emittunt, verisimile videtur, So-

tum. *Hepar* exalboruber, à quo *fellis* vesica pender, perspicuitate & coloris jucunditate smaragdum referens. *Intestina* lata sunt, coloris lutei. Ob parvam branchiarum scissuram sat diu extra aquam vivit.

*Carne* est molli, sed ob parvitatem negligitur.

TAB.  
XVIII.  
3.

Ad hanc *Piscis GYTTROSUS* dictus refertur potest. Nigricat quidem fetè undique: sed & punctis caeruleis distinguitur, & color luteus per totam superiorem dorsi pinnae partem, circa branchias & summo ventre visitur.

Littoralis est, & foramina lapidum aut ædificiorum littoralium subijte solet, vel carne vasi iniecta mox exempta capitur.

TAB.  
XVIII.  
2.

*ALAVDA NON CRISTATA* capite est parvo & rotundo, ore & oculis parvis, *dentibus* anterioribus serratis, posterioribus longiusculis, acutis, exsertis. *Pinnulas* duas habet ad branchias, duas in ventre, aliam statim à capite ad caudam continuam, item aliam à podice ori faris propinquo ad caudam usque ductam.

*Cauda* in unicum definit saxatiliū more. *Macula* multæ mediæ corporis parti asperæ sunt.

Aqua, muco, parvis *Athetinis* & *Aphysis* vestitur. Carnis substantia & mollitudine cristatæ par. In petrarum rimis degit, hinc nomen *Percepere* sortitus est.

TAB.  
XV.7.8.

Huc & *Exocætus* seu *ADO-NIS* Bellonii, qui cum *Vrticis* plurimum delectetur, & istæ circa littora inter cautes hæreant, mari profundius mergi recusat, in rupibus Bononiæ, in cavis cautium quiescit.

Species illarum sunt plures, quarum una *Cristata* est Massiliæ frequens, primo aspectu *Gobium* referens. Cute glabra obducitur. Vulgus *Glinos* vocat, colore est sub-ruffo, ut *Scorpena* multis aliis coloribus confuso. *Dentes* habet ut *Scarus*, firmos, continuam tergo-

ris *pinnam*, ac nescio quid supra *oculos*, quod veluti à pellis laxitate procedit, laterum *pinnas* inverteas, duas sub ventre duabus tantum cirrhis radiatas. *Cristati* caput ad *Chamaeleonem* accedit, in cuius cacumine *pinnam* Galli *cristam* referentem videas. *Dentes* habet antetiores acutissimos.

*Cauda* *pinnam*, & laterum rotundam, sub sterno duas; alteram in tergo continuam, maximè *laram*. *Branchias* testas, & parvo foramine pervias, sed & detectæ quatuor numerantur utrinque. *Cute* integitur laxa, multis coloribus ut *Draco* variegata. *Chamas* & *conchylia* conficit: sed & *urticis* interdum *passitur*. Triduum vel quattidui absque aqua vivit.

*Tertium Exocæti genus*, piscatoribus Byzantinis *Glini*, aliis *Chelidenis* nomine venit.

Rarè sex digitorum longitudinem, & duorum pollicum crassitiem excedit. *Squamis* caret, & lituræ melinæ cyanæ & fulvæ per tergo diffunduntur. *Pinna* tergoris continua est & mollis, caudæ & laterum latæ, varii coloris omnes. *Branchia* sunt connectæ *Spinea* extetior, utin *Dracone* marino, duobus aculeis obfirmatur: sed ab eo dissidet, quod quilibet aculeus duobus serratis denticulis repandis & aduncis sulcitur. *Caput* habet polymitum, *Os* grande, inferiorem *maxillam* latam & planam. *Dentes* *Glini* prior realiquantulum minores. Dum scinditur, *branchias* non ostendit integras *Aristot. H. A. 2. c. 55.* sed rudimenta coloris paulò magis rubra quàm in *Muræna*. Non male ad *Basilyscos* *Oppiani* referrentur. *Scalig. in Aristot. l. 2.*

*PHOLIS* à muco ita dicitur, TAB. quem emittit. *PHOLIS* dicitur, XVII. 4.

quod si vultu nunciat. In circuitu eius in comerescit, ac sic quiescibile. Antipoli & ab Italis *Bavola* vocatur. Alauda paulò maior est, dorso fusco, cute lævi, maculosa, ventre pallido. Pinnis aliisque partibus à superiori-bus non diffrens.





Mullus minor.

Kleiner Postbart.

Faber.

Meer Schwall.



Mullus maior.

Großer Postbart.



Faber marinus.

Meer Schwall.

Leiparis.

Schnala fisch.



Pholis.

albus ferox.

4

Schleim Lersch.

Alanda.

3

Meer Lersch.



Hymnodo.

8

Meer Schwall.

Cuculus.

10

Rothfisch Meerhyrn.



Cuculus.

11

Rothfisch.



Milvus.

12

Meer wip.



Hymnodo. alba.

9



Atherina.

15

1 Jener Hanne art.



Phaenax.

13

Pote Meer Bräuner.



Chironia.

14

Kellen Bräuner.



Necabitur ab his SCORPIOIDES  
Rondeletij sic dictus, quod capitis  
forma Scorpii marino similis sit,  
rotundemque supra oculos apophyses  
licet molles habeat. Galli Leporem  
marinum, quia rostrum terreni leporis  
et fissura admodum simili  
habet, nuncupant. Differt à Scor-  
pio dentibus, quos ferratos quidem  
habet, sed tenues & densos admo-  
dum, & in superiore maxilla duos ex-  
teros, ab eodem & Galerita pinna  
dorsalis magnitudine, duabusque eius-  
dem pinnae nigris maculis distinguitur.  
Littoralis est, mucro vesticur &  
aqua.

\*\*\*\*\*

### TITULUS III.

*De Piscibus Marinis Litto-  
ralibus.*

## САРУТ I

*De Squammosis non pla-*  
*nitis.*

## ARTICVLVS I.

*De Mullo.*

TAB.  
 XVII,  
 §. 6.  
 TAB.  
 XVIII.



**M**On minus bene primum  
Mulleto interales pisces  
locum dari, quod Scaro  
inter saxatiles darus est  
inferius patebit. *Nomen* apud Lati-  
nos non tam à mulleorum colore,  
(calcei erant quibus priores Albar-  
norū Reges, postea patricij vti sunt)  
quod Fcestellæ teste Plinio placet;  
quam à mollitie invenit. *Servitius*  
est indignatissimus, ut Columella  
loquitur; et in piscinis nihil vel pa-  
rum saltem crescit. Græcis τείλα non  
τείλα, et τείλις quod de temina (su-  
mendum est, quod ter pariat. Hinc  
Oppianus τείλαται ιππύωνος γυνή dicit;  
vocatur. Cretensum vox στεγυλα-  
μαστίν ex Græca & Venera com-  
posita est. An, γαβήσι dicantur, quod  
Helychius inquirere videtur, cum

Plm. H. N.  
Lg. 4. 17.

Oppien.  
Hobart.  
L.L.V. 590.

Triglas Gtzei *gamma* <sup>4</sup> *lidas* cognomi-  
nent, in medio relinquo.

*Due ipsorum sunt genera. Alii sunt Barbati, quos γυρίαιδες vocant, quique sola succi bonitate, siquidem alii alga, alii carne vescuntur, differunt. Vnde Lutatii apud Plinium nomen. Imberbes alii, quos quidam ἀπηνύκτες, τεργίνας Sophron, & quidem, ἰμαρῆς, λεῖπόμενος, quod vmbilicus pedexve aur magis quam aliis congenentibus patet, aut minus rotundus est; ἰοδυνίς, quod in summo mari natantes tranquillitate promittant, nuncupat. Dari tales Salviaus negat, nullum alium ex veteribus eius meminisse, perperam prætendens. Xenocrates enim faxatilis barba destitui innuere videtur, dum pelagium describit. Mullastros recte dixeris, quorum alium imberbem, alterum à squamis asperum Rondeletius facit. Figuræ est totus oblongiusculus, magnitudinis mediocris, binas libras raro exuperare, apud Plinium habetur, quadrilibris Seneca, sex librarum Iuvenalis meminere. Si verum est octoginta librarum in maritubo captum, vt Lucius Mutianus apud Plinium prodidit. Alterius is generis fuerit necesse est, dorso repando, vnde πῖδας gibbosus Epicharmus in nuptiis Hebes dixit, ventre plano nubitante, cætera purpureo, hinc ἰοδύκτων φῖλα Mullorum apud Oppianum. Matronus Parodus μάστιγι καὶ πολεὶς miniaceo fecit. Squamæ magnis, tenuibus, fætratis, obliquo sursu dispositis, faciliè vt apparet deciduis, robustis tamen. (Tiberius piscatori sibi secteto agenti insignè adferent Mullum, eo faciem perficari iussit) Pallentes eadem seu ad vitæ linem vergentes, virgis quibusdam patalellis insignitæ. Si vivus desquametur, colore sanguineum sortiri, hinc χερνίς apud Plutarchum, & χαρδύχην apud Nausicratem nomina. Massarius author est. Mortuum vericoloris quadam & numerosa varietate spectari, rubescentiumque squamarum multiplici mutatione pallefcere, vtrique si vitto inclusus pascitur, à Seneca & Plinio*

Invenit  
in Sisyph.  
Palm. H. N.  
l. p. 6. 18.

Oppiani  
L. 6.

*Sartorius*  
*Tuberos.*

proditum est. *Caput* habet tepandum, multis velut cancellis aureis exornatum, in quo *spinam* Canisimilem, quæ tenibus appolita, miro sit remedio, Marcellus Empiricus asserit. *Osi* patrum, edentulum, *aculeos* mediocriter rufos, in Aldrovandi ex Hispania misso, nigricant. Duo *cirri* cutacei albi in quibusdam, in nonnullis tubri, molles, rotundi, longi, atque barbæ similitudinem gerentes propendunt. *Branchia* utrinque sunt quaternæ, ad quas pinnae sunt duæ aurei coloris, in ventre totidem eandem; à podice rursus alia in tergore duæ, prior ex firmioribus, posterior mollioribus aculeis constat.

Cauda tubet, & in lunaram pinnâ degenerat, ac propterea laterum pinnae, velut in acutum tendere Bellonius autumat. *Interiora* si species, gula est parva. *Ventriculus* cum innumeris appendicibus itidem, *hepar* ex albo rubescit, *Splen* exiguus est & nigricat. Scaliger, sinistro illud ventriculi lateri adiacete, dextro hunc, scribit. *Intestina* sunt mediocria; cor triangulare.

Quia huc adscripsimus Minori quoque Salviani Mullo convenient, hoc discrepat, quod purpureo pingatur, aureis lineis careat, & lituris quibusdam flavis ac liventibus notetur, & squammis modico contactu decidui vestiantur.

De Loco ambigitur inter Authores. Septentrionali Oceano & proxima occidentis parte gigni Plinius dixit Galeno sunt pelagi. Oppiano modo *χθοναλίαν παρ' αὐγαδίαν ῥινορτα* humilia prope littora degunt: modo inter saxatiles cum Seneca referuntur; nec abludivit Ælianus, *λεγεῖν δὲ* ei à loco, quem incolunt nonnulli, *πτερεὶ δασύαι ἐπὶ ἀγνίας minuta & rara tubercula*, aspera illa habere, scribit.

Por incerta maris spacia vagari, & circa littora, eorundemque saxa, ut plurimum vel quosdam duntaxat degere, verisimile videtur. Sane Ælian. H. A. l. 1. c. 16. Xenocrates, & Cantharo *ἀνὰ τρι-*

buit Ælianus: *πτερεὶ δὲ ἀγνίας* mi. Oppian. *μυλῶ, πετρίῳ* semper asseru delectatur a. Hald. 7. 340. Arg. H. A. l. 1. c. 31. non dubitavit.

Procreantur & in marinis lacubus, *Varro* l. 2. detinuit & in vivariis Hortensius ad l. 3. c. 17. Baulos, & maiorem sibi habebat curam, ne ipsius esuriret Mulli, quam Varro se habere profectur, ne sui in rosea esurirent alia. *Gregali* est & autumno viget. *Pamphagi* sunt, & præter cænum, unde ipsi Sargus, comes, ostrea, algæ, & conchas, quibus ærtis inhiant, piscum & hominum eadaveribus vescuntur, & *μακρὸν τῶν μινωτικῶν ἐστὶν αὐτῶν φαδῶν, magis sordidissimum & male olentibus*, adde betarum folia, delectantur. De eadaveribus apud Oppianum & Ælium legimus, & videntur id pugnae navales & naufragia, quæ magna copia sublequi solent, Rittershusio declarare. Antiphancs tamen inter Helenæ cibos, quod homines non insectarentur posuit. Pisces insectari nullum dubium Orphum *ἰνέειν* inquit Oppianus.

Vescitur lepore marino unum tantum animalium ut non intereat nullus piscis, generascit duntaxat & ingrator visiorque sit, verba sunt Plinii. Dum itaque carnivorum Aristoteles negat, exiis, qui vel præter carnes nihil attingunt, vel viva tantum maris animalia venantur, eximere videtur.

Tet parere anno constans est Authorum opinio, his certe toties fertura apparet. Aristoteles *ἰσὶ τῷ μηνὶ δι' αὐτῶν τινῶν παλαιῶν χρόνων ἐπὶ τῶν ἰσθμῶν*, in cæno, itaque sero parere, diu enim frigidum est, addidit, solus Ælianus apud Aldrovandum, sterilem reddi postquam ter pepererit, natis in utero vermeculis, qui semen exedunt, prodit, quod mihi nondum apud eundem invenire contigit. *Antipathiam* cum lepore marino habere ex præcedentibus cognoscipotuit addit Aphrodisæus Torpedinem, cuius viribus stupefactis ista resistere creditur.

Insignis

Insignis est prodigo veterum luxu seu precium, seu coques seu lances consideres. Argenti pari pondere sæpius à privaris etiam Quiritibus emptum, cum pedis longitudinem superaret, Iovius prodidit. *Assinius celer Claudio Principe unum octo milibus nummum, id est, quadringentis plus minus Caroleis, mercatur est, licet magis luxuriam æstimare, quod Plinius suis temporibus neget facile Mullum reperit, qui duas libras excederet. Crispinus Ægyptius ex servili conditione ad equestrem dignitatem Domitiani indulgentia evectus,*

— Mullum sex milibus emit

*Æquantem sane paribus sestertiis libris.*

Publ. Octavius ingētis formæ (quatuor pondo & ad selibram esse aiebant (à Tiberio Cæsare in macellum missum, quinque milibus sestertiis mercatus est. Idem res, triginta milibus nummum vœnitse, graviter conqueritur & annonam macelli Senatus arbitratu quorannis temperandam censet. Nec satis soluta luxuria videbatur, nisi & coci maximo conducerentur pretio. *Ra-*

*putatio hæc inquit Plinius ausert trans-*  
*versum animum ad contemplationem eorum, qui in conquestione luxus, cognovimus singulos plus quam equos quiritabant. At nunc coci triumphorum pretii parantur, & coquorum pisces. Nullusque prope iam mortali æstimatur plus, quam qui perissimè censum Domini mergit. Lances quibus inferebatur,*

*Chrysendeta Marialis vocat, vel crustis aureis ornabantur, vel gemmarum fuere gemmarum auro confectæ & contestæ tenebantur, ut Turnebus explicat. Non eadem ramen omnibus præstantia. Polluci Ioniæ maximè placent. Actio Syncero qui ad rupes Herculeas capiuntur. Nausicrati Æxonici: Æxoniam Magnesiæ urbs est, sed Cratinus eos improbat. Archesstratus laudat Tichuntinos: Tichus castellum prope Tachinam Campiæ oppidum est. Corficæ &*

*Taurominitanæ rupes à Iuvenale celebrantur.*

Perotus præstantissimos in mari Tyrreno iuxta Corniculū, & Tarquinios capi prodidit. Iovius Romæ hyeme & suburbano mari capros maximè prædicari: Ligusticis, Veneris, & Neapolitanis non eam saporis gratiam esse, quanquam multo grandiores in convivia veniant, scribit.

Sed & longius à littoribus captis sua quoque gloria. Purior enim aqua in causa, corporis rubicundus, igneus, aureusque fulgor argumento. Magnas parvis gulæ procures præferebant, seu propter maiora capira, & iecinora: summopere ista expetita ex Galeno habemus: seu quod ira subtrilioribus pabulis placeret; seu ut inexplibilem gulam preciosissimo obsonio explerent, quas Philoxenum Poeram apud Dionysium fecisse legimus. Heliogabalus non integros, sed quod præcipue stupendum Lampridius scribit, barbas eorum plenis discis, palatinis suis apposuit.

De carnis qualitate inter scriptores non convenit. Xenocrates obsoniorum præstantissimum, stomacho idoneum, origratum, boni lucci, ræne plana, difficilem ad corrumpeudum, mediocre ad excernendum pronunciavit. Celsus medium inter duras & teneras carnes habentes reponit. Diocli, Philotimo & Psello difficulter concoquitur. Durissima est & valde friabilis, boni nutrimenti, si bene concocta fuerit, Galeno. Apparatus ad Oeconomiam pertinet. *Olim parum vi-*  
*debatur recens Mullus, nisi qui in convi-*  
*va manu morderetur. Vitreus ollis inclusis Naturæ*  
*offerebantur, & observabatur morsen-*  
*tium color, quem in multas mutationes mori luctante spiritus vertit. Apicius ad omne luxus ingenium mirus, in sociorum garo (nam ea quoque res cognomen invenit) necari eos præcel-*  
*lens puravit.*

Venit & inter Remedia. Sanguinis & hæmorrhoidum fluxus promoveret. Sæpe sumptus oculorum aciem hebetat.

*Galen. de Aliment. facult. l. 3: Actus l. 2: 679.*

*Seneca Quest. Natur. l. 3: 3617.*

*Plin. H. N. l. 9. c. 17.*

*Macrobi. Saturn. l. 3. c. 16.*

*Juvenal. Satyr. 4.*

*Seneca E. p. 96. Sueton. in Tiberio.*

*Plin. H. N. l. 9. c. 17.*

*Martial. l. 2.*

*Turneb. Adv. l. 1. c. 3.*

Impulsen-  
des Hitzes

hebetat. Vinum in quo suffocatus est inter virilis impotentiz causas numeravit Trepfates, nec mulieres si biberint concipere; ideo Dianz in sacris offertur. Aslus terminosis peculiariter prodest, à Tralliano dysenteria hepatica laborantibus præscribitur. Carnes ex capribus decoctæ & cum melle lubatæ, ani tollunt vitia. Percussis denique à Psittaco cum lafare medetur.

IMBRICEM duplicem nobis descripsit Rondeletius. *Prior*, quem Occitani *Imbrigo* à rubore, quo obocforum facies inficitur, vocant, rarus est, veteribus parum novus. Hirundini & Cuculo corporis *figura* similis, colore magis rubro, *capite* magno stellulis cæto. *Oculus* magnis, *Ore* parvo, edentulo, pars inferior Cinnabaris colore inficitur. Os branchias operiens in aculeos ad caudam spectantes terminatur, ad quas pinnae dux sunt rubrae cum appendicibus aliquot, in ventre dux *alix*. *Cute* aspera & rubra in dorso & lateribus conregitur. *Ventre* est candido, ad quem è dorso lineae multae ducentur. A capite ad caudam *dorso* medio acutorum osculorum ordines, cavum efficiunt, è medio pinna rubra aculeis ferratis constans etigitur, quod non nisi in Sagittario videbis, quam alia velut è mollioribus pilis constans sequitur. *Cauda* rubra est Scorpionis caudae similis. *Ventrilis* parvus cum multis appendicibus. *Venter* vere multis ovibus distenditur.

*Alter à squammarum asperitate, Asper nominatus, corpore est brevi, ceteri, digiti magnitudine, colore minij vel valde purpureo. Capite, brachiis, pinnis descripto similis, squammas habet parvas, serratas, oblique sitas, à capite ad caudam lineam ex squammis contextam, pinnas ad brachias extra candidas, intra ex viridi nigrescentes. Ventriculū cum appendicibus paucis parvum, hepā candidū, & sine felle. Splenem parvum ex rubro nigricantem.*

Aldrich.  
Ref. 107.

Diversus ab hoc *Aldrovandi asper*  
*Mullus* est, utpote totus fere ruber,

capite aureis cancellis ornatus, in *Pisium* L.  
vertice aculeatus, dorso planus &c. 2. 6. 2.  
Sper, ventre candicans, branchia-  
tum caeruleis striis pictis, cetera fla-  
vescens.

## ARTICVLVS II.

*De Hirundine & Cuculo.*

Quænam sit Græcorum Hirundo, TAB.  
seu ut illi vocant <sup>ῥομφαία</sup> ambigi. XVII.  
tur. Rondeletius eandem cum *Luc.* 8. 9.  
*cerna* Plinii, quod noctu luceat, fa- *Plin. H. N.*  
cir, & in Plinii loco transpositione *h. g. a. 16.*  
arbitrantur. Aldrovandus eum pi-  
scem esse, quem pro corace sive cor-  
vo Salvianus, pro *Lucerna* Gesne-  
rus posuerit iudicat, & *Hirundinem*  
Plinii ab *Hirundine* Græcorum di-  
stinguit, illamque Rondeletii *Mu-  
gilemalatum*, & Bellonii & Salviani  
eram *Hirundinem* opinatur. Ut ut  
sit, videtur *Lucerna* dici, non quod  
lingua eius peros exerta tranquillis  
noctibus luceat, (piscibus enim ex-  
planata ista, si Aristoteli credimus,  
& fieri id, piscatores negant,) sed  
quod vel pinnæ versicolore noctu  
fulgorem quædam emittat; vel quod  
speciem antiquæ lucernæ gerat, vel  
denique quod oculi eius noctu luce-  
ant, quod verissimum esse iudico.  
*Caponem* Romani à capitis asperita-  
te & magnitudine dicere.

*Dna ipsius sunt species, quæ in omnibus ferè cum cuculo conveniunt. Ore, rostro, capite osico, anguloso, calato, aculeorum, pinnarum, citroorum cartilagineorum numero & loco. Maxima in appendicibus, utrinque ternis, similitudo: in eo distinguuntur, quod binæ rostri eminentiæ, quæ in cuculo longiusculæ sînt, in hoc vix conspiciantur, pinna lateribus hærens, primum sit viridis, in extremo cærulea, tergus quoque variagatur. Cuculus denique sæpe rtes libras attingat, duas nunquam hirundo. Squammis pro iam exilibus regnatur, vte Gesnerus pro iam asperam habere cuticulam scripserit.*

*Altera Hirundo* duas latas & cz-  
ruleas ad latera pinnas, Milvinis  
brevis.

breviores habet, has per medium ferre corpus expandit. Corpore quoque est recurvo, & crassiore, grandiore ventre.

*Ælian. H. A. l. 2. c. 3.* Solitarius esse captura arguit, singuli & pauci capiuntur. Cum aliquid metuunt, ex mari exilire dicuntur, sed humiliter volant.

*TAB. XVII. 10. 11.* Cuculum Græci καυκω, seu a sono, quo avis eiusdem nominis more obstrepat, ut Aristoteles & Athenæus testantur: seu quod cum retibus capitur vocem κα exprimat, dicunt. Pseas ψευς nominatur, Typhon apud Athenæum cum τῇ τριγῶν sit similis, cum Trigola eundem à quibusdam haberi prodit.

Totus piscis rotundus est carnosusque, vix tres libras superat. Toto corpore præterquam in medio latere, in quo virga ex tenuibus squamis contexta protrahitur, glaber est, in dorso à capite ad caudam duo squammarum ordines deferuntur. Caput ipsi magnum, osseum, angulolum, totum exelatum, alicubi aculeis munitum. Rostrum in duas longiusculas eminentias semicirculum constituentes terminatur. Super utrumque oculum superciliis loco brevis, sed acutissimus & durissimus aculeus extat.

Utrumque branchiarum operculum alio & quidem longiori armatur. Maxille extrema sui parte asperiores dentium vice funguntur. Antepinnas, cartilaginei curri, utrumque rerni dependent. Ventrem habet planum. Caput dorsum, latera & pinnas rubra. Ventriculorum cum multis appendicibus satis carnosum. Intestina lata, inter se convoluta, & multa pinguedine obducta, hepar subalbidum sine felle. Splenem rubrum & parvum.

*Oppian. Hal. l. 1. v. 97. Arist. H. A. l. 8. c. 13.* Litoribus ab Oppiano accensetur. Aristoteles & Ælianus inter illos & pelagios ambigere dixerunt. Inter Brasiliam & Portugaliam densis agminibus volant, & aliquando milleni, sæpe centeni capiuntur. Pinnarum magnitudine adiutus in nando celer est.

Carnem habet plurimam, albam,

duram, & siccam. Diphilus Milvo præposuit, quia friabilis, haud temere salubrem censeas. Ab Hippocrate in puitosis morbis conceditur. Romæ frigus & arantii malis succo irroratus, editur, quidam nec elixum aspernantur.

## ARTICVLVS III.

## De Milvo, Hirundine Plinii, &amp; Lyra.

*TAB. XVII. 11. Aldrovand. de Piscib. l. 2. c. 5.* MILVUS seu *Milvago* Plinii idem est cum *Hirundine* Græcorum Rondeleni Aldrovando, Græcis ἰερεῖ, Oppiano id est Accipiter dicitur, quod Accipitris species inter aves Milvus sit. Pinnis caudaque expanlis Milvum avem omnino refert, latis nimirum & maculosis. Corpore est rotundo, oblongo, maiori ex parte nigro rubescente, aliquando omnino rubro. Sesequipedalem mensuram, vel maxime auctus non excedit. Caput habet osseum, quadratum, durum, asperum, cuius pars posterior duobus iisdemque magnis & robustissimis aculeis, ad caudam spectantibus armatur. Branchiæ quæ rectæ, opercula ossæa in duos aculeos robustos desinentia gerunt. Pinnae stellulis maculisque variis asperguntur: Squamma ossæa, asperæ & triangulares serpentium more inter se committuntur. Cauda unica atque lata pinna terminatur. Quantum ad interiora, Lingua, & palatum splendore Sandaracum vel Cinnabarim superant, his noctu lux, ac si candentes carbonibus ore continerentur. Ventriculus mediocriter multis appendicibus munitus est, hepatis pallido vesicula fellis committitur. Lien est oblongus & subnber. Venter bifidus, ovibus rubentibus refertus. Cor angulatum.

Qui Hirundinis nomine Aldrovando ex Hispania missus erat, sub oculis ex violaceo albicabat, cancellis quæ ad aureum colorem vergabant, exceptis. Alas habebat longissimas & latissimas, ex cæruleo viridescen-

descendentes, maculis plurimis rotundis caeruleis conspersas maiores aureis punctis oculorum qui in Pavonis cauda conspiciuntur similitudine ambiabantur. *Tergum* asperum partim aureo, partim ferrugineo colore tinctum erat.

Quem hic describimus, solo in mari degit, & raro, si Salviano credendum, capitur. Licet edentulus, Carnivorus tamen est. Iuxta littora ubi minor insequetur piscium metus est, humilem exercet volatum: altum, ubi maior. Ad lapidis ictum volatum protulisse, quatuor extra summam aquam cubitis eminens, in Gallico maris interni littore visus est. Qui ad Herculis columnas navigant, tantum aliquando ibi horum piscium volantium turbam affirmant, ut aves aquatiles esse videantur.

A mentis propter carnis ingratitudinem reuocatur. A nautis templis offerri, ibique ob raram formam suspēdi, Gillius author est. Rondeletius fel contra *oculorum suffusiones* efficax esse comperit.

*Oculus suffusiones.*  
TAB.  
XVIII. 5.  
HIRUNDINEM Plinius eum piscem Aldrovandus esse iudicat, qui Romæ Pisce *Rondane*, Agathensibus *Falco marinus*, Massiliensibus *Landola* dicitur. Si alas auferas ad Mugilis Cestrei inprimis accedit figuram, hinc Mugil alatus Rondeletius. Cubiti magnitudinem attingit. *Squamis* conregitur magnis. *Caput* habet rotundiuculum, *rostrum* acutum, *os* parvum, prorsus edentulum. *Pinna* quibus volatum exercet, totum corpus longitudine adæquant. *Cauda* pinna est lata, magna, lunata, & ceu in duas pinnas delinens. *Linea* quæ in cæteris piscibus à branchiis vel à capite per latera ad caudam dicitur, in hoc pisce à pinnis ventris orta per imum venerem ad caudam fertur. *Venter* albicat, *dorsum* quod latiusculum est, ex caeruleo nigricat.

*Describit & aliam* Aldrovandus, sub nomine *Mulli alati* seu *Lyræ* missum, alio rotundis, intus virentibus, extra nigricantibus, pinnis pectoris & cauda fulcis, ventre argenteo. *Lactera*, *branchiarum ossa*, & *Synceput* au-

ro resplendebant. Non omnibus locis capitur, & Romæ rarissimum ajunt. Alga & aliis maris quisquiliis victitat, sed carne abstinet. Mugilibus carne & succo similis esse creditur.

LYRA piscis, qui quibusdam *Cephali*, *Orphna*, *Erythrinus*, imò *adon* falso creditur, vel à cornibus anterioribus, quibus similitudinem lyre repræsentat, vel quod veluti lyre sonum edat, ita vocatur.

*Species eius duas* Rondeletius posuit. Prior lyra piscis est teres, ruber, capite osseo, magno: *rostro* in duo cornua lata protenso, quibus lyre antiquæ formam refert: quem veterum *Lyram* Salvianus esse credit: quique squammis parvis & asperis contegitur, & plus ossium quam carnis habet. *Altera*, quam superioris matrem quidam esse arbitrantur, sed falso, quoniam in huius quoque ventre ova rubentia reperiuntur: palmi est magnitudine. *Corpus* habet quoad vivit rubrum extincto color evanesceit. *Caput* osseum, angulosum, aculeis & eminentiis plurimis asperum, cuius anterior pars in duo longa, lata, & recta cornua degenerat, sub quorum exortu os est satis amplum, rotundum, & edentulum. Ex inferiore maxilla *cirri* quidam breves, molles & carnosii dependent. *Oculi* & branchiarum ossa opercula aculeis muniuntur. Ex duabus in dorso pinnis prior brevior in longas & rubentes setas degenerat, posterior à medio dorso ad caudam, sed inermis decurrit. *Cauda* in unicam pinnam illamque paryam desinit. Tegitur ossearum atque grandium squammatarum, quæ Media sui parte acutissimo, recurvo, atque ad caudam spectante aculeo muniuntur, octonis ordinibus: unde sicuti asper totus ita octangulus creditur. Quantum ad *internas partes*, *ventriculum* habet parvum, cum parvis & paucis appendicibus. *Hepar* pro corporis ratione magnum, album, & in eo sellis vesiculam. *Splenem* parvum & subrubrum. *Carnis* porum, ideo facile exsiccat & sit levissimus.

TAB.  
XXIV. 3.

*Festinus*



Aristot. H.  
A.J. 9. 4. 9.

*Vesitur* matis excrementis. Plures capi non solent. *Vocem* grunnitui similem omittit, seu attritu brachiarum, seu suis anterioribus, quas circa ventrem habent. Spiritus enim inclusus in his est, quem dum attulerunt atque agitant, sonos illos elidunt.

Utraque quia dura est, daminari ferè in cibo solet.

## ARTICVLVS IV.

## De Phagro &amp; Erythrina.

TAB.  
XVII. 13.  
Aldrov. de  
Piscib. L. 2.  
c. 8.

**P**HAGRVS seu Pagrus, ὀφρύς τι φάγας, quia vorax est Græcis; à colore fragorum, rubeo enim est, Italys ita dicitur. Cave cum Paguro confundas.

Tanta est inret ipsum & Erythrinum similitudo, ut, cum eiusdem sunt magnitudinis, etiam peritis imponant. Distinguuntur tamen eo, quod Pagrus *hyeme* à russo ad caeruleum magis vergat, toto corpore sit latiore & retundiore, Sargi instar recurvus, rostro spissiore, rotundiore, & ad aquilini nasi figuram accedente. Habet insuper *tergorii* pinnam crassiorē: *oculorum* pupillam crystallinum, indē rubram, peculiaremque lituram, nigricantem, tactu asperam, in lateribus circa cervicem, ubi linea est, quæ corpora piscium interfecat, latam. *Squammas* gerit rotundas tenues & latas. Superior *maxilla* in rubi modum cervici veluti infarsa est, neque cranio inhaeret. Cum oscirat exeritur, postea contrahitur. *Dentes* quoque habet acutos: quatuor exteriores parum falcantur; molares, qui rotundi & obtusi, duplici ordine disponuntur. *Interiora* si scruteris, sunt ei lapides in cerebro, *lingua* in ore veluti rudimentum, *hepar* sine felle. *Cor* angulatum, vesica aere plena. Numenius *λεπίς* quasi cristatum dixit, quod ea corporis pars, quæ cervici respondet, sublimis sit & alta.

Quem Aldrovandus exhibet, is pinnis omnibus tergo & cauda rubet. *Oculorum* ambitus ruberrimus, argen-

reis lituris conspergitur. A *branchiis* ad caudam linea excurrit, aurea, serrata. *Ambigis* inrer littorales & pelagios, inter hos Mnesitheus locat. *Oppianus* in *saxis* degere scribit. Quod ex Indico mari salrum affert *Oribasius* ptodidit, de illo potius, quæ Syennix in *Aegypto* sacrum habent, eo-que, quod una cum incremente Nilo apparens, incrementum eius denunciet, abstinent, intelligendus est.

*Vistitas* alga & luro, sed & *szpiolas*, squillulas, loliunculos appetit. Echimis an vescatur, quod nimis aculeati sint, dubio. Isidorus tam duros ei dentes tribuit, ut & ostris in mari aliqueat. Hyeme prægelida, quod lapidem in capite habear, latet. Inescatur channis sive hiatulis.

Quid sibi Aristoteles velit, dum *Oppianus* citante Athenæo Pagrum ἀκμαῖον τι καλεῖται, id est *vere vigere* scribit, diffici-  
ter intelligi potest, nisi *τίδω* inquit *πα-  
tere* vere innuatur.

Archestratus Syrio exoriente comedendas esse suadet. Suaves & media carne Heciesius posuit. Gellius inrer delicatos habuit Sanazarius ex Dicaechi, nunc Puteolos vocant littoribus, celebrat.

**E**RYTHRINVM, qui peculiare hoc *TAB.*  
nomen à colore invenit, moderni XVIII. 6.  
Græci *λίθου*, Cyrenæi auctore Zenodoto apud Arhenzum *λίθου*, auctore Clitarcho *λίθου* vocant. Theodorus satis ambigue *Rubellum*, Plinius rectius *Rubellionem* dixit. Idem ne cum Ruburno & Ruscupa, de quibus Murmelius, non disputo.

Palmi mensuram raro excedit. Ruber est ut Mullus, dilutior tamen, unde fortè *εἰς* *Oppianus* dixit, latus ut Aurata. *Rostrium* habet acutum, sed non valdè extensum. *Os* parvum, mediocribus dentibus munitum. *Caput* utrinque compressum. Ante oculos, qui magni, foramina patula. *Branchia* quæ in dorso unica est, multis *aculeis* horescit. Bello nius duodecim, quindecim Rondelerius, viginti duos, Salvianus, novendecim Gessnerus numerat. *Cauda* in lunatam pinnam definit. Inrus candidissimus est.

Peculiaris est mari, hyeme in alto  
I 2 degit,






*Pari gutturalis*


3 dikkhals.

*Aloula non cristata*. meerlerich ohne Kam.



*Hirundo Pluvij.*

4 *Miles orbis*. glatter rotbart.



roder meer brassen.

*Engrinus*



*Acarnus*  
fleck brassen



march brassen  
ein ander rother  
meer brassen

8 *Oryzias*



*Synodus*



*Dodge*  
zandbrassen

*Synagris*. zu brassen  
ander art



*Sparus*  
Sparbrassen



*Scorpius* *Scorpius minor*  
*Scombra* *Scombra*  
meer scorp





*Ariftoth. in  
Vejju.* oppofuit, & Ariftophanes inter re-  
gios pifces retulit. Arhenxus *ἰχθυόωντες*,  
*παλιχόωντες*, *παλιχόωντες*, *παλιχόωντες*,  
& *ἰχθυόωντες* facit, quæ fequuntur trans-  
pofita effe, ut Rondeletius obser-  
vavit, videntur, qui enim potest a-  
liquid effe *παλιχόωντες* & *ἰχθυόωντες*, gluti-  
nofum, & concoctu facile. Philo-  
fophus tamen inter duræ carnis pi-  
fces reposuit.

*Galen. de  
Alim. l. 3.  
c. 30.*

## ARTICVLVS VI.

De Synodonte fvee Den-  
tice.

**TAB.**  
**XVIII.**  
**9.** **S**ynodon pifcis *σύνδοντος* no-  
men invenit, quod fi prima fyl-  
laba per iota fcribarur, *σύνδοντος*  
*σύνδοντος* *σύνδοντος*, quod dentibus  
noceat, ira vocatur. Gaza *Denticem*,  
Albertus *Dentatum*, alii *Dentalem*  
nominavere. Plinius Græcam no-  
menclaturam retinuit. In Adria-  
tico mari in infignem magnitudi-  
nem excrefcit; in littore Auratam  
non fuperat. Vulgatum pondus  
trium aut quatuor librarum effe fol-  
let: decem librarum pondere ob-  
fervavit Salvianus. *Dorsum* habet  
repandum; *latera* fatis compreffa.  
*Caput* nonnihil fiftigiatum, in quo  
*l. 37. c. 10.* lapides, qui *Synodontides* vocantur,  
gerit; *rostrum* acutum, *Os* fatis am-  
plum, valdeque denticulatum, præ-  
ter minores ac ferratos, fuperior  
*maxille* quinus aliis, inferior octo-  
nis permagnis, caninis fimillimis ar-  
mat. *Oculi* funt magni, bran-  
chiæ utrinque quaternæ. In *dorso*  
*pinnæ* unica viginti aculeis muni-  
tur. *Cauda* eft falcata. *Venter* at-  
genteus, unde album Numenius  
vocavit: *latera* & *dorsum* ex al-  
bo rubent. Unde ruber Ovidio *ἰχθυόωντες*. Epicharmo:

Aldrovandus duos alios fortè con-  
generes huic addit: quorum prior  
*tergus* viride, *Syncepus* aureum,  
*branchiarum* offa violacea. *Alteri*  
*os* intus & extra fubatum, fupra  
id macula czrulea: fub branchia-

rum pinnis macula infignis, pur-  
puraceis, aureis decorata squam-  
mis. *Venter* flavus, *squamina* ar-  
gentæ.

Pelagium quidem Columella fa-  
cit cum Ovidio, fed Ariftoteli &  
Oppiano, quibus littoralis eft, fuf-  
fragantur pifcatores. Probantur ex  
Dalmacia & Illyrico, præfertim  
Salana atque Tragurio. Colu-  
mella Punicas & indigenas nomi-  
nat.

*Columella*  
*L. 8. c. 16.*  
*Ariftot. l. 10.*  
*A. l. 8. c. 13.*  
*Oppian.*  
*Habent. l. 1.*  
*v. 170.*  
*Aristot. l. 10.*  
*A. l. 8. c. 16.*

Carne tandem vefcitur, & tanta  
aviditate, ut venter in os pro-  
cidat. Polypi carne in primis dele-  
ctatur, quem cubili fuo extrudere  
non poffit, ante oftium tanquam  
mortuus fluctuat, brachium exten-  
dentem, arripit, fed & in oftrea ac  
pifces innoxios graffatur: nec Bo-  
ce, quod ab Oppiano proditum,  
parcit. Gregales funt, & *συνελόντες*  
*ἰχθυόωντες* folent: per adolefcen-  
tes *κατ' ἡλικίαν* *ἰχθυόωντες* a re-  
liquis natant. *ἑταιρίαν* *πλοῦς* *κατὰ*  
femiatiori ætate inter fe vitæ com-  
munitate junguntur. Cibo à pi-  
fcatore demiffio, in orbem confi-  
fcente, & fignum quafi eo arripiatur,  
dant.

*Oppian.*  
*Habent. l. 1.*  
*v. 189.*

Ab Antiphone inter lautiffima  
obfonia recenfentur. Hicetius eo-  
piofi effe alimenti, & difficulter ex-  
cerni fcribit. In Italia peculiare  
condimentum quod amarinare vo-  
cant. In Dalmatia concifus & fe-  
micoctus multo croco & perfpicuo  
gelu conditur, deteftatum Aponenfi  
obfonium.

*Ellen. H. 1.*  
*l. 1. c. 46.*

## ARTICVLVS VII.

De Synagride & Chro-  
mi.

**D**E SYNAGRIDE pifce diverfa **TAB.**  
funt apud Authores opiniones. XVIII.  
Theodorus Gaza pro eodem cum 10.  
Synodonte fumat. Maffarius & Gel. **TAB.**  
lius adeò fimiles, ut vix difcerni que-  
ant, volunt. Rondeletius fola æta-  
te diftingui judicat. Diverfos pifces *Pygish. l. 2.*  
vel *c. 13.*

vel ex Aristotele colligas, qui diversis in locis, duobus his nominibus utitur. De Bellonio tacebo, qui & modernos Græcos distinguere scribit. Antonius Gigas sequentem iconem pro Synagride misit.

Piscis erat insigniter dentatus, squammis undique latissimis, & facile deciduis tectus. *Capite* superius sanguineo, inferius ex albo & cæruleo variante. *Ventre* ex albo flavescente, lateribus candicantibus. Bellonius Synagride[m] Cyprini in modum, veluti citcino ita circumductum, ut pro longitudine ac latitudine magis crassus appareat, facit. Caput, inquit, utrinque compressum habet &c.

TAB. XVII. CHROMIS & Cremis æque idem esse piscis, vel propter nominum similitudinem esse videtur. A grun-  
14. nitu, quem edit ita dictus est, quod & apud Isidorum qui eundem cum corvo marino facit, legimus; sed is, ne, quem Rondeletius describit, pin-  
nis, spinis & figura Metaurino simili, oculis tamen minoribus absque macula in cauda, toto corpore nigricante, an is, quem Bellonius, Chromis sit, dubitatur. Accedit tamen huic Aldrovandus, sola grunntus ratione habita. Tenuibus aurem is squammis vestitur ex auro nitentibus, ac cæruleum interdum colorem concinne vibrantibus. Binas (verba sunt Bellonii) *pinna* gerit in tergo, quarum anterior quæ minor est &c.

In herbosis degere Ovidius auctor est, quia immundum nominat, & luto gaudere credibile est. Virentibus herbis vescitur. Parit quorannis semel. Exquisito esse auditu apud

Aristot. H. Aristotelem legimus. Grunntus superius dictum est.

Vilem suam Chromin Rondeletius facit. Bellonii inter laudatissimos cenietur.

83

## ARTICVLVS VIII.

### De Aurata.

Aurata, seu Orata, Græce *ἄρα*. TAB. XIX. 2.  
quod is in locis, ubi in cæ-  
teris animantibus supercilia esse solent, aureo colore resplendeat, Ephelis teste Archeftato *Ιουίων*. Helychio *ἰναι* dicitur. Ad denas libras cum maximè adolevit, vix unquam pervenit. *Dorsum* habet repandiusculum, ex cæruleo nigrescens. *Latera* compressa, argentea. *Ventrem* lactei coloris. Partes *oculis* superiores auto, in adulto maximè, resplendent. *Dentes* anteriores sunt longi, rotundiusculi, serrati, inter utriusque maxillæ partes, plurimis offeis tuberculis duris & inæqualibus muniuntur. *Ventriculum* habet amplum cum paucis, ut Aristoteles notavit, appendicibus. *Intestina* ampla pinguedine involuta. *Secur* magnum & pallidum, à quo *scellum* vesicula, longa, pinguedine obducta pendet. *Splenem* subatrum.

Sic est marinus piscis, ut & in la-  
cubus etiam marinis nascatur, quod  
tales convectis marinis seminibus.  
Romani replebant. Commachium *Αθην.* Di-  
Bonnonienibus eas subministrat, & *Ποσφ. l. 1.*  
olim Velimus, Sabatinus, Vultinen-  
sis, & Ciminus eas procreabat. Sed  
circa Berenicem Libyæ fluvium, qui  
hæc dicitur, inveniuntur.

*Cibus* ipsi sola caro. Tellinas & concbylia robustis maxillis frangere; Menide tanquam eius esu vehementer oblectetur capi, certum ferè est Scari modo *ruminare* asserit, sed fortè sine auctore, Rondeletius.

Æstate circa fluviorum ostia  
parit. Æstus impatientia, me-  
dus fervoribus, sexagenis diebus  
latere à Plinio proditum est: tem-  
pus Aristoteles non expressit. Ti-  
midissimos esse captura ostendit.  
Recedente maximè sub Arcturi  
tempus mari, arborum ramos fron-  
dibus vestitos, in arenam piscatores  
disigunt: accedente plurimè attra-  
hun-

Aristot. H.  
A. l. 3. c. 27.

Aristot. H.  
A. l. 8. c. 2.

Plin. H. N.  
l. 9. c. 16.

Aristot. H.  
A. l. 8. c. 19.

Ælian. H.  
A. l. 13. c. 28

huntur, reciprocante tamotum tu, quiescunt, & ab impetissimis quoque capiuntur.

Macrobi. In precio fuerit olim, Ephesiz imprimis, quas Archestatus celebravit. Sergium Romanum patritum, cognomentum inde sibi adscivisse, quod carissimæ ipsi essent Oratæ, apud Varronem Columellam, Valerium Maximum, & Macrobius legimus. De nutrimenti qualitate non convenit inter veteres. Mnesithæus difficulter coquit, concoctam multum alere. Celsus durior esse. Diphilus cum Melanuro, qui succi bonitate Sargo, Hicelso iudice, minus nutrienti, inferior est, proportionem habere, assentit. Ideo Rondeletius carne media esse pronuntiavit, laxatilius durior. Nostra ætate marinæ & quæ hyeme capiuntur, laudantur. Lacultres pinguiiores quidem, sed lutum, quod in eo degant, olent. Apparatum in Aldrovando vide.

## ARTICVLVS IX.

## De Sargo.

TAB. XIX. *Σαργὸς* an *αἰγὸς* dicendus sit piscis, dubitatur. Isquem Melanuro Hicelso accommodat, vnde *πυλιν* catur *αἰγὸς*. Rondeletius geminum nomen agnoscit, à multa carne id habere iudicans. Sparo squammis tenuibus, lato corpore, lineâ à branchiis arcuata, pinna continua asinum Bellonius pronuntiavit. *Rostro* acutiore, *dorso* magis repando, *ventre* prominentiore, *dentibus* latis humanisque similibus, lineis quibusdam, unde *αἰγὸς* & *μακρύσαρξ*, & *ὑπερπύρινος* Aristoteli dicitur, distinguitur. Colore aliàs est argenteo. *Pinna* quæ ad branchias sunt rubescunt. *Branchiarum* exterius tegumentum spineum est. Hepar subrubescit: ab hoc *fellū* vesicula pendet. *Lien* subniger est, & ferè circumnatus. Ad multam magnitudinem exerecere solet.

Aldrovandus binos exhibet. *Πύρινος*

*ὑπερπύρινος*, pinnas omnes, præter cam quæ ab ano est, habet aureas: maculam juxta Utopygiū violaceam, totum caput ad eundem colorem vergens.

*Alter* *μακρύσαρξ*, aut eis & argenteis quæ ferræ figuram exprimit lineis, elegantissimè condecoratur, pleræque ad rubiginem vergunt. Gesnetus in mortuis lineas evanescere tradit. *Ægyptio* cum mari vendicat Festus, sed & in Adriatico nascitur. Pelagius nescit an, laxatilis vel littoralis inter Ovidium, *Ælianum*, *Oppianum*, & *Aristotelem* non convenit. Ita littore gaudere dicerem, ut & cautes sæpè frequenter, quod radiis solatibus ibidem commodius fruatur. Sæpè quidem *cano* à Mullo excitato contentus est, sed & carnivorum esse certum, quia *Lycostomo* pisce inescatur. *Gregalem* *Ælianus* facere videtur: dum confertos capi scribit. Ad motum ut ut bene *ῥυθμὶ*

*Oppiano* dicatur, in evitandis tamen piscatoriis insidiis *μακρύσαρξ* est, seu quòd lineam ad scopulos terat, quod apud Plinium legimus: seu quod vel retibus proximus spei piscatorum illudat, *αἰγὸς* sanè & pro voti, & pro lineâ cui hamus affixus est, sumitur. Plures sibi adsciscunt uxores, pro his tempore vetno pugnant. Vere & autumnno parere, apud Aristotelem legimus, si quid aliter ab eodem dicitur, de Sargino non Sargo sumendum est. Tam vehementer capras amare *Ælianus* prodidit, ut ad illarum in aqua umbram, odore fortè illecti, adnarent, & saltu contingere conentur. Ne itaque mirete pellibus earum capi.

Fit eorum ab Epicharmo in nuptiis Hebes mentio. Et sanè grati esse stomacho creduntur, probique succi. Cæterum ægriusculè, quia durius carnis, concoquantur. *Hydropicis* *Garyopontus* præscribit. Dentes gestatos dentium avertere dolores. *Kitanides* fabulatus est.

Adiungit Aldrovandus Sargo *πύρινον*, quem pro *Melanerino*, *Athenæo* nomi-

*Ælian. H. A. l. 1. c. 23. Aristot. H. A. l. 8. c. 17.*

*Oppian. Habent. L. 1. v. 132. L. 4. v. 267. Plin. H. N. L. 9. c. 52.*

*Aristot. H. A. l. 5. c. 9. Ælian. H. A. l. 11. c. 15.*

nominato, si exemplat mendosum non est, (Causabonus Melanderini nomen ab aliis exemplaribus exulare scribit.) Rondeletius depinxit. Melanuro iste similis est. Toto corpore nigrescit, circa caput ex nigro purpurascit. Cauda laxatilius more in unam latam pinnam desinit. Hepar habet ex rubro candidum. Splenem nigrum, felaqueum, lapides in capite.

## ARTICVLVS X.

## De Sparo.

TAB.  
XVIII.  
17.

Quem Graeci *σπάρη* sive *σπάρη*, quod est palpitare, ut Eusthatus author est, Latini Sparum, seu à spargendo, seu aliunde vocant: hunc eundem cum *Rhyade* Aristotelis, & *Æliani Aspargo*, sed perperam, Rondeletius facit. Nec enim vel *σπάρη* speciale alicuius piscis nomen est, quod Salvianus opinatur; nec videtur isto vocabulo in linguari uti. *σπάρη* verò, quos Aristoteles, fugere quoties vel piscium lotura vel navis sentina electa est, quali fœdo tactos odore scribit, & quos Gaza modo *stutas*, modo *Spargos*, aliquando *fusaneos*, id est, *σπάρη*, quod fusum retibus capiuntur, vocat: ii sunt, qui frequentes quidem & simul natant, fusumque & retibus capiuntur; ducem tamen, quod *σπάρη* proprium, non habent.

*Ælian. H. A. l. 9. c. 46.* De Aspargo nihil apud Ælianum invenies. Gyllius duntaxat *Rhyades Aspargos* interpretatus est, & multis etrandi occasionem præbuit. Haud parvam cum Aurata & Sargo habet similitudinem. Ab illa, corpore minore & magis rotundo, rostro acutiore, & quod circa branchias nullam neque purpuream, neque nigram maculam gerat, distinguitur. Ab hoc verò, quod ex auro refulgeat, lientram in cauda habeat, capite sit magis protenso, tres aculeos sub spina quos est ano vicina ostendet, lienem rubrum, gracilem, oblongum, rectum, in dextro latere habeat, differt.

*Littoralem* Oppianus facit, Plinius inter marinos recensuit. Ovidius pelagium voluit, sed & marinis stagnis gaudet, inque iis frequenter capitur. Gregalis est, *carnivorus*, venatur & marinos pulices. Æstate circa saxosa littora parit. Haud olim ignobilis in cibo. Coquus apud Antipsum inter lautissimos recenset. Epicharmus inter eos ponit, quorum ne stercora quidem fas sit Diis abjicere. Diphilus acrem efflo *σπάρη* pronunciat, elixum coctum facilem, *σπάρη* difficilem addit. Rarò ob parvitatem elixatur.

## ARTICVLVS XI.

## De Mormyro &amp; Cantharo.

DE Mormyro, qui Oppiano *μορμύρο*, Ovidio *Mormyr*, Gazæ *Mormur*, pauca prodidere veteres. Quem Bellonius describit, Constantinopoli & alibi, nomine veluti per manus tradito, Motmyrus dicitur, videturque notas ab antiquis traditas. (*σπάρη* seu maculosum Oppianus, *πύλιν* Ovidius nominat) libi vendicare. Piscis est corpore quam Aurata, Sparus, Sargus, & Melanurus longiore, & minus ad latera compresso. Capite item (ut or verbis Aldrovandi) tenuiore & ex lato, rostroque acutiore. Os medio cre habet, dentes exiguos, labia crassa, oculosque medios, brachias utrinque quaternas &c.

*Littoralem* esse, præter Arcestrati apud Athenzum & Oppiani auctoritatem, Cottidiana piscatorum experientia testatur. Nullum non *σπάρη* attingit, parva animalcula, conchulas, & minuta crustacea venatus nec à terrestribus fordidus abstinet. Parit æstate, capitur utriusque, & plagulis, ut Plutarchus ait. Retibus inclusus, imis in vadis, fulco, crebro caudæ motu idepulsus arenis factus, subterlabitur. *σπάρη* facit, quia lutum olet, villis nostro corpore habetur.

CAN-



TAB.  
XIX.

**CANTHARUS** Græcis antiquis *καθαρός*, & genere fœminino *καθαρά*, modernis *cantharus*, Gaze *Scarabæus*, Plinio & Ouidio *Cantharus*, forte à coloris hæticæ & ferruginei similitudine, dicitur. Squammis integritur parvis, ex indico splendentibus. Caput & circa oculos partes ex nigro rubescunt. Labrum superius veluti in calva infarcitur. A branchiis ad caudam lineæ ducuntur subaureæ. Bellonius lineam armatam utrinque in lateribus, cyaneam esse tradit. Observati sunt lineis albicantibus, cyaneis, ex luteo nigricantibus, rectis quidem, sed non ita conspicuis variegati. Internis partibus non differt à Sparo, & lapides habet in cerebro. Versatur in ærenis littoribus ac prætus, in quæ loca maris fordes fluctibus pelluntur. *Pamphagus* esse creditur. Nam carnes, panis, caseus, aqua & stercus in cibum ipsi cedunt. Turgent amore fœminarum, & quia Zelotypi acerrime pro suis conjugibus pugnant, sed non aliter, quam Meneleus cum Paride, prout tantum, quod ab Oppiano & Eliano proditum est. Inescantur Polypo, aut Carabo in nasellam vimineam indiro. Ingratum fœco Ovidius dixit. Mollis & præhumida carnis fecit Rondeletius.

## ARTICVLVS XII.

*De Salpa & Stromatheo.*TAB.  
XIX.  
76.

**SALPA** Græcis *σαλπη* & *σαλπις*, Helyschio & Phavorino quoque *βῆλος* vocatur, quod nomen ipsi ab Halisorum (maritimi sunt populi Catæ vicini) piscatoribus inditum est, si bene Pancratis versus apud Athenarum, correxit Gesnerus. Posset & *Chrysopleuros* ab aureo, quo per latera Salpa resplendet colore, dici. A ceruice in caudam per argentea latera, aureis rubentibusque lineis, certis intervallis distinctis, decentissimè pingitur: Unde Aristoteli apud Athenarum *πυλίσσας*, *πυλίσσας* & *πυλίσσας*, Oppiano *αὐχέντι*, hoc est, ut Lippius reddit, variis distincta tergoralignis, dicuntur. Caput habet paruum & rotundum, dentes in superiore

maxilla fœdecim, in inferiore octodecim feratiles firmos. Oculos aureos supercilia quodammodo virescentes, pinnam in tergo unicam longam, multis spinis asperam. Caudam bifurcam, linguam mediocrem. Squammis tegitur latis & varii coloris. Ventre & lateribus candicat, dorso ex cinereo nigricat. Interanea nigerrimo pectoris continetur. *Heper* est magnum, subrubrum, in tres lobos divisum, cui fœllis velica appendet. Splen nigricat. Vulva hîda est, ovium innumeris plena. Bellonius raro duas libras excedere scribit. In nullo piscium genere exactiorem servari magnitudinem Salvanus, ideo forte à Pancrate *λεπιδωτός* æquales magnitudine longitudineve, quamvis Dalechampsius facta ad pisces, quos nominaverat comparatione, id fieri credit. *Duo ipsorum* videntur genera, *communium* & omnibus notum quod descriptum. *Minus alterum* quod in Narbonensi Gallia *Virgastelle*, id est virgis seu lineis distinctum nominatur, quodque in stagnis marinis reperiri, & non nisi ætate à communi differre ex Rondeletio habemus. *Longum* si attendamus, herbosa laxantur atena apud Ovidium. Oppianus *πύλας αὐχέντι* *φύλας* *πυλίσσας*, *σπόλους* Oppian. *maricinctos*, *musco humidis*, illis adscribit. Arist. in mari & stagnis marinis locat. *Cibus* ipsi alga marina, porrum, ut apud Philosophum extat, stercus & alia fœtida. Unde *κατὰ φύσιν*, & *βδελύσσεται*. *Merdivoram*, & fœtidam in nuptiis cibus. Hebes Epicharmus, obscurum piscem Plinius nominat. Semel anno & quidem autumno paulo ante æquinoctium *paris*, quibusdam in locis & ætate, si Aristoteli habenda fides est. Tutum ab imo guttate ad littora ferri, moxque alga, aliisque marinis herbis pastos, celerrimè in mare demergi, tradit Bellonius, raro unâ, plerumque plures simul capi Salvanus. Curbita capitur, quod ea delectetur nimium, idque uni ex omnibus evenite Aristoteles docuit. *Auditis* H. A. L. S. valere apud eundem legimus. Nul- lum ferè inter *cibus* habet pretium. Arehestrato semper mala, Diphilodura & insuavis est. Platinæ syl-

K vesire

vestre quid & fetinum respicit: circa Ebusam tamen capta haud spernitur. Alexandrina pariter maxime si in Autumno nata fuerit, humidum quid & album, idque non virosum emittit, ut Diphilus refert, sed & circa Mytilenem tempore messis capta haud ingrata est. Omnium tamen dura caro est, ut Plinius percoqui posseneget, nisi ferula prius verberetur.

Plin. H. N.  
L. 9. c. 19.

TAB. XVI. 7. Hue STROMATEUS pertinet, piscis in rubro mari teste Athenaeo nascens, Salpæ similis, & universo corpore, aureis lineis productis distinctus, unde nomen invenit. Rondeletius pro eo subsequenter piscem pinxit, sed non descripsit.

## ARTICULVS XIII.

## De Fiatola Roma dicta.

TAB.  
XIX.

8. Piscem qui Fiatola Romæ dicitur, quidam veretum Callionymum, alii *Ellapen*, nonnulli *Lycen*, Bellonius *nathidus* esse opinatur. Aurei est & argentei coloris, multisque lituris variegatur. Latus item est ac planus, ut Bellonius scribit, rotundum ferè & compressum, Seferino non valde ab similem, Rondeletius facit. Linguam habet carnosam Delphini modo, ad humanam accedentem, suisque partibus omnino absoluta, quod inter ceteros branchiis præditos solus habere videtur. Vendicat & hoc sibi peculiare, quod pinnis sub ventre careat, sique omnino inermis. Gerit quoque branchias utrinque quatuor superiorem maxillam immobilem, Caudam lunatam, lineam à capite sub ventre ad umbilicum extensam, atque utrinque in cervice maculam nigram, Squammis in eo duntaxat lineæ ductu, qui piscis latera distinguunt. Hepar ipsi unus lobi nullo felle præditum. Stomachus in litteram V. efformatus, cuius infima pars, in mucronem terminatur, & ad pylorum tam numerosas appendices, ut nulla arce numerari possint, habet. Intestina fuleit glandulosum pancreas. Lien stomacho subest. Bene in hunc pi-





cem *nathidus* Bellonius vocet, non disputo, hoc tantum addo, Cetaceis hunc ab Oppiano annumerari, denres serratos habere & gregatim degere, quod sonè Fiatolæ non competit. Adicio tamen Bellonij in iconè Callychti, quem Gesnerus pro Hepare primo habebat. Quod si liquum est, frequens est Romæ Fiatola, albiturus & incognitus. Rondeletius suis littoribus nunquam visum asserit. Fertur ex pulmone marino nasci, & optimi saporis esse.

## ARTICULVS XIV.

## De Scorpis &amp; Scorpide.

Scorpius piscis, qui Plinio aliquando *Scorpio*, ab insecto nomen transiit, non quod vel corporis figura id, vel colore æmuletur, sed quod, ut aculeo Scorpius terrestris, quem habet in cauda, ita hic spinis quibus in tergore & capite armatus est, venenum vulnerando infigit. Putatur à Scorpide sexu duntaxat differre, ut hic sit femina, ille mas: sed videntur specie distingui, & Scorpius cum Scorpide pro uno pisce habebuntur. Tribus quandoque datur; in maritubro ad duorum & trium cubitorum magnitudinem excrefcere, *Alia* *Alia*. nus: ad tantum & apud Ineos Tzetzes scribit. Corpus habet rotundum, anteriore parte crassissimum, posteriore tenius. Squammas tam exiles & tenues, ut nisi advertas, iis carete videatur. Solo ventre albicat, cætera tubet, unde Plinio rufus, Numenio *Scorpius*, Hicetio *Scorpius*, Diphilo *Scorpius* nominatur, quia nigra quasdam propocius notas habet, bene Epicharmus *Scorpius* dixit. Caput ipsi magnum, angulosum, durum, ossum, plurimis acutissimis aculeis munitum. Os magnum, dentes confusos, densos, in inferiore maxilla triangulares, superciliorum loco aculeus acutissimus Cuculi instar, cum appendice cutacea molli, branchiarum utrinque quaternæ, osseo aculeatoque experimento contrita: juxta eas binæ latæ pinnæ, totidemque ex harum regione in ventre sed minores, in dor-

so uni,





fo unica à cervice ad candam usque  
excurrens, anteriore sui patre undecim  
vel duodecim firmis aculeis horrida,  
cætera obtusa & innoxia. Cauda  
unica ac lara pinna constat. Duo  
ipsius genera posuere veteres, *scorpioides*

Athen.  
Dipnosc.  
L. 7.

Athen.  
H. A. L. 8.

Aristot.

H. A. L. 5.

c. 9.

Plin. H. A.

L. 9. c. 51.

Oppian.

Nalæur.

L. 7. 390.

Dioscor.

L. 6. c. 61.

## SCORPIDEM &amp; SCORPÆNAM

pro eodem pisce Aldrovandus sumit. Specie à Scorpio, ut supra dictum, quod colore & succo differant, ut Athenæus ait, distinguit. *Scorpidium* Pfellus vocare videtur. Cinericia est Bellonio, & multo Scorpio minor, de cætero (tam etiam vivax, ut exenterato & corde carens moveri non desinat) Scorpio in omnibus ferè similis. *Vesitum* algæ & sordibus marinis. Castitatem immaculatam generi suo servat, itaque habet pudicitiam sui generis, sed venenum sui generis non habet. Non enim percutit Scorpiæna sed reficit. Apud Athenæum Scorpio in cibo posthabetur.

12.

Ambros.  
Hexam.  
L. 5. c. 2.

## ARTICVLVS XV.

## De Blenno &amp; Pectine Ro-

manorum.

Blennus Oppiano *βλέννης* contra Bæ à *βλέννη*, Athenæo fortè *βλέννης*, quod præ corporis crassitie brevis (*βραχὺς* idem quod minutus) Sophroni *κατὰ* potius qui idem cum Gobio, quam *κατὰ* specie similis, dicitur. Coreyrensis & Zacynthii *Cepolæ* à Cepæ similitudine propter turgidū ventrē appellant, exinde *Bulbum* Plin. esse Bellonius conuicit. Rarò Gobium magnitudine superat. Colore est vario. Licet totus ferè liveat, plerisque tamen locis rubet, quibuldam etiam flavescit. Squammis paucis, tenuibus, & tam facile deciduis tegitur, ut tum ad hoc, tum quod ob plurimum mucum, quo oblinitur, adeò lubricus sit, ut vix manibus adstringatur. Caput habet magnum, oculos eminentes, nigros.

TAB.

XIX.

II.

TAB.

XXXI.

3.

*Labrum* superius capiti ceu tubum quandam inhxum. Dentes serratos, sed adeò exiguos, ut os asperum potius, quàm denticulatum appareat. *Lingua* albam conspicuam. In latiore pinnae tergoris parte, macula nigra, albicante circumdata circulo, parvi argentei numismatis magnitudine, oculorum in cauda pavonis figura conspicitur. Reliqua in icone

K 2 visum.

Plin. H. N.  
L. 3. c. 9.  
Hippocrat.  
de morb.  
mulier. 1.

capite è stranguriolis utiliter bibitur.

Oppian.  
Halicut.  
l. 1. v. 109.

visuntur. In algoso littorē versatur. Romæ rarus, in Græcia frequentior. Non longè à loco, quo degit evagati solet. *Fesit* apnis, Iquillis, similibusque pisciculis, horum inopia ipsas depopulatur herbas. Gulosus est sed & stultus Plauto, nisi Blennium ibi melius pro mucoso & pædido sumferis. Carnis est mollis glutinosæ & excrementi. Cinis cum ruta vesicæ vitia & calculos sanat.

TAB. XXVII. Quem *Pectinam* Romæ vocant, hunc *Novaculam* Plinii Rondeletius esse suspicatur, quâ tacta ferrum olent, quod dorso sit cultellato; Gesnerus *Pavonis* nomine sibi transmissum Româ scribit. Piscis est latus, & Fabri instar compressus. Tegit magnis squammis, & variis pingitur coloribus. Caput maxillæ & branchiarum opercula plurimis cæruleis lineis insigniuntur; Synciput eoloris est puniceo saturati, larera albicant. Imis ventris & caudæ pinnæ sublavæ & virentibus lineis inter se cancellatim commissis decenter admodum depicta sunt. Pinna dorsi rubra nonnullis cæruleis conspergitur maculis, dorsum ipsum est puniceum, cætera ex albo flavescit. Palmi mensurâ excedere nō solet. Capite est magno, valdè compresso, & prorsus omni rostro carente. Linea nāq; anteriorē capitis totiusque corporis partem terminans, longa sit & recta, atque fere ad perpendiculum, è summo capitis vertice ad inferiorem usque maxillam defertur; in cuius inferioris atque fere perpendicularis partis loco inferiore, os positum est parvum, dentibus acutissimis, recurvis, exiguis munitum. Branchias utrinque habet quaternas. Ventriculum modicrem, *Intestina* valdè pingua, multis gyris circumacta; hepar pallidum, cui vesicula fellis annectitur. In saxosis & arenosis littoribus degit. Rarus in Italia, in Rhodo, Siculo, & Hispano mari frequentior. Solus vagatur, & quia parvo esse ore, loliginculis, lepiolis, & Apuis duntaxat vescitur. *Carnes* autem esse tenra, friabili, boni succi, & concoctu facili. Nullis ferè aliis spinis quam his, quæ dorsi

spinam constituunt, interciditur, planorum mote.

## ARTICULVS XVI.

*De Aphyis seu Apuis in genere.*

**A** Pua, sive pro parvo piscitio, sive pro peculiari aliqua specie tantum accipitur, *ἀφύς* potius quam *ἀφύς*, ut Suidas & Aristophanis (scholia) pronunciant, dicitur, Atticos XIX. in plurali, in singulari rarissimè protulisse; quod cumulatim edi soleant, Eustathius author est; nec aliam ob causam *ἀφύς* vocavit Aristophanes. An vel *ἀφύς* à *ἀφύς* quasi non nata, quod Rondeletio & Aldrovando placet; vel quasi *ἀφύς*, bis nata, quod malignè & nimis pusillo corpore nascantur, vel *ἀφύς*, quod ex pluvia generentur, quod Plinius videtur velle, unde Gaza *Αφύας* Latine reddidit; vel quasi *ἀφύς*, id est spuma, ex qua ab imbre excitato oriuntur, dicantur; non disputo; nec an *ἀφύς* cum Apuis quas *Cobites* veteres nominant, specie iidem sint, inquirō: hoc certum *ἀφύς* à pinguedine Varino; *ἀφύς* *ἀφύς*, quod cum semper sint exigui, semper sætus recens esse existimari possint, ab Athenæo dici: nec fortè à vero aberrant, qui *ἀφύς* Oppiano vocari, credidit. *Plura ipsarum* à veteribus recensentur genera, quorum ferè nomina sunt, *Αφύς vera*, *Αφύς Gobitis*, *Ενγραύς*, seu *Ενγραφύς*, *Αφύς Phalerica*, *Αφύς Νιγίλιν*, *Μορίδιν*, *Μυλλόν*, item *Ηεπείριν*, *Αθηριν*, & *Μεμβρα*. Commune omnibus, candido colore esse. Caput majusculum & oculos elatos & nigros habere. Archippus apud Athenæum *ἀφύς* vocat; veteres, quosdam ex semine, alios sponte nasci prodiderunt. In scopulis, quorum sinus multiplices unda excavit, ad littora versantur, tamque densis natant agminibus, ut tam *ἀφύς* Hal. l. 1. v. 190. *ἀφύς* *ἀφύς* cæruleum mare album reddi videatur, ita aliquando se implicant, ut earū compactarum oc- Hal. l. 4. v. cursio, 470.

curfu, vel navis retardetur, ut de aliis quæ Oppianus ponit taceam. Quantum ad *Generationem*, fontē sine coitu ex imbribus spumefcente mari nasci; alias elimo putrescente scilicet & ipso, vel quicquid in fundo collectum est oriri, prodidit Oppianus. Nec aliter Aristoteles, illud si excipias, quod quandam ē piscibus oriri addit. Nam apud eum quod apud spumam vocant, prodire legimus. Argumentum ortus, quod frigidis temporibus non capiuntur, & trahis sculpta humo, sæpenumero & copiosiores & præstantiores sint prædæ. Oriuntur autem opacis tepidique locis, *στρωματικῶν ὑποπύλων ἀνὰ τὴν ἰσθμὸν* : γὰρ, cum calis elementa terra concalefit, veluti in Atheniensis agri Salamine, ad Themistocleum, & in Marathonē. Ejusmodi omnes sunt, ut neque gradescant, neque generent, neque diu durare queant, priore turbā abolitā altera succreſcit. In nullo apud Athenienses patinarum honore erant, si Chryſippo apud Athenzum credimus, fortē ob copiam. Arceſtratus *μυθῶν* seu olei mīſtar aſpernabatur. In mediterraneis expetebantur, inde pinguium Athenis nomen. Nicomedes eorum deſiderio flagrans, cum haberi non poſſent, figuris ex rapis forminis ad earundem ſpeciem ab Apitio diſſectis, ex oleo coctis, & ſale atque papavere conditis, ventrem explevit, referente Suida. Apparatum apud Aldrovandum vide. De extero humidum & flatulentum alimentum præbent. Diphilus gravis & difficilis coctionis eſſe putabat.

## ARTICULUS XVII.

*De Apuis in ſpecie, & in primis Vera, Phalerica, Membrade, Cobite, & Hepseto.*

Genera Apuarum præterito recensuimus articulo.

Prima eſt *APUA VERA*, cui, quæ generatim de Apuis dicta ſunt in primis conveniunt, quam Græci propriè *ἀπείρι*, Athenæus *ἀπείρη*, aliqui *ἀπείρι* à ſpuma nuncupant. Suidæ *ἀπείρι* à *ἀπρυγνός*, quaſi nullis orta parentibus dicitur. Piſciculus eſt vix auricularis digiti longitudinem adæquans, oculis nigricantibus. Duo eius genera. *Album* in Hollandia frequentius; & rubicundum, *Aphyia Trighis* Bellonio.

Alterā eſt *APHYA PHALERICA*, vel ab Atticæ portu qui Phalereus appellabatur; vel *ἀπὸ τῶν φαληρέων* (alba hæc eſt & ſpumæ Græcis) ita dicta. Sardinis eſt ſimilis, minor, tenuior. Squammas in mari habet, ſed ſtatim excidunt remanentibus earum veſtigiiſ, & iis quæ ventrem firmant. Adeo eſt mollis & pinguis, ut ſi aliquando digitis tractetur, liqueſcat aut ſi magna copia in navicula vehatur, ſupernatans oleum piſcatores colligant. Vidit Rondeletius unius diei capturam, quinquaginta coronatis aureis venditam. Erat apud veteres in præcioſi Polluci credendum.

Tertiā eſt *MEMBRAS*. Haſ Phrynichus apud Athenzum *βιόγιδας*, Epicharmus & Sophron *βιόγιδας*, Attici *μυρβιδας*, Trallianus *μυρβιδας* appellāſſe videtur. Ariſtoteles ex *Aphyia Phalerica* naſci author eſt; & inter *μυρβιδας* piſces, id eſt haud migræſolidos recenset. Cum verò Phrynichus *χρυσόφιδας* cognominet, ac Ariſtophanes *παλιγγυρίδας* id eſt, cano corpore, Rondeletius eos piſciculos eſſe conjicit, qui Galli *Celerius* vocantur. Sunt corpore admodum candido, capite auri colorem æmulante, Sardinis valdè ſimiles. Coquantur ex præcepto Doſionis, mutilato capite, ſi corpulentiores fuerint, & loræ ſale minuto & aqua. Contemptos fuiſſe Antiphanes oſtendit.

Quarta eſt *APHYA COBITES*, καβίτες Græcis, Theodoro Gobionaria. Putatur ab ignobili quodam & terram ſubiente Gobio procreari. Rondeletio eſt ille quæ Galli *Logis de mer*, ad differentiā *Buviatilis* vocant.

K 3 Nun-

Oppian.  
Cyneget. l. 2.  
p. 568.  
Ariſt. H. A. de τῶν ἰσθμῶν γένεσιν  
l. 6. c. 15.  
exercent.  
Scalig.  
c. 14.

Aldrovand.  
de Piſcib.  
l. 2. c. 29.  
30. 31. 32.

TAB.  
XIX.  
32. 33. 34.  
35. 36.

Nunquam ad Gobionum magnitudinem accedit, aliqui marinis Gobionibus similissimus. Corpore est rotundo, pellucido, dorso latiusculo, colore candido, nigris aliquot maculis asper, so caudâ variâ, oculis quodâmodo supra caput positis. Pinnæ eadem illi, quæ Gobionibus, maximè illa, quæ his peculiaris, barbæ instar ex ea ventris parte, in qua binæ sunt in aliis piscibus, propendens. Hepar est lactei coloris, & in eo felle vesica, splen, rubet, intestina & peritonæum ex albo nigricant. Cor ex albo rufesceit. Gravis est, & difficilis concoctu.

De *Encrasicholo sequenti capite agemus. De Aphyis Magulum inter istos agetur.*

*Apua* MULLORUM exiguis admodum Mullis arbitratu Rondelerius, qui in stagnis marinis ex putredine nascuntur.

*Aphyæ* MÆNIDUM verò pisculus Mænium specie sine mare & sumina fronte nascentes esse iudicat, etsi contra sentiat Aristoteles.

HEPHEti seu Hepseti nomen, ad multos parvos pisculos extenditur; peculiarem aliquam speciem esse, exinde, quod apud Athenæum pro parvo pisciculo Aphyarum generis ponatur. Rondelerius à Gallis *Isnil* appellari credit. Est digiti magnitudine, argentei coloris, corpore pellucido, dempta ea virgâ, quæ à branchiis ad caudam extenditur. Oculi habet depressos, pro parvitate corporis magnos. Os ita scissum, ut inferior maxilla superiori sit prætensa, sitque velut oris operculum.

#### ARTICULUS XVIII.

#### De *Encrasicholo* & *Arherina*.

TAB.  
XVII.

15.

TAB.  
XIX.

17. 18.

Plin. H. N.

L. 3. c. 8.

**E**ncrasicholos, Græcis *ἑγκράσιχος*, quod *ἐν* τῇ *κρίσει* ὄντι *αἰσχροῦ*, seu *bilis folliculum* in capite gerat, hoc est, quod eius caput impensè amarum sit, unde eo mutilari assolet, dictus; aliis *καὶ σαρκοφάγος*, quod dum oscitat, amplum os aperiat, ut serpentis potius quàm piscis videatur; Plinio, multorum cruditorum iudicio *Lapæus*

nuncupatur. An Chalcedoniis *ἰσχυρὸς* dicatur, quod Callimachus apud Athenæum prodidit, *ἰσχυρὸς* quoque Ælianus vocat. Magnitudine est plerumque digiti, palmi longitudinem nunquam assequitur. Argenteo colore micat, tergo ad caraeleum accedit, si soli opponatur transparet, dempta argenteâ lineâ, quæ spinæ vertebra comitatur, quæ sanguinem continet. Squammis carere falsum, vel in sale adervatis argenteæ micant. Rostrum habet acutum; os amplum, utramque maxillam serræ modo asperam, branchias parvas duplices. Cor oblongum & acutum, hepar rubrum, maculis rotundis conspersum. Ventriculi appendices multas & nigras. Ventrem mollissimum, ideoque plerumque absumptus in salitis conspicitur. Ovis scaret rubentibus. Spinis caret, ei exceptis, quæ in dorso est, & ipsa tenuis, adeo ut vix dentibus negocium faciliat. Arenâ, spurciis, atque cæno vescuntur. Capiuntur hyemâ à Decembri ad quadragesimam usque, in Provincia numerosissimè, noctu igne è naviculis accenso. Quam confertis turmis densi, metu insidiarum nati, de Aphyisin genere dictum est. Hanc tam confertam Lycostomorum natationem, *βίον* à peritis nominari, Ælianus tradidit. De *Oris* dissentunt Authores. Suidas & Arhenæus ex *Apua* Cobite; Aristoteles ex *Phalerica* oriri tradit. Satius est sui generis piscem statuere, quàm vespices in infinitum multiplicare; vel ex *Apua* *Phalerica* duos diversos pisces generari, concedere. Nam & ex hac *Membradæ* oriri Philoſophus author est. In magno plerisque in locis habentur precio. Comeduntur & crudi & sale asservati. Minutatim concidunt, capam pariter tirram addunt, sic ex oleo & aceto asperso pipere sumuntur, saliantur truncato capite, & fel aufertur simul. De *Garo* quod ex iis, vide *Rondelerium*. Huc referunt nonnulli *καὶ σαρκοφάγος*, cuius effigiem exhibet TAB. XLVII.

Ælianus.  
H. A. L. 2.  
c. 18.

ATHE-



ATHERINAM, Græci ἀθέρην, & per pleonasmum literæ α, Ἀθέρην, seu transverso, quem aliterum Atherinæ genus in ventre habet aculeo, quod Gildio placet: seu ab aritis (ἀρίτης idem est quod ἀρίς, id est, arista, pars spicæ acuta, seu ut Eriotianus explicat, tenuissimum illud, quod in hordeo acuminatum est) per metaphoram pro spina sumpta, quas multas in Sardinis duriores Atherinæ habent, quod Rondelenus voluit, dicunt. Possent & ab ἀθέρην, quod pro κατὰ θῆραν, floccipendere & contemnere deduci, quod nimirum ἀθέρη ἔχουσι πῦρ: ἔχουσι πῦρ, ἢ ἰσχυρὸν ἀβυσσάσιν negligitur. Gaza Arisam & Arisulam vocat. Callimacho, in nomenclaturis diversarum gentium ἰσχυρὸς & ἰσχυρὴ sine dubio à parvitate, ἰσχυρὸν Adverbium Græcis sonat propè vocatur, Romanis Laterina. Quid per suum Acerinam Plinius Medicus intelligat, difficile est dicere. Bellonius recentiorum Crinum esse credit; ego mendum esse, & Atherinam legi debere iudico. Descriptionem si attendas, ita de eo Rondelctius. Pifculus est marinus, litoralis: repetitur & in marinis stagnis, Aphyis similis, dodrantali magnitudine, parvi digiti crassitudine, dorso spisso, ventre leviter depressore parvo sine dentibus, oculus magnis. Colore est vario: nam ventres argenteus est, dorsum fuscum, circa caput, ex flavo rubescit Sardinatum modo. Locus qui inter oculos est, ex latus videtur. Pinnas habet quatuor, duas ad branchias, duas in ventre, aliam à podice, præter has, alias duas in dorso. Omnes candidæ sunt. Cauda duabus pinnis constat. (contra offendit apposita Icon) Pro linea medio corpore à branchias ad caudam protensa, spissum quid habet sub cute, q̃ non possum aliter quam faciam per similitudinem vocare, quæ eum cocta Atherina editur, evidentissima est, & cum lumini obiditur: quia reliquo corpore pellucida est, hac parte opaca. An Aphyx Meletz mas sit, quod piscatores credunt, dubito, tum quod illæ fin

mare & femina nascuntur, hæc dis-  
tinguantur sexu: rum quod mol-  
lissimo & depresso corpore sint illæ  
illæ solidius & pilosius habeant. Bala-  
nionusium, quem vulgus Cræcum  
Romani Latharium, Massilien-  
ses Sende vocant, ita describit. Pi-  
sciculus est digiti crassitudinem ex-  
cedens, neque extenso digito lon-  
gior: Argentei coloris, trans-  
lucente corpore, & quod soli ob-  
jectum, ut vitrum transpareat, li-  
neamque offendit internæ obscu-  
ram, rectam, à capite ad caudam,  
à sanguine, qui in spina profundit-  
ur, provenientem. *Oculus* est gran-  
dis, lingua candida. Pinnam  
utrimque in lateribus & geminam  
alteram habet sub ventre, quæ pi-  
scem in parres æquales secat: ac  
præterea tenuem aliam, & parvam  
sertim medio tergore pinulam. Cæ-  
terum *Cor* gerit, ut semen ovalidis  
triangulum & oblongum, pericardio  
perbellè inclusum: branchias  
utrimque quatuor: *Coslas*, item ut-  
trique decem omni capillamen-  
to teneriores: vertebrae adeo exi-  
les, ut vix ab acie oculi perspicaci-  
sima discernantur.

*Pascuntur in algoso lirtote, a. m. Oppian.*  
*exiguosque licti pascuntur; sordibus, ut Op.*  
 piani verbis utat. Quam Ronde- *Mal. 11.*  
 leus descripsit, non tantum in vi-  
 cino Monspelio mari, ubi Melet  
 dicitur, sed & Massilia, & in stagno  
 quod Martegne vocatur, frequen-  
 tissime capitur, & nomen Sancelz  
 obtinuit. Aristoteles gregales fa- *Aristot.*  
 cit, eodemque teste inter Rhya- *N. A. 16.*  
 de circa æquinoctium vernum *æq. 17.*  
 75 juxta terram, alvum arenæ ac-  
 terentes patiunt. Vilem in *Lib.*  
 Phavorinus fecit, & contemptum,  
 delicatissimum suum Rondeletius,  
 nisi spinæ negotium facerent.  
 Belonius quoque quæstuosissi-  
 mam suarum ob suavita-  
 tem piscationem  
 scribit.

\*

## ARTICVLVS XIX.

## De Lavarono Bellonij.

**P**liscis, quem Romanum vulgus Lavatonum vel Lavonum, seu à beata quæ Lavarono, quod non videtur, cum marinus sit, seu aliunde, Massilienses Cabassonum, Genuenses à capitis magnitudine Capassonum, vocant, ita à Bellonio describitur. Grandiote sunt capite, quem Atherinæ, magis recutto ac compressioread ventrem corpore, & paulo latiore transpatant, ut Atherinæ, maximamque habent cum iis affinitatem. Squamis multis integuntur, quæ detectæ argentum colorem præ se ferre videntur. Duas intergoregerunt pinnulas, utrimque ad latera unam. Dentibus carent, ut Harengus: Cor exiguum, oblongum, triquetrum, habent: hepar pallidum, cui stomachus subest, pisciculis & Cardibus parvis nonnunquam reffectus. Intestina ad anum tribus revolutionibus reſeſtuntur. Fel ob eius exiguitatem conspicuum non habent: spinæ quoque ferunt nullas. Carnem albiſſimam & leviſſimam. Calculos duos in capite gerunt, ſeſamino minores: Iquamas paulo quam Atherina latiores & numerosiores. Magnam cum fluviatili Lavarcto affinitatem habet.

## ARTICVLVS XX.

## De Sarda seu Sardina.

**TAB. XX.**  
**L. 2. 3.**  
*Galen. Hist. Nat. L. 3. c. penult.*  
*Plin. H. N. L. 32. c. 11.*  
**S**ardæ nomen, sibi nē ex Galeno colligo, omnibus pisciculis, qui ad ſaliendum apti ſunt, competere videtur: idque inde ſortitas apud veteres credo, quod ex Sardinia in alias regiones, eveherentur. A Sardinis & Sardellis magnitudine duatæ & ætate differunt. Cum nondum adolevere, Sardinæ & Sardellæ dicuntur, adultæ Sardarum nomen capiunt.

Unde Apicius Sardam farcti ſolere dicit, Sardenam ob parvitatem non poſſe. Farctot tamen, & Pelamydi longæ apud Plinium Sardæ vocabulum impoſitum inveniunt. Qui *Trichias* & *Trichides*, quas Dorian apud Athenæum non diſtinguit, Ariſtoreli dictas, cum nulli tam vulgatis piſciculis tam diligens naturæ explorator meminere, credunt eaſque *ἀντιπαρα*, quaſi à capillis, ſeu parvis illis & capillatibus quibus abundante ſpiculis, à quibus etiam *δριον* dicunt, quas recentiores Aloſas nominant, deducunt, vix falluntur, niſi forte hoc obſtet, quod idem ex Membradibus *Trichides*, ex his *Trichias* naſci dixerit. Nam quod \* alibi *πριον*, Ariſt. *H. N. L. 6. c. 19.* (Sardis Gaza vocat) quidam adſcribit, quæ Sardis nulla ratione competunt, ea *δριον*, ſeu Aloſis, cōpetunt, ut mendū lubelle, & male Gazam vertiſſe ſit evidentiffimum. *Chalcidas* quoque marinas Sardinias nuncupati, vel ex Callimacho colligitur, haſque Columella intelligit, dum dicit, *Πῖſκibus in πῖſκινῳ πρᾶβε* oportet, tabentes *Halculas*, & *ſαλῖ*bus ex *ſαλῖ* Chalcidem putremque Sardiniam.

Invenio & à Dotione *χαλκιδιν* dici. *Eritimum* vocari, vix ex Epeneti apud Athenæum loco *χαλκιδιν* τῶν (legendum *αἰ*) *καλῖς* τῶν *αἰ* *δριον* *αἰ* *πριον*, *αἰ* *δριον*, inquit, colligi poteſt. Bellonius etiam cum Chalcidibus eaſdem ponit; ſed dum fluviatiles à Celerinis ſola magnitudine differre, ſpecie convenire putat, argumentuſumpto, quod Galli qui ad Oceanum ſiti ſunt, nullum piſcem Sardinæ uomiæ agnoſcant, præter eum, qui aliunde ſale aſſervatus, ad eos perſectur. Celerinus vetò in Gallia tam ſit popularis, quam in mari mediterraneo ipſa Sardinia, ex Aldrovandi opinione fallitur. Sunt enim Gallorum Celerini (verba ſunt Aldrovandi) ab Allothogum Celerinis diverſi, illi marini ſunt, & noſtro & Rouclerit etiam iudicio marinis Membradibus in Aquatum genere nō Chalcidibus ſive Sardinis idem;

idem in lacustres, & Chalcides Aristorellis, Sardella, & Aquo Fracostorti. Anglorum Sprat, & Hollandorum Sprot, ad quos fumosicatus adferri solet, haud aliumputo quam Sardam aut Sardinam ficuti & illum quoque, quem Rondeletius scribit Agathopoli magna copia capi solere, nominariq; Calliques vel Lachez, & Massiliæ Garengades, licet ipse Membradem esse velit: utenim Calliques ex Chalcis corruptum esse videtur, ita etiam Lachez ex Laccia: quo nomine in multis Italice locis Alofa appellatur, cuiusmillima est Sardina, & ipse quoque cum Alofa similem esse profectur. Harengades verò etiam dici videtur, quod & Harengo similis sit, & similiter salita per mediterranea loca venalis effertur. *Icones & Descriptiones* diversas quinque apud Aldrovandum invenies.

*Prima*, pisciculus est Aphyx Phalericæ omnino similis, nisi paulo major, & spissior esset, à parva Alofa, ore, branchiis & oculis, pinna- rum numero, situ, squamis, caudâ minimè discrepans, sed in hoc tantum quod Alofa sit latior. Sardina igitur squamas magnas, tenues habet: colore est vario, nimirum capite aureo, ventre albo, dorso cum viridiæzruleo, utroque splendido, rutilanteque dum viva è mari extrahitur: una enim cum vita viridis evanescit, æzruleoque manente, eoque hebescente & splendorem suum amittente. Intestina habet parva & recta, Alofarum intestinis similia.

*Altero loco picta*, in qua pictor pinna- nas nullas expressit, capite est rubicundo, corpore toto subviridi, præter duas quæ in ea conspicuæ sunt, lineas, quæ sunt æzruleæ: Cauda ad castaneum in extremo vergit. Sardæ Flandricæ nomine missa est.

*Tertia* eodem quoque nomine, sed majoris cognomento commu-

nicata, pinna- nas habet nigras, quarum situs (dum modo pictor rectè expressit) alterius speciei piscem esse indicat. Colore est vario, viridi nimirum violaceo, palcari & ruffo. Maculæ in lateribus sunt nigræ: in pectore croceæ.

*Reliquæ duæ species*, dorso sunt viridi, ventre argenteo. Prior in extremitatibus ossium, quibus branchiæ teguntur, rubent. Oppianus Oppian. dum scribit: *Uell.*

*Chalcides & Thrissa passim Abrami-  
desque feruntur,*

*Et curvis habitant scopulis & litora  
visunt,*

*Atque catervatim percurrunt aquo-  
ria undas,*

*Alternantque imas ponti, curruntque  
per aquor,*

*Hospitium mutant semper, pectusque  
vagantur.*

is qui vagabundam vitam agunt, accenset. Capiuntur Mafâ ex er- vis frictis & myrrha vino odorato excepta, confecta: aliquando foliis betæ, quâ impensè delectantur. Adhibentur quidem in cibis, sed re- vera, ut Hieronimus apud Athenæum dicit, *ἀνθρώποις καὶ ἀνέμοις καὶ ἰχθύσι*, id est squalidi, nec multum pin- gues sunt, nec copiosum succum in alimentum præbent. Apicius far- *Apic. l. 9.* cire eas docuit, Galenus ad Galien. *Galien. de* dum aptissimas dixit. *Medicum u-* *farulis.* *Alim. l. 3.* sum quod spectat, in prima men- sa sumptæ, alvum subducunt. Ca- pite, in puero quodam, loco bala- nifelleciter usus est Brasavolus. Mar- *Marcell.* cellus exultas sine osse, vel balsamen- *l. 11. 19.* tum, & confectas, si varicibus sup- ponatur, statim prodesset scribit. I- dem Sardæ caput combustum, me- dicamento ad gingivarum tumo- rem, fororemque admiscet. Pri- vatim, contra presteris mor- sum valet, si Plinio credi- mus.

## ARTICULUS XXI.

## De Mana.

TAB.  
XX. 4.Plin. H. N.  
l. 36. 18.Columel.  
l. 8. c. 19.  
Martial.  
Epigram.  
l. 3. & l. 11.

**M**ANA, Græcis *Manis*, Theodoro Gazæ Halec est: metuo ne perpetam. Alecis enim nomen, vel omnibus pisciculis qui muris condiuntur, quod Rondeletius docuit, competit; vel illis, qui apud Græcos Anthracides, seu Carbonarij vel prunarij pisces, quod in pruna & craticula commodè coqui possint, dicuntur, quod ex Hermolao discimus; vel ipsi piscium fœti, unde Plinius. *Laudatur & Clazemene garum, Pompeique & Leptis: sicut muris Antipolis ac Thuria: jam verò & Dalmatia. Vitium huius est Alex, imperfecta nec colata sax: vel denique pisciculo fluviali seu dulcium aquarum, quem Plinius, ad ostreas, echinos, utricas, cammaros & nullorum jecinota pervenisse scribit.*

Columella inter parvi incrementi fluviorum animalia reponit, & piscibus maioribus præbeti jubet, ut de Martiali taceam. *Descriptio nem & Differentia*, quod spectat, Mænā inquit Gillius, non modo speciei, sed etiam generis nomen esse conjicio; quod varium & multiplex est earum genus. Aliæ in utroque latere nigram maculam orbiculatam habent, quas ii, qui Adriaticum sinum accolunt, vulgo Mænās selavas appellant: aliæ leucomænides, hoc est, albæ Mænæ Græcis sive Smarides nuncupantur: itemque sunt Mænæ Boopes appellatæ. Bellonius duas observavit differentias in colore: alias enim luteo, alias lituris cyaneis aut azureis confectas esse ait. Specusippus Mænidi similes facit Boacem & Smaridem: idem tradit Rondeletius, nec non Bellonius, nisi (inquit hic) paulo latiores & breviores cernerentur, & squamis Smaride tenuioribus contegerentur, breviorque essent capite, rarif-

sime siquidem palmum excedere; (Antiphanes quoque Mænās exiguos pisces esse dixit, & Martialis breves) lineam in lateribus rectam habere, quæ in Smaride arcuata est: pinnae tergoris, laterum, & caudæ diaphanas esse, & maculatas. Os si clausum contineat, minimūquidem apparere: sed dum hiat, rictum magnum ostendete, labrumque superius tubi in modum, ut in Harengo infractum esse: Oculos habere rotundos, iridem subrubram: maxillæ asperitatem quandam dentium vicem præ se ferre: si desquametur albidissimam argenteamque spectari: sed tergus livore quodam sub oculis in purpureum gemmate depingi.

Addit Rondeletius, utrimque magnam & rotundam maculam habere in medio corpore, quam etiam in icone expressit, Bellonius omisit, & in descriptione non meminit, nisi eam intellexerit, dum inquit, utrimque lituris notari, quod tamen non assero, quandoquidem icon mea cum Belloniana satis convenit, & eiusdem coloris lituras habet, item citum oculos. Pinnae omnes etiam versicolores. Venter candidat. Cauda fusca est. Idem Rondeletius hyeme candidam esse scribit, vere & æstate variam: maculis caeruleis toto corpore & potissimum in capite & dorso sparsis: item lapides habere in capite: maremque in eo fœmīz dissimilem, quod latior sit & porrectior, femina rotundior: cum fœtura fœmina impleri incipit, maris colorem in varietatem quandam & nigrotatem mutari. Aristoteles verò hanc mutationem temporis adscribit, & de Mænā simpliciter id tradit, nec fœminæ nec maris facta mentione.

*Mana & Smaris (inquit) mutantur, ut ex albedine rursus æstate ad nigredinem redeant, idque maxime suis pinnis & branchiis declarant. Ita & Plinius Mutant colorem candida hyeme Mana, & sunt æstate nigriores. Quem locum*


*Sarda Flanatica maior*

Section Tab. XX.  
*Sardina*

*Sarda, Sardina*



*Merluccius, alba*



*Merluccius, peregrina*

*Boops, Hautink*



*Boops peregrina*

30  
*Solea, Pecten salu*



*Solea lingulata*



*Solea, Citharus*



16  
*Rhomboides*

14  
*Citharus, fuscus*



13  
*Solea, alba*





cum Massarius explicans : dixit, inquit, æstare nigriores : quia susci-  
piunt colores cæruleos, qui quod  
ad albedinem sunt obscuriores, & ni-  
griores.

Et rursus: Maxna pisculus est digi-  
talis longitudinis, hyeme candida,  
æstate varia, picturis cæruleis ob-  
liquis. Quomodo autem colores  
mutent, in Merula ac Phyeide (ni  
fallor) explicatum est. Testatur  
denique Rondeletius, cum aliquan-  
do Romæ Venetias venisset, Max-  
nas setanta colorum varietate cons-  
pexisse, ut vix primo aspectu agnos-  
ceteret, quod suo in littore minus  
pictæ sint. Quod ad partes inter-  
navattinet: Maxnæ hepar, ut Bello-  
nius observavit, fungosum ex la-  
theo pallefcit: sub cuius lobo  
dextro fel luteum oblongo valen-  
tulo includitur: Splen niger, stomachus  
oblongus. Rarè in Oceano capi-  
untur: in mari tam supeto quam  
infero frequentes esse, nomencla-  
turæ apud utriusque maris acco-  
las indicant. Maxnaria insula ab  
earum frequentia nomen sortita  
est. Inter herbas in littore algofo,  
seu ut Ovidius, in herbosa arena  
villitare, Oppiani fide tradimus. A  
catne non omnino abstinere, qui-  
dam prodidere. Gregales esse a-  
pud Aristotelem legimus. Parit  
brumâ, vel ut Bellonius, post bru-  
mam, & omnium piscium fecun-  
dissima esse censetur. Cum fortu  
fœmina impleri incipit, ob mali-  
gnum ferorem, *maxna* seu *Hircus*,  
ut apud Aristotelem exrat, dicitur.

Singulare cum vespis sym-  
pathiam habere ex eo quidam col-  
ligunt, quod illæ nassa, in quæ max-  
na cum Chalcide repetta est, ca-  
pianitur, prodente Aliano: singu-  
lari in Xiphias odio ferti, ex eo non-  
nulli, quod eam balanzæ metu, gla-  
dio suo in terra hærenrem, confici-  
ant, ut Oppianus testatur. Inter  
plebeios *ribos* reputantur, adeò, ut  
accervatim, vitato etiam emptore,  
Venetiis vendantur, tum quod par-  
visint, tum quod cum uterum fe-

tunt, exquisiti fectoris. Unde  
Martialis

*Fuisse gerres aut inutilis manas*

*Odor impudicus urcei fæbat.*

& in Majali L. Pomponius Arellana-  
rum Poeta, urdicitur Agellio

— *Cenam quaritat, si nemo cum*

*Vocat, revertit maxsi ad manam*  
*miser.*

Succitamen bonitate Gobiis præ-  
stare Hiccius, teste Athenæo author  
est: quod forte de iis, qui in littore  
petroso aut arenoso, & suo tempo-  
te capiebantur, sumendum est. Nam  
aliàs, Gobius friabili est carne, & sa-  
xatiliu non multò inferiore. Li-  
quamen seu gari speciem ex iplis fie-  
ri solitam, Plinius innuit, dum scri-  
bit. *Salctiam è maria salfamentorum re-*

*coquitur, iterumque consumpto liquore,*  
*ad naturam suam redit, vulgè Manu in-*  
*cundissimus.* Apud Perlium quoque  
aliquid simile invenies, sit visceti-  
bus piscium in vas aliquod iniectis,  
& sale conditis. *De usu in Medicina*

hæc habeto. Jus assumptarum al-  
vum solvere: ut & salsas, si umbili-  
co illinantur. Capitibus invete-  
ratarum uestis ad sedis fissuras, &  
columellam inveteratam Galenum  
uri: ad uvam diu jacenrem, cum  
gallæ & floris xris, denarius duo-  
bus, Marcellum Empyricum: ad An-  
ginam cum melle illitis eundem.

Plinius eandem cinerem, admi-  
xto sale & cunila, oleoque, vulvæ  
mederi, & suffitione secundas ex-  
trahere, testatur. Cum alio tirus  
vertucas tollit, & verendorum pus-  
tulas discit. In dysenteria quem  
præbeant Maxnæ ulum, apud Gale-  
num invenies.

## ARTICULUS XXII.

### De Smaride.

Smarides qui & Marides apud A-  
thenæum dicuntur. (Bellonius X X.  
Græcos Anconæ se convenisse scri-  
bit, qui etiam Maridas appella-  
bant) ex Maxnarum sunt genere.

L 2 Vocan-

Martial.  
l. 12.  
Epig. 32.

Plin. H. N.  
l. 3. c. 7.

Plin. H. N.  
l. 3. c. 9.

Galen.  
Impt. l. 11.

Plin. H. N.  
l. 32. c. 10.

Alian. in  
Hystor. A-  
nimah.

Vocantur & *Leucomanides*, nempe, quia semper albae sunt, cum Mænz colorem immutent. Eum docti pisciculum esse volunt, quem Antipolirani hodie *Garum*, Veneti hurrulam seu herrulam, Massilienses hiarer, Galli Narbonenses & Hispani Picarel, quod fumo induratus & salitus, linguam acrimoniam vellicet, Neapolitani Cerrum, quod vocabulum Gaza retinuit, nominant. Rondeletius Garum vetustum esse putat, tum earundem nomenclaturarum affinitate, tum quod ex eo garum fiat, idque teste Plinio, optimum. *Trium descriptionem* Aldrovandus tradidit.

Plin. H. N.  
L. 31. c. 7.

*Primus*, Mænz & Boopi simillimus est; notis tamen quibusdam ab iis distinguitur. Boops enim lituriscaret; quibus prædita Smaris est. Boopi rostrum quasi recisum, Smaridi longiusculum. Boops irem quam Smaris rotundior est corpore, quam ob rem Rotundetus Romæ nominatur. Differt vero à Mænna etiam, quod & asperiores & paulo lariores squamas habeat. Lineæ laterum utrique rectæ, sed in Mænna nullo plane ordine dispositæ: suntque argenteæ & subaureæ, obscuræ, à capite ad caudam ductæ. Estque Mænna minor, digitum nimirum vix superans, corpore item striatiore. Est denique peculiaris ei nota, quæ & à Mænna & à Boope discernitur. Cum enim os aperit, labia exierit tanquam ex tubo pyxidatim infarcto. Pinnis alioqui, aculeis, cauda, partibusque internis Mænz similis est: eodemque modo colorem, recte Bellonio, mutat.

*Altero loco* exhibitus piscis, Smaris Bellonii videtur. Capite est fere violaceo, prono nempe, nam supino albicat. Eodem colore totum corpus, sed multo dilutius tinctum est. Lineæ quinque insignes flavescences à capite ad caudam perferuntur. Pinnæ etiam flavescunt. Exiguam habet & vix conspicuam lituatam.

*Tertius* Smaridis petegrinæ nomi-

ne missus, tergo est caeruleo, caetera subviridi, nigris & argenteis punctis conspersus. Prono capite ad violaceum vergit, supino vero candicat. Pinnæ omnes fere cæcei coloris sunt, punctis conspersæ nigricantibus. *De gunt* inter herbas in algoso littorei eodemque cum Mænis cibo vesci, verisimillimum est. Inter fecundas recenset Ovidius. Pastâ, ex pane, caprillo caseo, & purissimo polline, necantur. Optimos pisciculos esse Hesychius scripsit. Optimum & suavissimum ex iis gaviû, apud Guilielmum Pelicerium Episcopum Monspeliensem Rondeletius vidit. *De usu in Medicina* proditum, caput totum ad ploratum defluvia cum adipe urino conferret; excrecentes ulcerum oras, ab eisdem pulvere reprimi, thymosque & clavos absumi. Plinius alicubi cum pitifana sumptas, vel cum feniculo decoctas mulieribus lactis copiam facere scribit, alibi, rritas illas, verrucas tollere, & veterum pustulas discutere tradit.

Plin. H. N.  
L. 32. c. 32.

#### ARTICULVS XXIII.

##### *De Boope, seu Boce.*

**P**iscis, quem nos *Boopem* dicimus, is **TAB.** Aristoteli citante Athenæo **βούξ, XX.** Numenio **βούξ**, qua etiam appellatur. **8.** tione Oppianus vocat, Speusippo & **TAB.** aliis Atticis **βούξ**, seu **βούξ** à **vo-XXII.** ce, ideo Mercurio sacer habetur; seu **6.** quod **βούξ** **ἰσθαλμῶν**, id est bubulos **Athen.** oculos seu magnos habeat, dicitur. **Dynag.** Tertia est Mænis species, pedis ut **7.** Rondeletius scribit magnitudine, qui etiam *tres* describit. Prior piscis est marinus, littoribus gaudens, ex Mænarum genere, pedali magnitudine, corpore satis rotundo, non compresso, quale fere est Mugilû. Capite brevi, & parvo. Oculis maximis, p. corporis magnitudine, urpote qui totam fere capitis regionem occupant. Colore est vario. In dorso à branchiis ad caudam lineas ductas habet, alias aureas, alias argenteas, minus quam in Solpailustres: ob quas ab Aristotele in libro



libro *ἐπὶ ἰχθύων, συναγῶναι*, id est, in dorso pictus cognominatus est. In ventre nullæ apparent lineæ: sed hic squamis tegitur argenteis. Pinnae sunt spari, cancellari, Sargi, pinnis similes. Cauda subaurea. *Ventriculus* magnus cum multis appendicibus: intestina renuia admodum, hepar rubrum, splen ex rubro nigrescens. Nutritur alga, carne, luto. *Altera species* in multis priorum similis: suis Bogueravel appellatur, cuius cognominis significationem, non omnino allequi se potuisse ait, peritiores tamen piscatores credere, sic dici quia cum Ravalles vulgo vocatis piscibus, id est, (inquit) minutis, quique simul elixantur, & apponuntur, nec propter parvitate miseliguntur, capiatur, & vendatur. Boopi (inquam) vel Mænæ similis est: rostro magis acuto, dorso ex caeruleo rubescens: oculis magnis & variis, nimirum circa pupillâ nigrâ circulo ex aureo nigrescente: corpore toto latiore q̃ Boops sed brevior. Boopis hæc nostra species peregrina dorso fere est violaceo, aut amethystino, lateribus & ventre candicantibus punctis amethystinis, conspersis: pinnis omnibus flavis præteream quæ intergo est, cuius quidem aristæ flavæ sunt, membrata vero viridescit. *Tertiam*, quia squammis caret, huc pertinere non iudico. Bellonius quoque *duas species* describit, dum dicit.

*Dua* huius piscis cognoscuntur *differentia*: siquidem earum *altera* minor est, & perpetuo parva, *altera* paulo maior. Boces à Mænæ ita distinguere poteris, quod Mænæ videas esse latori corporis compage, nigriore colore, & utrinque lituram unam habere. Boca perpetuo parva est, & pro sua magnitudine crassiori constat capite, corpore magis tereti. Boces & Mænæ seu *Gerres* eandem corporis constitutionem, hoc est, pinnas, squamas, & capita habent. Boopes nullâ liturâ variantur, sed ambo tereti cor-

porpore præditi sunt. *Giruli* autem seu Smarides magis nigricant, & lituris variegantur. Boces teretiores sunt. Giruli magis plani. Bocum color hilari ac quodammodo aureo fulgore nitet, ut tergora colore ad aurum inclinante micare credas. *Gregali* est, & litoralis piscis, herbosis gaudens. Piscis est parvus, oculos pro corporis ratione grandes habens. Duos habet in capite calculos non prorsus rotundos, ut in Pafseribus, sed oblongos, ut in Merlangis. *Alter Boops* Orpho autalicubi ex rubris cognatus est. Littoralis, (inquit) pisciculus, qui Bogue & Renæu (cum iconè scriptum est Bogue Renæu sine copula) Massiliensibus dicitur, is Genuensibus Ruello vocari solet. Coloris est eiusdem cum Erythrino pisce, dentibus, pinnis ac capite consimilibus, sed reliquo corpore differunt. Nam Box vulgarem Bocam refert, eodemque circino tornata esset, nisi magis ad Erythrinum accederet. Verum linea quæ corpus Erythrini interfecat, per medium utrinque arcuata est. In hoc autem recta prætenditur, neque Erythrini gibbum habet: Dentes præterea anteriores breves & acutos ostendit, sed tam superiores quam inferiores molares sunt, ut Sargo, quod etiam Pagro & Erythrino accidit. Hanc quoque peculiarem notam insignem habet, quod eius branchiarum exterior spina ad radices nigra est. Putat Ovidii Bogyrum esse, q̃ Massilienses à Boopa & Gyro, id est Smaride, nomen ipsi indiderint, sed mendum est in Ovidio, & Ceteirus legidebet, qui apud Oppianum, circa petras conchulis plenas degit. *lib. Hal. Li. dem cum Mænæ locu gaudent, eodemque cibo vescuntur. De Car. Athén. nus eius qualitate ita Athenæus. Dispos.* *Βούξ δ' ἰσθίου, ἰωνίου, ἰωνίδος, ὀψίου ἀνίου, ἰωνίδος. ἡ δ' αὖτ' ἀνιόντος γινώσκουσιν, καὶ ἀνιόντος. Βούξ ἐλαχίον facile cognitur, facileque excernitur, jurelem tam quid emittens, facilem alvum reddens. Assus, succensus carbonibus suavior est & tenerior.*

In Provincia etiam agris apponitur. Anconæ, Bellonii prior, multis modis condita, carnis privii tempore, potissimum Anconæ, Illyrico more, ex gelu conservata divenditur. Psellus tamen inter excrementitios pisces retulit.

## CAPUT II.

## De Squammosis planis.

## ARTICULVS I.

## De Piscibus Psittaceis spinosis in genere.

Pisces, qui in latera compressi, latera ipsa in tenuem & latam extremitatem degenerantia habent, & quorum dorso spina, non in dorsum & ventrem, ut in piscibus reliquis, sed in latera, suas pinnas seu apophyses transmittit, Plinio *Plani*, *Columellæ*, *jacentes, prostrati, & cubantes*. Dorioni apud Athenæum *πλατύς*, id est, lati; quibusdam, quod supinâ parte candidi, prona verò terre sunt, ut passeris aves, *Passeres*: aliis *Psitta* vel cum Aristotele *Psittacei* pisces, dicuntur. Duo ipsorum genera, Spinosum unum, Selache seu Cartilagineum alterum, non eo tamen sensu, quo Ælianus & Artemidorus, inter Cartilaginea, quæ squammis carent, ut Muræna, Conger, Torpedo, & cætera, referunt. Spinosi ovipari sunt. Cartilaginei ova quidem intus concipiunt, sed viperæ more fœtus, postmodum vivos excludunt. Sethorum alii levi cute præditi sunt, aliis squammis teguntur. Videntur omnes è duabus pellibus compositam habere corporis speciem, & spina per medium dividi. Omnes item quaternas pinnas habent, more squamosorum, duas in prona, rotidem in supina parte, sed præter aliorum

morem pinna earum in gyrum circumvallantur. *Branchia* utrimque quaternæ, *lingua* nulla, *oculi* in supina corporis parte. *Dentium* loco maxillæ in platysque rugosa quadam scabritie asperæ sunt. *Gula* veluti ingluviei cuiuspiam persimilis, ventriculo contigua est. Quamvis pro corporis portione exiguum omnibus, qui tamen in hoc genere maiores sunt, nullum non concharum aut crustatorum genus deglutiunt integrum, sicuti minores, qui in utroque genere minora sunt. Nullæ ad pylorum apophyses: *Cor* ab una parte gibbum, huic quædam caruncula atra quadrangula pulvini modo subsidet: ad cuius superiorem partem vesiculam annexi Bellonius testatur, & pulmonis officio fungi arbitrat. *Hepar* latum est & ventriculum amplectitur. *Vesicula felle* ab eius extrema parte dependet. *Lien* ater, sub ventriculo situs, qui latus est, & cum intestinis anfractuose circumducitur. *Dequunt* in mari, sed & stagna & fluviis, quod lutum appetant, & commodè ibidem pariant, frequentant. Ideo *Columella*, *Cynosam regionem planum educare pisces* scripsit. Quia in arena & limo latent, idè reciprocante mari facilimè capiuntur. In Belgii officinis tanta eorum copia, ut universo orbi sufficere posse videatur. Quia ova in omnibus reperiuntur, idè sexu masculino carere scripsit Aristoteles; quod tamen de certo duntaxat genere sumendum est. Conchyliis & crustatis, piscitius item vescuntur. *Parium* teste Aristotele semel in anno.

De *natura* eorum ita Aristoteles. *Pisces Psittacei* eo modo nati. *Na. H.A.I. 5.* riant, quo *Cochites*, alteroque oculi capiti incedunt, quia natura eorum transversa, distortaque est: itaque transversî natant, convolvuntque se strabonû more, itaque prorsus latitudine, quam pinnarum adminiculo, cursum dirigunt. Ingenium relapit,

Plin. H. N.  
L. 9. c. 20.  
24.  
Columel.  
R. R. L. 8.  
c. 17.  
Aristot.  
H. A. I. 4.  
c. 11.

Aristot.  
H. A. I. 4.  
c. 11.

Aristot. de  
Anim. III.  
c. 9.

*Angler.*  
H.A.L. 9.  
637.  
respit, quod se arenâ obruant, & postquam se totos occultaverint. *Volto τῶ σπῆτι ἐν νάδιον ἐς ἀλιεὺς ἰαβῆλια, αἰς οἱ ἰαβῆλια, ὡς οἱ ἰαβῆλια, ὡς οἱ ἰαβῆλια.* id est, ad quas pisciculi adnatare, ranquam ad algas, quibus vescantur. Certissimam securitatem esse Plinius tradit, vidisse planos pisces, quia nusquam sint ubi male hæc bestiz, eaque de causa, ab urinantibus sacros appellari.

## ARTICVLVS II.

## De Planis Squamosis in Specie.

## PUNCTUM I.

## De Solea.

TAB.  
XX.  
10. II. 12.  
17.  
Planorum piscium alii sunt *squamosi*, quos fortè Aristoteles *οὐαῖες* vocat; alii *leues*, quos *ἀπὸ δῆδici* conijcimus. Illi iterum vel sunt oblongo corpore, vel rotundo. Inter illos est *Solea*, à figura, quæ solo pedis ita subicitur, dictæ, quæ Varroni *Lingulaca*, Gallis teste Bellonio, *Perdix marina*, fortè, quod in lautioribus conviviis magnam obtineat claritatem, nuncupatur. Græci hodie *γὰρ-ῆ-λα* linguam appellant; vereretur *βούλ-λα* non tam ob bubulæ linguæ figuram; quàm ob longitudinem, dixeret. Quidam sub nomine *αἰδῆ-λα*, ab Alciphronè in epistolis piscatoris nominari opinantur. Matroni Parodo, in descriptione Cænz Atticz, *αἰδῆ-λα* generis vocabulum est, quod omnes planos delicatiores exprimit. Sex ipsius *species* Rondeletius exhibuit.

*Prima*, quæ *Solea* simpliciter dicitur, longiore contractioreque corpore est quàm *Passer*; & sin-

stagnis capitur, à marina, parvitate, & odore lutum respiciente differt.

*Alteram oculatam* vocat, quod licet corporis habitus, & internis partibus superiori sit similis: in pronam tamen parte, magnas habeat maculas, oculorum effigiem cum iride & pupillâ referentes, squamæ ram renaciter hærent, ut nifidum in aqua calida maduerit, deliquamari non possit.

*Tertia* à prima, ut *Rhombus* à *Passere*, situ corporis differt, si enim iuxta eodem situ componas, os eius in sinistram, prioris in dextrum latus vergere conspicies. Haur tamen ex *Rhombis* aut *Passeribus* esse, forma ipsa, quæ planæ *Soleæ* similis est, satis arguit, Galli *Polam* dicunt: ipse *Epicharmo* apud Athenzum *Cynoglosson* appellari conijcit. Vel si *Cynoglossos* huius non sit: (nihil enim certi ex ram paucis verbis, quæ citat Athenzus, colligi potest) optimo tamen jure, ut à cæteris *Buglossis* generibus distinguatur, *Cynoglossion* appellari posse, neque aliud esse genus, cui hoc nomen aptius quadret. Nam cum vera *Solea* suavitate saporis *Perdici* comparatur, hanc ferio planæ esse sapore, viscidamque duram, contumacemque coctioni, insuaveque quid & grave olere. Nec probat Rondeletius eos, qui pabuli tantum ratione differre credunt, quandoquidem pabuli varietas, etiam saporem succumque immutare potest; ad corporis tamen habitum formamque immutandum nullam vim habet. Frequens est in Oceano. Bellonius in Mediterraneo mari capi scribit, & à Massiliensibus *Servatin* appellari, quod tamen falsum esse Rondeletius asserit. *Torus*, ut ipse etiam ait, fusco colore est.

*Quarta* eidem Rondeletio *Arnoglossus* sive *Arnoglossus levis* dicitur, quod

quod quemadmodum plantagini herbæ à figura vel foliorum levitate Arnoglossi, id est, agnitiæ lingue nomen impositum est, ira species isthæ Soleæ, Arnoglossus à levitate vel figura rectè ( inquit ) nominabitur: squamis enim carere videtur, prorsusque lævis esse. Suis Perpeire vocari ait, & ex Solearum genere esse, ex corporis habitu, figuraque cognosci: Differte autem ab aliis, quod multis squamis tenuissimis & statim deciduis, integatur: corpore esse valde gracili, candido.

*Quintam* diminuto nomine *Ligulam* dicit, quod sit in hoc genere omnium minima: negarque maiorum Solearum fœturâ esse, quandoquidem semper parva sit: nunquam dodrantalem magnitudinem excedens. Lineam quæ corpus dirimit, spinamque firmat vel ruetur: huic ex squamis ait esse compositam longe eminentioribus, quam in toto corpore, dempta ea parte, quæ circa maxillam anteriorem est: durior carne esse quam Buglossus lævis, *glutinosusque* nonnihil habere: satissimum esse piscem, & ob corporis tenuitatem vilem.

*Sextam* ac postremam *Gallis Flesam* dictam quod fluitando nater, antiquis ( ut putat ) incognitam, solisque Oceani æcolis notam, Græcorum imitatione, qui rei magnitudinem *βη* & *τρεῖς* particulis indicant, Hippoglossum appellat, quod cæteras non solum Soleas magnitudine vincat, verum etiam quatuor digitorum longitudine quandoque inveniatur. Esse autem ex Solearum genere vel ex primo aspectu iudicari posse scribit: oblongo enim ( inquit ) contractoque est corpore, parte altera candida, altera nigricante, in qua oculi sunt. Oro est conrotto, dentibus munito cicharimodo, quibus Buglossificarent. Carne est dura, sed suavi, ad Rhombi naturam proximè accedente. Ossa habet spongiosa, quibus inest medulla, quæ à cupidarum amatoribus expetit. Pi-

scis est maris Oceani, Antverpiæ salitus, & in frusta dissectus venditur. Capitur etiam sæpe in Oceano juxta Gallie Bononiam, ibi huius frusta farinæ massæ probe subacta & pasta inclusa, aromatissimæ condita in furno coquantur, ut dantius servari possint & exportari, Aldrovandus, non tantum aliud Hippoglossi genus, squamis præditum minoribus, undique sibi concolor, flavescens scilicet: quodque à latere uno lituras nigras, pinnam & caudas in extremo cæruleas, habet, exhibet: sed & alterius Soleæ genus, quod squamis tegitur latissimis, estque unicolor & albicans. Quam Bellonius *Taniam* vocat, illa tenuis gracilisque piscis est: & quod Athenæus de Tænijs prodidit, Alexandriæ, Canopi, & Seleuciæ in Antiochia, frequentissimè reperitur. Benè ab Aristotelis & Rondeletii *Tania*, in qua pinnarum numerus cum Anguillis convenit, distinguitur. Omnium ferè marium piscis est, sed cum Rhombis Pontum ingredi Plinius negat, flumina ingresses multum pinguescere, Londini Bellonius didicit, in stagnis deteriores evadunt. *Littorales* sunt Oppiano, Ovidio in herbosa arena degunt. Terrâ, hoc est vado maris excavato per hyemem condi cre-  
*Aristot. H. A. l. 2. c. 33.*  
*Oppian. Halicut. l. 1. r. 99.*

Nam quia lapides in capite habet, & corpore est tenui, frigus exhorrescit. Quantum ad usum in cibis, Matron Parodns apud Athenæum, mediocrem succum præbere, ut saxatillum vicem supplere possint, scribit. Galenus Passicrem molliorem, perperam asserit.

Duram enim esse, vel exinde, quod diutius fervetur, longa vectura putrescat, sic melior reddatur, colligitur. Facile tamen concoqui & minimè excrementitiam esse, apud

Rondeletium lego. Patinam ex soleis apud Apicium vide,  
*Apic. l. 2. c. 4.*



PUN-

## PUNCTVM II.

## De Citharo.

TAB. XX. 14.  
 15.  
 Elian. H.  
 A. L. 1. 6. 23.  
 Oppien.  
 Halicr. I.  
 8. 98.  
 Arg. H. A.  
 L. 2. ult.

Citharus, Aeliano *αἰθάρης*, Op-  
 piano, cui litoralis est, *αἰθέρ* di-  
 citur. Nomen à lineis quibus à sum-  
 mo capite vertice, ad extremam us-  
 que caudam distinguitur, invenit.  
 Gaza, ex Aristotele, qui inter eos,  
 quibus complures appendices cir-  
 ca ventriculum exeunt, numerat,  
*Fidiculum* vertit. *Quatuor* eius no-  
 minis pisces, ex planorum genere  
 omnes, esse, Rondeletius luculen-  
 ter ostendit. Galenus planum &  
 Rhombo similem facit, & quod  
 Philotimus cum inter *πανόρρινους*  
 omiserit miratur. Aelianus Buglos-  
 so feu soleæ assimilât. Galeni Ci-  
 tharum, Rondeletius eundem esse  
 arbitratur cum eo quem Athenæus  
 ex Aristotelis libro de animalibus &  
 piscibus sic delineavit: Citharus fer-  
 ratis est dentibus, solitatus, alga ve-  
 scitur, linguam solutam habet, cor  
 album & latum: esseque illum Psit-  
 taceum piscem, qui Romæ satis fre-  
 quens, *Folio* nominatur. Cum enim  
 lingua piscibus à natura data sit of-  
 fesa, & non soluta: vel dura, spinea &  
 adhærens: isque unicus sit ex planis,  
 cui lingua soluta sit teste Aristotele,  
 contra omnium aliorum piscium na-  
 turam: haud temere sese iudicasse  
 existimar, cum ex hoc, tum quod re-  
 liquæ memoratæ notæ ex asse re-  
 spondeant, hunc verum ac genuinum  
 Citharum esse. Quod si verò quis hunc  
 Rondeletii piscem pro Citharo non  
 accipiat, quoniam squamosus cum sit  
 ex Rhombis ut pote lævi cute prædi-  
 tis, quibus à Galeno assimilatur, esse  
 nequeat: huic responsum esse volo,  
 assimilationem ad Rhombum, non  
 ad corpus, sed ad carnis qualitatē,  
 referendam esse. Aelianum verò suos  
 Citharædos squamosos facere: quā-  
 obrem etiam admittit Rondeletium  
 suum hunc piscem Rhombo quodā  
 modo similem esse dicere, cum neq;  
 tegumento, squamosus enim est: neq;  
 figura, oblongus enim; respondeat:

quare prudenter subiunxit, Buglosso  
 similiorem esse, si squamæ accipias,  
 quæ Citharo magnæ sunt, Rhombi  
 instrumenti figura. Ab hoc Aristote-  
 lis Galenique Citharo differre putat  
 idem Rondeletius, eum qui Arche-  
 strato apud Athenæum rufus sive sub-  
 flavus cognominatur, assandusque &  
 cafeo multo, oleoque condiendus ef-  
 se dicitur, qui sine sumptu apparari  
 non potest: esseque eum quem alii ve-  
 rum Buglossum esse volunt, non ob  
 figuram solum, sed etiam ob asperita-  
 tem: Est enim bovis lingua magna &  
 aspera, quomodo buglossum herba  
 etiam nomen invenit. Superiori simi-  
 lis est figura, lingua magis soluta, oris  
 scissura magna, dentibus serratis,  
 squamis inæctus rotundis, aquarum  
 asperitate *Citharum asperum* etiam ap-  
 pellari posse existimar, buglossiq;  
 nomine comprehendi. Virgam habet à  
 capite ad caudam prorensam, latius-  
 culam, maioribus squamis constan-  
 tem. Partibus internis superioribus  
 similis est. Venetiis optimus repeti-  
 tur. Carne est inter duram & mollem  
 Galeno media. Stomacho ingratus  
 malique succi Xenocrati. A Dioele  
 assus commepdatur. Rondeletius,  
 quod salpæ modo alga pascarur in-  
 suaviorem prodidit. Apollini qui Ci-  
 tharum invenit sacrum, apud Athe-  
 næum legitur.

Athen. Di-  
 prof. l. 7.

## PUNCTVM III.

De Rhomboide Rondeletii,  
 & Passeribus squa-  
 mosis.

RHOMBOIDES Rondeletii, TAB.  
 Rhombi nomine Romæ ab ich. XX. 16.  
 tyopolis venditur. Fortè melius, *Alberand*,  
*rotundus Buglossus*, vel *rotunda solea de piscib*,  
 aut *lingulara* vocaretur. Squammis *l. 2. 45*.  
 parvis integitur. Oculi multum invi-  
 cem distant. Linea à capite ad cau-  
 dam per medium corpus ducta in-  
 itio sinuosa: dein recta, corpus in  
 duas æquas partes dirimit. Cor-  
 pore est exiguo & brevi: nunquam  
 M enim

enim palmi magnitudinem superat, quantum Rondeletio licuit observare. Internis partibus à Rhombo non differt. Carne est media, neque molli nimium, neque dura. Eius nullam à veteribus mentionem factam fuisse credit. Junius in suo nomenclatote Belgico vocat Scarde. *PASSERVM SQVAMOSORVM* tres idem Rondeletius species ponit. *Priorem Limandam* Galli dicunt, ob corporis tenuitatem, ut Bellonius conjicit, quam cum diffusis dolabta asferibus communem habet, Anglium Brut. Hic, teste Junio, Batavorum Grieta est. Ego enim id non satis memini. Flavas in pinnis, quæ corpus ambiunt, & in reliquo corpore maculas habet. Linea corpus intersecans, sinuosa. Magnitudine ad Quadrantulum (de quo mox) accedit. Lucidiori acri expositus, pellucidus videtur. Dentes teste Bellonio inter ceteros sui generis pisces, longiores habet: squamas conspicuas valde tenues atque asperas, quæque difficillime cuti adimuntur: quod cum solea quidem magis, cum ceteris vero minus, commune habet. Vento indurati ingenti quæstu ad mediterranea loca Germaniæ superioris venales feruntur. Gallis ex Britannico litore recentiores adducuntur. Italice planè ignoti sunt. Carne aiunt esse candida, humida, molli, parum glutinosa; non multum Buglossis sive Soleis infertiore.

*Altera species Gallie Fleæ*, Anglis Phlonder teste Bellonio, qui *Fleæm fluviatilem* vocat, verum improprie; & contra piscis naturam: non enim in fluminibus nascitur, sed in mari, ex quo in flumina migrat, ceterorum planorum more. Corpore est, quam vulgaris passer, paulo longiore, & ubi adolevit, crassiore. Squamis integitur parvis: colore est nigro. In corpore pinnisque in ambientibus maculas rufas habet. Officulis munitur in capite, medioque corpore in parte supina.

*Tertiam* Britannii *Heilbut* dicunt, Hollandi *Heilbut* vel *Eelbut*, Germani *Heiligbut*, Galli *Fletelet*, nomine (ut apparet) diminuto à *Fleæ*, cum alioqui sit maior, cetera similis est. Utraque in Anglia & Belgio frequens: nobis, Gallisque & fortassis antiquis etiam incognita, quia ad Oceanum usque non pervenerunt, nec in Oceani piscibus cognoscendis multæ opetæ studiisque posuerint. Utriusque caro candida & mollis, salubris & delicata: *Fleteletus* tamen paulo durior est.

### CAPUT III.

#### *De Piscibus littoralibus levibus.*

#### ARTICVLVS I.

#### *De Piscibus littoralibus non planis.*

#### PUNCTVM I.

#### *De Sanditz Anglorum.*

**P**liscis, quem jam descripturi sumus, Anglis *Sanditz*, id est *Angulus de arena*, tum quod longo sit corpore, tum quod sese occultatur sub arenam se citissime mergit, dicitur. Gesnerus *Ammodysen* vocabulo Græco vocavit. Capite est tenui ac rotundo, rostro longiusculo & acuminato: ore parvo: corpore reliquo oblongo, si latitudini conferatur. Nam cum eius medium (caput enim & cauda arctiores sunt) pollicis crassitudinem non superet, longitudo ad palmi mensuram extenditur. Quamobrem sicuti longis, sic etiam & parvis annumerari piscibus debet. Cum neque pollicis latitudinem, neque palmi longitudinem excedat unquam. Dorsò præterea (in quo pinnae duæ reperiuntur, in eo medio

TAB. XXI. 1.  
Altor. de  
Pisib. 1.2.  
40.

medio una, ac prope caudam altera) subcaeruleus. Ventre verò in quo præter binas, quas utrimque habet pinnas, una etiam alia post excrementorum orificium subsistit atgenteus conspicitur. Frequentissimè in Britannia littoribus capitur. Sæpè etiam in Bononiensi, ubi idem nomen obtinet. Quibusdam anni temporibus, seu maiorum piscium iniurias fugiens, seu naturæ impulsu, aqua derelicta, sub arenam penetrat: inde pedibus & pectinatis incisus lignis, ab incolis extrahitur. Pauperum duntaxat necessitatibus inservit.

Huc pertinet alter piscis *Mersungus* id est, *Porci* marini nomine missus, quod Porci more rostro terram fodiat. Lituris & specie corporis Lucium imitatur, sed aculeum rectum in fronte gerit. Lituræ omnes nigrae sunt. Pinnæ ventris, caput supinum & cauda rubent: cætera flavescit. Marinusne verò, an dulcium aquarum piscis sit, non satis memini, quamobrem histotia ad priorem piscem pertinet. Marinum tamen esse nomenclatura docet.

## PUNCTVM II.

*De Dracone.*

TAB. XXI. **D**RACO piscis, Græcis veteribus *Drakō*, modernis *Anguilla*, unde Siculi, Neapolitani, & Romani suum *Tragine* deflexerunt, dicitur. Iovius *Trachurū*, qui in eauda, non cervice aculeos habet, perperam vocavit. Plinius qui Draconis marini nomine duos diversos pisces, ut ex libro nono capite vigesimo septimo colligi potest, intelligit, quorum unus serpens marinus est, quem Aristoteles libro nono capite decimo septimo describit, ab Araneo male specie distinct, quem & Isidorus, qui Araneum ita describit, ut Draconi huic marino omnia competant, securus est. Quod ab Araneo Aristotelis distingui debeat,

mirum non est, cum eius Araneus, à nullis Græcis authoribus venenatus esse tradatur: hunc omnes post *Pastinacæ* venenosissimum asserant.

Salvianus duo ipsius generas ponit. *Primus* piscis est oblongus, & ut Bellonius ait, forma pugionis modò compressa, unde à quibusdam Gallis *Poignaste* vocatur quasi pugio. Salvianus squammis caret, dicit item Bellonius, vel saltem exiliores habere, quam sint serpentium. Rondeletius parvas ei tribuit ac renues, *Ælianum* (ut apparet) secutus, qui asperas habere scribit *quidam* quæ sete serpentibus tribuuntur, & ipse etiam Rondeletius sine squamis & planè nudum Draconem pingit. Petcam marinam quodammodo tefert capite, magno scilicet & rotundo. Os non in longitudinem, sed in obliquum, nec recta sed curva scissura filium habet: Connexa enim latera inferioris maxillæ (quæ paulò longior est superiore, nec recta nec oblique sursum portigitur) à concavis superioribus lateribus, dum illud clauditur, suscipiuntur. *Dentibus* ut in Dracone serpente id communiter est. *Oculi* magni sunt, quibus magnitudine supercilia respondent, sursum spectantes, ac a deo splendide virescentes, ut smaragdum pulcherri-  
ma viriditate superent, iidem brevi intervallo à se distant, in quo triangulum expressum & aculeos parvos cernas. *Branchiæ* utrinque quarernæ, quarum exteriora opercula aculeo ad caudam spectante armantur, ut dictum est: quæ opercula post articulationem eum ossibus capitis, tenui membranæque simili substantia potius quam ossa constant, quamobrem Draco ea cum extra aërem trahit, inflat, non aliter quam nos buceas inflammas. Ad branchias *pinna dua*, eo situ, ut in fluviatilibus, hoc est, inferiores multo quam in marinis esse solent: inter has & scissuræ oris finem, in parte superna, dux aliz minores, candidæ. In cervice vel dorso principio quinque ha-

M a bes

TAB.  
XXI.  
Draco  
piscis.  
Anguilla  
marina.

bet *aculeus* tenues, nigros, præacutos, tenui membrana anteriori parte nigra, posteriori vero alba connexos, quibus venarum vulnus infligit, multoque perniciosius quam branchiarum aculis. Ab hac, pinna incipit ad caudam usque continuata, quæ magna est, lara, atque adeo bifurca, Alia denique est à *podice* ad caudam etiam usque: qui diverso in hoc quam in aliis piscibus loco situs est: cum enim animal in medio eum habeant ventre, alij vero inferius versus caudam, in Dracone non procul à branchiis distat: unde fit quod brevis admodum ventris eius sit capacitas interna, cum tamen carnosus sit & satis amplus *ventriculus*. Colore est vario. Dorsum enim fuscum est, ventre candido, lateribus lineis aureis transversis pulchre distinctis. *Alter* qui torte non malè Dracunculus Plinii vocari poterit, quemque Salvanus minorem vocat, in nonnullis à priore differt. Cum enim maior crebrò ad libram unius & duarum etiam aliquando magnitudinem excreseat, (Rondeletius in Oceano aliquando cubiti magnitudinem attingere tradit) minor ne dimidiam quidem libram implet: præterea capite & corpore reliquo non rotundo, ut maior; sed in latera compresso est: cuius denique latera non subluteo solum colore, quo maior ille insignitus est, sed frequentibus etiam & obliquis ad cæruleum colorem vergeantibus lineis pulcherrime depicta sunt. Aldrovandus *quatuor* Draconis species exhibet. *Prior* aculeo ad branchias, pinnarumque numero cum præcedenti convenit, colore vero & maculis lineisque differt. *Offa* branchiarum colore sunt roseo, sed in extremitatibus aureo. *Aculeus* item aureus, sicuti & pinnae, quæ sunt ad branchias: quæ vero in pectore conspiciuntur, albicant, cæteræ subvirent. *Os* pronè quoque viride, supinè albicat. Dorsum ex subviridi fuscescit, maculis rotundis ad castaneum vergeantibus densissimis conspersum, *Venter* argenteis lineis crassiusculis contratio in vicem ordine oppositis decoratur.

Aldrovand.  
Lc.

Cauda tota ex cæruleo ad amethystinum tendit. *Alter* species invertice insignem habet aculeum; colore est in dorso subcastaneo, ventre albo, valde maculosa. Pinna cervicis inter quatuor priores culcos in summitate atra est, cætera fusca: quæ verò ad caudam usque prorrahuntur, & cauda etiam ipsa, coloris ferè sunt violacei. *Tertia*, capite est castaneo, præter os quod pronè supinèque ferè violaceum est. Oculi, in vertice ferè ut in Callionymo, inrer duos locati aculeos. Pinnae branchiarum & pectoris, item quæ in ventre est, roseo sunt colore: Quæ verò in cervice cernitur, ad quartum usque aculeum violacco, cætera albicat, & rotundas, fusci coloris maculas ostendit, quemadmodum & subsequens, quæ ad caudam usque excurrit. Dorsum ad castaneum vergit, & nigricantibus maculis insignitur. Latera & venter viridescunt. *Quarta* ac *postrema*, magna ex parte castanei est coloris, dilutioris in capite, infensioris in dorso. Lineæ quæ ad branchias sunt ad caudam usque plane ferrugineæ. Tota pars supina candicat. Pinnae ad branchias & ad pectus, rubrae sunt: cæteræ cæruleæ, sed aristas habent rubras. Cauda præterea in extremo ferruginea est. *Locum* si species, Bellonius pelagium quæ ad littoralem scribit. Aristoteli simpliciter talis est. Oppiano in petris, & arenis pascitur. Loliunculis & aliis minutis piscibus vescitur, ideoque Nicander *disipiscum*, *maris vastatorem*, Epicharmus *ἀδραπος* nominat. Gregalè non esse vel inde cõjicies, quod nunquam plures capiantur. Mirò etiam, si verum est, si manu dextra attrahere coneris, violentè renititur: si sinistra, cedere & capi, quod *Alanus* prodidit: nec minus, eo tempore cū pisciū genus amore tenetur, in vulnere quod iste inflixisset, pisciculos illi similes procreatos fuisse, quod multorum piscatorum testimonio narrat Gillins. Idem eius venenatum esse, piscatorum periculo certum est, sæpe nomas, sæpe febres & inflammationes excitat, plusque à vivo quàm mortuo periculi. Remedia varii varia ostendit. Plinius Mullus

Alanus, Ha.  
A. 15. 6. 379  
1500-1



Sanchis Anglorum.

Tab. XX.

Draco marinus major.

Griffin. Meer Drach.

Dracunculus ar-  
nisi Species.

En Art. Meer Drach.

Draco minor.  
Arcturus Randal.

Kleiner Meer Drach.

Arcturus.

Meer Drach.

Arcturus minor.

Dracunculus.

Kleiner Drach.

Phronopsis.

Starrfisch.

Starrfisch.

Scorpaen.

Morrell.

Tachurus.

England Morrell.

Arcturus pinnigrisus Paken.

maris.

Morrell.

Meer Heide.

Scorpaen. alius.

Saur.

Meer Heide.





Mullus illitus aut in cibo sumptus prodest. Dioscoridi & Galeno Draco proprio ictui applicatus placet. *Eginxeta* cerebrum piscis in potu præscribit & sulfur cum aceto imponit. *Actius* locum affectum cum plumbo fricari iubet. Piscatorum experientia jecore illito dolor mitigatur, foliorum lentisci affricu punctura curatur. *Genoenses* exiguum *Thlaspios* genus, quod in ipsis littoribus nascitur, admovent. Recentis piscis è capite cinis, contra omnia venena prodest, mirabili discordia, si *Rondeletio* credimus. *Plinius*, ossibus gingivæ scarificare iubet, ut dentium dolores sedentur.

## PUNCTUM III.

## De Dracunculo.

**D**RACUNCULI *Plinius* inter veteres meminit. Inter Recentiores à *Rondeletio* deferbitur. Est piscis marinus inquit, dodrantali magnitudine, corto fluviatili non multum absimilis, rostro acutiore, & capite latiore, Ranæ etiam piscatrici quodammodo similis: sed *Rana* piscatrix ore est majore, pinnis concoloribus, quæ in Dracunculo variæ sunt. Capite est magno, compresso, rostro prominente, ore parvo sine dentibus, sine ulla ad branchias scissura; sed huius vice supra caput utrumque foramen est, ut in Hippocampo, quod, nisi dū piscis vivit, eoque aquam trahit, & emittit, manifestum est. Oculos magnos supra caput positos habet: capitis os in aculeos desinit ad caudam spectantes. Pinnas longissimas pro corporis magnitudie habet, partim aurei, partim argentei coloris emulas. Quæ ad branchias sitæ, aureæ sunt, in radice argenteæ. Quæ in supina parte, à cæterorum marinorum piscium pinnis, sive magnitudineque dissident: nam & ori propiores sunt, & longiores ijs quæ sunt ad branchias. In dorso dux eriguntur: prior (hac in pictura vix apparet) parva est, aurea & argenteis lineis distincta; posterior magna admodum in medio dorso, papilionum alis non valde dissimilis, radiisque quinq; hordei aristis similibus,

membranaque constans. Radij priores longiores sunt, posteriores breviores, contra quam in membrana, quæ singula radiorum intervalla, veluti intertexta occupans paulatim crescit. Eadem quoque varia est, lineis etiam argenteis in medio duarum nigrarum sitis distinguitur. Hæc in medio dorso cavo veluti in vagina conditur. *Alia* est à podice ad caudam, etiam aurea demptis eius fimbriis, quæ nigricant. Corpus totum sensim gracilius sit, & in pinoam lōgam terminatur, cuius fimbriæ nigricant. Est & picto corpore: nam ab huius medio, argenteæ lineæ ad ventrem ductæ sunt. In maxillis partibusque anterioribus veluti punctis argenteis notatur. Ventre est lato, plano, candido, curricula tantum tegitur. Capitur in *Agetesi* littore, inprimis *Caniculæ* vigenis tempore. Venustas & summum Dei in eo artificum pretium ei fecere. Carnis substantia *Gobionibus* parvis similis est, iisdem alienentis vescitur. Ictum minus venenatum habet.

Item Dracunculi Tabula XLV. 2.

## PUNCTUM IV.

## De Uranoscopo.

**P**ISCIS, quem *Uranoscopus* seu cæli speculatorem dicimus, *Aristotele*, *Dioscoridi*, & *Aeliano* *καταμαρτυροῦν*, *Theodoro pulcher* dicitur, notam ob corporis pulchritudinem, deformis enim est; quam vel quod *Uranoscopi* nomen sit pulchrū, & homine quā pulce dignius; *Massilientes Tapecon* quod, cum pessi instat conformatus sit, aliquam cum pudendis similitudinem habeat; & *Rassacan*, quod caput ob asperitatem ad scalpenda pudenda muliebria accommodari possit vocanti *Oppianus* *ἰμπεριότρον*, quod interdū dormiat, noctuque vigilet, *Helychius* & *Varinus* *ἰμπεριότρον* seu *Arenarium* dixere, quidam *ἄγρον*, id est, castum, *Athenæo* vocari credit, sed mendum subesse putat *Gesnerus*. Piscis est levi cute, eq; dura, & quæ facile excoriari potest, præditus corpore fere rotundo: capite magno osseoque & duobus aculeis ad caudam spectantibus aspero, quo *Rana* piscatrici.

Actius L. 13.  
p. 36.Aldrov. de  
Piscib. L. 2.  
p. 30.TAB.  
XXI. 6.TAB.  
XXI. 7.  
Arist. H. de  
L. 8. c. 13.  
Aelian. H.  
A. 13. c. 41.

seaticem quodammodo refert: ver-  
tice admodum lato.

*Rostro* quodammodo caret. *Os* alio  
quam in aliis piscibus fieri solet, lo-  
co situm est, nimirum supra caput, &  
(ut Oppianus ait) inter medios o-  
culos: estque magnum & valde pa-  
tulum & inferiore maxilla sursum  
maxime attracta clauditur. *Dentes*  
habet exiguos, *linguam* brevem sed  
latam, quæ internas oris partes ita  
occupat, ut nisi digito eam compri-  
mas & submoveas, non videantur.  
Ex ea parte quæ inter linguam est,  
& maxillam inferiorem oriitur, teste  
Rondeletio, *membrana* in principio  
latuscula, sensim in carnosam rotû-  
damque apophysin desinens, extra  
os propendens qua pisciculos allicit,  
allectos devorat. Eandem cum vul-  
retrahit, & exerit, veluti serpens lin-  
guam. Pars inter oculos interieciens  
depressa est & concava. *Branchiæ* u-  
trinque quaternæ sunt, quarum os-  
sea opercula, posteriore parte acu-  
leo robustissimo ad caudam spectan-  
te horrent. Iuxta branchiarum scis-  
suram *pinna* duæ magnæ & robustæ,  
crassæ, & mucosæ & varix exorun-  
tur. Subsupæ in parte supina duæ aliz  
minores, albæ, maxillæ inferiori  
propinquæ. Has pinnas sequitur os  
veluti sternum, quod tribus aculeis  
horret. Succedit pinna alia à podice  
ad caudam. In dorso duæ sunt, qua-  
rum prior capiti propior parva est &  
nigra, ut in Ateone: posterior ad cau-  
dam eandem usque porrigitur, dorso  
concolor.

Cauda in pinnam latam desinit,  
Pavonis caudæ dum piscis vivit, æ-  
mula in, sinitur purpurascent, *Ven-*  
*ter* est subalbidus: dorsum vero ac  
partes reliquæ ex cineraceo fulcæ  
aparent, qui colores, dum vivit  
manifesti sunt, alioqui una cum vita  
pereunt.

A capite lineæ duæ ex squamulis  
constantes ad caudam protendun-  
tur. *Ventriculus* amplus est, cras-  
sus & carnosus, cum appendicibus  
plurimis, *intestina* ter revoluta, he-  
par, candidans, à cuius exeriore par-  
te fellis vesica pender, admodum  
magna pro corporis ratione, felle

valde distenta, quod substantia &  
colore oleum æmulatur: cuius rei  
meminit Plinius, nulli piscium hoc  
copiosius esse scribens: erat autem  
Menandri auctoritatem in comæ-  
diis, immemor fortassis eiusdem mē-  
tionem fieri ab Aristotele, qui nempe  
Callionymo in iccore fel inesse  
tradidit proportionem corporis om-  
nium copiosum: addit Ælianus hunc  
philosophi locum recitans, jecur ip-  
sum tradere ad dextrum latus col-  
locatum esse Menandrumque huic  
rei testimonio esse in Melenia, his  
verbis: *Facite te fel habere Callionymo*  
*copiosius: item Anaxippum in Epidi-*  
*cazomeno dicentem, nisi moveas &*  
*sic ut Callionymi fervere efficiat omne fel.*  
*Item exiguus, rotundus atque ru-*  
*bens ventriculo hæret. Fulva bifida*  
*est & longa,*

Non multum excrevit, & raro  
edalem longitudinem excedit. *Lir-*  
*teralem* esse Aristoteles prodidit, post  
eum Rondeletius, Carne vescitur,  
& pisciculis apophysi illa quam ex-  
tra propendere diximus, insidias  
struit. Adnatar tanquam ad ver-  
mem, & capiuntur. Si cibum capto  
obieceris, eo usque se infareit, ut ci-  
bus ad ipsum os redundet. Adeo vi-  
vax est, ut si omnibus internis spoli-  
es, moveatur adhuc. Comeditur  
à plebeis, quia virosi odoris est, unde,  
Bagic gravis Diphilo apud Athenzū  
vocat. Nec mirum, cum cernosis  
aquis vescatur. Hippocrates tamen  
non solum non improbat, sed & in  
victu præscribit. Nonnulli felle ocu-  
los Tobæ curatos fuisse volunt. Ci-  
catrices unare & carnes oculorum  
supervacuas consumere Plinius tradi-

## PUNCTVM V.

### De Trachuro.

*Trachurus* seu ut Oppianus & Ga-  
lenus scribunt, *Trachurus*, quo no-  
mine apud Larinos veniat, ignora-  
tur. Lacertum malè vocari vel exin-  
de patet, quod iste *Trachurus*, si pro pe-  
culiari specie accipias, vocatur. Ma-  
lè & *Trachurus* dici Oppianus, qui tan-  
quam

Arist. H. A.  
L. 2. c. 15.

Arist. H. A.  
L. 2.

Aldrov. III.  
stor. Piscium  
L. 2. c. 51.

Hippocr. L.  
de affec.  
intern.

TAB.  
XVII. 11.  
Aldrov. de  
Piscib. L. 2.  
c. 51.  
Oppian.  
Hal. L. 1. c. 106.

quam diversos pisces appellat, restat. Forma eius nisi paulò longior esset, *ovata* dici posset. Cum enim eius medium corpus latiusculum sit, deinde utroque versus arctatur, donec rostrum ore clauso, atque extrema pars caudæ carnea, acuetur. Inferior autem maxima, quæ superiore paulo longior est, cum os clauditur, non recta sed oblique sursum excurrit, unde os etiam non in longitudinem, sed in obliquum scissum est, dentibus adeo paucis & minutis munitum, ut edentulum videatur: rævratamen maxillarum pars denticulata est. Est autem ut Scombei admodum magnum: item oculis, ut in Melanoto. *Branchia* utrimque quaternæ. *Pinnæ* nascuntur quatuor, quarum duæ maiores ad branchias sitæ sunt, duæ alie minores in ventre: alie item duæ in dorso eriguntur; prior latior & brevior, in eminentiore dorso: altera paulo inferius arctior, sed longior, nam per dorsum reliquum fere usque etiam ad caudam porrigitur. *Podex* in medio ventre est, à quo alia denique pinna ad caudam usque demittitur. *Cauda* autem bifurca est, similis *Acus* vulgaris. In medio corpore *lineam* habet à capite ad caudam deductam, multis ossiculis, ita horridam, ut seta esse videatur, non rectam quidem sed media sui parte inflexam & obliquam, in cauda eminentiorem, asuperioremque quam in aliis partibus, quæque ob id *caudam quadratam* efficiat. Squammis catet, *levitantum* cute præditus. Dorso subæruleus, ventre verò & lateribus argenteus est, puerpenteoque aliquantulum emenititur, ut inde *anotia*, id est, varium forte dixerit Numenius. *Trachurus*, cuius hic iconem damus, colore fere est albicante, aut eis ubique lituris varius. Cauda ex violaceo fere ad cæruleum vergit. Ad pedalem magnitudinem petaro excrevit. Versantur circa littora. Numerosi omnibus anni temporibus fuerunt, quod veteribus apud *Oppianum* sævum, seu tetibus quod hodie in usu capiuntur, ut inde gre-

gales esse conicias, & Romæ *Friculæ* nomine venundantur. *Ælianus*, *Ad. 13. c. 27.* equam in utero habentem, si ei cauda *Trachuti* appendatur, piscis mox libet in mare dimittatur, non multò post arborum pati, prodidit, vete an fallo non dicam. Inter duræ carnis pisces, à *Philotimo* censentur, ideo *Diocles* apud Athenæum aridos vocat. *Æthenæus* *Dign. 1. 7.* forte extetnapinguedine, aut iuscullo tenet aut iurulentus fiat. *Galen. de Alim. facult. 1. 3. c. 31.*

## PUNCTUM VI.

## De Scombro.

**Q**ui Græcis *σκόμβος*, is Latinis *Tab. Scomber* & *Scombrus*, *Horat. XXIV. 9.* *Piscis Iberni*, plerisque nationibus, *9. 18. 11.* *Macarel* & *Magneæ* non tam à Græco *μαγρέλα*, quod *Scalgeto* placet, hoc enim nomen is potius conveniret, qui veteribus *Opsophagus* Dii vocantur: quia, leno, quæst, quod vetero tempore parvas *Alautas*, quas virgines dicunt, subinde subsequi soleant, dicitur. *Corporis* est tectre, denso, carnoso, utrumque in acutum desinente, *rostris* scilicet atque corporis extremo, cui cauda annectitur: & si parva magnis cõparare licet, *Thynnus* (ut *Scholias* *Arist. phanis* scribit) similis. *Orii* scissura ingens pro corporis portione *identes* exigunt: *caput* rotundum: inferior maxilla in superiorem recipitur, & clauditur pyxidismo. *Oculi* magni, aureo colore micantes. *Branchia* utrimque quaternæ: iuxta quas pinnae binæ, totidemque in ventre. A *podice* alia est, eique supra posita in dorso similis: quas ordine certisque intervallis, aliquot alie pinnulae subsequuntur, quod tamen huic soli proprium non est, sed cum *Thynnus*, *Pelamydibus*ve commune. Alia denique est in dorso initio aculeis nonnullis horrida.

*Cauda* in lunatam pinnam degenerat. In ipsis aquis sulphurei coloris est, extra non qui cætetis, (ut *Plinius* ait) sed setæ cærulei, sulphureum autem colorem quem intelligat, alias

lias explicat, inquit: Fulmina & fulgura, sulphuris odorem habent, ac lux ipsa eorum sulphurea est. Est vero caruleus ille eorum color porissimus in dorso: nam venter lateraque argentea sunt. Totus lineis nigricantibus, obliquis, insignis est: squamisque caret, licet apud Athenam squammatum esse quispiam velit, negandi vacula videlicet libranis omissa. Ad cubiti magnitudinem accedit. Sunt *mari peculiare*, & aliquando iuxta arenosa littora degunt, sæpe in petris, quæ chamis & patellis plenæ sunt. Etsi autem tam in Oceano quam mari mediterraneo, sinu Adriatico, & Hellesponto, capiuntur: iuxta Herculis tamen insulas, prope Carthaginem novam tam copiosi & frequentes sunt, ut una earum Scombraria est. Scabone dicatur: In Oceano tanta crassitudine proficiunt, ut paricum Pelamydibus magnitudine, auctore Bellochio evadant, in Adriatico parvi sunt. Existimavit aliquis in minore maris ambitu frequentes prædas exerceri, ideo non crescere. Vix ad Tergeste adeo proximum sinum comparent Scombræ: atque ilico capiuntur. In Oceani laxitate fuga moram, mora parit incrementum, ideo grandescunt quia non capiuntur. *Gregales* † sunt, & à locis † frigidioribus calidioribusque, tanquam Thunni, ut qui imbecilliores, dulcioris pabuli gratia, discedunt. *Beneficium* memores esse, *Ælianus* exemplo singulari, prodidit. Mane à piscatoribus cibari, seras Scombro gentiles suos cogunt, & corporum suorum abiectione ira concludunt, ut fuga sibi consulere non possint, hinc capiuntur. *Inferiunt* & *mensis*. Diphilus levis esse, & facile è stomacho descendere dixit. Hicetius multum nutrire, minus verò facile excerni indicavit viscosiores & crassiores, concoctu difficiles, & excrementitios esse, experientia eos docuit. Venetis verno tempore quo pinguiores sunt, in delictis habentur. Romæ ob siccitatem inter ignobiles reposuit. Quia graves & ventriculo refractarii, *negotiosus*, id est, sale in-

veterari scripsit Athenæus, habenturque inter *negotiosos* optimi. Veteres ex iis *garum* quoddam habebant, de quo ita Plinius. Est etiam num liquoris exquisiti genus, quod garum vocavere, intestinis piscium exterrisque, quæ obicienda essent, sale maceratis, ut sit illa putrescentiæ fanies. Hoc olim conficiebatur è pisce quæ Græci Garum appellabant (ut supra ostendimus) Nunc è Scombro pisce laudatissimum in Carthaginis Spartariæ extariis: sociorum appellatur singulisque millibus nummum permutantibus cogens peno binos: Nec liquor ullus pene præter unguenta maiore in pretio esse cepit, nobilitatis etiam gentibus. Scombro quidem & Mauritania, Bæticaque & Carthæa ex Oceano intrantes capiunt, ad nihil aliud utiles: Laudantur & Clazomenæ gato, Pœnæique & Leptis, sicuti maria Antipolis ac Thurij: jam vero & Dalmatia, Vicius huius (garum enim pe, non muris, ut Rondeletius vult) est alex, imperfecta nec colata sæx. Cæpit tamen & privatim ex inutili pisciculo, minimeque confici, Apum nostri vocant: Foroiulienfes piscem ex quo faciunt Lupum (super quo nostrum iudiciū supra diximus) appellant. Transiit deinde in luxuriam, creveruntque genera ad infinitum: sicuti garum ad colorem multū veteris, adeoque dilutam suavitatē, ut bibi possit. Aliud vero ad castimoniarum superfluitionem, etiam sacris ludæis dicatum, quod sit è piscibus squama carentibus (*legendum apparet non carentibus, nam ludæi hodieque nisi squammosos edunt, & non squamosos, abstinent, ut duo garisint genera, unum è squamosis, ut ex Lupo sive Encrasiculo, Manag, & Smaride consimilibusque alterum ex lavi ente pradiis, ut ex Scombris*) hic lex pervenit ad ostrea, urticas, gammaros, Mullorum iecinora, innumerisque generibus ad saporem gulæ cepit sal tasecere. Hæc obiter indicata sint desideris vitæ, & ipsa tamen nonnulla usus in medendo. Huius usus apud nos desit, apud Turcas Constantinopoli non item: quia pisces plerof-

*Staliger. in Exercit.*

† *Arif. H. A. J. 9. c. 2.*  
† *Arif. H. A. J. 8. c. 12.*  
† *13.*  
*Plin. H. N. 1. 9. c. 15.*  
*Ælian. H. A. 1. 14. c. 1.*

*Plin. H. N. 1. 3. c. 8.*

plerosque frigos vendunt, iis intestina & branchias eximunt, immitruntque murix, ut in garum vertantur. Sociorum verò Garum vocatur, seu quod ganeones & lurcones eo sociatione uterentur, ut quidam Galeni scholiasies putat, seu quod à sociis populi Romani, Hispanis nempe deferretur. Fæcosum ac plane fœtidū fuisse, faciliè Martialis indicavit, dum dicit

*Vaguentum fueras, quod Onyx modo parva gerebat,*

*Nunc postquam olfecit, Papilus, ecce garum est.*

*Ælian. H. A. l. 2. c. 46.* *Usum in Medicina* si species, arquato morbo correptis comestos opipulari *Ælianus* scribit in aceto putrefactos mulieres strangulatu oppressas excitare Plinius.

## PUNCTUM VII.

## De Colias seu Lacerto.

*TAB. XXVIII. 12.* *Aldey de Pysib. l. 2. c. 45.* *Arif. H. A. l. 9. c. 2. l. 8. c. 13.* *Columell. R. R. l. 8. c. 13.* *† Arif. H. A. l. 5. c. 9.* *† Arif. H. A. l. 8. c. 13.* *† Galen. l. Alim. facul. Marcial. l. 7. c. 13.* *Dionys. L. 3.* *Piscis* quem *καλιας, καλιας, & καχλιας* in vulgatis Aristotelis exemplaribus, seu a. pica varia, quam *καλις* aut *καλιας* dici, nescio quo auctore Bellonius credit, quod variegata latera habeat, unde *καλιγεραι*. *Athenæo*, seu aliam ob causā vocatur. Theodoro *καλιδ*, seu *Monedula*, & *Graculus*, Latinis ut C. Celfo, Columellæ, ac Martiali, *Lacertus* audit. Magnam eorum cum Scombris affinitatem esse, non tantum inde colligere licet, quod ab Aristotele & Columella semper simul nominentur: sed etiam quod Lemni incolæ magnitudine duntaxat à Scōbris differre asseruerint, & Plinius Coliam Lacertorum minimum faciat, quod & apud Athenæum, qui Sardam Coliæ magnitudine esse scribit, habemus. Pariunt semel † anno. In cibis laudantur, qui in Propontide † antequam pariant, Amyclani, Hispanis quos † Sexetanos (Sexi auctore Plinio, Bœticæ Hispaniæ oppidum est) Martialis vocat, ex quibus forte Salsamentum. Gaditanum, cuius apud Hippocratem mentio, & Paris seu Pariani, unde Parium apud Arcestratum nutrit Coliatum dicitur. De Carnis qualitate non conveniunt Auctores. Xenocrati est

stomacho ingrata, arida, mali succi, excretu facilis, & copiosè nutriens. Athenæo glutinosa, acris, mordax, & deterioris succi. Cornelio Celfo, gravissimi alimēti. Saliri solitas apud Martialem invenies. Muria ad dentium dolores Medici utuntur. Patinam ex Lacertis apud Apicium vide.

## PUNCTUM VIII.

## De Sauris.

*TAB. 13.* *Aldey de Pysib. l. 2. c. 55.* *Ælian. H. A. l. 2. c. 25.* *Quem Saurum Græci vocat, hunc* *Plerique Latini Lacertum* vocant, *XXL 13.* A Trachuro distingui vel exinde patet, quod & Oppianus de Trachuro & Sauris tanquā de diversis piscibus agit; & Speusippus apud Athenæum Acui & Sphyræna similem esse, quod Trachuro non convenit, scribat. *Duo* eius esse genera *Ælianus* tradit, videlicet *nostras*, & *peregrinum*, in rubro mari nascentis: *Nostras* caput habet *Ælian. H. A. l. 2. c. 25.* (inquit Salvianus) tenne & rotundum; rostrum oblongum, & acutum. *Os* magnum plurimis atque exiguis dentibus munitum: *Oculus* mediocres, rotundos & aureos: *Branchiæ* utrimque quatuor: prope quas binæ & parvæ sunt *pinnæ*, utrimque scilicet una: *alæ* duæ & maiores in ventre; in medio dorso una haud magna quinque senisve aculeis horrida erigitur, aliaque una multo minor in medio dorso caudæ vicina reperitur: de cuius regione abano, qui in hoc pisce caudæ satis proximus est, alio paulò maior imo ventri hæret. *Cauda* in unam lunatam pinnam degenerat. Corpus oblongum est & rotundum. Unde non ineptè à Speusippo in secundo similitum, Sphyræna, Acus & Saurus similes esse dicantur. Sphyræna enim satis similis est hic noster Saurus: similis & Acus, si Acus illam rostri dempseris tenuitatem. *Ventre* est subalbido, lateribus luteis, dorso ex viridi nigricante, maculis quam plurimis virentibus, rubeis, cæruleis, luteis atque nigricantibus, dorsum, caput, & latera, nonnullorum serpentum instar, variè admodum pingentibus: Quamobrem non solum ore, rostro, capite, atque reliqua corporis figura, sed colorum etiam

iam varietate proximè adeò ad terrestres Lacerti accedit similitudinè, ut ei similimus, si pedes exceperis, videri possit. Ventriculus habet oblongum & satis magnum: appendices non multos: intestina mediocria: hepar bifidum, & subrubeum: Lienem subatrum. Pedali mensura majorem adhuc non vidimus. Ab hoc nostro Sauro aliquantulum diversus est, qui in rubro mari reperitur, quem his verbis describit Ælianus: Rubri maris Saurus (interpretis reddit Lacertum) est, cuius magnitudo ei qui nascitur apud nos, æq̃ alis est virgatus, spectatur, lineis nimirum aureolis circumdatur à branchiis ad caudam pertinentibus, quas media argentea distinguunt: ore est hiante, maxilla inferior eminet in superiorem, virides oculos habet, quos aureo fulgore palpebræ ambiunt. Ab hac delineatione non omnino abhorret peregrinus iste piscis, supinè subviridis, prone castaneus, lineis sive lituris, maculisque orbicularibus subviridibus decoratus. Rictum oris habet maximum, Lacertorum terrestrium plane æmulum, & validissimis dentibus instructum. Branchiarum opercula flavescunt, punctis reserta ferrugineis. Pinna tergo & branchiarum, & cauda ex ferrugineo rubent. Quæ vero in ventre sunt, eiusdem ferè cum ventre sunt coloris. In mari vivit, & cœnoscis † locis delectatur. Carne vescitur, nec à putridis abstinet. Aristoteles inter gregales reposuit: sed cum in mari mediterraneo singuli capiuntur, solivagos melius dixeris, tam rarò capiuntur, ut vix annis singulis Romæ in foro piscario bis deni capti videantur. Inter pisces molli carne præditos Philotimus reposuit, inter molles & duræ medium, Galenus. Editur assus & frixus. Alexis apud Athenæum, branchiis exemptis, cæsis spinis, lotum atque incisum, & lasere probè pulsatum, caseo, sale, & origano implendum esse docet.

Athen.  
Dionys.  
l. 7.

Ælianus. II.  
Ad. 11. 4.  
49.

† Oppian.  
Hæbent.  
l. 2.

Galen. A-  
len. facult.  
l. 3.

## PUNCTUM IX.

De Corace Rondeletij, Mil-  
vo ejusdem, & Boopis  
raræ speciei.

CORAX Rondeletij, Romæ no-  
mine cum Lyra communi, Cæ-  
XXII. l. 1. 2. Aldrov. de  
pone vulgò à capitis magnitudine di-  
citur. Piscis est marinus, corporis  
forma Milvo Rondeletij similis, a-  
culeorum pinnarumque magnitu-  
dine dissepans, ossa, branchias inte-  
gentia, cæcata, in aculeos desinunt.  
Pinna quæ ad branchias, minores  
quàm in Hirundine Rondeletij, majores  
quàm in Milvo sunt, ex viridi nigricantes  
parte anteriore, exteriore albescunt,  
cum maculis rubescentibus, Dorsum  
ex cæruleo nigricat, latera rubescunt,  
Venter lactei est coloris. Caput est ma-  
gnum: locus inter oculos cæcatus. In  
dorso virgæ ex ossiculis contextas,  
instar Cuculi habet: in eodem pin-  
nas duas: prior est brevior, cum a-  
culeis longioribus, acutioribusque,  
posterior longior, cum longè minoribus  
aculeis. Linea simplex à capite ad  
caudam ducta est. Palato minus est  
flavo quam Milvus. Ventriculus par-  
vum habet cum multis appendicibus,  
intestina tenuia, hepar ex albo rube-  
scens. Carne est, si Athenæum sequi-  
mur, durior: si Celsum, teneriore,  
duratamen. MILVUS Rondeletij,  
qui Gallis Lucerna, quod noctu luce-  
at, piscis est marinus corporis forma  
Corvo persimilis, corpore magis ru-  
bro, capite minus lato, utrinque com-  
presso. Pinnarum numero caudaque  
similis, magnitudine & colore dissi-  
dens. Quantum ad colorem attinet,  
parti pinnarum quæ ad branchias  
sunt externæ, nullæ maculæ rubæ  
insunt: interna ex viridi non nigri-  
cat, sed pinnæ istæ partim flavescunt,  
partim nigricant. Linea à bran-  
chus ad caudam ducta simplex non  
est, neque lævis ut in corvo: sed ex  
acutis brevibusque aculeis horret.  
Non squamis, sed cute aspera con-  
tegitur. Partibus internis Mullo im-  
berbi

Piscis.  
l. 4. 96.

Aldrov. de  
Piscib. l. 2.  
c. 57.



Corv. 1ste Corv. Meer. Egg. Alvor alus Flomder. Polfish. Tai. y. II





berbi similis. Palatum parvum flavum est. Carne est dura & sicca.

**TAB. XIX. 6.** Boopis species ita à Rondeletio describitur, Rarus est piscis, cuius nomen neque à piscatoribus nostris neque ab aliis potui unquam extorquere propter raritatem. Palmi maioris est longitudine, rotus à squamis nudus, ore parvo, oculis valde magnis pro corporis ratione; in pronis partibus pinnam habet ad caudam usque continuam, cauda lauta spissaque est. Ad branchias & in ventre binas pinnae habet. Sapore, carnis substantia, oculis Boopem refert.

## ARTICVLVS II.

## De Piscibus littoralibus levibus planis.

## PUNCTUM I.

## De Passere levi.

**TAB. XXII. 7.** Passer levis, Aufonio Placessa, alijs *Pecten*, quod eius pinnæ rectæ & parallelæ pectinis speciem præ se ferant, Hollandis Scholle, dicitur. *Bina* eorum apud Gallos genera. *Vnum*, quod communiter *Phya* vocatur, & magnitudine excellit. *Alterum*, quod alibi *Carier*, alibi à quadrata corporis figura *Quarrelet*. *Quadratum* nomen sortitum est. Etate tantummodo differt, à quibusdam proditum; ex corporis forma, quæ *Quadratulo* magis quadrata, & pluribus maculis rufis sive subflavis, ostendit Rondeletius. A Rhombis sicra differunt. Si hos ita in latus componas, ut oculi in cælum suspiciant, & mentum deorsum versus spectet, pars supina erit dextra, si Passerem similiter constituas, supina pars erit lava. Ita *marinus* est, ut & dulcium quoque aquarum sit studiosissimus: In Oceano tamen numerosior quam alibi reperitur. Iuxta Livoniam sunt pinguidimi, & inde vento indutati ad mediterranea exportantur. Saxatilibus Mnesitheus accenset. Ovidius in herbosis. Oppianus in montibus *in traxione degere* credit. Vadum,

ubi piscatorem sensit petere, terræ adhærescere, aquam, ne videatur, turbare, Alberti M. fide habemus. Carnem eius mollem Philotimus dixit, sicciorē Diocles, duram & prohi succi Xenocrates, mediam Galenus. Optimi marini, qui etiam nigriores, secundum qui in stagnis albidiores & lutum resipiscentes, locum sortiuntur, mollissimi & inspidi, qui in fluvijs vivere. Nonnulli in cibum, cum iam putrescere, & male olere incipiunt sumptos, alvum perturbare asserunt.

## PUNCTUM II.

## De Rhombo.

**TAB. XXII. 10.** Rhombus piscis, à figura quadrata, cuius latera omnia sunt æqualia, anguli verò obliqui, nomen sortitus est. Nonnullis *Phya* dicitur, ut ex Plinio & Athenæo, qui Romanis Rhombum vocari testatur Græco nomine *piscem*, qui alijs Græcis *Phya* nuncupatur, colligimus. Duo sunt ipsius genera, *Aculeatum* unum, *leve* alterum. *Illud* prona parte multos habet aculeos, circa caput, quod grandius & elatum est, & ab hoc caudam versus maximè. Magni in Oceano & mari mediterraneo capiuntur, ideo forte Rhombus latior est patella Martiali Rondeletius vidit, qui quinque cubitos longus erat, latus quatuor, spissus pedem. Optimos Adriatici sinus maximè circa Ravennam alit, & hos veterum exornasse mentas arbitratur Platina. Celebrantur & Attici circa Eleusyniam, quos Lynceus Samius *Psectarum* nomine dignatus est. Ei qui *verms esse* putatur, pinnæ & cauda in extrema rubescunt, Cætera est unicolor, subviridis, rotundis punctis stellulisque undique plenus. Omnium *leviorum* & temporum piscis est. Ovidius in herba algosa, Iovius circa pinguiorem terram extremosque littorum margines versari scribit, in fluvijs ostiis frequentissime piscibus insidiantur. Voraces sunt, & piscium, cancrorum imprimis avidissimi. Abdit

N. 2. f. pin-

† Plin. H.  
N. l. 9. 6.  
42.

† pinnae exertas movent, specie vermiculorum. Terra, seu vado maris per hyemem condi, à Plinio sub nomine psetta proditum. Tardissime propter corporis latitudinem moventur. Inter delicatissimos olip fuisse cibos, ex Horatio, & Iuvenali potest colligi. Tempore Iovij, *Aquatilem Phasianum* quidam appellare erat solitus. Galenus inter pisces mollicarnes retulit, sed aliter Xenocrati, & Villanovano visum. Ille durum esse carnis, & difficulter concoqui ait. Hic inter crassos viscidos excrementitios, reposuit: nisi forte superiores de lævi, cuius pulpa candida & pressio quodam humore succulenta; hos de aculeato, qui revera durior, locuti sint. Vivus impositus medetur lient, si remittatur in mare, si Plinio credendum.



## HISTORIÆ

## PISCIVM

## LIBER II

*De Piscibus, qui in mari  
& fluminibus degunt.*

## TITULUS I

*De Squamosis.*

## CAPUT I

*De Salmone.*

TAB.  
XXXII.



ISCIVM, qui in mari & que ac fluminibus degunt, alij quam longissime à mari tecurrunt, & ad fluviorum origines usque penetrant, alij in marium proximis morantes, mox ad id regrediuntur. Utrorumque qui-

dam sunt *squamosi*, alij *Laves*. Ex illis sunt *Salmio*, *Lupus*, *Latius*, *Aloja*, *Ziga*, *Albis fluvij*, *Mugil*, *Capito Anadromus*, *Gesneri*, *Caper*, *Sturio*, *Galens Rhodius*, & *Cataphraclius*.

*SALMONIS* solus inter veteres Plin. H. N. Plinius mentionem facit. Aufonius l. 9. 6. 12. hoc nomen adultæ ætatis ut Sario- nis seu quod melius Farionis medix, & Salaris primæ imposuit, illud tamen Trutta convenit. Circa Rhenum & apud Helvetios ætatis tempore ad Iacobi usque festum vocatur, *Salin* inde ob festum Andreæ Lachsi *Lachs* nomine gaudet. Cum *Essoce* Pliny eundem, quod Georgio Agricola placet, vix credo, cum alibi eum suo nomine appelleret, & per *Essocem* Lucium intelligere videatur. An *Anchorago Cassiodori*, difficile dictu, nam à Rheno duntaxat venire scribit. Apud Græcos nullum invenio nomen, qui aut *Salangem*, cuius pisces tanquam delicati mentionem facit Helychius aut *scorædæ* vocari posse putant, suo iudicio fruaneur. *Descriptionem* si species. Piscis est sat magnus, Bicubitalis quidem ut plurimum est: apud Misenos tamen & *Desavix* à XXIV. libris ad XXXVI. accedit, in Helvetia circa Tigutum graviore capluntur. Basilea quinq; aut sex pedes longos dar, nec temerè Cetaceum piscem dici posse Bellonius reliquit. *Squamus* tegitur exiguis, & maculis ita notatus, ut totus ferè piscis subruis & luteis notis insignis videatur, quia verè in capite ijs caret, ideo *frontem lubricum* Poëta dixit. Os habet amplum, & valde denticularum; nam præter id quod maxilla magnis & validis armatz sunt dentibus, palatum etiam quadruplici eorundem ordine munitur, linguaque hamatis dentibus horret. Hunc quadruplicem dentium ordinem Bellonius huic pisci præter aliorum fluviatilium morem, peculiarem esse ait, & cum ceteris serpente communem: additque plures esse in inferiori maxilla, quam in superiori. *Tergum* colore ferè est cæruleo, aut ex cæruleo nigricat. *Oculi* magni sunt. *Narium* foramina utrinque gemina;

Cassiodori  
l. 12. 17. 4.

mina: *Branchia* utrinque quaternæ, quarum opercula lara, & rotundis puniceis maculis plena sunt. *Pinna* juxta easdem binæ, rotidemque in dorso, quarum prior in medio fere dorso est, altera caudæ proxima, curacea, carnosaq;. In ventre tres sunt, binæ fere in medio, tertia à podice qui in imo ventris est. *Caudam* in unam laram, & rotundiuseculam pinnam definire Salvianus ait, Rondeletius verò bifidam esse testatur, indeque Salmonem jure *anonymum* nominari posse putat. Quoad *internas partes*, *Corangulum* est, ventriculus oblongus & angustus: hepar in nullo lobos divisum: rubrum Rondeletius tradit, Salvianus & Bellonius pallidum dixerunt: huic vesicula fellis ex viridi nigricantis annexa est, *Splen* ex rubro nigricat. Alvus ipsi prodiga nutat, & opimato abdomine fluit venter. Gesnerus à faucibus parulis *duos* se observasse *mentus* scribit, deorsum prorensis, unum ad ventriculum, quem œsophagum vocant; alterum anonyum, (cuius usum ignorat, quandoquidem nihil in eo reperit, nisi forte ruminat (inquit) hic piscis & alimenti sui partem ibi repositam habet) qui cute candida & tenui constat. De *Mari & femina* differentia ita Aldrovandus. *Fœminam* à mare differre Rondeletius & Salvianus volunt, quod illa rostrum habeat magis aduncum, hami modo, indeque vulgo in Gallia Beccard appellat. Bellonius verò dum dubitat, num sit diversa species: *fœminam* esse interea insinuat, inquit: Est & alius prægrandis Salmo (*fœminam* esse autumat) quem vulgus Gallicum ab eis ore prægrandi Beccard vocare solet: alii à ferendis ovib; *Bortiere* (Portiere forte nimirum à portando.) Differt is à mare Salmonem, quod labrum inferius in hamum modum aduncum habeat. In superiore enim labro foramen est ad palatum tendens, in quo dhamus maxillæ inferioris recipit, pixidatimque in rubi modum insinuat. Alii aliter de hac rostri curvitate sentiunt. Gesnerus testatur suos piscatores in mare tantum

incurvari insigniter, in *fœmina* petparum. Rondeletius quoque mari recurvum esse ait, sed *fœminæ* magis. Quidam vero eruditus in epist. ad Gesnetum, in qua de Albi fluvii piscibus ad ipsum scribit utrumque sexum id ceu quid præter naturam pati arbitraturs inquit: Salmo in Milda (hoc flumen ex Albi ingressus) si obstaculum seu præcipitium aque juxta Dessaviam, secundo ac tertio frustra saltu superare conatus fuerit, vadum petit, eoque in loco sub lapidibus & saxis delitescens, emaciatur, & contrabescens maculis rufis seu ænei coloris impletur & rostrum inflectit in magnum hamum, eo quidem maiorem quo diutius manserit. Verumtamen credit vir ille doctus idem ei tandem contingere, etiam si obstaculis omnibus superatis ad summas fluviorum partes eluctatus fuerit. Ex rostri itaque curvitate sexus non satis ruto distingueretur, tutissime vero ex ovib;. Addit Bellonius *fœminam* crebrioribus mare, iisque sub rubris & rufis orbiculis in cute variegari: atque in Lepradis de quo suo loco diximus) modum multris coloribus fignillari. *Marinus* magis quàm fluvialis piscis est. Nam & in iisduntaxat fluminibus quæ in mare se exonerant reperitur: & observatione notum est, si supra annum in eis perseveraverint, insipidos fieri; si diutius, post annum secundum ceu sideratos intrerire. Observatus in Albi adeò tabidus, ut exanguis & nullis fetè intestinis appareret; nati verò ex eo pisciculi, nec longiores nec crassiores digito evasere, quamdiu ibi vel juxta stagnantibus aquis immorabantur. Uberrima eorum in Bothnico mari versus Lappones captura, circa solstitium in extremis litoribus circa Thotnam tanta magnitudo capitur, ut fortissima retia pondere suo rumpant. Apud Vestgorhos quoque in provincia Vermeandia, in qua duseium aquarum locus cœrum millibus passuum in longitudine, & quadraginta latitudine pareat, magna Salmonum est copia.

In Albi quoque Vistula, Duna,

N 3 Multa-

Rondelet.  
de Piscib.  
lib. 6. 17.

Mulavia, Sala, & Milda apud Misenos habentur. Rhenus & Mosella gratissimos alunt. Minus commendati quos Scaldis, Thamesis, Garumna, Sequana, & Ligeris exceperunt. In Rhodano qui capi existimant, falluntur. Hoc præter Rondeletium & Scaliger pater prodidit. In Occidentalis quoque Indis fluminibus numerosissimi capiuntur. *Cibum* ipsi Salvianus pisciculos trahunt. Alii ante XXV. Julii pediculis aquaticis vesci, à partu obvios pisciculos comedere, eosdemque in ventre repositos, prodidit. Nonnulli in dissecio spissus quidam humor, subflavus, & lapillus candidus, visus. Quidam in maioribus nihil unquam, in parvis nescio quid reperiri tradunt, illos sola aqua turbidiore visitare opinantur. *Vita* est tenacissima, sub uno corde pulsante, recentem captorum indicio, plures in frustra dissecti à piscatoribus venduntur. Roberus verò Constantinus, exenterati, a quosda sanie aspersum, ultra diem vivere vidit. De *Partu* proditum, per autumnum & hyemem, ad veris interdum initia, in fluviis, & minoribus rivis lubentius parere. An & in Oceano nemo tradidit. Scrobs excavatur. Ova pisorum magnitudine foeminae ponit: mas rore genitali irrigat. Ova paulatim auferunt, & spirita vitali inflata, ultro per aquam deferuntur, & Salmulos produciunt. Salmulos mares aliquando genitura plenos teperiti, & cum foeminis adultis coire, eorumque ova rigate, cum in Salmulis foeminis nulla ova reperiantur, admiratione dignum est. De eorum *Salu* ita Gesnerus. Mildam flumen præ cæteris diligit Salmo, & (ut quidam putant) ab aqua Albis fluvii qua cum permixta in mare se exonerat, discernit. Itaque plurimi eo in loco, ubi in Mildam in Albim influit (Dessaviam vocant, quod oppidum est principum Anhaltinorum) capiuntur, boe modo. Ad Mildæ in Albim ingressum principes vallum sive obstaculum quoddam excitaverunt, ut ita redundans aqua ad molendina revertere-

tur, octo cubitis aliquando altius vallo graves & magnas arbores imposuerunt, & petecis magnis intus cancellantur, ne Salmo transiliat. Inter petecas alicubi nasci sunt collocata. Hunc locum cum attigerit Salmo, qui per Albim ascendit, salu adversus aquæ præcipitium se portipit in altum, ubi vel in nassam incidit, & capitur, vel arborem petecasve contigit, indeque violententer in Mildam se trajicit. Hoc si prima vice non successerit, secundo etiam tertioque experitur, & si ne tum quidem transilire aut assequi altitudinem valli potuerit, vadum petit, in ibique sub laxis delitescens emaciatur ac contabescit. Si tamen flumen Albis augeatur & crescat, adversus illud subinde fontium & originis cupidus ascendit, parit, & consumptus tandem macie ac siccitate moritur. Ad eò verò nativus huic pisci saltus est: ut Salmunculi etiam, si in vase aliquo venales cum aliis permixti in aqua fuerint, aqua eis adempta exilant, unde & ab aliis piscibus dignoscuntur. Alii saltus causam in Robur, quidam in Hirudines, à quibus mense Junio & Julio infestantur, nonnulli in loca abrupta descendendi libidinem, conjiciunt, quod apud Hectorem Boethium invenies. Singularem in *cibis* habent gratiam, ita ut omnibus piscibus præferantur, suavitatem si spectes. Habenda tamen ætatis, loci, & temporis anni ratio est. Salmunculi, qui sex vel septem digitos non excedunt, Aprili & Maio in deliciis habentur: adulti, tenuiores in fluviis evadunt, si ea non longè subiere. Moderati tum exerciti, si longius progressi sunt, nimio labore tabescunt. Plinius Aquitanicus palmam detulit, *Plin. N. H. lib. 9. c. 18.* Rhenanis Albertus, qui mense Maio suavisimè eduntur. Miseni post Pentecosten placent. Partui vicini, cum & tostrum curvatur, & maculas xrei coloris gerunt, damnatur. Salitos & infumatos bona Europæ pars distrahit.

N. Icon. Salmonis Salviani ad Tab. 31.

CAPUT

## CAPVT II.

## De Lupo &amp; Lato.

**TAB. XXIII.** **Q**uem Latine à voracitate *Lupum* vocant, Lucill. Carillonē vocavit, is Græcis *λῦγος*, aut *αἰγίος* *λῦγος* dicitur, ut Athenæus auctor est, ab ipsa vehementia: aut quali *λῦγος*, valde vorax, ut Eustathio placet, vel *αἰγίος* *λῦγος* dicitur, quod illi os hiet, & repente cumque impetu vide voret, ut Suidas vult, dicitur. Nec *Lutius* esse, quod Philopellus voluit, quod hic in fluvius & lacubus degat, nec *Sturtonem*, quod Volaterraneus & Poggius Florentinus tradidere, quod luc squamis careat, nec carnivorus sit: nec *Lacciam* seu *Chiepan*, quod hæc dentibus destitutum, cetum est. Piscis est squamosus, squammæ argenteæ sunt, mediocres, & lerraræ, quæque carni & inter se validissime coherent. *Rostrum* habet oblongiusculum, *O* cum hiat valde parvum. *Lingua* oblonga, si Athenæo ex Aristotele fides, osseam, & adhærentem. *De dentibus* non conveniunt scriptores. Carere *Mallarius*, & *Rondeletius*, quod ob oris magnitudinem facile prædam devoret, trahiderunt: teneus consulo ordine undecunque *Bellonius* potuit, plurimos, tenuissimos, multiplici ac vario ordine dispositos, pectinum instar, quibus lanarii utuntur, *Salvianus*, *Oculi* sunt magni. *Branchiæ* utrimque quatuor. *Hat*um operculum duobus ossibus constat, quorum superius postrema sui parte squamatim committitur. A summis brachiis per utrumque latus linea fere recta ad caudam ducitur. *Pinnæ* Aristotele teste, binas habet parre pronâ, totidemque supinâ. Quæ pronâ parte capiti proxima est, octo vel novem acutis & inæqualibus aculeis tenui membrana colligatis horret: altera unico tantû. Contra supinâ parte caudæ vicina aculeos habet ternos. *Cauda* in unicam pinnam degenerat. In parvulo, ut diximus, nigra apparent *maculæ*, quæ in paulo aultiore prorsus delitefunt, *Grandiusculus* enim argenteus est, dorso tamen paulo minus quam vē-

tte cādido. *Locus* etiâ *colorem* mutat, nam qui in mari capitur, ex cæruleo candicat, in ostiis fluviorum, totus albus est. *Carnem* habet secundû Iovii læteam, secundum *Bellonium* rubescentē, seu is diversæ speciei, sive *Oceanus* aliquid mutat. *Cortique* trû, ut Athenæus ait: *ventriculum* amplû, & longum: appendices binas maximè conspicuas, *secus* subflavum, in duos lobos divisum, quorum dextro fellis vetica committitur: *Lecnem* rubrum & longum, *intestina* lata nec multis complicata anfractibus: *folliculû* plurimo aere tumidum, spinæ dorfi validissimè annexum. *Bellonius* è pusillo *magnum* ac *ectaceum*, *Salmonis* more evadere solere testatur, ut ex *Oceanus* libras quindecim non nunquā pendere visus sit. *Salvianus* ad viginti libras, aliquādo exercecere observavit. Quomodo *Columella* quosdā sine macula, varios alios faciat: & quid *Plinius* per suum *Lanarû*, intelligat, facile hinc colligi potest. Ita marinû esse piscem, ut & *λῦγος* *αἰγίος*, & ostia fluviorum nō refugiat, *Galenus* præter *Oppianum* auctor est. Sed & in dulcibus, *Letho* nempe *Lybiæ* circa *Berenicæ* fluvio nasci, *Athenæus* memorat: nihil de *Columella*, qui *Velinum*, *Sabatinum*, *Vulsinensem*, & *Ciminum*, eosdem procreare innuere videtur, dicā: secus n. insequenti sentire creditur capire. In dulci portu quæ *Phanarium* vocant, longè maiores vulgaribus reperias, apud *Miletû* quoque prægrandes & plurimos, ut apud *Aristophanis* *Scholiastæ* & *Suidæ* legimus. *Archestratus* apud *Athenæû* *θηταῖος* vocavit. Solet & mediæ cryptum penetrare saburtæ. Qui in fluviiis capitur. *Lanei* à *Martiale* nomē accepit, & expressè de iis *Plinius*. In *Lupis* in amne capti præferuntur. In *Tyberi* amne inter duos pontestanti precii, ut *Philippus*, apud hospitem *Cassino* in oppido, auctore *Columella* *Lupum* sibi in cœna appositum gustabundus expucit, dicens, *Percam* nisi piscem putavi: quasi innueret, solos *Tyberinos* *lupos* piscis nomine dignos esse. *Lucillius* isti *Catillonis* quasi *Catillorum* liguri-

adrevand.  
de Piscibus  
L. 6. 2.  
Rhen. Di-  
pos. l. 7.

*Columella*  
R. R. l. 12.  
c. 17.  
*Plin. H. N.*  
l. 9. c. 17.  
*Galen. A-*  
*lim. l. 3.*  
*Oppian.*  
*Habent l. 1*  
*Columella*  
*R. R. l. 8.*  
c. 16.

*Colum. R. R.*  
l. 8. c. 16.  
*Varro R. R.*  
l. 3. c. 3.

guratoris nomen, teste Macrobio, imposuit. Solet enim cloacas subire, & obvia quæque devorare. In India exundantibus in agros fluviis, † in planis camporum vagantur, & ab aqua destituti prædæ sunt. *Vescitur* carnibus præcipue, nec piscibus, vel corruptissimis escis parcat. In exenterati ventre serpens aliquando inventus est. Tangit & falgam, & stercorea: *Αλκυονες* Oppianus vocat. Iis maximè locis † qua flumina in mare exeunt, ova parit ætate † & hyeme, ideo alicubi bis † idque inter fusaneos solus facere creditur, sed posterior partus infirmiorum. Sublimes *natant*. Athenæo sunt *πυριγενες* solivagi, Aristoteli *χρῖνι*, fusiles seu fusanci. Mugilum, Luporumque capturam uno retis jacu centum aureis coronis venisse, Rondeletius oculatus testis est. *Solertia & ingenio* non destitui, docilesque sequentia docebunt. Rete circumdati harenas arant cauda, atque ita conditum transeunt rete. Et quamvis minus in providendo solertiz quàm mugiles habeant; magnum tamen robur in poenitendo habent. Nam ut hæsete in hamo, laxant vulnera, donec excidant insidiaz, quod præter Plinium, Oppianus, Ovidius & Plutarchus tradidere. In Eloro amne tā mansuetos esse, ut è manibus porrigentium cibum capiant, Nymphodorus author est. Et quia lapidem in capite hyeme sibi insensissimum se habere sentiunt, idco in abditos se tum gurgites demergunt, qui in sublimi natant, frigore congelati moriuntur. Cur inter alios pisces cum Mugile, Salpa & Chromide *clarissime audire*, post Aristotelem Plinius scribat, & in vado vivere addat, nescio, nisi fortè sublimem natatum in causa ponat. *Capiuntur* sæpe numero dormientes fuscina. *Inimicitiae* cum Mugile & Squillis gerunt. Caudam illi prærodere Nigidius apud Plinium author est. Pugnantcs invicem sæpe Pureolis, præsentè Befasione, Perotrus vidit. Statis tamen mensibus concordcs sunt, & in unum gregem, si abundè cibarii, coeunt. Ab his cornu quod fronte exit, punctus

interimitur, quem Oppianus & Ælianus describere: Magni olum apud Romanos Opsophagos æstimmii erant. Plinius post Elopen & Acipenserem præcipuam iis & Asellis auctoritatem tradit. Archestratus Milesium *γρίνδα* & quidem *δίσκον* *μαλινάριον* vocat, & Tripatinum summam cœnarum luxuriam ingrediebatur. Sed maximi, lactes, cerebrum & epar fiebant. Illo Eliogabalus rusticos in mediterraneis pavit. Huius gratia, Hermaxus Ægyptius piscium instititor, non nisi exenteratum vendebat. *Carnis qualitas* non nisi loci, temporis, & ætatis ratione habita, dehniri potest. *Locus* si spectetur, in mari puro qui sunt, boni sunt Hiccsio succi, sed pauci nutrimenti, † sanguinem con-

† *Galen. de Alim. facult. l. 3.*

LA TVS, inter Nili pisces à Strabo bone numeratur. Esse & marinum *Geogr. l. 5.* Archestratus apud Athenæum prodidit. Candidissimus est, ducentarum sæpe libratum magnitudine, & quo-

*Supra. Sa. p. 5.*  
† *Ælian. H. A. l. 6. c. 12.*

† *Arist. H. A. l. 5. c. 10.*  
† *Aristot. H. A. l. 6. c. 17.*  
*Idem l. 5. c. 9.*  
*Plin. H. N. l. 9. c. 51.*  
*Aristot. H. A. l. 5. c. 2.*  
*Plin. H. N. l. 32. c. 3.*  
*Oppian. Halon. J. Plutarch. J. vita animal. 2000.*

*Aristot. H. A. l. 3.*  
*Plin. H. N. l. 9. c. 70.*  
*Plin. H. N. l. 9. c. 61.*



quovis modo patatus suavissimus. Rondeletius pro eo, Coracino ac Umbræ simillimum substituit Tarentinus *Lasili* piscis meminit.

## CAPVT III.

## De Alofa, &amp; Ziga Albis fluvii.

TAB. XXVII. **A**lofa nomen, huic de quo jam auctori sumus pisci, post Strabonē Ausonius ex vulgari imposuit, Gregorius Tiphernas in Strabone, & Theodorus Gaza in Aristotele, *Zelexan*, quam moderni Græci *zelexan*, torrè quod spinis seu aculeis aliquando soleat inhorrescere, eius nomine donarunt. Rondeletius Archippo & Mnesimacho *Zelexan* appellari tradit; quam tamen à Thrissa diversam, ut Trissam cum Trichide eandem, Gesnerus, *varium* ut Panthera & Pavo Aristoteles facit. Nec *Lupus* est, quod Platina voluit; quod hic Mugili caudam præterdat, illam edentulam sciamus; nec *Clupea*, piscis magnus, qui crescente luna albus est, decrescente nigrescit, corpore minimum aucto à propriis spinis interimitur, in Areni Galliz fluvio nascitur, in eapite lapidem grano similem, quia d quartanas sinistro lateri decrescente luna alligatus facit, & Attilum Padi, venam quandam in faucibus eius mira cupiditate appetens, morsu exanimat, ob rationem eandem. Universi corporis figura, si cum latitudine conferatur, ob longiuscula apparet, & in latera ita compressa, ut imus venter, rectâ lineâ præacutis aculeis & constructâ, & propterea non asperâ solum, sed serræ etiam modo secante (si adversa deducatur manus) terminetur. *Spinis* sive *aristis* etiam scætat innumeris, & intetvescendum admodum molestis; quod cum Trichidibus quoque commune habet, unde Albertus, & Marmellius latinum eius nomen

Aristosum sive Aristosum confinetunt. *Caput* habet in latera valde compressum, *rostrum* acutum. *Oscula* cum maximè hiat, admodum patulum, edentulum, atque omnis asperitatis experta. *Branchiæ* utrinque quaternæ. *Squamæ* tegunt magnis, tenuibus & facile deciduis. In capite supra oculos, utrinque veluti gemmæ smaragdinz relucunt. *Lingua* nigricat, superiotes mandibulæ deorsum prominent. *Ventre* & lateribus argentum æmulatur. *Dorsum* verò & capitis vertice ex albo flavescit. Romæ cum maximè aucta bipedalem menturam non superat. *Marinus* est & piscis, sed ex mari ineunte vere cum in urero habet, subintrat, inchoante ætate revertitur. In Tyberim delapsæ strigilæ sunt, & quadam marinæ saltuginis ariditate parum amabiles, paucorum dierum mora, Tyberinis undis pinguescunt. Laudatas Arnus & Umbro in Hetruria, Lyris & Vulturus in Campania præbent. Galliz & Hispaniæ flumina maximas, Mosæ in Hollandia suavissimas. In Aquitania ob frequentiam *plebis* *absonum* Ausonius vocat. In Arverniz fluvio juxta Marignensium oppidum, supra mille ducentas uno retis jactu capi, Rondeletius auctor est. In Euripo reperiri negat Aristoteles. Burdigalæ & Lugduni sæpe entiores quàm Muscilæ venduntur. *Parium* in fine ætatis in mari. Arhenus *pariet* Thrissas dixit, Oppiano, alternant vias Ponti curruntque per æquora, Hospirium mutant semper, Pontoque vagantur. Figulus veris adventum Mossellanis nunciare, & mense Maio tonitrubus, adeo terri, ut plurimæ in ripa exanimatæ reperiantur, scribit.

In Arverniz Oppido Marignensio ad restudinis sonos adnatasse, & saltasse Rondeletius vidit, quod & de Thrissis Eliano & Porphyrio proditum, nec de mendo in Athenzo, qui Trichidi hoc quicquid est adiciat, dubitandum est. In nullo apud Veteres fuisse

Strabo  
Geogr. l. 15.

Oppian.  
Hall. l. 2.

Elian. H.  
A. l. 6. c. 12.  
Porphy.  
de l. 200.  
x. l. 3.  
Athen.  
Zoster.

precis,



Salmo. Salmo.

Lachs

Tab. XIII.



Salmo albus

Salmo. Ein ander geschlecht.



Maail Meeralt.

4



Lupus. Meer-Wolff.

Muoidis. Species alba



Capito. Finis. omnia. Ellingen Meer-namen.



Capit. capri: 7

Sawfisch.



Asperger. Zerkandius.



Stor. Sturio.

Asperger. 9



Stor.

Asperger in Sturio. 2.



Asperger. seu

Sturio 3.





Galen. de  
Anat. fa-  
cult. 3.

Galeo sunt fluviatiles, ἀμφαῖος ge-  
neris quidem nomen est: sed quia  
ἀμφαῖος ἢ βαρύντης τῶν ὑψηλῶν ἔχει nomen  
obtinuit, nec id omnibus magnum,  
non omnibus etiam competet, nisi  
forte ideo dictum esse putes, quod  
in metu capite abscondito totum se  
occultari credat. Aristoteli, sanè

Aristot. H.  
A. 1. 9. c. 17.  
† Arist. H.  
A. 1. 8. c. 2.

† aliquando peculiaris & unica Mu-  
gilum species est; aliquando duas † sub  
le species complectitur: nec fortè ma-  
lè Mugiles marinos in Cephalos &  
vires distinxeris. Nunc epithetum est  
omnibus Mugilibus commune, quod  
omnibus carabibus abstineant. *Mugilis*  
speciei nomen est, sed speciem Ce-  
phali alteram, quæ mucro seu vivit  
Epithetum, & idem cum *μυγίλος* vide-  
tur. *Sargus* seu ut apud Aristotelem  
*μυγίλος*, quid sit, dubitatur, Rondele-  
tius eundem cum *μυγίλος* seu jejuno fa-  
cit, Aldrovandus discernit. *Chelones*  
cum Bacchis Hicelio iidem, & Pli-  
nius Banchos inrer Mugiles recen-  
set, sed cum Myxone eisdem fa-  
cit. Rondeletius Bacchum quintam  
quamdam speciem Hicelio esse, in-  
sinuat. *Σφαγίς*, Salviano cuneatus,  
Gefnero Cunealius, quod *σφαγίς* τῶν  
μυγίλων, *gracilis & quadratus* sit, ita  
dictus, à solo Eutydemio inter Mugi-  
les reponitur. Alii *σφαγίς* legunt, ut  
à σφίς vespa, non σφίς cuneo, isti pi-  
sces dicti fuerint. *Δακτύλιος* nomine  
Salvianus minorem aliquem in eo-  
dem genere ab Eutydemio poni pu-  
tat, alii *διδάκτυλος*, sed perperam le-  
gunt, cum duos in latitudine digitos  
non excedat: nec alii fortè fuerint,  
quàm quos Padi accolæ Canistrel-  
los, quod in Canistris vanales ferti  
soleant, vocant.

Com-  
p. 1. 1. 1.

Galen. de  
Anat. fa-  
cult. 3.

*Cephalinus* quibusdam cum Blæ-  
psia, teste Dorione idem, nisi men-  
dum sit, & pto Blæpsia *βλῆψια*, quod  
idem quod *μυγίλος*, ut Galenus scribit  
significat, legi debeat, & sic Cephali-  
nus inter species Nestium nume-  
retur.

*Platanus* nomen Cestreis à qui-  
busdam imponitur, si Polemoni libro  
de fluminibus Siciliæ credimus. A-  
ctum de illis in capite de Murænis.  
*Species* Mugilium seu Cestriorum sunt

quinque, apud Aristotelem, *Cestreas*  
nempe propriè dictus, *Cephalus* co-  
gnomento Chelon seu Labeo, *Ceph-  
alus pereas*, sive transitoranus, *Sargus*  
sive *Sargo*, & *Myxo* seu *Muco*. Caput  
nonnullis est magnum & depressum,  
*rostrum* breve ac tetusum, ut Capito-  
nibus, aliis minus & rotundius, ro-  
strum magis extensum & acutius, ut  
Cheloni. Os omnibus parvum, rotun-  
diusculum & edentulum. *Squamis*  
omnes teguntur. Cestreas magnas &  
crassas habet, quæ numismatis spe-  
ciem mentiuntur. *Pinnæ* utrinque  
binas gerunt, illos si excipias, quos la-  
cus Sipharum gignit, quibus teste A-  
ristotele, una tantum utrinque est, &  
supinis carent. Præter binas illas pin-  
nas, quæ utrimque consistunt, utram  
habent ab ano: in dorso duas, quarum  
altera aculeata est, altera aculeis  
caren: ad caudam spectans. Omnes à  
branchiis lineas aliquot subob-  
scuras ad caudam deductas habere  
videntur, et si haud æquè in omnibus  
sint conspicuæ. *Dorso* sunt subnigro:  
*ventre* vero candido. *Ventriculus* teste  
Aristotele carnosus est: cui parte al-  
tera plures appendices exeunt: alte-  
ra una tantum, ut idem ait. Rondele-  
tius longè alium esse scribit quam in  
carnivoris piscibus, densum nempe  
& carnosum instar ventriculi avium,  
foris planum, intus rugosum, figura  
verticilli vitrei, quod mulieres tufis  
appendunt. *Intestina* quoque crassa  
sunt, pinguique & in gyros acta: in  
quibus splen latet, ut idem observa-  
vis, & sub pinna locum aere plenum  
reperit. Hepar pallet parvum, & tan-  
quam manu ventriculū amplectens.  
*Fel* rufum sive flavum, aquæ consi-  
stentiæ. *Cestreas* eiusdem Rondele-  
hepar ex alborubescit: caro mollior, la-  
xior, minus candida, minusque pin-  
guis quam Cephalo, additque gulam  
habere: ventriculum in longam ap-  
pendicem desinere, semper inanem  
esse, uti & intestina. Lapis quem Ce-  
streus in capite gerit, *Echinus* & *Sphon-  
dylus*, ab echinata specie dicitur. Li-  
næ quæ à branchiis ad caudam du-  
cuntur, Cephalo breviores sunt. *Chelo-  
lon* sive Labeo nigricans à capite ad

Arist. H. A.  
1. 6. c. 13.  
Arist. de  
part. 1. 4.  
c. 13.

caudam æqualibus spaciis distantes protensas habet. Habet & labra crassa, spissa, prominentia, unde *χρῆμα* *Labronis* nomen. Capire est paulo minore quam Cephalus, oculis prominentioribus, sine pellicula illa concreta, quam veluti palpebram habet in capite. Marinos pisces esse nullum dubium, sed an omnes fluviis & stagna subeant, incertum. Capitonum

*Aristot. H. A. l. 8. c. 2.*

*Strabo Geogr. l. 15.*

*Aristot. H. A. l. 8. c. 19.*

alius translittoratus Aristoteli, quasi in alto mari degat. Galenus in stagnis quoque nasci scribit. Ut ut sit, Cestreum propriè dictum esse iudico, qui longius à mari, ut in † Nisum ita in alios fluviis recedit. Cephalus in eiusdem vicinia, propter dulcem aquam & limum morantur. Esi autem aquas amēt, ab imbribus ramen adeò vehementer læduntur, ut *ψῖσιν* amittant, ut Aristoteles prodidit. Cephaloni inprimis oculi per hyemem albescunt: ipse tum & macer & cæcus, quod in Nauplio terræ Argivæ agro accidit, capitur: inprimis, si hyems asperissima fuerit.

Marinos à fluviatilibus, spinarum numero & quantitate distinxit Galenus, plures his & minores innuens: certius indicium sapor ipse suppeditat. Acriorem & pinguedinis expertem Cephalum dicunt qui præstantior.

De Cibo non convenit inter autores. Carne abstinere Aristoteles tradit, vivente duntaxat Oppianus & *Ælianus*. Idem Cestreum alga & limo vesci scripsit. Gulosus autem maximè est & insatiabilis, ideò in proverbium abiit, aviditas sæpè tanta, ut cauda verberando exequiat cibos.

*Ælian. H. A. l. 1. c. 3.*  
*Oppian. Hal. l. 1.*

*Plin. H. N. l. 9. c. 17.*

Tanta iisdem salacitas, ut in Phœnice & Narbonensi provincia, coitus tempore è vivariis marem linea longinqua per os ad branchias teligata emissum in mare eundemque linea retractum, feminæ sequantur ad litus, rursusque feminam mares partus tempore.

De ipsorum *Generatione* ita *Aldrovandus*. Quod ad ortum generationemque eorum pertinet: scribit Aristoteles esse qui omnes sponte oriri opinentur, quorum opinionem re-

fellit, quoniam unicum tantum èdum genus sit, quod non coitu, sed ex limo arenave enascatur: cæterorum verè feminæ ova, mares semen genitale habeant. Patiunt autem eodem teste semel anno: sed an eodem omnes tempore, difficile ex ipso colligas: alias enim Capitonem vere parere tradit ultimum, quoniam novissimè eius særus apparet: alias omnes Decembri mense gravescere ait, tricenisque diebus gerere, & in iis Capitonem quoque enumerat, alias Cestreos ait inter primos partum accelerare, parere hyeme, locis iis maxime quæ flumina exeunt, dum uterum ferunt, præcipue graviter laborare, ideoque fieri, ut tunc potissimum ruant in terram ac excidant: feriri potro gravi stimulo agitato in terram, atque omnino in temporis motu perpetuo incitati, donec pariant, sed requiescere à partu continuò.

De Ingenio & aliis hoc habet. Tam veloces esse, ut jeiuni transversa navigia superarent, & ubi dispositas piscatorum sensere insidias, cetia supervolent, ut veluti sagittæ arcu emissæ videantur. Curvos hamos habere suspectos, ideò postquam diu circumnavare, cauda prius escam percillere, & quod avulserit deglutire, mox ore in angustum collecto, summis tantum labris ac vellicatim escas stringere. Irritati, in sublime feruntur, & effugia quæruni: si aberrare, quiescunt, & necem prostrati expectant: *ψῖσιν* in Cibus quòd attinet, Hicetius omnes Leuciscos & Mugiles boni succi esse, facile excerni, nec multum alere, scribit, nempe si mari puro capti sunt. Nam qui in cœnosis locis, quales tum illi, qui in Etruria in Prillino lacu apud Orbatellum ad mediterranea deferuntur tum hi, quos Padusæ atque ipsi luculenti Fosse Clodis canales viscere prætere-ro, Ferrariensibus & Venetis copiosissimè præbent, pinguedinem humanæ naturæ infestissimam habent. Aristoteles in fluentis & lacubus, quod pinguiores fiant, præstare dixit. Lynceus Samius hyeme post partum laudat.

*Plin. Hist. Nat. l. 9. c. 17.*  
*Ælian. H. A. l. 1. c. 3.*  
*Oppian. Hal. l. 1.*

*Æst.*

Æstate lutum quod stagna exsiccantur, olent. Septembri, quod luto putrescente pinguiore evadant, insalubres sunt. Optimi qui circa Abderam, deinde qui circa Sinopem capiuntur. Romæ maxima ovorum gratia, quæ recte Iovio, geminis folliculis circumcisa patte seminis, recentibus Cephalis eximuntur, & nomen *iur meliorum, ovorum salitorum* apud Græcos obtrinuere. Quantum ad Medicinam, Venterculus Mugilum, seu in cinerem redactus, seu in fumo siccatu, & vel vino albo, vel aqua absynthij ablutus, & in cibo sumptus, ventriculi exsoluti vires non minus quam ventriculi gallinarum potus interna reficit. Elixus in vino & ex acero sumptus vomitum compefcit, prodente omnia Rondeletio. Lapilli in cerebro contra Nephritim valent.

## CAPUT V.

De Capitone Anadroma  
Gesneri.

TAB.  
XXIII. 6.  
Aldrov. de  
Piscib. l. 4.  
c. 7.

CAPIRONEM Anadromum, Gesnerus & Kentmannus describere. Natus, inquit, ille, videretur, prominente & carnosa superiore oris parte, ut in nostris fluminibus, is quæ Nafi nomine descripsimus: cui etiam reliqua corporis specie per omnia adeo similis est, ut discrimen nullum animadvertam, ne colorum quidem ferè, nisi quod Albinus hic Nafus magis albicat, noster fluviatilis, vero magis fuscus est. Sed noster plane fluviatilis est, Albinus è mari ascendit: præterea noster vilis & plebeius est, Albinus vero inter laudatos, præsertim assus. Hoc etiam notandum, cum Albinus alio nomine *Blecca* dicatur, longe alium piscem eodem nomine à nostris vocari, de quo egimus inter albos pisces. Miseni etiam Zertam dicunt, quod nomen etiam Polonis usitatum audio. Zerta inquit Kentmannus, piscis longiutculus, argentei nitoris, squamis

parvis tegitur, dorso subfusco: *pinnæ* quæ ad branchias sunt & parte supina rutilis, paucis caruleo admixto. Linea utrinque à branchiis ad caudam tendit, in qua puncta fusci coloris digeruntur. Caput crassiusculum, oculi pulchri, magni, albicantes, nates magnæ non procul ab ore. Os molle prorsus, in quo nec dentes sunt, nec alia asperitas, sed ab initio gulæ seu faucium, maxilla utrinque valida, dentibus senis oblongis valida. Maximi huius generis pisces qui apud Misenos capiuntur, bilibres sunt. Libram XVI. unciarum dico. Anno toto ex Oceano in Albim ascendit hic piscis, maxime vero circa Pentecostem, qui tempore patitur, migrare solet, tunc etiam ad cibum præfertur, quod fæminæ ovis pleniæ sunt. Manent & parvuli in Albi, proficiuntque ipsi & soboles: augentur enim & pinguescunt. Velociter omne genus pisciculus, qui nullis præfertur spinis & aculeis riget: item muscis aliisque insectis, quibus intra aut proxime supra aquam potitur. Habetur inter optimos qui in Albi sunt, assari solitos pisces. Caro enim eius optimis saporis est. Rirè etiam elixus non male sapit. Desquamatus nempe, exenteratus & elutus, in aquam fervere incipientem immittitur, cõditusque ac salutus ad iuris ferè consumptionem coquitur, quo modo permulti etiam alij fluviatiles pisces elixari solent. Sunt qui iuri haud ferè cõsumpto copiosum butyrum addunt, eoque liquato piscem inferunt. Porest & acceti aliquid affundi, & Zinziber aspergi, pro cuiusque palato. Assus vel simpliciter, vel cum embammate è cœpis minuratum cõcisus, vino, croco, saccharo & Zinzibere, sapidissime estur. Nec displicuerit desquamatus, in frustra concisus, quæ in polenta aut fecalis pollinevolvuntur, atque ita in butyro sive crudo sive liquaro frigus. *Hæc omnia Kentmannus.* Addit Gesnetus non in Albi tantum, sed Sala etiam apud Misenos flumine Zertam capl.

## CAPUT VI.

## De Caprosive Caprisco.

TAB.  
XXIII. 7.  
Aldrov. de  
Pisib. 4.  
c. 8.

**C**Aprum & Caprisicum eosdem Salvi-  
anus, diversos Rondeletius facit. Maxima hic nominum affi-  
nitas, & uterque duram pellem habere traditur. An vere *καπρίσκος*, *χα-  
ρίσκος* Strabonis, & aliorum, & *μύς* Op-  
piani & Æliani sint iidem, dubitari  
potest. Equidem Athenæus Aristoteli  
*καίριος χαίριος* vocat, alij tamen  
*σάπρος*, quidam *σαπρος* legi debere o-  
pinantur, nonnulli *Chalcidem* piscem  
vocalem & in dulcibus aquis habitam  
tem credidere. *Poreus* etiam Niloti-  
cus Strabonis potius *porea* fluviatilis  
minor est, piscis rotundus, spinis in  
capite noxiis, & vero *σημαδία*, quasi  
in arena fodientem facit, quod ter-  
restris suis more rostro arenam fodi-  
at, Numenius facit, eandemque cum  
*σάπρος*, cui Simeon Sethieas in nutri-  
endo facultatis rationes attribuit,  
quas alij fere Rhombo tribuunt, Al-  
drovandus posuit. Salvi-  
anus cum *κα-  
πρίσκος* & *χαρίσκος* eundem iudicat, *μύς* de-  
nique inter *σπλάχνα* seu cartilaginea A-  
thenæus ex Aristotele recenset, inter  
quos, quis Caprum nostrum retulerit?  
Athenæus eundem cum Capris,  
cum ait *καπρίσκος* *καπρίσκος* *μύς* *χα-  
ρίσκος* esse censet. Descriptionem eius ex Sal-  
viano, eamque accuratissimam da-  
mus. Caper, inquit, Molę piscis in-  
star, caput utrinque admodum com-  
pressum habet: Oculos rotundos, atq;  
in superioris capitis parte locatos: Os  
parvum, & valde denticulatum: utra-  
que enim maxilla orationis dentibus  
validissimis, magnis, latis, non ferra-  
tis, sed continuis, atque humanis si-  
millimis minuta est. Branchiis utrin-  
que quaternas non osseo & deatri-  
culato (reliquorum squamatorum  
instar) operculo sed cute contectas,  
nec lata, sed modica scissura (Molę  
piscis more) pervias habet. Nec si  
Aristot. dicat: *Habent quibus paucissi-  
ma sunt, singulas branchias utrinque cas-  
que duplices, ut καίριος* (live *Aper*, ut  
Theodorus vertit) alij *bina utrinque*  
*sunt, altera simplices, altera duplices, ut*  
*Congro*. Suspiciari debemus hunc eno-  
strum piscem Congrum non esse, cū

neque etiam vetum sit, quod binę  
utrinque branchię Congro sint. Et  
propterea mirari potius cōvenit, cur  
hęc ita tradiderit Aristoteles. Utrin-  
que una tantum pinna & rotunda ad  
branchias conspicitur: nam illis, quę  
in piscibus aliis utrinq; in ventre sunt  
conspiciuntur, caret prorsus. In dorso fe-  
re medio tres, membrana inter se iū-  
cti repertiuntur *aculei* robustissimi &  
magni, quorum prior reliquorū duo-  
rum tripulus est, quosque omnes non  
solum ubi vult, deprimit, sed in sulcū  
etiam osseum, in dorso ob id sculptū,  
recondit. Depressi autem & recondi-  
ti uti quam facillimē simul erigun-  
tur, ita eorum unus dūtaxat erigi ne-  
quit. Et pari ratione erecti omnes  
deprimi possunt, cum eorū unus ne-  
vocati suntque ea arte fabrefacti, ut  
cum prior & maior quantumvis im-  
pulsus deprimi nullo prorsus pacto  
possit: postremi tamen depreSSIONE,  
quę facillima est, statim deprimitur,  
non secus quam in arcubalistis voca-  
tis, in quibus parvo ac inferiori fer-  
reo vecte compressus, tensus illico re-  
mittitur arcus: ob cuius similitudinē  
hic piscis noster Romę *Peſce baleſtra*  
vocatur. Et quod maiore dignum est  
admiratione, si postremus aculeus  
non prorsus deprimatur, sicuti prior  
quoque proportionē duntaxat depri-  
mitur, sic ibidem etiam ita rursus cō-  
stitit atque obfirmatur, ut nullo im-  
pulsu ulterius deprimi possit, nisi rei-  
terata postremi depreSSIONE. Hos ter-  
nos aculeos pinna sequitur, ad eandē  
ulque deducta. *Offe* autem valido, la-  
to & recurvo, ex cordis loco ad eam  
ventris partem, quę ē branchiarum  
regione est primum reflexo, deinde  
per ventrem sub cute usque ferē ad  
podicem extenso, ibidemque postre-  
mo in acutissimum & conspicuum a-  
culeum desinente, tota anterior vē-  
tris regio roboratur atque munitur.  
Quę verō inter prædictum aculeum  
& podicem, ventris portiuncula re-  
linquitur, plerisque aliis longē mino-  
ribus, sed satis robustis atque serratis  
aculeis armatur. A podice per ventrē  
reliquum ad eandē, osque alia singu-  
laris pinna deducitur. *Cauda* quę non  
sensum, ut reliquorum pisciū, sed re-  
pente



pente extenuatur, in unicam & latā pinnam degenerat: *Ventriculum* habet amplum, & crassum: intestina lata & valde reflexa: hepar subalbidū, cui fella vesica hæret.

Cotio tegitur squamoso, cuius tamen squamæ serpentis potius quam piscis videntur; nam præterquam quod eo ordine sunt commixtæ, ut lineas, cancellatim sese interfecantes constituunt, firmæ etiam & valide adeo hærent, ut desquamari nequeant; unde ita durum & asperum efficitur eius corium, ut vix dissecari queat. Rondeletius sese experitum esse scribit, ut acutissimo quidem gladio penetrari posse, utq; ligna & ebora eo poliri possint. Quā obrem jure Ælianus atque Oppianus marino Muri pellem præduram tribuere; & Athenæus Aristotelis testimonio, etsi apud Aristotelem id nunc non legatur, inter pisces qui aspera cute teguntur, recensuit.

Quod ad *colorem* attinet, ex livido virescit, nonnullis parvulis notis cæruleis & rubentibus maculis quam plurimis insigniuntur. Estque totius piscis figura valde compressa, & lata, atque fere orbicularis. Ad multam magnitudinem non excrevit, duas enim libras raro excedit, unde merito Oppianus & Ælianus eum haud magno corpore esse dixerunt. Hæcenus ille. Non maris duntaxat, sed & fluviorum accola est, ut Plinius & Aristoteles scripsere. In amne Acheloo grunnitum habet. Vescitur carne, cancris, squillis atque testatis. *Solvagus* est, & raro capitur. Pugnacissimum esse, tum quod pelle prædura tegatur, tum quod denitum robori confidat, Ælianus & Oppianus sub nomine Muris marini prodidere. Carnem habet duram & suavem. Virus namque oler. Athenæus inter *medicamenta* retulit.

gerat dicimus, is Græcis nostri temporis *ῥαῖς* quali *Oxyrinchus*, Cyprijs teste Bellonio *Μορένα* vocatur. Nec est veterum *Lupus* quod Poggio Florentino placuit, ut capite quarto huius tituli innuimus. Nec *Attilus*, ut Franciscus Philephus voluit, cum Attilus is sit, qui hodie ab accolis Padi, veteri servato vocabulo *Attina*, Adilo & Ladinio vocatur, piscis ipso Sturione amplior, effigie, sapore, pretio & tota fere natura ab eo dissimilis: Nec, *Tursio* Plinij, quod credidisse Theodorus Gaza ei editur, cum hic *Carichiz*, id est, *Canicula*, ut *Atchestratus* apud Athenæum comprobatur, species sit, & cum *Turso* sive *Phocænz* in Ponto catulos pariat, hæc oviparus sit, & ubique nascatur. Nec *Hycca* seu *Hysca* ut Hermolaus Barbarus in epistola ad Corvium prodidit, cum vel ipse Athenæus, quisolus *Hyccæ* meminit, qui piscis *Hycca* sit ignoret, & duntaxat, à Callimacho sacrum piscem, à Cyrenæis *Erythrinum*, ab Hermippo Smyrneo *Hyccam* lulidem vocari scribat.

Nec *Delphinus*, ut Carolus Figulus voluit, quamvis in multis quoad formam conveniant, quod iste omnium veterum auctoritate, inter cetos referatur. Niloum tamen Delphinum, de quo apud Solinum leges, quemque Delphino potius similem, quam Delphinum Marcellinus vocat, Sturionem existimare, nihil forte obet.

Nec *Oxyrinchus*, veterum, cum hic Carnivorus sit, & hamo, ut apud Athenæum legimus, capiatur. Anpro *Oxyrincho* Caspio Æliani, haberi debeat, comparatio ostendere poterit. Circassi sane cæteri, quæ Mæotidis accolæ, Sturionem *Oxyrinchum* vocant, si Gesnero & Scaligero credimus. *Salarum* veterum esse Salvianus contra Manardum apud Aldrovandum ostendere conatus est, quæ prolixissime agentem vide. Aufonij esse nullum dubiū, & ita Sturio à Vcnancio Forrubiō Pictaviensi Episcopo, qui duobus post Aufonium seculis vixit, vocatur. Ve-

Plin. H. N. l. 9. c. 9.

Arist. H. A. l. 4. c. 9.  
Plin. H. N. l. 10. c. 51.

Ælian. H. N. l. 9. c. 41.

Ælian. H. N. l. 17. c. 32.

## CAPUT VII.

## De Sturione.

Piscis quem nos Gothico vocabulo Sturionem, quasi *sturius*, quod rostrato suo præter rostratæ speciem

Tab. XXIII. B. 10. II. Aldrov. de Piscib. l. 4. p. 19.

Juvenal.  
Scalig. l. 4.  
c. 14.

Scalig. in  
Isid.  
Aulon. l. 2.  
c. 1.  
Galen. de  
Alim. fa-  
cilit. l. 3.

Plin. H. N.  
l. 9. c. 17.  
Macrob.  
Saturn. l. 2.  
c. 12.

tur : Veterum non esse, tum ex eo colligas quod non tantum teste luvendale & vereri ovis interprete, sed etiam Antiphane & Theodoro Sinopenfi apud Athenæum, vilis apud eos piscis fuerit : tum quod eum in Garumna non invenias, quod & Scaliger monuit. *Γαλαζον* seu γαλαζίας vocari Galeno crederem, nisi eandem in Græciæ mari, in quo Strutiones danur nasci, negaret. Acipenserem esse, qui ab Elope & Anthia distinguitur, Rondeletius erudite ostendere conatur, quem sequitur Iunius : obitare eius sententiæ videtur, quod rarus inventu, & unus omnium squamis ad os versis contra aquam nando meare, apud Plinium dicatur, & id Nigidius Figulus, referente apud Macrobius Sammonico Sereno, confirmet. Aldrovandus Sturionem Acipenserem Romanis cum recens & in Italia captus esset vocatum fuisse : Silurum Græco nomine cum ex peregrinis Græciæ inptimis oris allatus, opinatur. *Descriptio* nem eius Paulus Iovius hanc dedit. *Corpore* est tereti oblongoque, inter rotundos & planos ambigente, ut qui subtus quodammodo planus sit, dorso verò semitotundo. *Caput* quadratum est, & ad effigiem patvæ pyramidis protensum. *Oculus* est sine maxillis, sine dentibus, diversum penitus ab reliquorum piscium forma, idque sub mento in ipsa prope ingulum parte, ad similitudinem fistulæ arundinaceæ rotundum, semperque patens, & cartilagineum & summx candidum : cuius hiatus in procerionibus hasta brachij haud facile impleri : cæterum totum caput dura potius & callosa cartilagine quam certis ossibus constat, quod ex lentro quodam & præpingui mucore concretum esse videtur. *Naribus* omnino quæ illi prætenues sunt supra rostrum, refrigeratur. Sunt autem branchiæ utrimque quaternæ osseo operimento, non secus quam squamosis piscibus contractæ. *Oculus* habet parvos. Ex rostro gemina barba, ut in Mullo dependet. Toto dorso crassiores quædam squamæ ossæ du-

ritie certo numeto ordineque distinctæ, intercurrente spinæ acie, ad elegantiam eminent, ut in magnificè-  
roribus valvis hodie videmus, quas ferrei arque inaurati clavi certa serie confixi decentissimè figunt. Cæteræ corporis partes cuticulari & scabro admodum operimento potius quam per petuis squamis integuntur, idque ad subviridis atque coloris speciem. *Venter* cute levi & argentea tegitur. *Lingua* habet crassam & duram, *gulam* undeque rugosam. *Pinna* sunt ad branchias duæ & rotidem in ventre ad podicem : præter quas in dorso prope caudam alia unica erigitur, è cuius fere regione in medio ventri alia etiam una subnectitur. *Cauda* vero in duas pinas degenerat, quarum superior crassior atque duplo longior extat. *Ventriculus* est carnosus solidusque atque pertinaciter inhirescens tergori, ut nisi discissus divelli inde possit. *Oesophagus* in rugas contractus. *Hepar*, in duos lobos oblongos pallidi coloris dividitur, quorum dextro vesica fellis validissime connectitur. *Lien* subrubert : *intestina* crassa, & rems gyris convoluta. Magnis piscibus annuerati debet, cum crebro & plensque in locis cenrum librarum, & alibi longe maior capiat. Ego aliquando Ferrariæ Stunonem mercatus sum centum & quadraginta libratum, donavique Illustrissimo patrer ac Reverendissimo Ioan. Baptistæ Cæpicio Episcopo Majoricensi Domino meo nunquam satis celebrando, qui paucis ante diebus ut labores meos promoveret, mille aureos donaverat. † *Quantum ad Differentias* refert Bellonius, Ponricorum, Adriaticorum, Gallicorum, & Germanicorum inter se esse differentiâ, quæ magnitudine, crassitie, cutisque asperitate, & subnigro, subflavo, aut argenteo colore distingui possit : Sequanicum & Ligeinum adustum interdum tres orgyas excedere, Galæum piscem pinnis & forma referentem, exili corpore, hirta sursum pelle, deorsum plana ac levi : apud Ferrarienses, & Bononienfes argenteo

† *Macrob. Iovius.*

colora

colore fulgentem, dorsum, & latera tribus veluti carinis distincta ostendere. Scaliger quoque tria Sturionum genera, in Occa Sarmatiae fluvio tradi scribit, & pretiosissimum illum, qui Bialarybitza vocatur ponit: sed Herbersteinus Bialarybitzam à Sturionibus distinguit. *Locum* si arrendas, In Ponte, & circa Mæotidem plaudem frequentissimus est, inde ovain molem coacta, salira, & cadis conclusa, per Turciam & Italianam distrahuntur. Tyrreno & Adriatico mari si Bellonio fides, raro videtur.

Maiores tamen in fluminibus, quæ nonnisi quinque aut sex dierum itinere subintrat, quam Oceano, Tyberim si excipias, in quo parvi capiuntur. In Albi (hunc circa Pentecosten gregatim, auctore Kentmanno ingrediuntur) capti, ducentas interdum libras singulas sedecim unciarum appendunt. Captus tempore Iohannis Friderici Electoris sexaginta supra ducentas librarum pondere, quem roridem florentis Princeps redemit. In Liguri quoque & Rheno delicatior. In Tanai, Danubio, Rheno, Tibisco, Vistula, Garumna frequenter capitur. *Cibus* Sturioni non pisces & conchylija, edentulus enim, sed sordes & mucus, quidam sed perperam aeris tranquillitatem ei ad cibum sufficere crediderunt.

Dum escam quaerit, suis more terram sub aquis fodere. Isidorus prodidit. Cum branchiis omnino latis carere, naribus refrigeratur, & si quam hauriendo recipit aquam, eandem prono ore statim regerit. De eiusdem Robore, ex relatione Kentmanni ita Gesnerus. Sturio in aqua validissimus piscis est: & in terra quoque cum ventri innititur. Cauda concussa hominem urcunque robustum prosternit, ubicunque contigerit, perricas etiam magnas & ligna per medium tranxit. In terram extractus, lapides aliquando tanta vi cauda ferit, ut ignis exiliat, attritum nimirum ossiculorum, quibus toto corpore mucronatus horret. Quam

obrem cautè tractandus est à piscatoribus, ne vel crura eis confringat, vel reia disrumpat. Peritiores in aqua captum reri ad ripam impellunt, ita ut reze, non adversum, sed ad latusei sit: secus enim rete vel sextuplex laniaret. Cum ripam attigere, caput eius omni contentione in altum levant, & piscem totum in latus declinant: sic enim robore suo nocere non potest. Viderur cum Salmonæ Amiciziam colere. Ducem enim istorum piscatores vocant. Zigam è mari pulsam, per flumina persequitur, sed frustra. Agilis enim hic & velox prævenit. Tanti olim in cibis apud Romanos; Traiani tempore, si excipias, æstimij, ut cum nbiis, & eoronis in cœnis circumferebatur, & Gallonij mensa, teste Horatio, eo famosa fuerit. Mares ramensæminis præstant, hæc ovis plenè probantur. Poggijus Doctoris Poggij filius caput commendavit. Caro duriuscula est, præpinguis, viscosa, & ægrè concoquitur. *Hepar* adeo dulce, prodente Alberto, ut nauseam nisi felle ringatur, pariat. Græci sale inveteratos tribus nominibus insigniunt. *Rachis* ipsius dorso porrio pleura, costæ & latera: *hypocellum* alvus cum pube. Caviario, quod ex ovis paratur, Græci & Turcæ vescuntur. Iulio II. Pontifici mirifice idè placuit. Paratur & ex Cyprinorum ovis in ludæorum gratiam. De usu in Medicinâ nil occurrit. Quæ enim de Siluro Plinius, huic vix comperant.

## CAPUT VIII.

## De Galeo Rhodio.

DE Galeo Rhodio ita scribit *Al. drevandus*. Rondeletius hunc piscem, cuius modo icon exprimitur, Galeum Rhodium esse crudissime ostendit, propter maximam nimirum cum Acipensere sive Sturione similitudinem, non solum quoad corporis speciem & partes, verum etiam quoad gustum, & saporem, dempra, inquit, unica differentia,

P quæ

TAB.  
XXIV. L.  
Altor. de  
Piscib. l. 4.  
c. 10.

quæ non nisi ab ijs potest percipi, qui citra ingurgitationem huius cibum sumperint, quique exquisito gustatu fuerint: ferinum enim quid respicit, quod tamen etiam non nisi paucissimum esse potest: nam Archestratus, qui in nullis non terrarum Orbis angulis gulæ cupidias diligentissime perquisivit, id observasse in eo non videtur, quandoquidem Acipenser plane eundem esse credebat, ut Athenæus tradit, qui illius sententiam refellit. Athenæi verba non solum Acipenseris à Galeo Rhodio discrimen indicant, sed verum Galeum Rhodium hic depingi comprobant: Archestratus, inquit, qui Sardanapali vitam vixit, de Galeo Rhodio scribens, eundem esse opinatur cum eo, qui apud Romanos cum tibiis & coronis in crenis circumferebatur, coronatis etiam ijs, qui gestarent, vocantque Acipenscrem. At hic quidem Acipenser parvus est, & porrectiore rostro, & figura triangulari magis quam ille. Et paulo post, Archestratus de Rhodiensi Galeo loquens, amicis patrio more consulens, ait: Galeum in Rhodio quem Vulpem vocant, si tibi vendere noluerint, vel mortis periculo rape. Nominant illum Syracusani *νύλα νιούρα*, id est, canem pinguem. Hæc ille. Quod si Galeum Rhodium cum Sturione seu Acipensere contuleris, nullam planè comperies, (inquit Rondeletius) qui ei similior sit eo quem proponimus; his exceptis quod Sturio est longior rostro & corporis figura magis triangulari. Nam alioqui Sturionem totius corporis figura, tergi ossibus acutis, & clypeorum modo efformatis, aliis item in lateribus dispositis, pinnis, cauda, ore in supina parte sito, omnino refert. Is quemadmodum Sturiones, relicto mari, amnes subit. Reperitur enim in Pado, & Rhodano, & pro Sturione venditur: nec ab eo distinguitur, nisi ab exercitatissimis & exquisitigustatus hominibus. Hanc differentiam docuit ipsum Guilielmus Pelicerius Monspelienfis Episco-

pus, vir singulari doctrina præditus: tum ex capite crassiore, & rostro breviori, obtusioreque: tum ex gustu Galeum Rhodium sive Vulpem deprehendi. Ferinum quid recipit, quod de Sturione dici non potest, carneque est durior: à quo sapore Galei & Vulpis nomen habet, Galei enim & Vulpes ex Galeorum genere ferini sunt saporis & ingrati. Si tamen in dulci aqua diu naraverit, in cibis haud aspernandus est. A nonnullis eodem Rondeletio teste *Cops* vocatur, eoque nomine designatum atque optimè figura expressum ad ipsum Ferraria misit doctissimus medicus Antonius Musa Brasavolus. Alij nominis affinitate decepti *Copso* appellant. Est enim id nomen alterius piscis.

## CAPUT IX.

## De Cataphracto.

Piscis huic Schonveldius nomen Tav. XXIV. 2. imposuit, sicque eum descripsit. Schonveld. Ichthol. p. 31. Est palmorum duorum longitudinis ad summum, Capitis fere triangularis, depressi, angulosi, ac lati pollices vel digitos duos, cuius duo latera tuberculis plerisque horrent in ambitu, anteriora quæ os spectant cirrhus multos tenuissimos alunt. posteriora aculei, retrorsum spectantibus minacia sunt. *Rostrum* habet resinum, quatuor apiculis munitum, quorum duo anteriores instar Lunæ cornutæ vel semicirculi se rotundant, reliqui posthos suis aculeis retro conversis conspicui sunt. *Os* in supina parte semicirculare habet, parvum, ad incisuram eius utrinque binis, sub mento pluribus tenuibus cirrhis barbatum.

*Truncus* proxime caput depressior, octagonus est, prope caudam sexagonus, prona parte fuscus, nigris lituris intersparis, circa ventrem plenum, in cuiusque medio *podex* est, albicat. Totus *signatus* offeis contactus est, in quarum medio

tumor

Eperlan.

Schmidt. Rolden.

Gulio Rhodio.

Tab. XXIII.  
na art der fin.



1848

1848



Hufse

Haugen.



Hufse.

Antacurus stellatus.



Alia Hufse.

Haugen. ander art.



Antacurus Rond

Ein ander art Hufsen. Rond.



Orbis

Schmitz Rondel Schmitz.



Ostracion pinnatus.

Schmitz.



Ostracion alba. Mdr.



Ostracion

Auratus



Holostrun Belli.

Ostracion Nili.



tumor durus, reduncus, erigitur, qui in omnibus continuatus corpus angulatum efficit, quod versus caudam valde gracilefcit. *Pinnæ* circa branchias habet latusculas duas, sub ventre toidem, sed longe minores, binis sibi constantes. In dorso inter squamarum extantias concavo; duas contiguas, parvas, omnes nigris lituris pictas. *Cauda* in pinnam subnigram exiguum & rotundam definir.

*Dentes* nullos habet, sed horum locolabia aspera, & in faucibus officula aliorum in morem hirta. Frequenter circa Nortslandiam insulam Oceani Slesvicenſi Ducatul subiectam frequenter & per totum annum, in ostio Albi & Ederæ sæpe capitur. Incolæ Steinbicker, Muller, & Bursbul vocant.

*Vitellus* iquillis & aliis pisciculis. Habetur ob carnis dulcedinem in deliciis.



## TITULUS II

## De Leuibus.

## CAPUT I

## De Husone.



**H**ACIENUS de *Husone* piscibus squamatis egimus, sequuntur non squamati seu *Leues* *Huso* nempe, *Eperlanus*, *Lampetra*, *Anguilla*, *Orbis* & *Holoſtens Bellonii*, *Husone*, quem à domo quasi Hauso, Germanis dici Bellonius opinatur. Plinius fortè *Marianum*, quem Danubio Porculo marino similem extrahi dicit, vocat; quidam *Eficem*, appellarunt. *Elhano* ni fallor est *Antracius*, Germanicus. Magnitudinis est viginti quatuor pedum, & tantæ, ut vix biga à tribus vel quatuor equis trahi possit. *Vadianus* magnitudinis pondo quadrin-

gentorum minimos quinquaginta, frequenter centum, ducenta, trecenta, vidit.

Dorsum habet asperum. Nullum os in capite, si Alberto fides, si aliis multa, in corpore parva & pauca, cartilaginea potius, quam solida. Loco *spinae dorsi* cartilago est, quæ foramen habet magnum & vacuum, à capite ad caudam tanquam terebello perforatum. Adipem pinguedini immixtum sicut porcus. Similia de suo *Antracæo* *Elhano*.

Cum ætate processerunt, ad maximum *Thunni* magnitudinem, in *Istro* accedere describit, & tam pingui abdomine esse, ut eorum ventrem latenter suos fœtus scrophæ ubera dicas, sicque aspero corio tegi, ut eo perpoliantur hastæ. Addit item capitis medio à medulla ad caudam mollem & strictam membranam pertinere, ex qua ad alium solem exficcare, flagella ad concitanda lumina efficere possis. E *Ponto Danubium* subit, & per centum quinquaginta millaria Germanica, adversus suavisque undis progreditur.

*Decime* captura, ita quidam ad *Gesnerum* mercator. Mitto tibi, inquit, *Husonis* piscis effigiem vivam. Is in *Danubio*, nec ubique nec tempore quovis capitur, sed quando migrat. Terra argillosa & pingui gaudet. *Captur* fere ab autumno usque ad Ianuarium, spaciū decem milliarium inter *Viennam* & *Posonium*, *Presburgum* vulgo vocant: ubi ad insulam *Schutam* nomine, cum arce minutissima, ultimus huius piscis capture locus est.

*Viennæ* die *Veneris* plerumque quinquaginta vel septuaginta, & aliquando centum *Husones*, veniunt, qui integri fere distrahuntur. Copiosissima eorum captura fit in *Vualachia* iuxta *Chiliam* non procul ab ostiis *Danubij*, quibus in mare *Ponticum* se exonerat. Inde salu expottantur in remotas regiones.

*Vadianus* mensibus *Octobri* & *Decem-*

TAB.  
XXV. 1.  
Aldrovand.  
de Piscib.  
L. 4. c. 12.



Decembri captos Viennæ inveni scribit. Timidus est, & à minimo etiam piscicula in fugam vertitur. Sturio se ei per lulum affricare solet, in latebras profugum eiecit, & ventrem lanceinat, dumque unus fugit, alter persequitur, aquarum agitatione se produnt, & capiuntur. Caprus lacte vel vino *poscitur*, nō ut diutius vivat, nec citius inebriatur, quā sextarios quatuor ebibet.

*Gregatim* natant, & tubarum cantum sequuntur, ad eum postquam accessere, irriuntur. In aqua tanto robore pollent, ut piscatorem cauda istum ē navi desiciant, elato ex aqua capire, mortuis similem apparent. De Antacorum captura, vide *Ælianum*.

Quantum ad *usum in cibis*, vitulinæ in dorso, porcinae in ventre saporem habet, magna pars salsamentis cedit, lactibus nihil dicunt delicatius, sed & ova in cibum expetuntur.

## CAPUT II.

### De Eperlano.

TAB.  
XXIV. 3.  
*Aldrov. de  
Pisib. l. 4.  
c. 12.*

IN fluviorum in Oceanum, (verba sunt Aldrovandi) in fluentium ostiis, ut Rhotomagi & Antwerpæ frequens est piscis, teste Rondeletio qui *Eperlan* (quam vocem vulgarem secutus Eperlanum seu latinum nomen fecit) dicitur, à nitido & splendido (inquit) colore, quo unionem (perlam) refert.

Ceterum si à perla ipsi nomen est, verendum est appellari een, peerl: nam Epetlan Belgi, eum vocabulum non est: & Bellonius Eperlanum nuncupat. Attamen etiam, Atherinæ modo transparenere. Hic Anglis *Schmelt* vocari scribit ab odore (violam enim gratissime redolent, quamobrem quidam *violam* vocari posse censent, argumento quod *Ælianus* ab odore thymi Thymalum piscem nominavit,) vel à pinguedine. Gesnerus priorem etymo-

logiam probat, quoniam Smelle Anglis sit odorari.

Smel tamen apud Belgas est liquescit, & proprie de pinguedine dicitur, à quibus Angli forte nomen mutuaverunt. Uterque *duo eius genera* esse scribit, *marinum* unum, *fluviale* alterum. Sed Rondeletius marinum litorale esse, Bellonius laxatile dicit.

Rursus Rondeletius Epetlanum in marinum & fluviale distinguens, figura corporis nihil vel parū differte innuit, ideoque unice iconem exhibuit: Bellonius contra duas, admodum diversas: quare suspicari licet fluviale Rondeletii à marino non differre. Bellonius marinum item, partim marina, partim fluviali aqua gaudere tradit, & Rondeletius quoque ex mari ad fluvios ascendere insinuat, dum in Sequanæ ostiis optimum esse scribit, & in Angliæ fluviiis.

Apud Neustricos Caudebecanos Angliæ populos uberrimus est, maior tamen proventus circa viudemias, quo tempore est delicatissimus. Tereti ac tenui est corporis compage, nonnunquam dimidium pedem æquante. Rondeletius ad pedis magnitudinem aliquando accedere innuit.

Asinos parvos refert, unde ex eorum genere esse iudicarunt, quos refellit Bellonius, propterea quod glabro sit corpore. *Ovis* huius satis magno est.

*Dentes* habet in maxillis, & in lingua. Truttam præter cætera dentibus refert. *Lingua*, ut ait Bellonius quasi gemina, hoc est, (inquit) in cuius radice posterior quædam appareat, in qua multo plures dentes sunt, quam in anteriore. *Fimias* habet easdem quas Salmonum genus, maxime posteriorem illam dorso pinnam subrorundam & pinguem. Prius totum piscem in æquales fere partes dividit. *Cauda* bifurca est. *Branchie* sunt utrimque quaternæ, decolores, & *violam olentes*.

Transparenti est corpore, depraefi-

ta ni-

hæa nigra quæ spinæ internæ parti in-  
hæret. *Calculus* habet in capite rotun-  
dos, albos, quosque facile forinsecus  
propter piscis transparentiam per  
cranium videri posse Bellonius tra-  
dit (qui diligentissime de internis E-  
periani partibus egit) sub posteriori  
cerebri partesitos, ubi medulla in  
cerebro desinit. *Cor* branchiis se-  
micircularibus & fimbriatis est ad-  
modum vicinum ac seutiforme: de-  
sinit quoque in angulos, rubrumque  
est, cui molles ac sanguineæ sunt car-  
nuncule, quæ huic tanquam aures  
in terrestribus famulantur. Illæ e-  
nim moventur cum corde: quod  
septo ab hepate dirimunt: unus  
tantum lobi, in longum demissi ad  
secundum latus. *Stomachum* desinen-  
tem in mucronem habet in V. liti-  
ram efformatum: *Lienem* admodum  
rubrum, feminis triplicis in modum  
latum.

Cumque stomachi dextrum la-  
tus sursum usque ad hepar reflectit,  
illuc geniculo intercipitur: ubi *apo-  
physes* duas latus emittit, quæ veluti  
secundum ventrem constituuntur.  
Aliud post hunc subsequitur, quod  
nec pylotum nec jejunum, neque  
iteon commode nominare possis; si  
quidem sine anfractibus recta ad a-  
num procedit. Sed rectum geni-  
culo intercipitur, estque rubetia-  
rum. *Mesenterio* nullam admixtam  
pinguedinem habet, quo stomac-  
hus & intestina obsidentur; ut ni-  
hil aliud in ventre, quam adipem esse  
dixeris.

Caridibus, culicibus, Aphis, æ-  
stro, lendibus, mille pedibus, pedicu-  
lis & eiusmodi deicetamentis vesti-  
tur. Carne est molli & friabili. Æ-  
statis fine vel autumnii initio ca-  
pitur.

## CAPUT III.

## De Lampetra.

Nilidius lacus piscis, qui ad ætæ quod  
manu propter lubricitatem capionem  
possit, dicitur, vocatur. Doctiores  
Plinius & Ausonius Mustelam esse opi-  
nantur, nec tamen vel ex *marinis*  
*Aelian* quas jecorino simillimas  
esse pupillis oculorum ad cyaneum  
colorem accedentibus, mento quam  
jecorini maiori; quam Chremetis  
minore; algas depascere, saxatiles  
esse, & omnium cadaverum in quæ  
ineurit oculos conficere; idem au-  
thor scribit; vel ex *Mustela*, qui Ari-  
stoteli exterisque *zani*, qui flumina  
nunquam subeunt, & vivipari sunt,  
esse judicō. Sed nec ex *Marinarum*  
genere esse credo, quamvis Dorioni  
apud Athenæum Muræna fluviati-  
lis haud ineptè dicatur, quod illæ  
Branchiis integris careant; quas  
Lampetræ velut cartilaginem obti-  
nent.

*Lambricum marinum* Plinius non ef-  
se, exinde quod pinnis omnino ca-  
reant, colliges. At ex *Fernibus aqua-  
ticis* eiusdem esse, quos in Gango  
Indiæ Stadius Sebosus, haud immo-  
dico miraculo attulit; branchiis bi-  
nis, sexaginta cubitorum, eicræulis,  
qui nomen à facie traxerunt, eis-  
que tantas vires, ut elephantos ad  
potum venientes, mordicus com-  
prehensa manu eorum distrahant,  
Rondeletius credidit.

Idem ex *patissæ* seu Hiradinibus  
Strabonis, quas in quodam Lybiæ  
fluvio septenum cubitorum perfo-  
ratis branchiis, ita ut respirare pos-  
sent nasci scribit, quod linguisuga-  
rum instar faxis & navium clavis  
hæreant, opinatur. *Tineæ fontanis*,  
de quibus apud Plinium, quod Her-  
molao placet, non esse, certum,  
quia illæ ex insectis; *Flutam sen Ple-  
tam* quod quoque Rondeletio vi-  
sum, dici posse, quod nisi in sum-  
ma aqua nater, ut aerem attrahat,  
facile suffocetur, concedimus. An  
*Anguilla capæ* sit, cuius Archestra-  
tus apud Athenæum meminit, du-  
bito.

Quamvis enim sit ex ossis seu  
insectis, quod Anguillæ vulgari non  
comperit: in eo tamen & quod An-  
gillas

*Albroy. de*  
*Piscib. c. 13*  
*Plin. H. N.*  
*l. 9. c. 17.*

*Plin. H. N.*  
*l. 9. c. 10.*  
*Plin. H. N.*  
*l. 9. c. 15.*

*Strabo*  
*Geogr. l. 7.*

*Athen. Di-*  
*noscl. 7.*

TAB. XXIV. I. Lampetra, non tam à lambendis  
petris, quam ab *Alabro* Plinius  
5.6.

P 3 guillas

guillas Copaidas Agatharchides prodigiosæ magnitudinis esse scribit, diversa à Lampetra esse videtur. Echeneida Oppiani esse, Rondeletius censuit, nec abhorret ab ea Echeneidis descriptio, quam apud Oppianum vide. Bellonius quoque nautis præcipuè infestam esse ait, temonibus triduum fere hærendo, caudamque in contrarium vertendo, recensque picaræ navis lateribus picem lambendo sic infigi, ut nautas ab irinere remoretur.

De *Generibus* ut dicam, non unum Lampetræ genus est. Sunt quæ è mari flumina subeunt, sunt quæ à salis aquis omnino abstinunt.

*Marinarum* triplex genus est, maius, medium Germanis & Belgis Prick dicitur, & minus à Salviano depictum, qui, licet ætatis ratione tantum differre quispiam suspicari possit, quoniam colore tantum & magnitudine à maiori differt, differre tamen, & specie ostendit, cum maiores semper & maculosæ & bicubitales; minores contra sine maculis & pedales tantum teperrantur: Prick vero cubitalem magnitudinem haud superet, transversalibusque & nigricantibus lineis solum insignatur.

Rursus ipsi maiores haud ubique æquè magni. Testatur enim Iovius in Arno & Tyberi ad generosum habitum adolescere: in omnibus autem Galliarum Cisalpinarum rivulis, ipsisque præsertim Ticini atque Adriæ emissariis multas reperiri prædictas, admodum, quanquam minimi digiti, crassitudinem minimè superant.

Et Platina in Cisalpina (Gallia) parvas, in Hetruria mediocres, Romæ ex Tyberi permagnas capit: nisi dicamus, haud rectè ab his scriptoribus isthæc observata esse. Omnibus sive marinarum sive fluviantes, commune est, Ceterum more *stisulæ* in *cervice* habere, per quam cum navibus aut saxis hærent, aquam ad branchias attrahunt. *Spina* item omnibus cartilaginea à capite ad caudam usque de-

ducta, chordam Galli vocant, quæ vere tenerior, ætate durior est, & insuavior.

*Branchiarum* numero, figura & ordine conveniunt, ore item & *pinnis* & totius corporis figura. Murænis valde similes sunt, si caput excepias. *O*s enim neque in longum neque in larum scissum est, sed excavatum velut in hirudinibus quas sanguisugas vocant. Gesnerus ab eo locutorum instar, qui ad servandos nummos loro contracti clauduntur, contracto lignum aut lapidem ita apprehendens ait, ut sugere videatur, idque tanta vi, ut ægrè avellatur, cucurbitularum medicinalium similitudine. Marginem item oris rotundum fibris quibusdam laciniisum esse, quæ nimirum ut firmius hærear, sugarque efficiunt. In cavo illo sparsi sunt *dentes*, plurimi flavi, acuti, hamati, quorum interiores maiores esse idem Gesnerus observavit, eosque circiter viginti ordinibus distinctis & tanquam à centro ad circumferentiam digeri, ordinibusque singulis quateros, quinos, senosve inesse. Esse & in ipso oris recessu duplicem *dentium* minorum ordinem, quorum maior, inquit, omnino serram denticulis utrimque denis refert, eos denticulos continuos esse, cæteros cutim habere interiectam. In eiusdem cavi oris teste Rondeletio particula est contraria occursum foramen interius ocludens. *Ceræ* habent sub branchiis & foraminibus reconditum, cartilaginea membrana, spongiosa ac prætumida inclusum, subrotundum, ciceris crassitie: *hepar* oblongum, cæruleum, unius tantum lobi. *Felle* carent. *Intestinum* omnibus unicum, rectum, minimè complicatum: reliquum corporis in fœminis matrix ovis testerta occupat. Pinnis lateribus carent: nullasque ad natandum habent, sed flexuoso corporis impulsu aguntur, & *pinnulus* membranaceis iter dirigunt, quarum una sæpe supra caudæ extremum erigitur, altera paulo superior est. *Lævi* cæte reguntur, quæ in maiori nigricat prone, supine candicat, ad la-

adlatera, & in dorso subluteis ac nigricantibus maculis conspergitur, quibus minor caret. Gesnerus maiori maculam ait esse albicantem in vertice, in medio oculorum interstitio; & contiguum ei anterius foramen parvum membrana parum prominente circumdatum. *Pricku* cum maiori colore convenit, sed pro maculis quales diximus, transversales habet lineas. Omnes utroque gutturis latere *septem foramina* habent, quibus aquam acceptam reddunt. *Platina linguam* Lampetris tribuit, Rondeletius habere negat. Salvianus & Bellonius non meminerunt. *Oculi* rotundos & profundos habent. In maiori cæruleam pupillam aureus circumnubit circulus.

De *Lampetrarum migratione* & hoc habe, Veris initio migrare, & circa Donati diem, qui est decimus septimus Februarii, nullas amplius apparere, sed aut recedere, aut corpore reliquo tabescente, licet capitis molles relinquatur, interire.

Initio Maii optimas, ab eo tempore irrequieto motu emaciari, & plerasque ante partum mori, parientium sobolem evanescere, nec unquam circa Argentinam apparere; adulas, quæ non pereunt, cum fluvio aqua secunda, Maio mense auferri, Argentinensium piscatorum relatio est. In mari & fluminibus parvas parere, eoque tempore quo in fluminibus capiuntur, in mari etiam capi, reliquisque anni temporibus vel in abditis locis latere, vel à littoribus in altum pelagus longè secedere; maiores in fluminibus rariores esse, Salvianus auctor est. *Vesuntur* aqua & musco. Quidam esca quadam composita in fontibus & aquis dulcibus eas nutriunt, & servant. Spumarum indicibus comperiri solent: capteque perpetuò in aqua immergi, cum qua ex longinquis partibus in urbes deferuntur.

*Vsum in Cibis* quod spectat, Albertus dulcem & insalubrem vi-  
noque condiendum, Alexan. Be-

nedictus optimi succi, facit. Salernitani crassum & viscosum, minus tamen Anguilla, & quia veneni aliquid habent, in vino submergendas donec moriantur, posnere. Romæ olim proximam à Scaris quibus principatus debebatur habuere mensam. *Scribis Platina Roma aula fortassis offensus*, bene à natura factum esse, quod Romæ ex Tyberi permagnæ capiantur, & delicatissimæ, quoniam vallatæ ibi gulæ inter se auctis pretiis certant. Emi (inquit) frequenter Lampetras quinque sex, septem aureis, & olim à laticlavio viginti, cum alter secum auctionaretur, emptam scimus: nec passa est ingenua gula tantam audaciam gratuitam esse. Dispensato enim, quod suipsius arrogantiam & fastum (nolo dicere stultitiam) imitatus esset, centum aureos dono dedit, ne secundo ad certamen singulare provocatus, timidus ac infractus animo succumberet.

Cæterum non quovis anni tempore, nec quovis loco tanti fiunt. Scribit enim Iovius Romanis, id est, Tyberinis præcipuam nobilitatem à magnitudine & sapore esse adeò ut denis sæpè aureis veniant, ipso præsertim vere: & recte quidem, quoniam incipiente æstate, spinalis medullæ nervi instar durior efficitur, & marinæ, hoc est, quæ in mari capiuntur, aridæ semper ac velut agrestes judicantur. Iovius delicatiore condimento, multo maiorem quam ab ipsis pulpis nobilitatem accipere scribit. Necari enim solere in vino Cretico, eiq; myristica nuce os claudi, & foramina illa (branchiarum utrimque septem) totidem caryophyllis adimpleri in reganoq; convoluta in spiras, additis avellanistris, medulla panis, oleo, vino Cretico, aromatibusq; ad temperatiores prunas certis momentis sedulo excoqui, quo condimento, inquit Leo X. in minori fortuna, joci causa, ut convivium exhilararet, Marianum cucullatum, falsum, & ridiculum hominem decepit.

Namque

Namque funem instar Lampetræ incoctum, multoque illo jurulento immersum, grandi in patina appositum, ut notam omnibus eius edacitatem, gulamque eluderet: qui jam magna pultarii parte absumpta pseudo-lam petram aggressus, diu multumque cum ea maxillis ac dentibus inhzente colluctatus, cachinnum cunctis tollentibus, facerrime respondit: utinam sic mihi sæpius illudatis. Nam in hoc condimento non modo funes, sed & ipsas catenas (quibus infani vobis similes vinciuntur) & cum voluptate quidem absumerem.

## CAPUT IV.

## De Anguilla.

TAB.  
XXIV.  
7.8.

Aldrovand.  
de Piscibus  
l. 4. c. 14.

QVem piscem Latini Anguillam ab anguis similitudine dicunt, illa Græcis veteribus ἰχθυόλη, ὁμοίῳ δὲ ὅτι quod commoto cæno feliciter capiat, modèrnis ἰχθυόλη, vocatur. Lacedæmonii ἰχθυόλην dictas, apud Helychium legimus. Est ex piscibus *maximè* qui in aquis dulcibus geniti, ad mare descendunt.

Duo ipsarum sunt genera, Maius & Minus. Illi caput brevius, crassius & latius, color fuscus: in profundo degit, & aqua deficiente sæpe in limo, ut inde effodiatur, occultat. Ad mare nunquam descendere, sed semper in vallibus degere, quidam affirmant: Mares Rondeletius vocat. *Hæc*, quod Anguilla simpliciter dicitur, caput longius & acutius, & in mare descendit. Læves sunt in universum & lubricæ, ut manu teneri non possint, si inclusæ tenentur, quacunque caudam exerere possunt. eadem totæ evadunt. Aristoteles eis quæternas utrinque *branchias*, sed simplices tribuit.

Alias quoque branchias pauciores minusque continentes habere scripsit. Athenæus verò ex Theophrasto exiguas. Cuticulæ quæ hæ-

teguntur, Parvula inest *rima*, quæ causa est, quod in turbidis aquis facile strangulentur, & in aere diutius vivant. Teste eodem Aristotele *galem* quæ paucis piscibus contigit, habent, licet exigua, ventreque sunt exiguo. *Fel* jecori hæret. Hoc magnum est, illud aqueum. *Pinguis* inest paucis, plurimæ eo carent. Hippocrates tamen pinguedinem habere scribit, eandemque naturæ hominis inimicam: cæterum hæc pinguedo à carne separata non est: quare alias dicebat Philosophus: seorsum enim à carne non pinguescunt: unde parvum eis in omento sebum esse solet. *Tergus* earum quam Murænis ctasius teste Plinio: cuius locum de pinnis huius piscis, ubi lumbricis pro lubricis legebatur, restitui in Lampetra ex Aristotele, qui longorum vel lævium alios ut Anguillam & Congrum binas pinnas, alios ut Murænam nullas habere scribit. Has juxta branchias hætere idem asserit, supinisque pinnis carere. A medio dorso & ab excrementi meatu veluti limbus cutis potius, quam pinnarum substantia superiores corporis partes ambit.

*Ventriculus & intestina* in longum protenduntur. Colot omnibus haud idem. Variat enim aquarum in quibus degunt, tatione. Quæ puram & fluentem incolunt, ventre (inquit Salvianus) sunt candido, dorsoque cineraceo sive subcitrulæo: quæ vero in impura & stagnante commorantur, ventre subalbo, dorso vero subviridi vel subnigro apparent: Os habent satis apertum, dentibus, parvis, acutis minutim, multiplici ordine. *Magnitudo* quoque non ubique eadem. Plinio atque Solino *Plin. H.N.* testibus in Gange ad tricenos pedes *l. 9. c. 3.* augentur: & Athenæi Pausaniæque *Athen. Di-* testimonio Copaidæ, item Strymonis *l. 7.* nix eximæ magnitudinis esse dicuntur. Archestratus Copaidas apyrenos quasi spinas & ossibus carentes vocat: Gesnerus & Dalechampius Lampetras inelligi volunt: quoniam hæc prospinis carilaginem

ginem habent. *Magna* vel ad brachii crassitudinem capi audio in aqua mortua (ut appellant) Galliz Narbonensis. In Italia ad viginti libras aliquando accrescunt; sed quæ superant, nunquam inventæ sunt.

*Locum*, si spectes Marinarum quoque Diphilus & Epicharmus apud Athenæum meminere, non quod ibi nascantur, cum paucæ & nondum adultæ nunquam, magnæ & adultæ raro ibi reperiantur; sed quod, ut Plinius, Aristoteles & Oppianus firmant, maria ex huminibus subeant. In nullo amnium qui Danubium influunt, reperiti in omnibus, qui Rhenum, licet ex uno aliquando cum illis fonte scaturiant, Naucerus & Albertus prodidere. Frigiditas Danubii fortè in causa, cuius aquæ ante fauces Alpium ab Occidente in Orientem fluunt: maior pars ex Alpibus descendit, & à parte Aquilonari, ante Alpes delabitur. Copaidum, quæ ἀνίχου, τρυφίδας, Pollux & Aristophanes commendant. Prodigiøsæ eadem interdum magnitudinis à Bæotis hostiarum more coronabantur, asperæque mola, cum precibus Diis immorabantur. Regiæ, quas Lethus circa Berenicem fluvius sibi vendicat, sequialteræ adillas, quæ ex Macedonia & Copaide lacu habentur. Suus iis & qui in freto Rhegii, & in Mæandro fluvio capiuntur honos. Strymonis quoque, Elori amnis, & qui ad Euclea fluvium, in precio fuere. Pars Britanniz Anguillarum terra à copia, quamvis ibi non degant, dicitur. Ad Aquas mortuas brachii crassitudinem æquant. In stagno Montepelienfi Latera dicto, trium vel quatuor cubitorum sunt longitudine. Ex Tarni fluvio, quinon solum auget, sed efficit Garumnam, quæ parte in eum erumpit, tanta copia defertur, ut una die xvi m. in nassis inventa sint. In Mintio amne quandoque mille glomeratæ capiuntur, Arist. H. A. ur apud Cardanum extat. Malè ergo ἐν τῷ τῷ Ἀλφειῷ κίχριν, in sta-

gnis promanantibus, ut Scaliger vertit, reperiri negat Aristoteles.

De *oriu* dissentiunt Authores. Plinius, Anguillas arterere se scopulis, ea strigmenta viviscere, nec aliam earum esse procreationem scribit. Secundum Aristotelem, in

dissectis neutrum sexum, nec vel ova vel semen deprehendas; in temporibus siccis, sed post imbes, idque exiis, quæ vocantur γινῆτιες, terra intestina; quæ sunt in cæno & putredine; maritimis quidem locis, quæ algam producunt; in stagnis verò & fluvii propè ripas, quia repositivæ calor illic putredinem gignit. Plinio Athenæus & Oppianus ex veteribus, ex recentioribus Rondeletius ad stipulantur. Illi complexas coire, & strigmentitium, quid emittere, ex quo cum in limo fuerit, ἐν τῷ βορβόρῳ ἐπὶ τῷ ἡμῶν γινῆτιος, animal generetur, prodiderunt. Hic inferiore ventris parte vulvam in feminis, semen in maribus esse, multa pinguedine perfusas non apparere, corporum complexu coeuntes à se visas scribit. Utroque id fieri posse modo credo. Nam & Bernicæ in Scoticæ Oceano ex vermine nascuntur, post ova excludunt. Eadem & Rondelerii sententia. Addit enim, cum equus mortuus in stagnum Megalonæ injectus fuisset, innumerabiles paulò post ibidem visas Anguillas. *Nutrimetum*

ipsarum sunt, radices herbarum & cuncta quæ in limo offundunt, visæ, tanis, vermibus & piscium partibus vesci. Paxamus hirudines, Homerus cadavera, quidam seipias invicem, Plinius edulia si quæ apponuntur, devorare, testantur. Purissimam tamen aquam impensius amant, idè in quadam Britanniz parte, ut Alberrus ex Beda refert, in ortu Cosmico Plejadum hoc est xviii. Calend. Junii, quod tunc propter ventos, qui initio veris è terra erumpant oppositos aqua nunquam luto turbetur, ingens ipsorum copia; & à turbida abhorrent adeò, ut Athenæo teste, cum

Plin. H. N. l. 9. c. 61.

Aristot. H. A. l. 6. c. 15. edr.

Scalig.

Athen.

Dipnos.

l. 7.

Oppian.

Halieut.

l. 1. v. 156.

Aristot.

H. A. l. 8.

c. 2.

Athen.  
Dipnos.  
l. 7.  
Aristot.  
H. A. l. 6.  
c. 14.  
Aldrov.  
de pifc.  
l. 4. c. 14.

Athen.  
Dipnos.  
l. 7.

Scalig. ad  
Arist. H. A.  
l. 6. c. 15.

ventris turbatur suffocari, & quidem propter exiguas branchias, soleant. In exiguis aquis mori dixit Aristoteles, hyemem malè ferre, Plinius.

Aristot.

H.A.I. 8.

c. 2.

Plin. H.N. nius.

L. 9. c. 21.

De reliqua ipsarum natura hæc habet. Noctupasci, interdiu limo quiescere, ideo separatim ab aliis degere piscibus; exanimis piscium more non superfluitare, ut apud Plinium legimus, quod ventre sint exiguo, pingue paucis insit, plurimæ eo carcant, ut Aristoteles tradidit, aqua tranquilla efflare, id bullarum indicio colligi eodem genere motus, quo serpentes in terra, id est celeritè, moveti, ita ut dum Phalacrocorax integras devoravit, mox per intestina delabantur, idque vel novies aliquando fiat, in sinu detentas, hominem aliquando ita circumplecti, ut nonnunquam suffocent. Annis septem vel octo, quod

Arben.

Dipnuf.

L. 7.

Aristot.

H.N. I. 8.

c. 2.

Plin. H.N.

L. 9. c. 21.

branchias pauciores minusque continentes habeant, & paucum humorem admittant, vivere, extra aquam ad quintum, sextumve diem si loco umbroso, & frigido; (si à sole tangantur in terra brevi moriuntur) reponantur, à motu non impediuntur, & ventus septentrionalis aspicit; exconiaras & in partes scissas far diu. Tonitrua denique adeò timere, ut profundo ad superficiem enarent, frigoris adeò impatientes esse, ut cum Anno M C X X V. omnia gelu & glacie rigerent, in terram proroperent, & intra sæni cumulos se abderent.

Disciplina non omninò expertes esse videntur. In Jovis Lebradii namque fonte Anguillas è manu vesci & inaures additas, à veteribus proditum Plinius refert; & in Arethusa Chalcidensi, Anguillæ & Mugiles mansueti inauribus rum atgenteis ornati accipiunt à largientibus cibos, à sacerdotibus viicera & caseos, ut Athenæus scribit, & Ælianus, item Pitaræhus, qui sacras hæc Anguillas vocari ait. Nymphodorus denique in Eloro amne tradit Lpos esse, & Anguil-

Arben.

H.A. I. 14.

c. 3.

las magnas adeò mansuetas, ut è manibus etiam porrigentium panem capiant: quod & Apollodorus scribit in Chronicis. *Hosiliter* eas tractant, Ardea, Corvus aquaticus Phalacrocorax ex avibus; ex quadrupedibus Lutra, quæ tamen amputato plerumque capite discedit, ut piscatores prodiderit.

Quantum ad usum in cibis, delicatissimas olim fuisse certum est. Maxander inter paucas sumptuosissimi convivii, quæ talento ferè constarent cupidias enumerat. Phileratus miseris divites, qui parè viverent, & Anguillas non ederent, dicebat. Alii cernarum Helenam, voluptatis reginam, præ Diis honorandam, &c. dicebant. Sybaritz, iis, qui eas piscarentur aut venderent, immunitatem, reffe Athenæo, decreverant. Hicæus denique succi bonitate ceteris præcellere, stomachoque gratas esse reliquit. At medicis quamvis carnem mollem habeant, succo tamen lento & pituitoso abundanti inflammationem pulmonis, quod pinguedine hominis naturæ maxime insensa oblinantur, inferunt; sumptuosa humiditate, quam partibus alluunt, turbidam & sonoram vocem reddunt; & secundum quosdam, nescio quid, quod nisi eximatur in periculum vitæ coniciat, habent, ideo forè capus, cauda, & à quibusdam oblonga, quæ nigricans per dorsum fertur vena, absciunduntur. Platina ubi præparationem Anguillarum eximiam dedit, subjungit acutissimè, sic paratas hostibus apponendas, quod nihil boni in se habeant.

His noxis infringendis, veteres betæ involutam, ut vitiositate sua humidum detergeret, comedebant: Salernitani vinum forè hoc est generosum & crassum, quale est rubecum præscribunt, nam si tenuè biberetur, Chylus in venas anteperfectam coctionem abiret & in corpus raptus Cachexiam excitaret.

idem

Arben.  
Dipnuf.  
L. 12.Hippocrati.  
L. 2. de  
Diata.  
Galen. de  
Alim.  
L. 3.

idem accidit, nisi pedetentim, & parum velut pitillando hauseris.

De *Ufu in Medicina* tantum observari apud Authores, *Pinguedinem* in elixatione supetnatantem unguentum ad plagas ingredi, de tosta destillatam, aurium & nervorum doloribus mederi; glabeo capiti illitam capillos restituere, cum pinguedine anseris, succo rutæ, absynthii, heræ terrestris, & Cynoglossi subactam, ad vulnera præstantissimam esse: Fumum ex salutarum cule exceptum; tormina ventis ex dysenteria sopire; in vino putrefactam vini tædium parere. Eviscerata, tufam, & in olla vitrea coctam, cum pinguedine ac liquore, qui in fundo valis remanet, hæmorrhoidum cruciatus egregiè lenire. Cingari Anguillas Equis per anum inserunt, ut obesoiores, & agiliores videantur, Hippia tri quidam equo asthmaico Anguillam vivam ori inserunt, ut per intestina elaboratur. Alii & parvam imponi jubent purgationis causa. Nec propterea mortis periculum esse aiunt: quin Gesnerus asserit nautam sibi notissimum vivam integram deglutiisse, integram per alvum, vivam reddidisse. Idem author est, aliquos aureum & cholobaphicum colotem ex felle Anguillarum, aliorumve piscium vel boum parare: miscere autem aceti modicum & cum cetera subigere in massam. Prætextatos earundem tergore verberari solitos Verrus teste Plinio tradit, & ob id multam his negat institutam. Prætextatos appellans impubes, eos nempe qui frugem aratro quæsitam nocte furtim secuisent, aut depopulati essent.

## CAPUT V.

## De Orbe.

TAB. XXIV. Huius piscis solus meminit Plinius. Durissimum esse piscem, inquit,

constat, qui Orbis vocetur: rotundus est, & sine squamis, totiusque capite <sup>Plin. H. N. l. 32. c. 11.</sup> constat. Geinerus Apuleii, *Cranium* esse opinatur, quod ad cranii formam <sup>Aldrov. de Piscib. l. 4. c. 15.</sup> magnitudine, rotunditate, & dentibus humarotum similibus accedat.

*Tria ipsius genera* describit Rondeletius, *quartum* addit Aldrovandus.

*Primus* qui Orbis simpliciter figura, si caudam demas, sphaericus est. Squamis profus caret, cuteque tegitur admodum dura; quam asperam efficiunt aculei duri, quibus tota cõspersa est. *Rostro* caret: *Capitisque* nullum apparet vestigium, quin (ut Plinius ait) totus capite (malim ventre) cõstare appareat. *Os* habet parvum, dentes vero magnos & latos, utrinque binos. Supra os duo exigua sunt foramina, olfactus, auditusve instrumenta: *Oculi* mediocres. Circa corpus medium unica est & semicircularis utrinque *branchiarum* scissura: prope quam etiam utrinque unam haud magnam, sed rotundam pinnam habere Salvianus ait, & in iconce exprimit. Rondeletius unicam esse ait, ut in Caprisco. Hic & in summo dorso pinnulam pingit qua Bellonii icon & Salviani quoque caret, & ipse in descriptione non meminit. Eam tamen etiam videre est in iconce ad sceleton efficta à Gesnero, quæ hic exhibetur. Posterior corporis pars in *caudam* brevem & rotundam, inque latam & fere lunatam pinnam desinentem degenerat, in cuius parte media atque superiore, pinna una etigitur, altera quoque inferiori parti hæret. Color ei cineraceus, lineis quibusdam latis & obscurioribus ex pisco medio exortis posteriorem eius partem ad caudam usque pingentibus. Est maris *Ægypti* accola, ex quo Nilum quoque subit, & in eius ostio, quod Saiticus vocatur, capitur. Ob insolentem corporis detractum corium tomento impletur, & in domibus ornatus causa suspenditur: suspensus, rostro cæti partem à qua fiat ventus indicat. *Alter Scutatus seu Scutifer* dicitur, & in Septentrionali Oceano capitur.

<sup>Aldrov. de Piscib. l. 4. c. 16.</sup>

Q 2 EST



Est corpore terete, mucoso, capite magis exerto quam superior: oris scissurâ majore, dentes in eo sunt plures & minores; oculi parvi, & exquiescent rotundi. Branchiarum rimam multo majorem habet: intra has pinnas duas. Subest prosterno os illud, quod scuti specie esse diximus. Neque prona neque supina parte pinna habet, cauda in unam latam definit. A capite ad caudam usque ossa ovi figura disposita sunt inter quorum intervalla aculei interjacent. Pisces est rarus & non edulis. Tertius est *Echinus seu Muricatus*. Aculeis totus hic Orbis riget, ut manu tollere non possis, nisi cauda extrema apprehensa. Capite est multo minus exerto quam proximè descriptus, corpore magis rotundato & majore, in quo nullæ sunt pinnae præterquam in cauda, quæ in unam definit. Sunt qui Hystricem ab aculeis, non inepte appellant. Possit etiam nonnullis videri *Æliani Sagittarius*, quem rubri maris pisces esse scribit. Sagittarius in eo mari procreatur, & quoniam erinacei speciem & similitudinem habet: firmis & bene longis armatur aculeis. Sed de hac re judicent ij, qui matris rubri pisces viderunt. Nihil temere de rebus parum compertis affirmare volo. Quartus, quem Aldrovandus dedit, quod ad otis figuram potissimum cum Scutato convenit, *Stellatus* sive *Asterius* cognominatur, quod totus conspersus sit stellis seu asteriscis: differtque à cæteris, quod neque ad branchias, neque in caudæ exortu pinnas habeat, sed ultra tergoris medium, nisi pictoris id incuria factum sit. Pinnae etiam caudæ in extremo vitidi sunt colore.

## CAPUT VI.

## De duobus piscibus Orbibus annumerandis.

TAB.  
XXIV.  
13. 14.

O Blongi quidem hi Pisces sunt, Orbibus tamen, annumerari

posse censet Gesnerus, rû quod mucrones ut illi in corpore eminentes habent, tum quod à muco, quem similiter ore emittunt, vulgo *Snottol* quasi *Myxini* aut Mucones appellantur. In prioris effigie color erat circa dorsum, qualis in terrestribus ranis videtur: circa latera & Inferius ex subæruleo & viridi pectmixtus. Antverpiæ cineteo colore capi audio. Sicille. Alterû & hic quoque depictum, Snottolis nomine missum, ex icone, sive ea, inquit, naturalis, sive aliqd etiam in ea artificiosum est, sic delineavit. Longa est dodrantem & palmos duos, lata palmum unum, circa medium præcipue ad caput attenuatur, sed magis ad caudam: dorsum medium fastigiat, punctis notatur variis, subrotundis, & eminentijs exasperatur triangulis, per tres aut quatuor ordines digestis per intervalla. Oris hiatus, figuram sive ovalem refert. Pinnae ad branchias binæ, una in fine dors, altera in fine ventris, inter quas corporis pars extrema veluti disereta, & articulo distincta videtur. Cauda tripartita, sive natura, sive potius arte. Mucosus admodum est, inquit ille qui misit: non ossium, non carniū quicquam habet: mucoso tantum lentore expletur. Capri difficilissimus. Nam ubi hamum vel retia senserit, suum illum mucum evomendo, lubrica reddit omnia, contractoque orbem exuvio profluit. Mollem quidem & mucosam carnem, & eminentias trigonas, cum alijs Snottolis communes habere videret.

## CAPUT VII.

## De Holosteo Bellonij seu Ostracione Gesneri, &amp;

Catan.

DE hoc Pisce sic ex Gesnero & Bellonio Aldrovandus. Hunc quoque Tab. XXV. è mari Nilum subire, etsi ignoremus, 7. 8. 9. matinum tamen esse ex cori duricie cõpicimus, qua testâ fere ostreaceorum imitatur, unde cum ob hoc, cum quod *ignotus* à Strabone inter Niloores pisces

piscēs numeratur (in vulgaribus Strabonis codicibus impressis legitur *segius*, sed interpret Latinus *segius* legisse videtur, vertit enim ex testaceis, impetire: & in epitome scribitur *segius*.) Gessnerus *Ostracionem* hunc piscem nominandum conjicit. Bellonius vero non aspernando nomine *Holostrion* appellavit, quasi totum osseum. Forma (inquit hic) ad pentagonum accederet, pedalis intermedium longitudinis. Incolæ ab intera:neis protinus emundari curant, deinde vero testam eam duram (testaceum corium) qua contegitur, multos annos incorruptam servant, ut inde lucrum consequantur, quod à negotiis totius externis novitatis gratia huiusmodi piscis emisit solitus.

Cæterum dum vivus est penicillam incandā habet, & pinna supra & infra caudam: actus pinnam aliam utrinque; oculos albos, os parvum. Color eius laetescit, & velut in pallidum languens. Is quem ego in museo jam multos annos inter rariora refero, & hic depictum ostendo, ab eo quod supra rostrum conspicitur tuberculo (nasum appellare liceat, piscē ipsum ab eo *Nasum Niloticum*) ad extremam usque caudam vix implet duos do-drantes. Totus est pentagonus, totusque item ex articulis sermē pentagonis (ut icon ostendit) constat, qui coctione, imo per se temporis diuturnitate dissolvuntur. Branchiarum scissura semicircularis: juxta quas utrinque pinna est, parva quidem si corporis magnitudini compatetur, sed perquam robusta: post podicem alia similis planē sed brevior. Uropygium totum cutaceo corio tegitur, ut quod mireris, in ostreaceum totius corporis tegumentum ita inferitur, ut à lateribus ei annecti non videatur, quin laud aliter corpori affixum est, quam navi clavus: oportuitque cutaceum esse, ut mortui promptus, idoneusque foret. Oris rictus per corporis portione exiguus: in quo dentes utrimque fere octo, non absimiles dentibus murium. Utraque maxilla eutacē etiā, nō ostreaceo corio quod ad modum ineptum fuisset, constat.

Habes hic huius generis piscem alium æque duro tegumento præditum, sed qui dimidio minor est, nō pentagono corpore, sed ventro triplo quam tergo, latiore, lateribus quodammodo concavis: cuius item articuli nō pentagoni, sed ferē rotundi, & orbiculari, & in singulis asteticus venustissime spectabilis. Eminencia quæ in medio dorso est, non pinna, sed planē ossa substantia gibbi specie. Pinna vero in eius conspicitur extremo. Cætera superiora similia habet, præterquam quod naso (ut vocabam) caret, & oculi sub majoribus tuberculis latent.

## HISTORIÆ PISCIVM

### LIBER III

#### De Piscibus fluviatilibus.

#### TITULUS I

#### De Piscibus fluviatilibus squamosis.

#### CAPUT I

#### De Trutta fluviatili.



Antum de Piscibus *ira*. TAB. XXVI.  
*degius* & *carad* q' *mu*. Fluvia-  
niles sequuntur, & hi vel i.

*mere tales, vel qui etiam in alder. de*  
*alio dulcebus aqua vivunt, vel lacustres. Pifib. l. 5.*  
Inter Fluviales eoque squamosos.

primus est *Trutta*, Ambrosio *Troita*, a trudendo Platinæ, quoniam semper in advesum & impetuosum flumen nitatur, adversas undas superare. Itali *Torrentidam*, quod in torrentibus & rivis montanis abunde vocaverunt. An veteribus fuerit cognitus incertum. *Theodonem* Aufony Figulus putat; *Rondeletius*, *Gillius*, & *Bellonius Salarem* eiusdem. *Jovius Lupum varium* *Columellæ*, *Gessnerus Atheni* *pyrrunt*. Figulo obest, quod *Theodonem*, *Salarem*, & *Farionem* unum piscem faciat. *Salarem* parvum esse *Salinonem* superius dictum, & *Pœra*

Q 3 claris

clarissimè indicat. Nec *Trutta Lacustris* seu *Salmonata* erit, cum hæc in lacubus nascatur. Lupos inter duos pontes in Tyberi capi diximus: *Truttas* suburbani jamnes ex *Reatinis* Sublaqueanisque quotidie suggerunt. Illi frigidus vehementer pertimescunt, frigidiorib<sup>9</sup> duntaxat locis gaudent. Quod verò *Ælianus* in *Astræo* *Macedoniz* fluvio pisces *trutta* vocat, *gignit*, & peculiare quasdam muscas circa summam aquam volitantes appetere; piscatores, pro his muscis purpurascens lanâ bannum vestire, & gallinaceas pennas dias cerei coloris addere, ut pisces decipiant, prodidit, egregiè *Truttis* conveniret, si nomen additum fuisset.

De *Pygæntibus* credit *Gesnerus* *Mnesitheum* apud *Athenæum* loqui, cum ait. Ex fluvialibus optimi sunt, qui in rapidissimis fluviis versantur, *hi* enim non gignuntur nisi in rapidis & gelidis fluviis & facilius quàm ceteri fluviales concoquantur. Convenirentque ista *Trutta* nisi *Causabonius* pro *hi* *trutta* scribendum esse *hi* *trutta* *trutta*, ita, ut sensus *Athenæi* sit, optimos ex piscibus fluvialibus illos esse, qui in fluminum locis, quæ maximè æquarum impetus vergit, quæque rapidissima sunt, quod plus exercitii habeant, vivunt, putaret. *De ipsarum Forma sic scribit Aldrovandus.*

Sunt *Truttæ* & *Salmones* multa cõmunia; forma nẽpe tota, & corporis partes externæ & internæ: *caro* rubicunda, *squama* exiles, *macula* seu pûcta, magnitudo, formæ mutatio, circarostrium præsertim, ac simul nominis: (in *Truttis* *Salmonatis* peculiariter) ascensus ad summam aquas saltum vis & agilitas, suavitas in cibo: quamobrem non est mirum si ex *Truttis* illis, quas Germani *Lachsforen* appellant, aliqui ætatis progressu *Salmones* fieri putaverunt: *Pinnis* etiam quatuor natant, quemadmodum *Salmo*. *Cauda* vero maximè invicem distinguuntur. In *Salmonibus* enim ea gracilescit, in *Truttis* semper lata est: in illis pinna caudæ longa & bifida, ut in *Alofis*; in *Truttis* brevis &

non divisa. Hic accedit rostrum acutius in *Salmonibus*, quàm in *Truttis*. Rursus *partibus* internis à *Salmone* & *Umbra* fluviali non differunt, nisi quod ventriculi appendices plures & evidentiores habent. *Cardanus* formam *Truttis* omnibus communè esse tradit, quod quidem de fluvialibus verum fuit: nam quæ *Salmonata* cognominatur, non parum ab illis differt, utculibet icones conferenti notum esse potest. Quæ flavescunt item & nigricant, ab *albis* differre *Rondeletius* testatur, quoniam illis rostrum sitacutius, & veluti in fronte macula nigra. Præterea albas minores esse & carne minus flavescere.

*Fluvialis*, corporis forma Lupo (inquit *Salvianus*) persimilis est, rostro tamen minus extenso, magis retuso & paululum recurvo. Ore etiam paulo minore. *Alba* testante *Rondeletio* capite Mugilem quodammodo referunt: brevi namque, subrotundo, carnoso, vel potius pingui, coloris lactei. Maxillæ & lingua acutissimis dentibus armantur. *Sylvius* sex eorû ordines esse scribit, primum labris connatum, alios quinque à labro in pharyngem abscedentes: in quo tamen dentes sint in contrarium hamati, & qui cibum ex ventriculo regredi prohibeant. Idem ait, branchias utrimque quatuor dentibus humatis & asperis & duris contrumaces habere: quæ verba non satis percipio. *Cardanus* & *Bellonius* sex inquit in lingua dentes habere: addit *Cardanus* & certo ordine dispositos: scilicet duos ante, totidem in medio, ad latera positos reliquos juxta radicem. Qui vero in oristitu sunt, eorum *Bellonius*, quinque ordines in superiori parte palati facillè posse scribit denumerari. *Pinnas* duas sub ventre superiori tergoris oppositas, & duas ad radices branchiarû habet, quæ rursus versû caudâ proxime ad anũ, quæ idem è regione est superioris indotso, quæ longo minor est & cutacea. Oculos habet rubetres. Corpus squamis parvis tegitur, & cute quæ facile rugatur, & carne divellitur, absceditque.

*Dorsum,*

*Dorsum*, Imo totus fere piscis ex albo flavescit guttis, quales diximus. *Cauda* in brevem & latam pinnam degenerat. *Pinna* tergois, iisdem quibus corpus maculis conspersa est. Cubitalem magnitudinem non excedit.

*Differentia* à coloribus duntaxat sortiuntur. Bellonius ex Rila Neustriæ flumine variis notis pictas videri, aliis atque aliis multum diversas, tametsi in eodem tractu experiri, scribit. In Santonum & Bosorum fluviis, reperiuntur, ut Rondelerius prodidit. Captam allicubi flavi coloris & admirationi fuisse, apud Gesnerum legimus. Subnigræ, maculis rubentibus notatæ, quem colorem ex senio contractum, quod ex maximæ sunt, Rondelerius putat, in Mithia sunt vulgares. Sunt ibidem *Lachisforen* dictæ, nomine ex Salmone & Trutta composito, quæ aureis maculis pinguntur. Subnigræ rivi ad Correndorfum, & fluvius quem Nigram aquam vocant, Suarceburgum oppidum alluens, alit. Multis in locis optimæ reperiuntur, & quamvis in maloribus fluviis reperiantur, in minoribus tamen frigidioribus, saxosis & inter montes delabentibus potius quam contra se habentibus, nasci & degere constat. In altis item montium rivis, etiam tenuibus & exiguis aquis, Truttæ satis magnæ & pulcherrimæ habentur. Ascendunt enim altissimæ, cum & contra aquam luctari magna vi, & saltu se promovere, ad tres vel quatuor ferè cubitos interdum, in ascensu queant. Ex quibus efficitur, ut haud falsa esse credamus, quæ de iisdem Paulus Jovius scribit, eas adversos amnes vel è præruptissimis etiã cauitibus decedentes, incredibili impetu subire. Ab Nare enim fluvio in Vellinum lacum, qui hodie Pedelucus est, stupendâ velocitate volucrum modo ascendere credi: qui lacus ab altissimo montis vertice certis primo coarctatus angustis, & mox tota aquarum mole præcipitatus, nec subiectis quidem cautibus madefactis, veluti è cælo in ipsum profluentem Na-

rem effunditur. Idem in Gardonis fluviis fieri experientia docuit.

*Vesuntur* aquarum dejectamentis, phryganiis vermibus, locustis aquaticis, & piscibus. Percarum sobolem, Fundulos, & Phoxinos læves, rancæ sæpè aviditate appetunt, ut supra aquam elatæ in scaphas aliquando incidunt. *Auro vesci* vulgus credidit. *Periunt* mense Octobri, in modicis quas excavavere scrobibus. Laudantur vehementer in *Cibis*, maxime si in frigidioribus & putionibus amnis procreatæ sunt.

Quæ adverso eorundem impetu fatigantur, atque occurrentibus inæqualium vadorum petris illiduntur castigatiora sumina, & aridiusculas carnes ostendunt, sed recenter captæ comedi debent: mortuæ enim paucissimis horis, quia ob pinguem tenebritudinem ocyssimè putrescunt, saporis gratiam amittunt. In Malacca regione Indicæ, salitæ ad comæatus servantur, Cayuba vocant.

## CAPUT II.

## De Trutta fluviali altera.

**H**VCH apud Bavaros (inquit Gesnerus) nuncupatur piscis boni saporis, Truttis non nihil cognatus, cū alias ut pictura ostendit, quam ad vivum expressam Achilles Pyrrminius Cassarus, præstantissimus Augustæ Vindelicorum medicus ad me misisset, tum quod pinnulam illam adiposam similiter in fine doli habet, & punctis variatur: sicut & icon nostra, & quæ in libro Bavaricarum constitutionum publicato habetur, præ se ferunt: in quo etiam mensura huius piscis proponitur, duodecim aut tredecim digitis, quibus brevior vendi non debeat. Augustæ, ut audio hic piscis vocatur, cū Rot/Rottle, à colore rubicundo, quæ nomina nostri Vmbilis (ut Sabaudi nominant) lacustibus tribuunt. Voracem esse aiunt, in cibo Truttis inferiorem.

In

In Carinthia Huchæ rubræ (Ror Huechen) quædam cognominantur in fluviis, eas Salmoni comparant: carne etiam rubrâ & boni saporis esse aiunt, & saltri ut inveterentur, solet: quod quomodo hat Balthasar Stendelius ad finem lib. 4. Opiopetæ suæ Germanicæ docet. Colores huius piscis in pictura nostra huiusmodi se apparent. Aut colus color passim aspersus est, copiosius tamen circa branchias & oculos. *Pinna* circa branchias rubicundæ sunt: cæteræ omnes, sicut & *cauda*, fuscæ & maculose punctis partim nigricantibus, partim aureis. *Dorsum* fuscum est, utrimque ad indicum vel cæruleum colorem vergens, ubi & punctis nigris creberrimis distinguitur. *Linea* nigra & recta fere à branchiis ad caudam fertur. Lateta media maculis quibusdam subcæruleis per intervalla distinguuntur. *Venter* candidat. Circa *rostrum* & branchiarum opercula roseus fere color, &c. in capite etiam viridis aliqua ex parte. Huchas istas quidam iconè nostra inspecta in quibusdam Germanicis locis ali, in piscinis nobis referebant: & in Traga flumine Carinthiæ reperiri, ætatis progressu in Salmones converti (specie rostri nimirum) licet & lacustres Truttæ, quamquam & aliz Truttæ Salmonum speciem præferunt.

## CAPUT III.

## De Thymallo.

TAB.  
XXVI.  
3. 4.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 14.  
Alien.  
H. A. l. 14.  
c. 22.

**T**hymalli solus Ælianus inter Græcos, Ambrosius inter Latinos mentionem faciunt. A Thymo quem olet ita dici, Salvianus contendit. Bellonius Thymum vocavit. Itali Temarum, quasi temerarium, quod stolidus piscis, dicunt. Truttarum generis esse, cum pinnarum situs, rum totius corporis figura indicant. Eratque Ælianus Truttis, si eas notas sibi habuisset, potius quam vel Lupis vel Cephalis, quorum communem & mediam speciem similitudi-

nemque gerere scribit, assimilaturus: quamquam & his non abii nihil multum: similior interim Mugili, quam Lupo. Caput pro corporis ratione parvum, in acutum tendit. Os aperitur nō longo, sed quadrato fere hiatu. *Ventre* est prominentiore. Rondeletius latiorē, magisq; ventrosū pinxit, quam pat est. *Pinnas* duas habet ad branchias, duas alias in ventre inferiore, à podice unam. In dorso prior magna est, maculis multis pulchre variis: infra partim nigris, partim subrubentibus, supra rubicundis tantum, *Cauda* in duas latas pinnas desinit. Rondel. corpote ait esse cæruleo: Bellonius verò tergos ex livido in opacum tendere, & Gesn. fuscum id, vel subcinereum facit: Atqui hic exprimitur, Rondeletius scribit: fierique potest, quod vel loci, vel ætatis ratione evanescat. Lineas per latera rectas habet, quarum quæ ea dividit à superioti branchia angulo spineo otitur, & recta ad caudā defertur: sunt & aliz per totum corpus non paucæ, singulæque per singulos squamarum versūs, non rectæ, sed innumeris veluti arcubus, minimis triangulis undutz; quod veluti operculum pictores nostri, inquit Gesnerus, non indicant. Obscurè sanè & in meo pice quem ad vivum depictum in museo refero, pictoreas expressit. Latera præterea modo pluribus modò paucis punctis & lituris nigris temerè asperguntur.

Vidisse se idem Gesnerus in fine Decembris aliquando singulis tantum utrimque ad branchias *liturâ* insignem scribit; aliumque initio Junii, uno altero puncto vix apparente. *Squama* ex eiusdem observatione, singulæ fere *pinnas* sunt, hoc est, rhombi figuram imitantur. Latera enim, inquit, earumque utrimque circuli segmentum referunt, supra vero infraque in cunei acumen tendunt, quod tamen in iconibus suis expressum negat. *Branchias* habet utrimque quaternas, & ut Bellonius addit, Harengi & Sardiniæ modo, solidioribus horrent, uncinatisque oculis constant. Idè Bellonius *linguam* ostendere albam

albam feribit, dentibus caret, immo ne ullis quidē rudimentis eorū prædium esse: ē contratio Gesnerus pro dentibus, inferius supetiusq; labrum exasperat, limæ instar, introctum perficitur: & Bellonius haud bene istæc exanimasse apparet: nam alias *Lavaretum* Gallice dictū piscem, ollicula ad fauces atq; Oesophagi ingestum utrimq; habere senis hinc inde denticulis ait, ut in Themolo cōminuta; cū alioqui in Thymallis, & in Lavaretis suis nihil quicquā tale reperlas. *Ventriculum* habet medioctem, intestina crassiuscula, pinguedine multa obvoluta; & ut Bellonius ait, apophyses plures ex pyloto dependent, à quo statim sequitur intestinū unū gracile, rotundum, q; ad rectū tendit, in quo excrementa recipiuntur, & ad anum deferuntur. Idē Bellonius, eorū tā exigūū habere scribit, ut ne inesse, q; dem eructedatur. *Splenē* Salviā<sup>9</sup> subrubrū facit, Gesnerus in suo quē manibus tractavit, ferē nigricare asserit. Bellonio teste hic tā magnus est fere in hoc pisce, q; hepat, quod in nullo alio pisce (inquit) unquā viderā, oblongus rubra pinguedine mixtus. Unicus hepaticolobus est, ut idē Bellonius observavit, statim ubi gula finit, stomachū amplectens. Salvanus *felle* catere putat: Bellonius veto tam exiguum id esse tradit, ut vix rudimentū aliquid eius appareat: & Gesnerus quoq; suū Thymallum felle caruisse negat, sed flavū vel subaurei coloris id habuisse. Bellonius folliculum piscium nationi accommodatum plenum semper vidit, ac per spinā delatū. Cum maxime augetur, ad cubitalem *magnitudinem*, teste *Æliano*, excrefcit: etū qui crebrius capiuntur, minores sint, & ut Salvanus ait, libram non excedunt. Longitudo ad latitudinem ferē quintupla est, cauda etiā computata, ut Gesnerus advettit in eo quē manibus tractans descripsit, latus enim erat digitos tres, longus quatuordecim. *Gaudent* puris frigidis & saxosis aquis, in quibus circa saxa reperiuntur: nec ulli magis in mōtanis & præcipitibus fluviis, Truttas si excipias, capiuntur.

*Gignunt* eas in Germania Rhenus,

Limagus apud Helvetios, & Floha apud Misenos; in Italia Ticinus, Abdua & Ambra. In Pado rarius capiuntur. *Præstant* insectis aquatilibus, dejectamentis mille pedibus, pediculis, cardibus, pulcibus aquaticis ac terrestribus. *Ælianus* alia quā culice escā capi posse negat. Volaterranus Thymallovesci, & solus quidē inter scriptores, voluit, *generālyz*, id est aurivoti dicuntur, seu q; minutula auri fragmenta ppter splendore appetāt; seu quod cū majoti pteio vnziant, obfophagorū aurum absorbunt, & oculos exhauriant. *Deodore eius ita Ælianus*. Elus capi odor non indignam admirationē habet: notū n. ut cæteri pisces pisculentum quendā mittit odorem: imo verō existimes te ejus gētilem herbam, recentem ex terra lectā manibus tenere. Tanta sanē odoris suavitate fragrat, ut qui eum ipsum non videt, gratissimā apibus herbam, unde nomē duxit, in manu latere putet. Ambrosius de eo, qui gratam redolet suavitatem, dici facile scribit. Aut piscem olet aut florem: Omnitibus sui partibus cōmendatur in *Cibū*: quibudam tamen interiore tunicā maxime blandiuntur. Circa Album præferuntur Truttis. In Athesi & Addua capros tenerrimos Salvanus fecit. *Majo* menle maxime appetuntur, & loco marinotum laxatiliū præferuntur à Medicis.

*In Medicina*, Adeps hujus piscis laudatur, tum contra auditum gravem, si mense *Majo* in vasculū conjectus soli exponatur, & quod distillat, auri immittatur; tum contra oculorum pterygia, ungues, tubotem, fervorē, &c. si quotidie binæ guttæ cum pinna instillantur. Vidisse se puellā chemosis affectā Gesnerus inquit, quod malū aliquādo exanthemata puerorum sequitur. hoc temedio per septuaginta ferē dies continuato, (ut quotidie gutta instillatetur) curatam, rubore mox ptimis diebus sublato. Addit insuper, habere & pharmacopolas apud suos hunc adipem; & ab illis maxime ad oculorum remedia, ut maculæ in eis deleantur, peti solere, deinde etiam ad curandas igne vel aqua adustas partes.

R C.

## CAPUT IV.

## De Umbræ fluviatilis.

TAB.  
XXVI.5.  
Aldrov. de  
Pisib. l. 5.  
c. 15

**U**MBRÆ fluviatilis Aufonius ex venenibus in Mosella sua meminit, Gelsnerus pro eadem cum Trutta fluviatili, quod ista in Mosella imprimis ubi se in Rhenum exonerat abundet, accepit. *Rondeletius* ista de *ferripiscis*. Piscis est non solum nomine, sed & colore marinis (Umbris) similis, à quo utrique nomen. Corpus enim est opaci loci modo subfuscum & subobscurum, cubitalem magnitudinem non excedens. Galli Narbonensis, demptis Monspelienibus, Umbram vocant. Piscis est ex Trutarum genere, Carpio Italico corporis aspectu affinis. Pinnis & earum situ à Trutta non differt. Duas itaque ad branchias habet, duas in ventre, ab ano unicam, in medio dorso priorem majorem, posteriorem minorem, subrotundam, & pinguem, squamas parvas, & maculosas similiter habet. Carnis substantiam, partesque internas omnes caldem. *Capite* verò à Trutta differt, quo Carpio (Italico, Gelsnerus) similis est: capite enim longiore est, quam Trutta. ore minore necram hante, rostro non acuto, sed obtuso, maxime in maxilla inferiore, sine dentibus, & sine magna maxillarum asperitate. *Oculus* est parvus, cornea tunica aurea, pupilla nigra. Corpus à medio sensim gracilescit, in caudam latiusculam, & pinnam bifidam, latissimam deficit. A branchiis ad caudam linea recta (hanc in pictura non expressit) per medium corpus producta est. *Branchia* intus sunt quaternæ. *Ventriculus* longus & spissus pinguitudine quæ lacte candidior est, obductus, à quo mulx apophylæ pendunt. *Hepar* rubet, cui alligata est fellis vesica, *fel* nigerrimum est, *splen* longus & niger. *Intestina* sine gyris ullis ad anũ demissa sunt. *Festitur* terræ, aquilimo, unaque, cum his, & cum arena auri laminulas haurit: ob id vulgus auro nutrirî Umbræ credit: & revera in ventriculo & intestinis aurum reperiri certissimum

est. Carne est sicca & alba, qualis est Trutarum parvarum caro. Hyeme latet: æstare cum Trutis capiti: cui cum infusco & substantia, permultisque aliis similis est, Trutarum generi & tractationi subiecimus. Pura aqua maxime delectatur. *Hæc Rondeletius*, nulla coloris facta mentione, quem Bellonius non racuit: totum hunc piscem sub ventre argenteum, esse scribens: dorsum verò terassimum habere ex livido opacum.

## CAPUT V.

## De Barbo.

**B**ARTI quoque solus inter veteres **TAB.** Aufonius meminit. Nomen ei **Cu XXVI**, raceilli Ciri quæ barbe quodam-6. modum similitudine ex utroque huius *Aldrov. de* piscis labro dependent, fecere. *Bel. Pisib. l. 3.* lonius haud incongruo vocabulo-16. *Myssum* vocat, & Græcorum vulgo *Myssacum* vocari scribit. Sunt qui cum Mullis marinis piscibus, qui & ipsi barbati, confundunt. Corporis figurâ Mugiles sere refert, aut Squalos, nam si latitudinem spectemus, oblongiusculus est rotundus, in laterâ modice compressus. *Differt à Mugilibus*, quod pinna quæ in medio dorû, hrmiori aculeo innixa est: pinna ventris magis sunt flavæ; caudæ pinna rubescit: Rostro item est longiore & acutiore, carilagineo & pingui. *A Squalo* etiam perspicuis quibuldâ notis differt. Nam cum in extremo rostro Squalo sit os, infra rostrum in inferiore parte illud Barbis habet unde & superior eius maxilla paululum prominet: Labra item longe crassiora sunt quam Squalo, caputque compressius. Postremò è superioris rostri extremo duæ appendices, ex lateribus duæ alæ propendent: quibus & Squalus & Mugiles carent. Est autem appendiculum earum substantia cutacea quidem, sed mollis, lubrica, teres, subrubra. *Venter* est colore lacteo, latera argenteo. *Dorsum* ex albo flavescit, nigrisque quibuldâ ac parvis maculis conspergitur. *Branchias* habet quaternas: quarum rima admo-







Trutta. Fario

Fische Fore

Trutta

Tab. XXVI

Fische





100

admodum parva est: quamobrem extra aquam satis diu vivit. Ab iisdem linea ad caudam porrecta, minus evidens est, quam in aliis. *Dentibus* caret. *Oculi* parvi sunt, pupilla nigra, quam ambir aureus circulus. *Fel* adhæret jecori. *Intestina* in spiras conorta, plurima pinguedine oblita. *Pteris* oblongus est & bifidus, ovis innumeris refertissimus, cum prægnans est piscis. Pondere plerumque libræ unius, quandoque duarum, raro trium. Salvanus ad octo libras excrevisse observavit. Belonius frequenter in Nilo capi testatur, sed quo modo Lucius Italicus, inquit, à Gallico differt, sic Nili Mystus à nostro dissidet. Noster enim Mystus oblongus est, & quasi reses: Niloticus vero crasso & recurvo est corpore: Eiusdem tamen coloris sunt: & eodem modo barbis quatuor, seu mysticibus exornantur. Niloticus nostrum Cyprinum ipsi formæ ferè æmularur: ventrem enim habet expansum. Tanrâ crassitudine in Nilo proficit, ut eum Memphis libras viginti pendenrem viderim; quo in loco Myrhus vel Mystus dicitur.

De Loco eius & Natura hæc Aldrovandus habet. In lacubus quidem nascitur, sed cū multo frequenter nascatur in fluviis, fluvianis potius, quàm lacustris erit dicendus. Scribit Salvanus paucos esse lacus, qui barbis abundent: plurimos vero esse qui eis carent: contra in omnibus fluviis gigni atque ali: Ideoque iure intrer suos Mosellæ pisces Barbum recenseri ab Ausonio. Albertus auctor est, à piscatoribus sibi relatum, ova ab eo custodiri, ne ab aliis devorentur: ad dirque se observasse in cavernis domus suæ ad Danubium sitæ, quorundam post æquinoctium autumnale congregari hosce pisces; tanraque copia convenire ut manibus etiam capiantur, ita ut meo tempore, inquit, incolæ loci aliquando decem plaustra ferè manibus eiecerint. Nam hoc genus piscis frigus non sustinet: quare semper languidus hyeme invenitur; æstare verò mundus & sanus est. Hæc ille. *Festus* algis, coch-

leis & piscibus, & ne suo quidem generi parcere dicitur, Albertus cadaveribus capi quoque scripsit. *Degunt* gregatim, *parvum* ineunte æstare propellirora. Genserus ex piscatorum observatione sub collibus & ripis prominentibus libenter versari asserit, & porcorum instar fodere, ita ut aliquando in cavernis inhæreant, & pereant: pinnaeque eorum ab hirudinibus nonnunquam infestari, quas saxi africanres in fundo aque depellant, aut rapidiora fluminis loca perant, utraque imperu elidantur. Apparet verò cum Squalis quandâ occultam exercere *amicitiam*. Nam quemadmodum in quovis lacuum, fluminumque Barbus, ibidem ferè semper, & Squalis reperitur: ita è contrariis ubi Squalus, ibi semper etiam Barbus, ut Salvanus refert. Claustra fert, & in piscinis æque & Squalus parit & pinguefcit.

Quoad *usum in cibo* Cardanus eum omnino reicit. Aliis, si in saxosis & puris fluminibus capitur benè sapit, concoctus est facilis, laudari succi, catnis candidæ & mollis, sed plurimis spinis firmatæ. Majo circa Rhenum ad Juhum laudari, Augusto in Helvetia, Gessnerus prodidit. Salvianus ineunte vere sapidiore dicit. Ausonio grandiores nam, majore in pretio. Nonnulli propter mollem carnem vino prius imponunt. *Ovis* venenata, Majo imprimis mense Plarina auctor est. Gazius scribit, cum experiundi gratiâ duos duntaxat de ovis hisce bolos come disse, nihil inde aliquot horis postea noxæ percepisse: demum sub horam cœnæ, plurimam in ore ventriculi sensisse inflationem, quam ut dissolveret, inquit, anisum sumpsi, sed frustra. Post horam faciem apparuisse ranquam in syneope, ita ut astantes & admirari, & de mea salute timere inciperent. Se interim magnam non solum in stomacho & ventre, sed omnibus membris externis alterationem, & inæqualem quandam in remperiem in unaquaque carnis parte sensitse. Tum supervenisse passionem cholericam, donec infra septuaginta simul pluries ova purgaretur.

R 2 renrut,

rentur, magna cum anxietate & virium prostratione, & maximo vitæ periculo. Idem apud Gesnerum invenies. Sunt qui credant tum esse malefica, cum salicum, quæ fluviorum ripas obfident, floribus in aquam decidentibus vescuntur; sed quia nec salicibus nec aliis Barbi partibus ista vis, præstat culpam in idiosyncrasiam conjicere.

## CAPUT VI.

## De Capitone.

## ARTICULUS I.

## De Capitone Aufonii, seu Squalo veterum.

**TAB. XXVI.** Piscis quem hic descriptum sumus, à magnitudine capitis, *Capito* Latinis dicitur. Apud alias nationes varia invenit nomina, quæ apud Aldrovandum, Gesnerum & Bellonium vide.

Quis sit apud veteres, difficile est dictu, Bellonius *Theodonem* Aufonii, quem nullo spinæ nociturum acumine dicit, Rondeletius Capitonem ejusdem, Salvianus Alburnum Aufonii, & Galeni Lencefium, Aldrovandus Squalum ut Romæ vocatur, esse putat.

Marino Capitoni Mugilibusque aliis corporis figurâ similis est: dorso tamen minus lato & corpore compressiore. In dorso item unicam duntaxat pinnam habet, Mugilum verò genus duas, unam videlicet in eius medio, alteram inferius caudam. Mugiles denique lineas quasdam habent subobscuras à branchiis ad caudam productas, quibus carere omnino Squalum Salvianus scribit: unam tamen ei lineam esse Gesnerus proficitur, sed quæ leviter appateat. Idem Salvianus ait habere parvum, Rondeletius contra crassum & magnum: id quod plerumque etiam vulgates nomenclaturæ

inducunt. Rursus uterque dentes habere negat. Rondeletius os tantum asperum esse ait: Gesnerus verò dentes eius latere in faucibus asserit, maxilla ferè semicirculari, superne leviter aduncos, ordine duplici, exterius quinos, interius binos. Dentes enim ei tribuit Albertus his verbis: Piscium omnium dentes valde acuti sunt, exceptis perpaucis, qui in lateribus gutturis, mandibulas habent, ut pisces fluviales magnis vestiti squamis, Barbelius (archæ squamæ sunt exiguæ) Monachus, & alii quidam. Hi enim habent dentes largos aliquantulum, magis ad conterendum cibum, quam ad dividendum idoneos: quomobrem etiam omnes æquales sunt: & ideo naturâ abscondit eos in gutture, ut clauso ore aqua non suffocet mandentes hos pisces. Tales autem dentes maxime habet Carpo (ut Cyprianus) piscis, *Labra* sunt satis crassa. *Oculus* nigri, in circuitu aureo, tempora subflava, *Os* rubicundum, *branchia* utrimque quaternæ, geminæ colore totus est argenteo: dorsum tamen minus quam venter & latera pollucunt. *Squamæ* splendide sunt, albicantes, angulosæ, latæ, cute ultra medium obductæ, minimis variante punctis. *Aristis* in carne multis abundat, quarum etiam in Capitone meminit Aufonius, qui item à squamarum magnitudine squameum cognominavit, dum canit:

*Squamæ herbosæ Capito interlucet arenæ,*

*Viscere pratenero fartim congestus aris.*

Gesnerus cum circa Octobris calendas unum ovis gravidum magnum item & præpinguem inspiceret, nullas in eo apparuisse aristas testatur. Quare vel non omnitemore, vel non omni ætate in iis reperiri credendum est. *Ventriculum* parvum habet, intestina parva, hepæ ex albo rubescens, fel in medio viride, *vesicam* geminam aëre plenam, *peritonæum* nigricans. Circiter libram plerumque implet, aliquando tres & quatuor, aliquando sed rarissime, octo

octo aut novem. Non tantum in fluminibus sed & in lacubus, sed & iis paucis *degit*. In Lario invenitur, in Constantienti non item. Ab Aufonio inter Mosellæ, à Bellonio inter Strymonis pisces refertur; sed nec claustra refugit. Dulci piscina inclusus, crescit, pinguescit, & prolem propagat. Expressit Varro. In tertia parte quis habebat piscinam nisi dulcem? & in ea duntaxat Squalos & Mugiles pisces? Servari diu & in aqua pura potest, si eandem sæpius mutaveris, vas ad summum repleveris, nec quicquam aliud injeceris, aliàs suffocantur. *Fecit*ur cœno & sordibus, ideo un Vilain in quibusdam Galliarum locis dicitur: scarabæis & animalculis, qui in aquæ superficie narrant; gryllis quoque campestribus, & uvæ acinis, & muscæ genere, quod propterea Aletmug: en Helvetii dicunt; cerebro denique bubulo, ideo à piscatoribus hamo subtiliter alligatur. In locis litoribus proximis, in fine veris & sub æstatis initium parit. Mense Maio patere ab uno latere, ab altero Cerasa quæ Helvetii Amarella vocant, matura sunt postea, aliqui Gesnero teste prodidere. Inter gregales esse censentur. *Primum in Cibus si* species, inter viles censetur. Carne quidem est candida, sed insipida ac molli, & quæ mox extra aquam flaccescit, plurimis abundans aristis: utrumque tetigit Aufonius dum canit:

*Viscera prætenere farum congestus aris-  
tibus,*

*Nec duraturum post bina trihoria  
mensis.*

Improbantur præ cæteris, quia in lacubus, & in magnis cœnolisque fluminibus capiuntur; quamobrem Romæ, quod vel ex proximis lacubus, vel ex Tyberi afferatur, parvi sit, cum aliqui Tyberinus in ligneis vastis diu vivus conservetur. Contra, in limpidis, parvisque ac saxosis fluviis torrentibusque captus, haud omnino aspernari debet, maxime ubi adolevit.

Major enim factus, minus mollis

est, ut hic etiam, sicut de Barbo diximus ex Aufonio in senectâ præferendus videatur. Commendatur apud nos verno potissimum tempore, cum prægnantes sunt: Alit tradunt per totam hyemem admittimentis posse, & vere etiam usque ad initium Maij: ætate non probari.

Gesnerus apud suos commendat: scribit mense Decembri, placeatque circa Calendas Octobris, quo tempore unam ovis gravidum, inquit, reperi: magnus is & præpinguis erat: ova quoque sapiebant palato: nec ullæ apparebant spina. Idem caput in eo præferri assenti.

## ARTICULUS II.

*De Capitone fluviatili seu  
Squalo minore.*

FRæquens in fluviis est, inquit Ges. TAB. XXVI.  
*nerus*, vulgo nominatus in *Hafle* 7.  
in lacu juxta Tugium *Ganghafle* Aldrov. de  
vel communiore nomine *Wapfish* Pisc. I. p.  
quasi albus piscis, item alio nomine *Wapfish* à Mense Maio, quo præcipue  
feruntur, quod nomen Alaulis, quoque attribui putar. Italicum huius  
piscis nomen nisi *Stretta* sit, (à corpore longiusculo forte, & stricto, id est,  
minime lato) in Lario lacu, & in Verbano *Cravetta*, aliud se nescire  
profiteretur. Hæc verò cum scripsisset, piscator Lucarnensis in Verbano vocari ei asservit, *Letta* vel *Aletta*.

Conjicitque eundem fortè esse quæ Papiæ *Cabacello* dicitur. Germanicum *Hafle* videtur leputiculum significare, fortè quod agilitate ac celeritate narandi lepores repræsentet. I. se Cephalos aut Mugiles fluviatiles minores vocat, quod fluviatilem Cephalum sive Squalum magis quam Leuciscos referat, adeo ut icone opus esse neget. Pisciculi, inquit, sunt molles, duns aut tres palmos longi, albicantes, per dorsum in viridi nigricantes, cauda & pinna dorsu glaucis; cæteris rubicundis minime lati.

R 3 Squa-

*Squamulæ* tenuibus, argenteis, branchiis ternis. Caro eorum arstis referta est, ut & *Mugilum* fluviatiliū maiorum. Ex his qui in fluvio apud nos capiuntur, oculis rubere audio, qui in lacu non item. Observavi postea lacustres superna oculorum parte flavere.

*Dentes* in faucibus utrinque conditos habet, ut *Capito* fluviatilis, in mandibula curva, exteriori ordine quinque majusculos, interioribus minores, omnes fere in summo leviter aduncos. *Parere* incipiunt medio Aprili, vel paulo ante. Suo tempore (Majo & Aprili præcipuè, deinde Junio & Julio : à Majo quidem mense etiam *Weyssisch* alicubi nominantur) satis grati in cibo, & salubres habentur. Aliquando verò vermes eis innascuntur, (*Ligulas* nostri vocant, & *Nessel*) & omnino insalubres sunt. Hyeme macri sunt ac minime placent. Fluviatiles etiam lacustribus præferuntur. Elixari debent in vino fervido. Circa initium Novembris ova in hoc pisce reperi, quæ magis quam piscis placebant. Idem

Aldrov.  
de Piscib.  
L. 5. c. 19.

*Capitonem fluviatilem* C. A. R. U. L. E. U. M. cognominant differentia causa, quem Germani, Saxones potissimum, *Jeser* appellant. Quidam *Aulausam* interpretantur, sed male, quoniam è mari fluviis non ascendit: Capitur in Albi, & in Danubio quoque, ubi *Jeserling* vocatur. Cum *Capitone* fluviatili similitudinem habet, sed colore est in dorso & in aliquibus capitis partibus cæruleo. Præfertur assus. Germani ad Viadrum *Jesetz* appellant, Marchici ad Viadrum *Jesle* scribunt: alicubi *Wradisch* dicunt, hoc est piscem assari solitum, per excellentiam. Poloni *Jaszcz*, Hungari *Zompo*. Non est in magno pretio, neutiquam salubris, quod pinguisculus sit, & non, saxatili modo friabilis: suavis tamen satis, quantum ad gustum. Estur frigidus, assus potissimum, quamvis & elixus, & aliis modis. Longitudo eius cubitum non excedit, nec latitudo tres aut qua-

tuor digitos. Post Pascha potissimum capitur.

### ARTICULUS III.

#### De *Capitone* fluviatili rapace *Gesneri*.

**H**Oc genus *Capitonis*, *Misener* <sup>TAB. XXVI</sup> *Rappe* vocant, id est corvum, ut *Kentmannus* *Gesnero* communica iconè significavit, quod is <sup>Aldrov. de Piscib. 5. c. 10.</sup> volneris instar vorax & rapax sit, quamobrem *Gesnerus* rapacem cognominavit.

*Piscis* (inquit *Kentmannus*) est candidus, argentei splendoris, dorso tamen fusco, & subcæruleo, *Squamæ* tegitur latiusculis, tenuibus & perspicuis, quibus pellicula tenuis argentei nitoris subternitur, quæ persquamam translucens, piscem velut argenteo illitum ostendit, quales etiam cæteri pisces, quos communi nomine albos cognominamus (*Weyssisch*) apparent. *Piscis* est longus, crassus, & cornosus: caro *aristis* plena. *Longitudo* ad latitudinem quintupla. *Dentes* ei non in ore, sed in faucibus sunt (ut aliis quoque huius generis) longiusculi, utrinque septem, è mandibulis prognati. *Ventriculus* & intestina simul, piscis longitudinem non æquant. *Revolutio* eorum triplex est, ita ut in summo ventriculus sit, inde tenuius intestinum incipiens revolvitur, duas sub eo helicas efficiat.

Tegit hæc dextro latere *jecur* (in quo vesica fellis longa conspicitur) altero *lien*. *Vesica* in eo aëre plena, oblonga est, ut in *Lucio*, *Cyprino*, &c. Maximi qui apud *Misener* nos capiuntur, ad sex aut septem libras, (xvi. unciarum) accedunt.

Addit *Gesnerus* sese audivisse *branchias* molles esse, ut in *Salmone*: *pinnas* coloris è fusco puniceæ. Nomen à rapacitate tulit.

ER

Est enim velut prædo vehemens in aquis: nec minus ferè quam Silurus (Glanis) & Lucius, aut etiam amplius, damnosus est vorandis piscibus: quos dum persequitur, in ripam aliquando expellit, & simul etiam ipse interdum impetu in siccum delatus, relinquitur. Hic piscis in Albi nascitur, non aliunde subit, & toto fere anno (sed rarius & per intervalla quædam) capitur. A partu valde augetur, & pinguescit. *Paris* autem circa annuntiationem Divæ virginis: quo tempore à stationibus suis catervatim procedunt, magni & parvi duobus aut tribus diebus ante aut post illum diem: idque ita forcertum est. Quod si nihil impediat, sexaginta, plus, minus, uno retis tractu, interdum capiuntur. Piscis est *callidus* & extra hoc tempus, quo propter partum gregatim natat, difficilis captu: nisi vel nimii ventorum status, quo minus piscatores & retia trahenda audiat, efficiat: vel aqua perturbata, visum eius impediat: aliàs enim inter scamna, quæ arenâ accumulant, manet, nec facillè retibus ineluditur. Cæterum extra pariendi tempus hamo ferè *capitur*, hoc modo. Quoniam vorax est piscis, Phoxinus aliusve pisciculus hamo infigitur, & sic linea per aquam, ultro citroque agitur, eo in loco, ubi huius generis pisces degere conjectura est: Hic cum pisciculo pariter hamû devorant, & capiuntur. Piscis est admodum laudatus & boni saporis, tum assus, tum elixus. A plerisque tamen parvi æstimatur, quod idoneum coquendi modum nesciant: nam nisi ritè coquatur, sive asses sive elixes, in patres aliquot dilabitur: quod si integrum servare velis, nõ in fervidam, ut alios plerisque pisces solemus aquam, sed ab initio statim in frigidam præparatam immittes, ut pariter cum aqua concalescat: tum condies, salietque, & ad ius ferè consumptionem coques. Assandum verò, desquamabis, exenterabisque similiter: deinde sale diligenter consperges & persicabis, & per duas

horas in sale relictum, tandem assabis: ita bonus & grati saporis piscis erit.

Sunt qui pisces assari solitos, simpliciter assent, ovis (aut lachibus) solum non exemptis & salviâ infarctâ. Alii ova seu lactes, cum hepate & liene exempta, minutatim concidunt: adduntque multum pipenis ac caryphyllorum, salem, uvas passas minores, vitellum ovi, hæc impenfam in piscem infarciunt: & assant, putantque ita salubriores fieri.

## ARTICULUS IV.

## De Orfo Germanorum seu Capitone sub rubro Gesneri.

ORFUM Germani vulgo *tin Orff* TAB. genus hoc Capitonis vocant, XXVI (inquit idem Gesnerus) quod mihi 9. videre nondum contigit, præter TAB. II. quam Augustæ Vindelicorum o-7. lim in piscina quadam, ubi mihi in-<sup>Aldrov. de</sup> tuenti Cyprini colorem præ se fer-<sup>piscib. l. 5.</sup> re videbatur, aqua forte visum meum<sup>6. 12. 22</sup> mutante. Ibidem depictam iconem clarissimus medicus Achilles Pyrminius Gasparus mihi communicavit.

*Dorso* est rubicundo, ventre albicante, *squamis* (ut a) parvis magnis & latis. Alti laudantur, præcipue Aptilli, & Majo mensibus. Linea à branchiis ad caudam, an probè adeo recta (præter plerorumque piscium morem) expressa sit inquirendum. Germanicus liber qui Bavaricas Constitutiones continet, eadem forma piscem hunc delineatum proponit, digitos 12. vel 13. longum, quâ longitudine inferiorem capinon liceat: cum vulgarem Ausonii Capitonem, vel novem digitos longum capere concessum sit: unde hunc (Orfum dico, qui tamen ab Orpho marino pisce toto genere differt) ad molem multo maiorem ex-<sup>6. 12. 22</sup> crescere coniecimus.

In

In diversis Germaniæ partibus aliter atque aliter (proximis tamen se vocabulis) nominatur, *Driff* / *Erste* / *Norfling* / *Wurfling*: alieubi etiam *Elfr* / idem ni fallor. ( Apud Hollandos *Elfr* est Aloia: ) Intempestive caprum, spinulis seu aristis tedundare ajunt. Duorum generum hunc piscem esse audio assatos alios carne alba esse, qui Augustæ vulgo *Weißfisch* appellentur: alios rubicundâ vel naseicente, Trutta Salmonatæ instar. Piscem Notinbergæ quoque in Begniza fluvio frequentem esse ajunt; præferti genus illud, cuius caro rubeat: insuperficie discrimen nō apparere: *squamas* paulo latiores esse, quam in Thymallo: carnem siccam, & friabilem, salubrem, ut vel pureis concedatur, minus suavem quam Truttarum. Bellonius quoque visa apud melhuius piscis effigie, forma ad Squalum ( id est Capitonem fluviatilem ) eum accedere ferebatur. Piscem audio lautum, & in pretio esse; muscis vesci. Cyprino minus lautum esse, sed crassiores: non in aquis fluentibus, nec in lacubus, sed in piscinis fermè reperiri, apud Vindelicos, Norimbergæ, & alibi. Sunt qui *Pigo* *Picene* pisci Larii & Verbatu lacus eum comparent: & similiter certo anni tempore è squamis ceu clavos quosdam emittere mihirulerunt. Ad Cyptinos neigrit magis an Capitones pertinet, judicandum illis telinquo, quibus in prompru hi pisces sunt.

## CAPUT VII.

## De Leucisco.

**TAB. XXVI.**  
10. II. 12.  
*Albroy. de*  
*Piscib. L. 5.*  
c. 22.  
*Galen. de*

**L**euisci nomine omne Mugilum genus Hicelio apud Athenæum ventre superius, ni fallor, diximus. Galenus suæ speciei piscem *fluviatilem* & *lacustrem* facit. Salvianus Squalum esse, ideò quòd eum Galenus quoque *græci* *δρύνιγγας* habere sciti-

bat ( sed ; erperam, Legendum enim est, *καρπὸν ὅπερ μακρὸν ὄντι δρύνιγγας* ) *Alim. fa. cult. L. 3.* credit; Modernis Græcis *Leucorinæ* dicitur. Bellonius, *Albucellam* nōn. de commodè vocari posse scribit, apud *Aquatil. L. 2.* alias nationes, Germanos inprimis, *Alim. fa. cult. L. 3.* vatia sortitur nomina. In Germaniâ, circa Argentinam *ein Lauch* / Helvetiis diminutiva voce *Laugele*, quo nomine Gelenus dici consuebat ( inquit Gesnerus ) quasi *Alim. fa. cult. L. 3.* *Alim. fa. cult. L. 3.* id est Albiculam, tanquam olim sic appellassent Græci, & ab his mutuati essent Getmani. In quibusdam Helvetiorum lacubus, ut juxta Tugium & Bielam *Vvinger* vocatur, ut à Sabaudis circa Neocomum *Vengeron*.

Diversus tamen ab his piscis est Vangeron in Lemano dictus, cui Helvetii à tubore pinnatum nomen posuerunt. Brelenpes etiam *Onbapt*, id est, acephalos nominant hos pisces: amputatis enim capitibus, siccatos, alio venales mittunt: cum minimi densis agminibus natant. Helvetiis *Eetlen* / id est animæ dicuntur.

Actoni lacus accolæ nominibus variant; *Grasig* Lindaniæ vocant: *Vberlingæ* *Laugele* Constantiæ dum parvi sunt, *Stenfsische* vel *Grasing*: adultiores, *Agonen*, *Agunen*, *Lagenen*. Aliunt enim piciculos esse vix longiores palmo, *squamosos*, quibus multi abstineant, quod circa latrinas pascantur: suo tempore tamen commendari.

Æstate, inquit, innascuntur eis vermes, quos vulgus, *Kestel*, nominant, quo tempore insalubres habentur.

Ova getunt usque ad Junium, deinde pariunt. Non solum autem intet se, sed cum illis etiam piscibus latis laeustribus, quos Helvetii *Rotten* vocant, & cum Scardulis sive Cyptinis latis *coeunt*, unde piscis genus enascitur, inter utrumque parentem medium, *ein Drütsfisch*.

Sed

Sed alius est Agonus in lacubus Italicis, & Germanicum nomen Græsing cavendum, ne quis cum diverso fluviatili piciculo confundat, quem Grefzling, vel Krefzling nominant. In Duncti Bernensium Helvetiorum lacu, *Blanninling*, id est, cæruleus, hoc genus Leucisci dicitur nostri longe aliud læuſtre tantum genus sic vocant. *Glyffen* à splendore factum, commune est piscibus illis qui vulgo dicuntur Laugelen aut Suualen.

*Squamis* modèstegitur, quæ lineolis distinctæ sunt. Nonnulli cum priore Rondeletii Leucisco confundunt, sed corporis, inquit hic, latitudine differt, rostroque est acutiore, alioqui pinnis, earum numero, & situ similis est, Romani pilcatores à Squalo, recte Bellonio, non distinguunt: neque enim adeò exactè pices fluviatiles, ut Galli, internoscunt. Etenim Leuciscus aspectu multo hilarior, quam Squalus, minoribusque squamis contegitur. Albo colore nitet, & veluti inter squamas striis tectis interlinguitur. Caudam bifurcam & pinnas albas proferret, neque ita latus, ut Squalus. Hic præterea Leucisco maior evadit. Alburnus eidem similis est Lencisco, tamen est paulo latiore corpore, & squamis elatioribus, ac labro inferiore melius infarcto. Est etiam nonnihil discriminis in linea, quæ utrinque corpus interfecat: si quidem Leucisco non tam arcuata est, quam Alburno, & Alburnus rotundiori corporis compage constat, ad Cephalum magis accedente. Bellonius nulla ait habere *dentium* rudimenta, verum fortassis haud diligenter inspexit, Gesnerus namque in faucibus utrinque mandibulam curvam quinis armatam denticulis reperit, ut in Bello. Albertus utrinque mobilem in faucibus mandibulam habere ait. In Pado (ut Gesnerus observavit) dodecantem nunquam excedit: crassitie fere æquali per totum corpus, à capite ad usque eandem. *Oraperit* ut oblongum, nec prominet mandibula superior. Addit

irem Gesnerus apud suos paulo maiores capi in fluvio quam in lacu: longiusculos esse, non latus, Haselis non dissimiles specie, paulò breviores, si bene meminit: Dosti colore esse fusco, flavo, & viridiscere permixtum esse. *Pinnas* albicare, vel nimium rufi admixtum habere, lineam quæ terminatur laterum color, instar iridis resplendere ex flavo & viridi calore. Rondeletius quoque ex fusco partim viridem esse, partim flavum dicit, *ventriculorum* habere parvum, hepar magnum, & in hoc felle vesicam: denique multum *pinguescere*. Quo loco in cibus haberi debeat, apud Galenum legimus, qui conditam seipso meliorem effici, quod quicquid in sapore est mucoli abjiciatur: meliorem recentem, diutius in muria servato, scribit. Testatur Bellonius, *Belon. de Aquat. Lib. I.* nondum protracti magnum numerum veris initio capi, modicoque sale conspersum atque exiecatum, Byzantium deferri, vendique Maio, Iunio & Iulio mensibus. Eorum captram maiorem fieri ex Epiri lacubus, Venetosque his maxime uti, ad fœque navibus adferri curare, & eodem vocabulo cum Epirotica lingua, quæ Seohranicos dicit, Scourancas nominare: quæ eum Leucorinis, inquit, maiores sunt: ambo tamen pices sale conspersi & fumo infecti atque exiecati, ad externos mirti, ut nostri Harengi foreti, consueverunt. Sic Bellonius. Gesnerus commendari scribit Aprilis & Maio mensibus, Februarioque non insuaves invenisse, quo tempore lactes in mare pleni erant, eodemque mense à suis laudari. In Italia quidem, hyeme in primis capi. Veru totos, sale, aceto, olivo, pipere, & cinnamomo conditos Grapaldus laudat: & Rondeletius denique molli suavique carne esse tradit, & pinguedinem eius aurium doloribus succurrere, & cum felle eiusdem permistam oculorum caliginem abstergere.



## CAPVT VIII.

## De Leucisco primo Rondeletii.

TAB.  
XXVI.  
II.  
Aldrov. de  
Pisib. l. 5.  
c. 23.  
Bellou. de  
Aquatil. l. 2.

**H**Æc Leucisci species, in Italia *Lafcha*, in Gallia *Hardon*, quod facile per longum tempus in vasculis aquatilibus seruari possit, alibi apud Italos *Dorada*, quod in eotractu caput eius aureo colore fulgeat, Helvetiis *Rotetigle*, quasi *strytrophthalmos* dicitur. Bellonius *Sargum Sargone* uocet, qui inter marinos Mugiles fluuios subeuntes, ab Aristotele recensetur, perperam uoce cavit. Capitone seu Cephalo fluuiatili corporis aspectu, pinnarum numero, situ, figura, squamis similis: sed capite est minore, corpore latiore. Dorsum ceruleo uersice uirescente, ventre candido, oculis flavescentibus. *Dentibus* caret. Imò palato ossa habet. Bellonius ad Cyprini magnitudinem unquam accedere negat: aitque corpore quam Squalus, compressiore esse, pinnaeque habere subrubras, paruos item Gardonos pinnam caudæ longiorem exerere quam Leuciscum: (sic uocat piscem proximè præcedentem) & antequam in extremum pinnæ, quæ bifurcata est, desinuat, rotundari: Latiusculis *squamis* contegi, ipsoque capite magis ad Leuciscum quam ad Squalum accedere. Oblongius & paulò crassius habere corpus, quam Abramis, ac denique terrore esse magis quam Squale nigricante, & auti colorem referente. In Ambra Melegrarum alluente numerosè capitatur. Sed & Peni sinus lacus delicatissimos profert. Alacres sunt & uividi omnes *ore* habere, & formidare esse creduntur. Solidiuscula illa & rusta. *Partim* Aprilino coatur, & ad Maii pergit medium. Laudantur antequam patiunt, Ianuario, Februario, Martio & tota hyeme mediocriter: sunt qui April, & Maio commendant. In uinum fervidum

immissi elixantur, Rondeletius carne esse fluxili & patum nutriente dixit.

## CAPVT IX.

## De Oxyrincho Rondeletii, Corvo Nilotico &amp; Nasso Alberti Magni.

**O**XYRINCHI nomen inter poly-TAB. leina censetur. Diphyllo apud A-XXVI. thenzum Mugil est, fluuiatilis, idem, 13. ut Rondeletius insinuate videtur, Aldrov. de Corvo superiori Gallorum Gardono: *Pisib. l. 5. c. 24.* Straboni, Eliano, aliisque inter Nilipisces recensetur: eidemque Eliano rubri maris quoque piscis est, ac denique maris Caspii, ut in Scutione dictum est. A quibus omnibus differt, (ni fallor) Oxyrinchus iste Rondeletii, Antverpiensibus *Hantia* uocatus, rostro longo, tenui & maximè acuto, unde Oxyrinchium rectè à se appellatum fuisse putat, nisi mavis, inquit, Sphyrænam fluuiatilem uocare, quia marina Sphyrænae rostrum simile habet, molle & nigrum. *Squamis* melioribus tegitur. *Pinnas* in dorso tres habet, in æquali spatio à se distantes: totidem in ventre habet, quos Barbus. Quærendum nunquid idem sit, qui *Filius Snelæ* appellatur, à Scolopaceæ uero, puto, quam Snelæ dicunt Galli uerò à rostri proceritate *beccassam*. Gesnerus in Albi fluuii quendam quoque piscem *Snepfelsingen* uocari tradit, sed à superiori diuersum, paruum nempe, & candidum, Capitone fluuiatili similem.

**CORVUS** Niloticus, corpo-TAB. ris figura Mugilibus similis est, sed XXII. caput pro corporis portione (lon-14. gum enim dodrantes duos) paruum Aldrov. de Maxilla inferiori superiore brevior. *Pisib. l. 5. c. 25. & 26.* Pinna ad branchias, utrimque una breues: interiore ultra medium alia oblonga: in supina parte à podice alia.

aliam in ventre una, de pisce hoc, quod præterea dicam, non habeo.

TAB.  
XXVI.  
15.

NASVS ab oris figura sen naso valde crasso, nomen sortitus est. Nasum vel Nasutum benè dixeris: & quia labrum seu rostrum superius crassum, simum obtusumque habet, non malè Græcè Pachyrinchus & *aspis*, Latine Simus vocabitur. Genre Squalo ac Leuciscis fluviatilibus adscribendum esse, & corporis totius figura indicat, & Albertus quoque attestatur Monacho, hoc est, Capitone fluviatili similem esse inquam, sed tenuiorem, naso valde crasso. Er Gesnerus esse tradit, qui fluviatilibus Barbis hunc piscem comparant, quod ad corporis speciem: aliquos piscibus Ersten vulgo dictis apud Germanos. Ipsi vero specie, squamis & colore Capitonem fluviatilem referre videtur: sed ad eam magnitudinem, inquit, non perveniunt. Lonicerus duorum triumve palmorum magnitudine esse ait, & oris formam peculiarem habere. Venter eorum intrinsecus nigerrima membrana ambitur: unde ioculari nomine Germani hunc piscem, scribam cognominant. Os modice deorsum vergit. *Lapidem* habet in capite, teste Alberto. Capiuntur in fluviis & rivis. Libenter enim in rivos ascendant, inquit idem Gesnerus, in lacum non veniunt, nisi ad initium eius tantum, præsertim vere. Albertus Danubii piscem esse ait, & aquarum in Danubium influentium. Corno & spurcitiis vestitur. Caro alba & laxa est, spinulis referta, ut & Capitonis & aliorum multorum fluviatilium, præsertim circa caudam. Verno tempore præferuntur & pinguescunt. Apud Helvetios tamen Novèbri mense laudantur: si modo unquam laudandi sunt. Nam caro eorum semper laxa & insipida est, quam obrem asiare eos potius quàm elixare coqui solent. In Rheno præstantiores habentur. In libello quodam Germanicè vulgato de piscibus, Februarii & Martio & cum salices stillant, eos præferri legimus. Hæc senè Gesnerus.

## CAPVT X.

## De Gobio fluviatili.

## ARTICVLVS I.

## De Gobio non capitato.

Gobio fluviatilis est duplex. U. TAB. XXVI. 16. *abreviand. de Piscibus l. f. 627.* nus non capitatus; alter capitatus. NON CAPITATE Dorion apud Athenensium inter fluviatiles meminit, fortassis & Aristoteles, dum eos in fluviis pinguescere scribit. Mediolanensibus Varira, fortè quasi varius. Ubique enim rotundis nigris maculis distinguitur, vocatur Germanis *Kressling*, aliis Leutesser, quod cadaveribus submersis vescatur. A Gesnero ita describitur. Gobio noster, *ein Gressling* / quem nuper caprum in lacu, inspexi, mense Ianuario ovis gravidus erat barbatulus, *cirra* singulis in angulis labiotum perbrevis. Pupilla oculorum nigra, ambitu candicante. *Macule* à capite caudam versus per media utrinque latera nigricantes, rotundæ, magnæ proportionè, circiter decem, singulæ deinceps digeruntur & similiter per medium dorsum. Cauda etiam maculosa est, & dorsi pinna. Vesica bifida, magna proportionè. Longus est plerumque quinque aut sex digitos. *Fel* habet subviride, caudam bifurcam. Os cum aperitur rotundum & veluti è præputio se exerens, deorsum nutat. *Lapilli* in cerebro perexigui sunt. Hæc ille.

*Squamis* tegitur parvis. Quamvis ab Ausonio, qui cum *Barbi jubat* æmulari cecinit, fluviatilibus æcenscatur, in lacubus tamen quoque capitur. Degit in fundo & corno, unde Fundulos quibusdam vocari etiam diximus. Vescitur musco vel alga, item arenulis, & rudinibus minimis lacuum. Creditur cadavera hominum submersa depasci, unde nonnulli anthropho-

TAB.  
XXVI.  
16.  
*abreviand. de Piscibus l. f. 627.*

pophagum dicunt : quæ res aliis for-  
talis anſam præbuit , ut ex cerebro  
equorum procreari dixerint , quo  
quidem in aquas abiecto veſci , à ra-  
tione non eſt alienum , nam & Bello-  
nius teſtatur calvariis bubulis in a-  
qua proiectis oblectari , cuiusque gna-  
ros Ligeris accolas , calvarias eas ſtu-  
dioſè adſervare iis denique in Lige-  
rim immerſis , Gobios allicete , ut  
facilius eos poſtea capiant . Idem te-  
ſtatur Rondeletius . *Capiuntur* au-  
tem facile & magna in copia , inquit  
Geſnerus , citra ripas laevis noſtri  
retis genere , quod Stolzbaren ap-  
pellant .

Aliquando bis aut ter anno pa-  
riunt . *Æſtate* vermiculis quibuſ-  
dam in ventre vitari dicuntur , teſte  
Alberto . Rondeletius *carne* ait eſſe  
molli mſipida , virus nonnunquam  
reſpiciente : fallique medicos , qui Go-  
biones fluviatiles agris apponi vo-  
lunt , his eam ineſſe ſucci bonitatem  
exiſtimantes , quam Galenus in ma-  
rinis commendat , ab hiſce enim illos  
hac dote multum ſuperari . Cœnum  
aliquando reſpiciunt . Author de na-  
tura rerum , ſalubriores eſſe ait , ubi  
aquis arenofas in nutrimentum ha-  
bent . Et Geſnerus elixum ſatis ſoli-  
dum eſſe teſtatur , nec contemnend-  
um in cibo .

N. Ad Gobiones referimus piſcem Rbe-  
ac Mani alumnum rariorem quem  
Obriſ / ſeu Obreſ / q. Obreſ /  
Piſcatores vocant . Ambire enim vi-  
detur inter Gobionem & Percam .  
Huius iconem , exhibet Tab. 31. eoſſi-  
gura ac magnitudine , quam cum duo-  
bus ſociis capſus eſt non procul Fran-  
cofurti , 16. April. 1649 .

## ARTICVLVS II.

### De Gobio capitato.

TAB.  
XXXIV.  
9.  
Aldrov. de  
Piſcib. L. 1.  
c. 28.

Gobio Capitatus nomen iſtud à  
Capite pro corporis ratione ma-  
ximo accepit . Non tantum apud Ita-  
los , ſed & inter Germanos varias ſor-  
titus eſt appellationes . *Gropp* dicitur  
inter Helvetios , *Cop* vel *Kop* in Ca-

rinthia , *Karbrapp* in Franconia : alibi  
*Mul* , circa Tridentum (qua parte Ger-  
manice loquuntur) *Tholmin* . Saxo-  
nes & Miſeni à capite , quod ferè glo-  
bi inſtar rotundum habet , ſed com-  
preſſum , varia ei nomina fecerunt :  
*Kenling* , *Kulingk* , *Kulheit* , *Kaulbeupr* .  
Anglice à *Bulbed* , à capite taurino ,  
quafi Bucephalum dicas , nempe ob  
magnitudinem , non ſimilitudinem  
formæ . Rondeletius & Bellonius

Bellon. de  
Aquatil. L. 2.

*Bellon* vel potius *Bellon* aut *Bellon* Aris-  
telis eſſe voluit , ſed cum iſ duntaxat in  
fluviis ſub ſaxis ſtabulari , quod & aliis  
competit ſcribit , nihil definiri po-  
teſt . Cremonenſibus *Bos* vel inde vo-  
catur , quod Buſonem , qui Botto vul-  
go , deformi oris riſtu referat . Piſci-  
culus eſt ranæ piſcatrici ſimilis , ſi pa-  
va magnis (inquit Rondeletius) con-  
ferre licet , corporis figura & colore .  
Capite enim magno eſt , lato & de-  
preſſo . *Ovis* magno hiatu , line denti-  
bus : ſed pro iis labra inſtar limæ aſpe-  
ta habet : *pinnæ* binæ ad branchias ,  
rotundas , & ambitu pulchrè criſta-  
tas : duas alias inferius parvas , longi-  
ſculas , albicantes in medio ſummi  
ventris : aliam ab ano ad caudam : in  
dorso quoque geminas , non ſingula-  
rem , ut Rondeletius ſcribit , qui a-  
liam fortè ſpeciem , inquit Geſne-  
rus , nobis ignotam vidit : nam &  
cauda quam ſuo attribuit Cotto ,  
proportionemulto longior eſt , quam  
in noſtro . Ex his docti pinnis bre-  
vior , quæ capiti propior , altera lon-  
gior caudam verſus , quam tamen  
non attingit : idque in fluviatili & la-  
cuſtri genere ſimiliter . *Oculi* ſurſum  
ſpectant . Branchias quaternas ha-  
bet , *hepar* magnum ſine ſelle . Si  
corpufculum ſpectes , ventriculum  
magnum . *Fœmina* *ovis* immodi-  
cè turgit , quæ in peſtore in globos  
collecta , geminas veluti mamillas  
præ ſe ferunt , & membrana veſtiun-  
tur nigricante . *Lepilli* in capite ha-  
bet . Qui in *lacubus* degunt , (ur Ti-  
gurini lacus exemplo oſtendit Geſ-  
nerus) non ſolum magnitudine infe-  
riores ſunt *fluviatilibus* : raro enim  
ultra digiti medi longitudo ex-  
creſcunt : ſed ſpecie etiam differunt  
etſi

et si vulgus forte non discernat. Nēpe, colore magis albicant, cum illi nigriores sint. (Corpus varium est, partimque albicantibus partim fuscis punctis, & maculis etiam nigricantibus trāversis distinguitur) *Spinulū* circa branchias pluribus & acutioribus, brevissimis tamen illis, & visum pene latentibus horrent; quibus digiti etiam, si retro ducas, configuntur. *Pupilla* oculorum aliqua ex parte pulchrē virefcit, & geniz instar resplendet, præsertim ad solem. E lacu in fluvium non migrāt: neque fluviatiles in lacum Gustus etiam suavitare fluviatilibus lōge sunt deteriores. Iconquam dedit Aldrovandus Gesneri est, diversa nonnihil ab ea quam Rondelerius exhibuit, pinna dorsi singulari, & cauda penicilli instar, longiuscula: unde suspicari licet, aliud genus Corti circa Monspellum haberi. *Degunt* in rivis frigidis ac montanis, & fluviiis præcipitibus, sub lapidibus & inter Saxa. *Carniveri* creduntur, & à se mutuo devorari certum est. Mense Martio circa festum Paschatos *pariunt*. In aqua fundo non ram natant, quam subito impeditu relictis instar se vibrant, & quo volunt traiciunt. Gesnerus testatur, legibus piscatoriis licere, eos capi in flumine à Calendis Novembris usque ad Pascha: extra verò illud tempus, nec retibus, nec fuscina, neque alio modo licere: hamo autem nunquam. Nassis uti permisum esse, à die D. Marci usque ad exitum Maij, non arctius tamen contextis, quam ut Gobij capitati evadere queant. Cocta esse suavissimos & origratissimos cum ovis, quæ pingua, copiosa, & delicatissima, Matthioli prodidit. Carne molli, Rondelerius, dura Albertus fecit. Apud Helverios fluviatiles dūtaxat, & quidem circa brumam & Ianuariomen- se in deliciis sunt, quidam à Calendis Decembris ad Calendas Aprilis commendant: omnes, capita, quod spinis tantum cuteque constant, reiciunt. Placent & frixi.

## CAPUT XI.

## De Aspero Pisciculo.

**H**uius Rondeletius meminit, et-  
demque à maxillarum asperita-  
te cognominatum inditum, atque  
Lugdunensibus *Asperon* appellari pro-  
pter squamarum asperitatem, Rhodanoque peculiarem, cæterum  
non quovis eius loco, verum in ea fe-  
re parte reperiri, quæ inter Viennam  
& Lugdunum interiecta est. Piscicu-  
lus, inquit, est *capite* latiore, quā Go-  
bio, in acutum desinente: ore me-  
dio, *dentibus* caret: sed maxillas aspe-  
ras habet, foramina ante oculos. Co-  
lore est rufus, maculis nigris latis, à  
dorso ad ventrem oblique descen-  
dentibus varia: Pinnae ad branchias,  
& in ventre similes cum Cortis ha-  
bet, sed in dorso dissimiles: duz en-  
im sunt à sese seicūta. Vulgus ait  
pisciculum hunc auro *vesci*, quia a-  
renam cum qua nonnunquam auri  
laminæ sunt, haurit. *Carnes* est siccio-  
re quam Gobio.

Ad hunc referri potest, & *is pisci*  
*Dannbians*, quem *Iulius Alexandrinus*  
*ad Gesnerum dedit*. De eo ita Gesnerus, 19.  
Forma quidam tota, & singulari ferme  
corporis partes, inquit, in utriusque  
pictura cōvenire videntur, nisi quod  
pinna ab ano in nostra icone nulla  
est, pictoris forte incuria. Nulli enim  
piscium, opinor, hæc pinna deest.  
Rondeletius *Lacertum* peregrinum  
suum sine ea pinxit, quam Salvianus  
eidem addidit. Bellonius in sola Tex-  
nia hanc pinnam se non reperisse mi-  
hi retulit. Piscis quem exhibemus,  
Germanicum nomen est *Zindel*: vel-  
ut alij scribunt, *Zinde*, *Zindel*, *Zinne*,  
*Zingel*. Ungari *Kolek* appellant. Icon  
ad me missa, digitos XII. longa est:  
quam longitudo in hoc pisce me-  
dioerem esse audio. Colore est, par-  
tim è fusco rufescente partim nigris  
*maculis* satis magnis per intervalla di-  
stinctus: quarum aliquæ à dorso ad  
ventrem, qui cinereus est, oblique  
rendunt. *Oculus* color Indicus: & ali-

quid sub eis rubri. Audio cum ad libz pondus, id est, unciarum XVI. accedere: (alii etiam trilibtem fieri retulerunt) *caudam* adeo duram habere, ut vix amputari possit: pinnas in dorso aculeatas in capite Perce in stat, (icon nostra pinnas molles, non aculeatas, pte ferre videtur) nostrum acuminatum; carnem candidissimam. Sunt qui forma & colore Cani marino comparent: alii Lucio, præcipue quidem capite: absq. *squamis* esse aiunt, instar Anguillæ. (Rondeletius Asperum suum à squamarum asperitate vulgo Gallice Apron dictum ait) Lautissimum esse addunt simul & *saluberrimum*, omnium Danubii piscium, ita ut vel puerperis apponatur, & divitum duntaxat mentas oneret: quod equidem miror, si squamas non habet: fere enim omnes qui *squamis* carent, minus salubres existimantur. *Ferunt* cum Danubius & Tibiscus. In Danubio prope Bosoniâ magna eius copia capitur. Viennæ etiam non deest: & in Bavariz fluvii, ut Isara & Leisaca: hic quidem è latu Ammelse fuisse in Racheelse lacum, & inderursus in Isaram fluvium. In piscinis servari non potest. Eiusdem piscis effigiem illi quam dedimus, similem, coloribus tantum diversam (ventre & pinnis albicantibus) Raphaël Seilerus Iurisconsultus doctissimus, comes Palatinus, clarissimi Augustanæ reip. archiatri Geryoni filius, ad me misit: in qua similiter nulla abano pinna, nullæ squamæ apparent.

## CAPUT II.

## De Cobitide fluviatili.

## ARTICVLVS I.

## De Cobitide Rondeletij.

TAB.  
XXVI. 10.  
Aldrov. l. 5.  
de piscib.  
6. 9.

Triplex invenitur *Cobites*, fluviatilis Rondeletij nempe, Aculeata, & Barbatula. De illa ita ex Gesnero, & Rondeletio Aldrovandus. Idem Rondeletius fluviatilem hunc pisciculum antiquis, qui de fluviatilibus

parum fuisse soliti, in dictum, *Cobitem*, *Cobitidem*, fluviatilem nuncupavit, quod maxime, inquit, persimilis sit: cum alioqui neque situ neque numero pinnatum cum marina conveniat, quate similitudo isthæc ad *Cobitidem* barbatulam potius pertinet: ad hæc *Cobitis* marina lævis est, uti & *Barbatula*; contra *Squamosus*, quo de loquimur, pisciculus est, nisi figura exhibitâ nos fallat, quod quidem suspicari licet. Ipse enim Gallis *Loche franche* vocari asserit, vel quod totus lævis sit, & aculeis careat: vel quod mollior sit, & salubrior: quâobrem *Cobitem* forte hunc pisciculum, inquit Gesnerus vocat, quod ad *Gobionem* fluviatilem Ausonij accedat, non ad marinam *Cobitin*. *Degit* in rivulorum & fluviolorum ripis, digitali magnitudine, rostro satis prominente. Corpus flavescit, & maculis nigricantibus notatur, subrotundum est & carnosum. *Pinna* duæ sunt ad branchias, duæ in ventre, unica ab extremitate meatu, unica in dorso. Gesnerus cum hoc piscitio idem putat, vel saltem simillimum, suis *Ryffele* nuncupatum; *Digit*, inquit, longitudinem parvum excedit, colore per dorsum è caeruleo virescente, per latera & ventrem candido. In Silo torrente capitur ad Tigurum circa lapides: & ex eo Limagum annem ingreditur, inter lautos pisciculos habitus Rondeletij suos *Cobites* carne est humida, & viscida: si in aqua sordida & cernosa nutrantur, pinguescit, sed multo insalubrior redditur. Pro *Cobite* Rondeletij nos aliam iconem dedimus, eiusdem ni fallor, piscis

## ARTICVLVS II.

## De Cobitide aculeata.

*Cobites aculeata*, quæ *Mustela* patet. *Tab.*  
Va imberbis dici posset, Gallus est *XXVI. 11.*  
Perce, quod Petras quasi videantur *3.*  
perforate (duos habent in branchiis *Aldrov. l. 5.*  
aculeos, utrinque unum, ad caudam *de piscib.*  
spectantes, denarium cetastis longi- *6. 30.*  
tudine, quibus sese impellunt, ut minima

tima inter lapides foraminula sub-  
eant) Germanis Steinbeis, seu Da-  
cobythus, Oxycrinus non incom-  
mode, aliis Pisciculus est inquit Al-  
bertus, eodem colore quo Fundula.  
Non est autē rotundus, sed quasi co-  
lumnalis compressus, & habet spinā  
acutam iuxta os, qua cum recutvato  
capite vulnerat manum se tangentis.  
Bellonius quoque & Rondeletius a-  
culeum in operculis branchiarum ut-  
trique unū habere tradunt. Alber-  
tus branchiis ipsum carere omnino  
ait; cuius errorem detegit nuper Ge-  
orgius Fabricius, qui parva foramina  
circa oculos eis, sicut in Lampredis  
in esse observavit, teste Gesneto, qui  
pisciculum esse ait exilem seu tenuē,  
& oblongum, Fundulo, de quo mox,  
similem, paulo longiorem: nam qua-  
tuor aut quinque digitos æquare so-  
lere: maculosum, capite acuto & de-  
orsum vergente. Rondeletius spinā  
internam duram quam in præceden-  
te rigidiorē esse monet, ideoque in-  
ter edendum molestiorē esse: æpi-  
us vero etiam ichtyopolas parū cau-  
tis imponere, & pro levibus vendere,  
extremum imposturam inter edendū  
facile deprehendi. *Degit* in aquis fon-  
tans & rivis præcipue. Ex his vero  
migrans cum aliis fluvios, tū Albim  
maxime subit, ut Gesnerus refert, qui  
& apud suos nullum aut certe rarissi-  
mum esse scribit, circa Argentinā  
vero frequentiorē, & ex Georgij  
Fabricij testimonio in Misēna opti-  
mos capi in Mulda prope Doblā op-  
pidum in herbis, algis & cœno *degere*,  
atque inde *visitare*. Majo menie cū  
Fundulis parete, & aliquando vel bis  
vel ter. Rostro lapidibus mordicus  
se affigere, & aliquando valis etiam,  
licet æneis, quibus in foro piscatorio  
à mulieribus, inquit, iniiciuntur, ita  
ut fugere videantur. Esse quando co-  
pules gregatim hærentes inveniun-  
tur. Rebus angustis, id est, quorū per-  
angustæ sunt maculæ, capi, cum aliis  
pisciculis circa ripas fluminum. Bel-  
lonius pisciculum esse scribit admo-  
dum *vivacem*. Eidem delicatissimus  
est: contra infatuare nobis videtur  
Rondeletius in cautis pro lævi Coti-

tide obtundi iniquens, fraudemque  
dando dete, i: & Gesnerus vilissimos  
vocat, carne tenaci, Fundulis multo  
ignobiliore. Aprili mense & Majo  
minus improbat; præferri gravidos  
frigi debere buryro: Misēnos circa  
bacchianalia, & Martio mense eos  
commendare, antequam migrent,  
quod tum ovīs gravidis sint: præstan-  
tiores apud eisdem non in Albi, sed  
in Mulda capi.

## ARTICULUS III.

## De Cobitide Barbatula.

**C**obitis ista *Barbatula* nomen à Cir-  
TAN.   
ris tenuibus ē rostro barbæ mo- XXVI.  
do dependentibus obtinuit. Alber- 22.23.  
tus M. Fondelam, Germani Grinde- Aldrovand.  
la vocat. Gesnerus Mustelam flu- 31.  
viatilem dici posse putat. Indici di-  
giti crassitudine est, inquit Bellonius,  
quinque digitos longa (pinguis Lo-  
chia) tota puncturis seu punctis di-  
stincta: notæque in tergore & lateri-  
bus habet, nunc grandes, nunc par-  
vas ac nigricantes, quibus ipsa etiam  
quoddammodo pulla apparet: sed  
ventre est candido. Pinnam utrimque  
unam in lateribus gerit: item in ven-  
tre duas, in tergore vero summo unā  
admodum parvam: item sub cauda  
ad anum alteram. Pinna caudæ to-  
runda est: reliquæ omnes, obtusæ &  
laxæ. Cirris quaternis, utrinque, duo-  
bus (Barbi modo) tanquam mystaci-  
bus insignis est. Os habet parvum sub  
longo naso: ejusque *intestinum* statim  
à stomacho (quem hepar fovet) re-  
cta per ventrem ad anum ducitur. *Fel*  
dextro hepatis labo adestum: *Lienem*  
insignem, & rubrum habet. *Cer* sub  
branchiis, suo pericardio obvolutū,  
ova singulari vesicula, ut aliis piscibus  
bicorni folliculo conclusa. Hæc ille.  
Duo genera esse huius pisciculi Geor-  
gius Fabricius Gesnerum in epistola  
monuit. *Primum* commune, quod it  
deliciis habetur, & insigni magnitu-  
dine apud suos (Misēnos) capitur in  
Flohamne: alterū & tenuitate cor-  
poris, & colore & sapore divetum,  
quod à Saxis nomē est consecutum,  
Stein-

Steinsmirlin. Limpidis & saxatilibus locis gaudent, quamvis & circa ripas & in cœno, unde Mossgrundel dicitur, reperiantur. Plurimi in rivis quibus maiora flumina ingrediuntur, capiuntur, idque præcipue Februario, Martio & Aprili. Gesnerus medio mensis Maij capto, ovis gravidos vidit, aitque post Pascha parere incipere: quamvis non desint, qui vel singulis mensibus eos parere asserant. De *Fusiporum* in cibis ita Aldrovandus. Tam delicatus pisciculus est, ut Lonicerus inter omnes ferè primatum tenere scitipserit. Teneros tamen præsertim & nuper natos in deliciis haberi, Gesnerus ait, eosque cum iure coctos ex eodem, quod mireris, cū pane cochlearibus edi: quas delicatas, inquit, aliquando circa summum Acronium lacum gustavi. Salubres vulgo existimantur, ita ut medici etiā ægrotis alicubi eos permittant. Esse sane solidiuscula carne, & odore non piscoso, ut alij pleriq; sed magis grato, idem Gesnerus asserit, & cum exigui sint, nec pingues, non multum replere: præferri à Misenis maiores, & qui à saxis denominantur: colore saporeque differre, corpore tenuiore, carne duriore, & quæ in elixis tenacius spinis hæreat: Commendari maxime à narali Domini usque ad Pascha, quoniam tum parere incipiāt: alios Februatio, Martio, Aprilimensibus eos præferre, usque ad initium Maij. Teneros verò nunquam non laudari, maxime si cum apio, petroselinio, edantur. Vino calido iniecto elixari debere, idque brevi tempore & sub finem modico aceto affuso, ad eius fere consumptionem coquentis, quomodo Gobij capitati etiam parantur.

## CAPUT XIII.

## De Phoxino squamoso.

TAB.  
XXVII.  
f. 6.  
Argut. H.

Quid de Phoxino Aristotelis statuendum sit, ex ipsius verbis colligere difficile est. Statim enim ac natus est ova habere, & semel in an-

no in stagnis fluviotum & arundine-  
tis lacuum, quæ *πελαγιάδες* vocant, o-  
va ponere dixit. Rondeletius eo no-  
mine *duos* squamosos pisces describit,  
*Fusus*, quem in Picardia sub nomine  
Rosiere vidit, dimidiati pedis longi-  
tudinem nunquam superat. Corpore  
est lato & compresso, oculis magnis,  
colore luteo, bramis minimis, cor-  
poris specie simillimus. Semper ute-  
rum *Ovis* refertum habet, ideo cum  
illis nasci piscatores tradunt. *Alter*  
vocatur à rubore caudæ, *Rose*. Reli-  
quo inquit corpore cæruleo est, pau-  
lo maior, minus lato corpore, *ovis*  
semper plenus, etiam maximus. Cū  
priori eundem esse coniicit, qui apud  
Helvetios *Bambela* vocatur.  
Gesnerus. Pisciculus, inquit, est tres  
aut quatuor digitos longus: sex qui-  
dem digitis longiorem non vidi. Ca-  
putei crassiusculum pro sua magni-  
tudine, nigricans, iris oculorum cro-  
cea: qui color etiam ad pinnarum in-  
itia omnia spectatur, in pinna dor-  
sique initio, in maioribus & adul-  
tis. *Pinnarum* ad branchias articulos  
veluti carum enlam quandam habet,  
in aliis parum, in aliis valde croceam  
(in aliis si bene memini, rubentem)  
pro ætatis nimirum & sexus differen-  
tia, fortassis & aquarum & regionum,  
in quibus degunt. *Squamos* habet al-  
bicantes. Linea fusca oblique à capi-  
te ad caudam fertur. Pinna in dorso  
medio unica est, binæ ad branchias,  
totidem in medio ventre, alia post  
anum. In principio caudæ macula  
atra notatur, & aliis minoribus sin-  
gulis, ad initia pinnarum utrinque.  
Dorsum & latera nonnihil flavescunt.  
Sapor in cibo subamarus: Reperiun-  
tur influentibus solum aquis, ut au-  
dio: non etiam in lacubus & cœno,  
ut læves, quos è rivis, lacus & flumina  
maiora ingredi diximus: unde eos,  
læves, nostri à rivis *Bachbæmele* no-  
minant. Idem in Glatto flumine apud  
Helvetios, parvo ac cœnoso, ab  
his qui canculos captant, subinde in-  
veniuntur, & abiciuntur. A baccha-  
nialium vel quadagesimæ initio usque  
ad Calendas Maij nascas non angu-  
stius contextas, quam ut Gobij capi-  
tati

Ad 66.  
13. 14.

Gesner. in  
Phoxin.

12.

tati & Bambelæ ex ijs evadete possunt, in flumen immirre piscatoribus nostris licet. Bambelam nostram Itali quidam, ut audio, eodem quo Gobium fluviatilem nomine appellant, Varon. Verbani vero accolæ circa Lucarnum Stornazzo, vel sterniculo.

## CAPUT XIV.

## De Bubulca Bellonij, &amp; Rutilo fluviatili Gesneri.

Aldrov. l.  
5. de Piscib.  
632.

**P**Hoxino *Bubulca* Bellonij subiticius, quia cum priori illi, quem Rosiere Piccardi vocat cognarâ Gesnerus facit. Ira verò de eo Bellonius. Sordidus admodum & vilis pisciculus Gallico vulgo è re ipsa Bouviera nuncupatur: alius Petese, etymologia à bombis obscenâ tracta. Piscis est Sequanæ alumnus, non ramen usquequaque frequens, ut quind semper appareat. Nam quomodo Verones pisculi nusquam Augusto, Sept. & Octobri tibi, aut saltem raro apparebunt: sic *Bubulca* sero in conspectum venit. Plurima vere *capitur*. Brémam aut Castagnolam marinam toto habitu æmuletur, nisi corpore esset minimo. Planus enim & latus est: sed & argenteo nitore refulget, atque orbicularem magis habet formam: quam in longitudinem protēsam. Trium digitorum longitudinē excedit, neque sesqui digitalem latitudinem. Soli obiecta, nigri nihil habere competitur, quam in linea, quæ spinam comitatur ad caudam. Parvam in tergore gerit pinnulam; oculorum pupillam, omniem nigredinē superantē. Squamis tegitur magnis, & latis. Carneum quiddam, ut Cyprinus (quatenus parvum magno licet conferte) in fornice palati ostendit, *branchias* utrimq; quaternas simplices, ac sub ventre toridem, caudā bifurcam. *Ore* est parvo, dentibus vacuo. Pisciculos istos respui credo propter fellis magnitudinem, quod vix possint exenterari, quin eorum

*fellis* vesica disrumpatur: quo pertorum corpus diffuso, plurimum amari invescendo sentiuntur: id autem sub hepatis lobo dextro coloris Smaragdini, magnitudine pisii continetur. *Folliculum* vento plenum in utero gestat geniculo intercepit: *lienem* tomacho inhaerentem, rubrum atque orbicularem. Huius etiam intestina multis in gyrum revolutionibus & infractibus circumvoluta sunt. Hætenus Bellonius.

Rutilo *fluviatili* à rubro pinna-<sup>TAB. II.</sup> tum colore nomen Gesnerus, ad differentiam Erythrini vererum imposuit. Circa Comum in Latio lacu, in-<sup>TAB.</sup> XXVI. <sup>9.</sup> quirit, Piora, ut circa Verbanum quoque dicitur: à Germanis Oceani accolis Roddovu vel Roddau: Sabaudis circa lacum ad Bielam & Neocomum, Vingeron, vel Vengeron, unde Germanorū Vingeron, vel contra, (quo tamen nomine Lucernæ accolæ Leucisci speciem intelligunt eam quam Vendosiam & Dardum Gallis dicii dicavimus) Anglis, Roche, Polonis, Pfistrega. Piscis è foro ad Gesnerum delatus, latus erat ad digitos quatuor, longus duodecim. Pupilla nigerrima, iride aurea labijs subrubris: colote in cauda, pinnisq; in ventre & ab ano stris, cinnabarinis: nam cæteræ minus rubri habent. Linea à summis branchijs caudam versus obliqua, cauda bifurca: Supercilia & circa branchias locus, auteo colore nitent. Squamæ latæ, striatæ, validæ. Dorsum fuscum, ventres pallidus: pinna quaternæ: *superior* viride, *vesica* geminata: *aristis* plena. In faucibus maxillas utrimque habet, recurvas dentibus minutis quinque, qui ab interiore parte singuli serræ instar asperantur: quod in aliorum piscium dentibus nondum memini animadvertisse. Piscis hic apud nos Helverios, *lacustris* tantum est, satis *vivax*. In nostro & Acronio lacubus, abunde capitur. Piscatores Constantiæ, & circa Acronum aiunt cum aliquando cum Cyprino lato *cuius*: inde Hybridam, (cui *Halbisch*) gigni: qui inter utrumque ambigat, Rutilo maior aliquando, minor autem Cyprino lato.



lato. *Paris* Iunio mense. Muscarum fluviatilium (sive lacustrium) genus est quoddam magnum, oblongo, terete, varioque corporis alveo, has insigunt hamis ad inescandos Rutilos. Februario Martioque mensibus apud alios Getmanos, Novembri apud nostros in cibo præfertur. Major rursus deterior fieri, & imminui incipit. Parari iubent peritiores instar Cyprini; & vino frigido immisium elixari. Hactenus ex Gesnero. Putatur cum Vangerone Rondeletii esse idem. Hic autem corpore Balteo, (de quo suo loco) rostro Mugilibus simile esse ait, rostro tñ esse longiore. Dentib. carere: piñas ad brachias duas habere subaureas, in medio ventre duas alias croceas; ab extremi meatu unicum, in dorso aliam. Caudam in duas desinere haeque à squamis initio integri, etiam si non adhæreant. Cyprino & corporis specie & carnis substantia succoque affinem esse, & vilem haberi.



## TITULUS II.

### De Piscibus fluviatilibus lævis.

#### CAPUT I.

##### De Attilo Padi.

TAB.  
XXVIII.

2.  
Aldrovand.  
de Piscib.  
L. 3. c. 1.

Phn. II. N.  
L. 9. c. 15.




Antum de Piscibus fluviatilibus squamosis, sequuntur Læves, inter quos præcedat Attilus, in Pado inertia pinguescens, ad mille aliquando libras catenato capris hamo, nec nisi boum iugis extractus, ut Plinii verbis utar. Piscis est Cartilagineus, Sturioni magna ex parte respondens. Huius enim more ossa gerit clypeata, sed ea tempore dicitur abicere. Idque in causa esse cur alii sine ossibus, alii cum ossibus depingant: post quæ, pinna dorsii est unica, cui parte supina subiacent duæ, quales omnino sunt Sturioni. Cauda et-

iam in duas deficit: Os clausum ad obliquam lineam incisum est, sed apertum & hians rotundum. Antecilud pendente rostro *appendices* carnosæ & molles. Brachias operas habet, ad quas pinnae sitæ sunt. Quomodo vero à Sturione, quem Franc. Philadelphus Attilum esse credebatur, differat. Caelius Calcagninus perquam eruditè docet his fere verbis. Quod à me percontaris, an Attilus, quem Ladanum vulgaris nomenclatura solet appellare, is sit quem Italia Moronem, Ulfonem Pannonia vocat: paucis respondebo, me eundem non existimare, vel ex Plinii testimonio, qui cum Pado vult peculiarent esse; quo loco de propriis quorundam amniū piscibus ait. Sed ego, et tecum agam liberalius, non modo te ad Plinium, sed ad oculorum etiam tuorum testimonium provocho. Toramque itaq; Attili effigiem ac membraturam quantam potui brevitate perstrinxi. Et quia non satis perspicue id fieri posset, nisi noti alicuius piscis exemplo uteremur. Hyccam sive Sturionem, qui nullo ferme loco non nascitur, mihi proposuisti. Qui licet in mari natales habeat, solet tamen adversus amnes mira subire voluptate, donec iam præpinguis redeat. Motonis sive Ulfonis exemplo nondum dixi, quod neque ii pisces non cognoscantur, neque mihi eorum imago satis memoriz inhæreat. Sic ergo accipie Attilus hoc differt ab Hicca sive Sturione, quod Sturio pelagius est: Attilus amnicus est, & Pado peculiatis. Sturio non temere visus & quare quatuor talenta Attica, id est, trecentas libras: Plinius scribit Attilum ad mille libras, id est, supra XIII. talenta extevisse. Quæ magnitudo sane insignis & raro perspicua. Attilus cum ad certam magnitudinem extevis, squamas hispidas abiecit, quas per quinque versus dispositas gerit, in summa scilicet dorsii spina ex utroque latere geminatas, & sibi quasi parallelas, extremus versus pinnas attingit. His abiectis taçu lævis evadit, nec habet quod unguem offendit. Contra Sturio semper hispida squa-

Alien. M.  
A. L. 1. c. 11.

Pecten.



Alia

Clit

Arctus minor

Silerman.



Alia seu Clupea

Thynnus Squalosus Minor



Thynnus Squalosus minor

Alia Ballerus

Black.



Glan. omart Walfen

Barbata

in arbor art Trudi



Cyprinus monstrosus



Gymna. karv

Cyprinus Alia in arbor art Kappi.





Phagrus

H'nyflem Barabari

Phagrus

Elinz


Phagrus Lanius

Mylina Erling



Althia. Padi

Eon out Slow



Mylia

Trynke



Arlexan. Stelshus

Gelenier Slip vi-  
haurin



Mylia. flumidus flus

Trynke



Mylia. sp. 8



Mylia. alba

Trynke



Mylia Barabari




Lambride

Ninoug



Lambride

Lambride. Prud.



Saimmim.

Saiming.



Perca

Perch.



Perca

Perca  
maur. dete



Schvaller.

Schvaller



Eydorus.

Pottelien




Stobliano

Pungit

Stobliano









1911  
MAY 11  
1911

mas suas tota ætate retinet : Caro Sturioniscallum habet , & mitissime palatum oblectat. Attili contra, fluxa est, & mollis, & palato parum iucunda. Existimant piscatores <sup>apertius</sup>, id est, partem priorem Attili, ad posteriorem vix eam habere proportionem, quam quatuor ad unum. Tota n. vis huius piscis sita est in *capite*, & parte capici attigua. Quæ observatio etiam ad Sturionem etiam, aliosque pisces pertineat, auctore Aristotele & Plinio: cuius verba sunt, videlicet capita piscibus portione corporum maxima, fortassis ut mergantur, tamen in Attilione scio quomodo prætet cæteros luculenta est atque admirabilis. Parvi sunt *oculi* Attili, in tanta mole capitis. Sturio & Attilus habent os in parte prona, (supina dicere voluit) eo prope in loco, cui in cæteris perfectioribus animantibus, respondent, omoplate. Os utrique sine dentibus, sed Sturioni ferme orbiculatum. Attilo multo maius, & ad lineam obliquam incisum, quo aperto, vasto illo hiatus pisces devorat, quos respirando <sup>inter ducendo</sup> (ita piscatores putant) contrahit. *Leca* pisculenta, maximè frequentat, hybetno præcipue tempore vorticosas voragines, ad quas pisces frigotis impatientes, temporis gratia ferociunt. Rostrum Sturioni resimū ac latiusculum, ad imaginem fere Delphini & Oxyrinchi; Attili planum, & parvominus quam in mucronem desinens, Attilo tergicolor albicans & lanosus. Sturioni vergit in glaucum. Hæc itaque Cælius. De eius cum clupea inimicitia ita Plinius. Minimus hunc piscis, appellatus Clupea, venam quandam eius in faucibus mira cupidine appetens, morsu exanimat.

## CAPUT II.

## De Antacæo Borysthenis Rondelerij, &amp; Stellari.

TAB. XXVIII.  
TAB. XXV.  
Antacæi pisces dicuntur prægrædes, inquit Rondelerius, & vastæ magnitudinis in Mæotide & Borystheni: quos aliquando in ostiis in glacie concretos effodi auctore est

Strabo. (Nec alios, ut coniecio. Soli <sup>alib. de Piscib. l. 3. c. 2.</sup> nus intelligit, inquit: Apud Nuros nascitur Borysthenes flumen, in quo pisces egregij saporis, & quibus ossa nulla sunt, nec aliud quam Cartilaginosis tenerrimæ. Nec dubito, quin Plinius de his loquatur his verbis: Et in Danubio Mario extrahitur porculo marino similis. Et in Borysthenem memoratur præcipua magnitudo nullis ossibus spinisque interlitis.) Ex his salsamenta fiebant, præsertim ex maxillis & ijs quæ circa palatum sunt partibus, quod eæ partes aliis suavitate præstarent. Ex his igitur unus est, quem hic proponimus rostro oblongo, acuto, *eris* vasto & rotundo hiatus in supina parte Bellonius similem figuram exhibet Attili nomine, nisi quod unicam ei tantum in dorso pinnam appinxerit. Ingentis, (inquit) est magnitudinis: Cætera Sturionem tamen internis quàm externis partibus refert, hoc dempto, quod pro eminentioribus ac callosis illis elatis tuberculis, quibus Sturio quinque carinis præditus est: hic stigmatibus tantum lividis sessilibusque maculis in cute minus aspera, ad latera sit distinctus: Præterea unicam tantum *pinnam* ab ano ad caudam gerit. Sturio autem duas habet. Cæterum *Os* Attilo prominens oblongum, fistulosum, sublongo etiam naso. Hætenus Bellonius, qui deinceps non nulla de hoc pisce scribit, quæ vero Attilo conveniunt.

ANTACÆUS STELLARIS in Danubio prope Strybingam captus, & <sup>alib. l. 3. c. 3.</sup> depictus, ad Gesnerum missus est. Colorem ubique ferè cæruleum ostendebat, venter erat candidior ad roscum inclinans. Spina in dorso & stellæ pallidi coloris puncta etiam passim expallido albicantia, vel fusci Indici coloris. Cognatus huic est, qui Sick vel Tick vocatur, & in Danubio circa Pestam vel Budam capitur, mole corporis quæ ad XXV. libras accedat, cute varia undique stellata, sed rostro longiore & graciliore quam vel in Hufone, ansetino fere simili.



## CAPUT III.

## De Ichthyocolla.

TAB.  
XXIX. 16.Plin. H. N.  
l. 32. l. 7.Diosc. M.  
M. l. 3. l. 4.  
302.Diosc. de  
Pisib. l. 2.

**I**chthyocollæ meminit Plinius ex veteribus dum inquit. Ichthyocolla appellatur piscis, cui glutinosum est corium, idemq; nomen glurini eius. Quidam piscem Iudaicum vocati scribunt, quod nomē Zyganæ apud Parisienses competit, alij Antacæum ab Herodoto, à Pomponio Magnum vocari dicunt, nonnulli Plinij Mariorem appellant. Bellonius Tanais accolis *Barbotam* dici, quod quaternis veluti barbis ad labia sit cōmunitus, prodidit. Nec alium Dioscorides intellexit, cum gluten ventrem esse piscis cetacei, laudariq; candicans, ratione Ponticum scripsit. Tale enim & hodie ex ei<sup>9</sup> intestino ex Pōto mittitur. Est autem Piscis cetaceus figura oblonga ac prope recti. Ossibus ac spinis caret, capite est crasso & lato, ore magno & in promptu posito: è superiore maxilla quatuor apophyses carnosæ, velut barbæ dependent, unde Barbotta dicitur. Oculos parvos habet pro corporis magnitudine. Bellonius ait hoc à Stutione atq; Attilo præcipuè differre, quod rostro careat, magnum oris rictum præ se ferat, sitque sublurea, dura, lævi ac glabra cute convestita carne. Bina ante oculorum cantium, parva atq; aperta foramina habet: pinnas in tergore duas (quas aliter Rondeletius, aliter Bellonius pingit) ad caudam erectas. Branchiæ veluti spineo tegmine cominuntur. Sturionis modo: Cauda quæ huic magis bifurca; præcipuè à cæteris piscibus nota discernitur, quod paulo supra spineum operimentum branchiarum, quodam ad eius latera impresso foramine pervius sit. *Folliculus*, sive vesica, ex qua glutinum fit à capite ad caudam, per spinæ longitudinem extenditur. *Carnes* est secundum Rondeletium prædulci, & gluriosa admodum, ob id salutaris idonea, qua melior redditur & rubescens Salinonis modo, arque etiam durior, quam ob causam aliquādiu maceranda, priusquam coquatur. Eam Tanais & Ponti accolæ Romæ & Venetias transmittunt, illicque in

foropiscatorio venditur. Ichthyocolla auctore Plinio epinyctides tollit, Erugat cutem, extēditq; in aqua decocta horis quatuor, denuo confusa, collura & subacta ad liquorem usque mollis. Ita præparata in vase novo cōditur, & in usu quatuor drachmis eius, binæ sulphuris, & anchusæ totidē, octo spumæ argentæ adduntur, aspersaq; aqua teruntur nna. Sic illata facies, post quatuor horas abluuntur. Idem alibi. Lethargicos (inquit) coagulum vituli adiuvat in vino possum oboli pondere: idē Ichthyocollæ. Valet ad conglutinandas omnis generis charras, atq; instrumenta musica, reliquaque lignaria incrustamēra, quæ tessellato, imbricato, & vermiculato opere fiunt.

## CAPUT IV.

## De Glanide.

**P**iscis, qui Aristoteli & Pausaniz <sup>TAB. XXVII. 3.</sup> Glanis, Plinio sæpe Silurus aliquādo Glanis, Glanus, & Glaninus vocatur. Ab Æliano Siluro explicatur. Veteres sequuntur recentium plurimi, interq; hoc Gesnerus & Schonfeldius, nos quid sentirem<sup>9</sup>, superius diximus. Nomen à Glanide Italiz & Cunæ fluvio accepit, si Stephanum sequimur, eiusdemq; vestigia apud Byzantinorum vulgus, qui hodieque Glangnū teste Manardo, vocat, quasi Glanum, retinet. Descriptionem quod atrinet, sunt ipsi spinæ pro ossibus non Cartilagine. *Corpus* fuscum, <sup>Schonfeld.</sup> <sup>Ichthys.</sup> <sup>p. 69.</sup> nigris maculis plenum, squamæ nullæ, corium satis crassum, & lubricum. Caput grande, depressum. *O*s obtusum. Oculi parvi. Rictus amplus & ad capitis latitudinē parulus. Labia superiora gemino, inferiora unico ordine denticulorum confusane orū, in rorsum reclinatorū aspera, quibus prædā retinet. *Fauces* binis utriq; folliculis, limæ instar asperæ sunt. A labro inferiore dependent barbule quatuor, tenues, oblongæ, pallidæ, à superiore duæ, eiusdē coloris, duæ, longissimæ, prætenturarum instar, quas ante se modo exerit, modo cōponit. *Pinna* illi in dorso post cervicē unica est, parva, quatuor aut quinque

fibris

fibris elata, post branchias duæ: quarum prima, faucesque proximè spectans, aculeo constat osseo, duro, quo infestus sibi piscis arcet, &c.

Venter magnus est, defotmis, & subalbidus, obscurè fuscis lituris còspersus. Cor inter branchias utrinque quaternas situm est, à reliquo diaphragmate separatum, quod gula ampla perforat, à qua ventriculus dependet, & intestina, quæ unica revolutione in anum desinunt. Ventriculo incumbit *Epar*, ex rubro pallens, duobus lobis distinctum, cui vesicula fellis dilutiaquei, adhæret. Dorso adjacet vesica simplex, peritonæum candidum est.

Ad multam magnitudinem excrescit: non solum enim ducentarum librarum, sed maior etiam capi solet. Gesnerus testimonio eruditi cuiusdam Ungari in Tibisco, qui Danubio miscetur, aliquando captum fuisse scribit septem vel octo cubitorum, plaustrum occupantem: cum in fluvio annis sedecim sub culina Viri cuiusdam nobilis latuisse: hamo tandem inescatum esse, dum faturam suam custodiret: ubi se caprum sensir exsiluisse; secutos impetum eius piscatores ad millaria duo, denique defatigatum cepisse: barbas eum supra infraque os habere, rectum latum, caudam versus attenuari. *Dentes* habere instar pectinis illius quo laneæ vestis depectuntur, à cardus denominati vulgo: squamis carere: in aquis crenosis *versari*. Ipse vero Gesnerus dentes habere negat, sed labia limæ instar exasperari, atque ita prædam faciliè retinere: recentam mandere & comminuere: ei opus non esse, sed faucibus & gula maximè patentibus integram vorare. Idem & in Viadro apud Silesios tantum esse scribit, ut caprus, impossurus curru, plerumque ultra currum emineat. Variat ab isto ille cuius Gesnerus leonem sub Siluri tertii nomine ponit. Piscis, inquit, Similitudinem aliquam cum Mustelis fluviorum & lacuum habet. Oculi sunt parvi: barbulae fuscæ, non longæ, crassiusculis paulatim attenuantur;

binæ superiore labro, ternæ inferiore. Pinnae ad branchias binæ, in dorso nullam ostendit pictura, sed tantum carunculum quandam mucronatâ eminentem, qualis & in *Mustela palustri* maiore, eodem fere loco visitur. In ventre vero una & continua longissima pinna ad caudam usque albicat, maculis distincta fuscis. Corpus à capite retrorsum subinde attenuatur, finis latiusculus & obliquus est, & quid mireris nullam caudæ pinnam habent. Os magnum & latum. Capitis colore caruleo subviridis; reliquum corpus viridi & flavo colore mixto pingitur, sed maculas etiam diversî coloris habet. Huius generis duos in suo stagno civis quidam aluit, qui cum ante annos triginta sex, (verba sunt Stuibii ad Gesnerum) ad Hundselden in Rheno cum aliis piscibus illis quos Argentinae vocant *Ruselken*, simul nassa capti essent, vix digiti longitudine, & Argentinâ in forum advecti, à cive quodâ raritatis gratia empti, in piscinam coniecti sunt, in qua alter ab eo tempore usque adeo excrevit, ut jam sex cum dimidio pedes meos (hominis mediocris proceritatem aut amplius) longitudine contineat. Caput quæ crassissimum est, filo complexus, duorum pedum & dimidii fere circumferentiam deprehendi. Alter huic per omnia similis, sed longitudine longe est inferior. Maior ille piscibus quibusvis, excepto carpione sive vivis sive mortuis, *versatur*. Hyeme nihil quicquam gustare unquam visus est. *Cornua* quæ supra & infra os habet, quotannis decidunt, & rursus nova succrescunt, sicuti cervis.

Repetiebatur in pluribus fluminibus tempore *Æliani*; temporibus *Æliani*. Plinii præcipuè in Mæno, nisi Rhenum velis legere. In Aeno grassatum quem quidam Mæno & Rheno subsistunt prope *Visibium*, quod ad eius amnis ostia conditum *Aventinus* prodit, tanquam loco magis canoso, verisimile est. In Cydno *Ciciliz* fluvio procreatos sed minutos, quod eius confluens *nixidus* & *trigidus* apud

*Ælian. H. Ad 12. c. 29*

pud Ælianum habetur. Pyramus, Saurus, Orontes plurimos producunt, quia limosi; nec pauciores in Ptolomæorum fluvio, Apamiensi stagno. In Bubasto Ægyptiæ cicures aluntur plurimi. Strabo, & Athenæus, dū Siluros in Nilo esse scribunt, Glanides intelligunt, nō Sturiones. Nam qui ē mari fluvios subeunt, præter Delphinum Mugilē & Alofam, nullus alius Nilum intrat propter Crocodilos. Plinius dū maris peculiarem facit Gladinē, fallitur. Expressē Schonfeldius. Fluvatile hoc animal est, nec unquā aquam falsam ingreditur: ubi circa Hæburgū capitur, itatim Albis ex aquis pluviis aut nivalibus exæstuantis metus est, quas ut passim ex locis montosis, stagnis seu lacubus collectas, fugiens, Silurus cedit, & partes Albis paciosiores sequitur. Repertur & in Istro, Tibisco, Vistula. In Helveti. stagnis paucissimē capiuntur in Bernensibus Neocomenſi & Morerano aliquando. *Vesitur* carnibus, nec minoribus duntaxat pisciculis ventrē implet, sed & in maiores, imo homines & equos grassatur. Captū in Pannonia fama receptū, in cuius visceribus humana manus ornata annulis reperta sit. Puerum in Danubio ad Pofoniam natantē ab hoc pisce devoratum, & in capti visceribus fragmenta eiusdē reperta, à fide dignis Pannonibus proditū est. In eius, quem sub culina viri cuiusdā Nobilis latuisse supra diximus ventre, caput humanum cum dextera manu & tribus annulis aureis inventum est. Aristoteles dentibus dūtaxat valere, & *ἀνὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς* esse scriptum. Cauda cōcussa, pisces præfertim minores ori admovet. Canicula exortu sideratur, & alias fulgure sopitur. De *Cottu* & partu apud Aristotē legimus. Cohærentes fœtus edere, sicut & ranas. Maiores profundis aquis patere, quippe nonnullos etiam ubi senum pedum altitudo sit: minores, locis brevioribus ferē ad radices salicis, aut alterius arboris cuiuspiā, juxtaq; arundines, atq; etiam muscū. Tardissimum eis ex ovis incrementū: atque idcirco assidē mas, quadragenos, quinquagenosq; dies, ne devo-

retur fœtus ab occurrentibus piscibus. Eodem quoq; die, aut etiā post, capiunt ova incrementum, quæ contigerit semen. Glanii ad erui magnitudinem. Quantum ad *ῥάσιν* in cibis, Salvianus durā carnem habere scribit. In Germania & Polonia pinguis est, & boni saporis: laudaturq; in cibum recens, cum sale conditus. Circa festum Iohannis optimus est, trium librarū inprimis. Obsonatores venā candidam, quam per spinam dorsī tenuissimo tectam involucre, transire, Benedictus Martinus scribit, tanquam venenatam eximunt.

## CAPUT V.

## De Barbota Gallorum.

**A** Glani, licet maximo pisce, non malē de hoc parvo dicetur, ob corporis barbzq; similitudinē. Galli vulgo Barbotam vocant, non à barbis (inquit Bellonius) aut arunco, sed ex hoc, q. Galli barbarare, cœnum & lutum rostro, anserum modo commovere dicunt. Ipse Clariam fluviatilem vocat, sed cum Lota Lugdunensiu de quo suo loco, implicat. Anguillæ, aut Congri modo glabram cutem habet, atq; idem caput. Cirro recto brevique & simplici in maxilla inferiori barbatur. Continuā in tergo pinnam gerit mollem, ad caudam (quæ illi rotunda est) desinentē. In nonnullis duas pinnaſ, ut in Icone quam à Bellonio misam ex Rondeletio exhibemus; in tergo videas: quarum exigua est, quæ capiti magis est vicina, sed & inter anum & caudam rursus aliam pinnam gerit: unam præterea utrimque in lateribus circa Branchias, quas utrimq; quaternas habet: duas vero sub vêtre capiti multum propinquas. Cæterum duos in inferiori maxilla habet denticulorum ordines admodū parvos: atq; in superiori maxilla totidem, ut nihil quam asperitas in eis sentiat: nam alios etiam in fornice palati gerit. Tergus & latera fulvum vel sublividum colorem habēt: *venter* autem albeſcat. Sēmipedalem non excedit longitudinem. *Hepar* lobum oblongū ad sinistrum latus demittit, sub quo est

TAB.  
XXVII.  
Bellon. de  
Aquatill. &

Arist. H. A.  
L. 9. c. 17.  
Aristot. H.  
A. L. 8. c. 20.  
Aristot. H.  
A. L. 6. c. 14.

est *Stomachus*. In pyloro apophyses; seu cecos viginti quinque connumerare potes: *lienem* quoq; videas, neq; dextro neq; sinistro, sed in medio spina stomacho inhzrentem. *Anus* eius propinquior est capiti, quam caudæ. *Intestina* pluribus quam tribus inflexionibus non circumducuntur. *Ova* in bicorni vulva fert utrinq; permulta. Huc ferè Bellonius. Vira & moribus cum *Lota* Lugdunensium convenit. *Hepar* magnum habet ac delicatum; Carnem quam *Lota* glutinosiorem: mucore & cæno vescitur, in eoq; delitescit.

## CAPUT VI.

De *Mustella fluviatili* & *Lacustris*.

QUam nos *Mustellam* vocamus, illæ lovius inter *Lari* pisces *Trisium* Latine dixit. *Mediolanenses* Botam vocat, seu quod utri similis sit, ut *Cardanus* scribit seu quod capite rana refectat. In subra. alii *Botetris* dixerunt. Specie *fluviatiles* & *Lacustris* apud suos differre *Gessnerus* asserit. Esse enim minores, colore nigricare, carne albiore, solidioreq; in cibo lautiores; duabus per dorsum pinis, quæ obrem separatim etiam describit. Cæterum corpus ait esse utrisque lubricum sine squamis (licet quibusdā, inquit, squamulæ minimæ radendo appareant) flexuosum, quod caudam versus attenuatur veluti in tæniam. Coloris varietas maculosa, pinna ab ano ad caudam ferè, oblonga. Binæ omnibus ad branchias, & binæ aliz eodem circulo inter caput & ventrē: pupilla oculorum alba, pars ambiens nigra. Branchiæ quaternæ simplices. Caput magnum, latum, & veluti compressum. In cerebro lapilli. Os granderecissum. Barbulæ circa os infra supraque; numero & magnitudine differentes in diversis generibus. *Dentes* nulli, sed veluti in lima exasperatū os. Voracitas, piscium quos devorare possunt. *Caro* mollis & dulcis. *Iecur* magnum. In deliciis *Pescica* (aut folliculus) nulla, *intestinum* parum anfractuosum, fere simplex. *Stomachus*:

ab eo ventriculus, & in circuitu multæ appendices, lā vero *Botarissium fluviatilem* *feminam* (eam intelligit quā nigricantem modo dixi.) Ianuario mense diligenter contemplari his verbis (ex quibus tamen etiā nonnulla aliis huius generis speciebus conveniūt,) describit. Piscis est forma & flexibus serpentē ferme referens. Capite lato, caudam valde versus attenuatur. *Brachia* ei quaternæ. *Pinna* ad latera brachiatum utrumque una nigricat: & aliz dux paulo inferius in pectore parvæ albicat à podice exorta una oblonga, paulo citra caudam definit: itē in dorso oblongior alia, ultra mediū dorsum continua tradit: & alia ante ea minor caput versus, quā pectoris in cone per in curiā nō expressit. *Pinnæ* omnes molles sunt & sine spinis. Carūcula sub mento pili instar prominet. *Cauda* non bifurca, sed circularis, nusquam omnino divisa, sed ubiq; sibi instar membranæ cōtinua: Colore vario, è fusco & nigro dorsum tenerum albicat: latera juxta dorsum minimis punctis nigris in colore subalbido distincta sunt. *Os* aperitur hiatus rotundo, totus piscis sine squamis & viscosus est. *Maxillæ* minimis denticulū ferratæ. Color subalbidus (linea subalba nimirum) à capite incipiens obliqui per latera caudæ versus procedit. Nam cauda in colore nigricante variat. Membranea vero caudæ extremitas partim nigricat partim subflava est. *Lapillos* duos in capite gerit, albißimos & bene duos, figura & magnitudine granorum oryzzæ. *Lacustris* modò in *Trissia* in Grissio lacu capta ab eodē considerata huiusmodi erat. Longa dodrantes, duos cum palmo filum ambiens Ventrem triū palmarum. *Denticuli* minimi, frequentes, ut serpentū. Superior pars oris duos ordines dentium habet, unum scilicet in terius in medio, cui nullus responderet infra. Sunt & in intimo oris recessu, duo denticulorū ordines seu in maculis duabus. *Brachia* quaternæ. *Squamula*, rotundæ minimæ, quæ dū pellis cultro taditur, apparent, in parvis generibus. rum *fluviatili*, tum *Lacustris* luteo minore nullo prorsus, per cunctos passim

TAB.  
XXVIII.  
6. 7. 8. 9.  
Aldrov. de  
Piscib. L. 5.  
c. 7.  
Cardan.  
Vener. Rer.  
4737.

passim ceu foramina, ceu puncta cava rotunda, conspiciuntur: quæ si quis caput versus valide radat, albissima videntur: sin iterum caudam versus, rursus obscureretur. In ventre meatos duos unus excrementi, alter genitura: qui compressus lacteo succo manabat. Et rursus alias *alia ex lacu* huiusmodi: sub flava, punctis nigris, barbula à mento demissa, albicans. Ante initium pinnarum in dorso carnosae particula, mollis, teres, intusque cava, prominet. Inde mox sequitur pinna brevis, longitudine pollicis: deinde una continua, octo vel novem digitos longa, ab ea nudum pinnae dorsum est, per tres fere digitos: cum sequuntur alix duæ parvæ, trian-gulares fere, inter quas digiti propemodum spatium intercedit: ex quibus infima & ultima, minor & caudæ coniuncta est. *Fels* subviridis: vesicula eius tum jecoti tum intestinis affixa. In ventriculo pisces duo integrierant, uterque digitos septem longus, tres latus: nec aliud quicquam. Pondus totius, uncia quin-quaginta. Costæ pellis subviridi & deformi colore erat, caro albissima, bona, satis solida. *Tecur* album, non ut in minoribus subruffum, grande, suavis-simum. In *alia Trissia parva, fluviali*, forte digitos decem longa, pinnae dorsi inquit, sic sunt. Primum, caruncula illi brevis non est, sed pinnula digito brevior: & minimo spacio intercedente, alia duos digitos longa: deinde post spatium duorum digitorum, alia paulo brevior, media, & mox cauda. Rursus ab hac differt alia, paulo longior, (ut semel animadverti: non enim simpliciter hæc accipi debent, quod ad magnitudines & colores) cui minus erat flavi in corpore, plus nigri, & eius splendidi-oris. Primum enim pinna illi brevis est, deinde una longa continua usque ad initium caudæ: Ergo magna Trissia lacustris, præter carunculam illam, pinnas in dorso quaternas habet, ex minoribus, nigricans binas: luteola vero maior ternas, minor binas: si modò species duæ sint luteolæ: quod accuratius considerandum est:

Minoribus lacuum Trissis pinnae in dorso binæ, adeo propinque invicem sunt, ut unica putentur: Colore fusco, non pulchro. Differentia à pin-nis certior: nam colores multas ob causas variare possunt. In Rheno supra Acronium lacum aliquando ad tres libras sedecim unciarum accedunt. Constanti tanta capta, ut drachmis duabus cum dimidia venderetur. Capte & Præte aliquando, pulcherrimæ, coloribus distinctæ, flavo, croceo, candido, roseo, atro, oculorum pupilla nigra, parte ambi-ente cærulea. Nigriores circa ripas fieri, magis in profundo flavas, quibusdam placuit. *Carnivora* sunt, nec ullus pi-scis pro sua magnitudine maiores pi-sces devorat. Profunda petunt, adeo, ut Albertus scribat, in lacu circa Co-stantiam ad trecentos passus sub aqua hamis extrahi: sæpe cum ranis extrahuntur: quæ quia illis ore adhe-rent, tanquam ex fugendi cibi gratia, ideo ore cum ranis aquaticis coire, quidam prodiderunt. *Parere* incipit Decembri, alicubi & Ianuario. Solæ piscium senectute *obscantur*. Maxi-mè commendantur in cibum illæ in pe-imis, quæ in puris rapidisq; fluviis de-gunt, quod candidiorem ac solidiorem carnem habeant. In jecinoribus tanta saporis gratia est, ut apud Thuringos olim cunctis cuiusdam Bichlingorum matronæ, omnes, dicant, principatus sui reditus in eorum delicias consumsisse. Laudatur hæc præcipuè ante Natalem Dominicum: circa par-tum improbantur, quod hoc tempo-re nonnullis in aquis grandinosa fuit. *Ova* aiunt semper valde noxia esse, quibusdam in locis, ut circa Neocomensem lacum Sabaudia. Caupones aliqui excisus jecinoribus, pisces vi-vos aquæ reddunt, consuto prius vulnere. *Ventriculū* huius piscis cum suis appendicibus miras habere virescra-dit Encelcius. In veteratum enim, ut fit (inquit) in Saxonia à matronis, trahere mirifice secundas hærentes aut reli-ctas in partu, in potu datum: & magni momenti esse ad omnia vitia matricis. In Suevia passim in Cauponis & divet foris patietibus hærentes hi ven-triculi

tricoli circa Zetorum fornaces visuntur, ab edentibus illuc electi, ut exsiccati serventur, & cum potione aliqua hausti à colios cruciatibus liberent. Colligunt & oleum ex hepate ad solem vel ad fornacis calorem suspenso, intra vas vitæcum: clatum id & flavum esse, adversus oculorum suffusiones utile, item nubeculas & maculas, quæ ab angulis oculorum nasci incipiunt.

*N. Mustela marina Iconem vide Tab. 46.*

## CAPUT VII.

*De Piscibus Fossilibus.*

TAB.  
XXVIII.

*Adron de  
Piscib. f.  
19.*

**P**iscium Fossilium & Veteres & moderni meminere. Ex illis ita de eorum natura & ortu Theophrastus. Pisces alieubi fossiles sunt, ut circa Heracleam & alibi in Ponto. Nascentur autem circa fluvios, & aquosissima loca, quæ cum siccantur (certis temporibus) paulatim, pisces subinde humorem sectando tetram subeunt: quæ demum siccata, remanent in ea, veluti vivi sepulta, vel ut animalia quædam in suis lacubus hinc condita durant, sine sensu feræ & motu totipida. Quod si loca illa priusquam denuò aqua accedat, fodiantur, pisces illi moventur. Sic & in Ponto contingit pisces glacie & gelu occupari, neque sentire, aut moveri prius, quam in ollas coquendi injiciantur. Præterea autem Gobio hoc accidere videtur. Ferè autem fossiles pisces sunt, eo quod ab inundatione fluviorum, in locis quæ resiccantur, vel ova, vel alia principia gignendis idonea piscibus relinquuntur. Nonnulla enim non ex ovo oriuntur, ut Anguilla & Centiscus. Et hoc in Heraclea, circa Lycum fluvium contingit. Principia autem hæc in terra relicta, perficiuntur, durantque. Neque absurdum est hos pisces durare.

Multa enim huiusmodi animalium exiguo egent nutrimento, sicuti serpentes quoque & quæ lacibus

lis se abdunt. Primum scilicet ipsa ova humore à terra manante, deinde eodem nati ex ovis pisces nutriuntur. Ad magnitudinem tamen aliquam eos excrecere neque vetissimile est, neque fertur, cum & loci angustia & alimenti penuria impediant. Carterum durare in aere hi pisces non æquè valent, ac illi qui ab aquis ad pastum egrediuntur: qui scilicet exigua refrigeratione, & quæ ab aere eis prestari possit, indigent: nam vel ipsa branchiarum angustia indicat, non multa refrigeratione eis opus esse: quamobrem & Anguilla tum in aere multum temporis vivit, tum in aquis turbidis illico suffocatur. Et similiter fossiles pisces à terra eos ambiente, quantum satis est, refrigerantur. Sed quod circa fossiles in Paphlagonia pisces contingit, peculiarem & abditam rationem habet. Illic enim profunde admodum multos & bonos pisces effodiunt: cum neque inundate aquam animum iis in locis neque aliter colligi animadvertatur, unde semina & principia generationis relinqui dicimus. Reliquum est ut sua sponte nascantur, idque continuo. Neque enim coire inter se possunt. Aut igitur hoc fieri existimandum est ratione loci, qui humidus sit, & omnino ferax huiusmodi piscium propter certam humidi calidique commodationem. Oriuntur autem & alii quandoque quidam pisces spontè: aut humores quosdam alieunde manare cogitandum est, qui generationis principia secum adferant: quæ mox locus idoneus & recipiat & alat. Præterea hoc inquirendum de utriusque, tum illis qui in aere vivunt, tum fossilibus, utrum in aquam immissi vivere valeant, aut in proprio duntaxat loco, qui eis naturalis sit, sicuti sua & marinis & fluvialibus aqua. Nam ex his quoque non nisi pauci mutationem sustinent. Nam qui in aquis ressecatis terram subeunt, & qui glacie gelati detinentur, iis similiarem esse humorem magis quam alius (è fossilium genere) conlat. Ergo piscium

alii simplicis naturæ videre debent, alii amphibii secundum Democritum, ut & aliz quædam animantes. Utuntur enim aere quædam (ex aquaticis) ut prædictum est. Theophrastus sequitur Plinius, dum inquit: Circa Heracleam & Cromnam (aliâs additur, & Lycum amnem: probè nimirum, mox enim sequitur) eodemque Lyco amne, & multifariam in Ponto unum genus esse Theophrastus pto di, quod extremas fluminum aquas sectetur, cavernasque faciat sibi in terra, atque in his vivat, etiam reciprocis annibus siccato litore, effodit ergo: motu demum corporum vivere eos approbant. Circa Heracleam eandem eodemque Lyco amne decedente, ovis relictis in limo, generari pisces, qui ad pabula petenda palpitent, exiguis branchiis, quod fieri non indigo humoris, propter quod & Anguillas diutius vivere exemptas aquis. Ova autem in sicco maturari, ut testudinum. Eadem in Ponti regione apprehendi glacie piscium maximi Gobiones, non nisi patinatum calore vitalem motum facientes. In his quidem, rameris mirabilis, est tamen aliqua ratio. Idem tradit in Paphlagonia effodi pisces gratissimos cibis terrenos, altis scrobibus, in his locis, ubi nullæ restagnant aquæ, miraturque & ipse gigni sine coitu. Humoris quidem vim aliquam inesse, quam (qualem &) puteis arbitratur, cum in nonnullis reperiantur pisces. Quicquid est, hoc certe minus admirabile talpatum facit vita subterranei animæ, nisi fortè vermium terrenorum & piscibus natura est. *Nestorici* est piscis fossilis ille, quem Germani *Beisber*, alii *Peisber*, quidam Meerputen vocant. *Duorum* sunt Agricolæ generum. *Maiores* nempe, & *minores*. Sonum omnes edunt acutum. Et fluminibus, quæ currunt in locis paludosis egressi, per ripatum venas longius, & interdum in proximi oppidi cellas, neque subterraneas penetrant. Quidam Eruditi *Musellam* fossilem vocant, eamque ita describit Fabricius. Longitudine est

palmi crassitudine digiti, quanquam multò maiores etiam repetiuntur. (Agricola palmos quatuor longos maioris esse scripsit.) Dorsum coloris cinerei: cum punctis multis, maculisque transversis, partim nigris, partim cæruleis. In lateribus linea utrinque nigra & alba. Venter flavus cum maculis albis, & punctis rubris ac nigris, ita parvis ac sicculis essent. Ab ore carneæ particulæ eminent, quos nando extendunt, extra aquam contrahunt. In Misena trans Albim duobus locis, quod scio fodiuntur. Ad Polinitum amnem; prope Orlanrem: & ad Dobram rivum prope Hanam oppidum. Item in pratis ad Rederam fluvium copiosè effodiuntur, si flumen inundet. Ex terræ cavernis etiam ingrediuntur lacus & paludes: Cum aquæ extra ripas excreverint, è terra prodeunt: à aquis autem resistentibus, in pratis campis relinquuntur, & ubi greges sunt, relictis votantur à suis. Sordes amant, & in cloacas, quæ alia purgari ratione nequeunt, inieci, omnia consumunt. Cum in rivis paludibusque capiuntur recentes, solent à tenuioribus etiam mensis adhereri. Serviunt imprimis fraudi agyrtarum, qui eos alunt, & vitris inclusos mulititudini ostentant pro serpentibus, quia forma à parvo serpente non multum figura differunt. Sunt qui eos spirare putent. Ubi enim plures huius generis pisces simul sunt, spuma supra eos effertur. Vitro inclusi ore angusto, *crescunt*, & suo quodam succo vivunt usque ad semestrem.

## CAPUT VIII.

*De Lampetra Fluviatili, &  
Vario, seu Phoxino  
lævi.*

Quam nos *Lâpetram fluviatilem* dicimus, in Tholosanis Chatillou, à stillatione, quod cum manu tene-

TAB.  
XXVIII.  
10.11.  
Aldrov. de  
Piscib. l. 9.  
rur, 62.

tur, quasi titillationis sensu variis fluxibus videatur contorquere se & elabi: Germanis Neunaug seu *imiggha-  
m* dicitur. Matinis, inquit Rondeletius partibus internis & externis & colore similes, sola magnitudine differunt: quædam enim magnitudine: aliz vermibus terrestribus crassioribus assimilantur. Caro est tenax, *spina* nulla; pro spina dorsi, unus continuus nervus cavus, quo *humor* albus continetur, simplex, absque ullis nervorum costarumve ramulis. Intestina tenuissima. *Ventriculus* vix apparet: nec mirum cum solo fuctu vivat. Foramen in capite supra, sicut Lampetæ maiores, habet. In fluviis & rivulis in quibus capiuntur, nasci vel indeliquit, quod nullis marinis Lampetis ibi adirus patere possit, cum neque illi in mare confluant, neque mare cum eis ulla parte sit coniunctum. Capiuntur sæpius reti cum Variis siue Phoxinis pisciculis. Vescuntur luro & aqua, iisdem Locis degunt quibus vermes: Autumno in brunam usque in Albi capiuntur, torrentur recentes in craticula, aceto condiuntur, & vasis ligneis exceptæ, in varia loca distrahuntur. Vernis quadragesimo jejuniis gratum delicatulis oblationum. Salitæ item leviter, fumo indurantur. Carne sunt satis molli & glutinosa, quod quantulumcumque est vini, conditum & coctum facile beneficio corrigitur, nisi aquæ in qua vixerunt vitio, plus solito virosæ fuerint.

TAB. XXVIII.  
1.  
*Aldrov. de  
Pisib. l. 5.  
c. 10.*

VARIUM seu PHOXINUM lævem, Romani *Morcellam* quod nigris punctis & tenuissimis lituris sugilletur, Infubres Sanguinerol à rubore, dicunt: Rondeletius à Græcis quibusdā *ἰσχυρὸν* vocari scribit. Germ. *Elrig*. Diversis toto corpore colotibus depingi hunc pisciculum ex diversis imprimis nomenclaturis ostendi potest. Dorsum, inquit Rondeletius, aurei splendoris est, venter argentei, *latera* purpurascent, Cauda in pinnam auream & latiusculam deficit. *Cute* lævi integitur, punctis notata, nigris nempe. Pinnæ laterum multum ad ventrem tradunt: quarum ra-

lices, quæ corpus pertingunt, rubro sunt colore perfusæ, inde sanguinaria dictus. Nigricat quoque in tergoribus per intervalla. Linea quæ latera utrimque fecat atcuata est. Digitum longitudinem seu palmum, nunquā excedunt. Circa lacum & fluviorum oras aquis stagnantibus capiuntur reticulis. Bellonius *ovis* semper prægnantes esse asserit, ideoque Aristoteles Phoxinum esse autumat. Gænerus vero sexu distingui dum ait, coire invicem etiam inlunuat; quin, quod si (inquit) Phoxini, minimi isti pisciculi sint; nil mirum si propter parvitatem mediocres etiam ex eis nupet nati videantur. Verum nec ipse Aristoteles simpliciter nuper natos, sed verbis *ὡς νηπῖοι*, id est, prope dixerim, additis, gravidos capi radit. Verisimile est autem rantillos pisciculos, sicut & mures inter quadrupedes, brevi tempore perfici & generare posse. Carne est molli & satis suavi: sed non nisi evisceratus coquendus est.

## CAPUT IX.

## De Salmerone, seu Salmerino.

TRidentini, piscem sibi peculiarē, TAB. XXVIII.  
*Salmerinum* vel nomine ab Salmerone desorto, quo cum carnis rubedine conveoit, vel quasi Salmonem lacustrem, nuncupant. Aldrovandus à Cardinale Madrucio acceptum ita descripsit. Corporis forma pinnatum, numero acūto cum Truttis ac Salmonibus fere convenit: Cæterum squamis catet; et si squamosum esse profiteatur Salvianus: Capite est rotundiusculo, retulo rostro. *Oculorum* pupillam nigram aureus, qui in mortuo postea fuit ruberrimus, circulus ambit: acquam maxime splensens. Ante eos foramina duo, audicus vel olfactus instrumenta, rotunda, manifestæ. Oris maxilla inferior nonnihil recurva, Unco sursum vergente: estque tota ea mandibula alba. Lingua eiusdem coloris, item palatum.

V 2 Totum



Totum os insigniter dentatum. Piscis ipse rotundus potius, quam latus est. Pinnae sunt numero septem, omnes sine aculeis: quinque supino binæ prono corpore, juxta branchias duæ, totidem in medio ventre, quinta à postrema à Podice, longæ omnes ac late. Quæ ad branchias sunt, triplici colore præditæ. Ubi enim longiores sunt, hoc est, in ipso exortu, albicant, mox totæ rubent, exceptis nervis, qui nigricant, reliquæ tres sicuti in exortu magis quam illæ albent, ita quoque rubedo in his intensior est, nigredine veto plane carent. Priores quatuordecim nervis constant, subsequentes novem, novissimæ decem: quæ vero in medio fere dorso cōspicitur, duodecim nervos habet, altera non longe à cauda, iis caret, mollis & coracea, ut in Truttaceo genere: malè que ceu nervosa à Salviano expressa est: utraque dorso concolor, id est, nigricans. *Cauda* Lunata est, eiusdem coloris, non tundra, ut ille ait. Podex in imo ventre juxta exortum posterioris pinnae. A branchiis ad caudam linea exilis, recta ad caudam usque fertur asperiuscula. Latera non nihil albicant, & nunc rotundis, nunc oblongis, iisdemque nunc maiusculis, nunc exiguis maculis subfolvi coloris consperguntur. Torus venter coloris sicut crocei, aut vulgaris minii. *Vterum* habet admodum procerum atque latissimum, utpote qui totam corporis capacitatem occupat, ovis refertus eiusdem fere magnitudinis, fulvis auroque resplendentibus, margaritis autem diceret. Intestina alba, pluribus circumvolutionibus intorta. *Secur* breve, latum, unico duntaxat lobo constans, flavescens. Vesicam felles invenire non licuit. *Lien* maiusculus ex atro rubens. *Pertriculus* longus & carnosus. Caro, ut in Salmone, rubra. Longitudo totius piscis à capitis initio ad caudæ extremum, Spithamas binas explet. *Locum* si attendas, in lacubus Tridentinorum montium capit innot. Salvianus in frigidissimis & saxosis fluminibus nasci prodidit. *Vesitum* pisciculis; & in horum defætu, recrementis. Quin singuli ca-

piuntur, ideo solitarius esse concedimus. *Cœrin* sine Novembris & Decembris. Piscis est, si quis alius delicatissimus. Cato ei tenera quidem, & quæ brevi tempore potest fieri, sed minime viscida, satisque friabilis.

### TITVLVS III

*De Piscibus, qui præter fluvios alias quoque dulces aquas incolunt.*

#### CAPVT I.

*De Perca Maiore:*



Antum de Piscib. Fluviani. TAB. libus, tam squamosis quam XXIII. levibus sufficiat, sequuntur 13. 14. Illi qui præter fluvios alias TAB. quoque aquas dulces incolunt: *Perca* XXIV. nempe *Maior*, *Perca fluvialis minor*, 9. *Scrollus*, *Pungitius Alberti*, *Alburnus Aufentii*, *Epelanus fluvialis*, *Lucius*, *Cyprinus latus*, *Ballerus*, *Tinca*, & *Lota Gallorum*.

*PERCÆ MAIORI*, quæ Germanis Baets & Bersich, corporis figura lata & compressa est: rostro prominenti non aliter quam marina, verum non adeo acuto: Ore etiam ut illa mediocri, imò pro corporis ratione parvo. Dentibus caret, sed labia habet denticulis horridula, ut Bello-nius testatur. Squamis tegitur parvis ac aridis, quæ difficillime à corpore avelluntur, maximeque ancillis fastidio esse solent. Color ei varius, venter nempe: Corpus reliquum fere cinereum; nigricantibus quibusdā ac latis maculis à dorso descendentibus (non aliter ac in marina) latera depingentibus. Pinnae ac cauda rubescunt. In *summa* v. nihil, vel parum saltē. *Pinna* in tetragore duæ, quarum quæ capiti proxima, maior est & aculeata, posterior minor sine aculeis: totidē ad Branchias quos Rondeletius altiores esse putat, quatuor.

quam in reliquis fluviatilibus totidē item in ventre: quæ vero ab excrementorum est officio, aculeo crenato vallatur. Brachias habet utrinque quaternas easque duplices, id quod Aristoteles quoque vidit. *Cauda* bifurcatim dividitur. Ad maiorem *magnitudinem* excrefcit, quam marina: nam & trilibris aliquando capi solet inquit Salvianus: in Lario lacu ad pedale in etiam teste Iovio magnitudinem. In Suerinensi vero lacu ulnam id est cubitum æquare Gessnerus intellexit. Ventriculum habet mediocrem intestina paucā & tenuia, *hepar* subpallidum: à cuius maiori lobo vesica pēdet, in qua sel est tenue & aqueum: *Lien* subrubet. *Lapilli* habet in cerebro. Plinius eam mari & fluviis communem facit, sed pereram. In dulci enim aqua vivere & usu, & Aristotelis Aufoniusque testimonio, qui eum cum Cyprino, Glanide & aliis nominat, constat. *Ælianus* in Danubio caput scribit. Rhenus eo caret, forte quod altiores aquas amet. Præcipua in Verbano lacu & Pado flumine producitur, prodente Platina. Fama est Larij lacus Percas fuisse advectitios & inquilinas, tralatus scilicet à lacu Eupyli, qui Lambrū emittit amnem, seminibus. In omnibus *jecur* grandine affectum est, nec quoquam alio vitio laborant. *Devorant* alios pisces tum proprii generis sobolem. *Parinus* circa littora & frutices ut Aristoteles prodidit, in Helvetijs lacubus verno tempore in profundo, Aprilis & Majo mensibus, ut Gessnerus. Partus tempore facile capiuntur in Sleia, & frequenter, hinc à littoribus ad pastum excurrunt, vaganturque locis spacioſioribus. Circa Iohannis festum rursus capitur, dum littora ex profundo repetit. Lucio laſo opitulati, fabulosum puto; nec ille huic parceret, nisi propter pinnas coereretur. Gessnerus narrat, piscatores in Lemanno lacu observasse, Percas hyeme emittete per os *Pesculam* quandam rubram ex ore pendentē, quæ vel invitata, inquit, supernatare cogit: coniectant autem id ab eis fieri præ iracundia, quod in recta incide-

tint: hoc enim tum maxime pati, cū retia trahunt piscatores: sed mirum esse quod hyeme tantum id ipsis accidat. De ipsarum *Salubritate* diversæ sunt Aulhorum opiniones, Rondeletius dotibus illis quibus marina instructa est carere, scribit. Gessnerus Rhenanas, & quæ in fluvijs & lacubus maioribus purioribus versantur probat: quæ in minoribus minusque puris aquis degunt, non item. In Gallia summam alendis febricitantibus dignitatem obtinent, si Iovio credimus. In Italia quæ in Lario lacu laudatissimi, eadem ad pedalem magnitudinē crescunt, & matureſcentibus præſertim uvis, ab ipſo pingui & præternis interaneis cōmendantur. In Germania quovis anni tēpore, April. & Mart. mensem si excipias, laudantur. Aufonius in pretio habitato fuisse testatur alibi inertis gustu prodidit. Minimas quas *Hornas* cognominat, coqui peritiores vino calido immerſas elixant. Maiusculæ propter spinas & aculeos pinnarum dorſi, veſcentibus moleſtæ sunt: in minimis propter teneritudinem nō curantur. Parvulæ etiā, butyro frigi ſolent, frequentius quā ulli alii pisces. Circa Verbanum lacum Percas modice apertas, verubus ligneis tranſverſas inſectunt & aſſant: ſemiſſas butyro illinūt. Ibidem omne genus piſciculorum ad ſolem inveterant, maxime vero Perculas. Vulnus aculeis pinnarum dorſi inſlictum, non facile ſanatur.

## CAPUT II.

## De Perca Fluviatili minore.

**P**ERCA fluviatilis minor, quibuldam TAB. XXIV. 2.  
*Cernua*, & *Acerina* medici Plinij, Aldrov. l. 9. c. 34.  
 Straboni *Porcus Niloticus*, quia porci continente spinarum serie admodum setarum mentitur, Trago *Aurata fluviatilis*, quod extra aquam educta ac suo humore deterſa, aureo fulgore in Cæruleum abeunte insignis ſit: Caio Anglo *Aſpreto*: Piſtorio *Aſpretulus* dicitur. Piſcis eſt toto corpore aſper, pinnis ſpinofus.

Percæ forma & magnitudine, colore per ſumma fuſcus, per ima cum pallore flavus: duplici per maxillas

Bellon. A.  
guar. L. 1.

femi circularum ordine notatus: oculo ex dimidio superiori fuscus, ex inferiori subaureus, pupilla niger. Linea per dorsum longitudinem porrecta, & veluti filo transverso corporis affixa singularis: notis per caudam atque pinnas nigris maculosus: quæ, *pinna* cum ira subest, inhorrescunt: cum animo conquiescunt, resident. Bello-  
nii scribit nullum alium *Channam* exanimem melius exprimere: mor-  
ruum n. hiare & oris rictum apertum tenere. Idem ait, recens *caput* hilari quadam ac subvirenti opacitate ceu pavonis rotqueus, refulgere: imo vero extra aquam eductum, ac suo humore derectum, aureo fulgore in ex-  
ruleum abeunte insignem esset. Per-  
cam plurimum æmulari, nisi transver-  
sis lineamentis (quæ Perca insunt) caret: et tunc magis esset recurro.  
Hoc potissimum signo dignosci, qui spineum branchiarum tegumentum, crenatum ut in Lupo & sua rima lu-  
xarum habet. Ubi autem linea quæ piscium larera secat, ad branchias in-  
cipit, ibi aculeum caudam spectantem ut in Dracone marino videri. Sed & hoc à Perca dissidere, quod perca duas in tergo pinas habeat. Cer-  
nua (sic vocat) unicam tantum, nul-  
lisque denticulis, sed neque lingua ma-  
nifesta præditam esse, *squamæ* habere quadrangulas, robustas, crenu-  
listenibus in gyrum incisilis, quæ pi-  
scem Scabrum admodum efficiant. Radiis denique solaribus obiectam, *maculis nigris* per dorsum distingui percipi: at totam sub ventre candi-  
care. Cæterum non advertit Bello-  
nii extremis branchiis, id est, bran-  
chiarum margini alterum paulo in-  
ferius aculeum adductum esse, quod observavit Gesnerus, qui ramen neu-  
trum in duabus quas dedit, iconibus expressit. Sunt n. inquit, perexiles: ut in mediis etiam branchiis denticula-  
te aliquot spinulæ crenatim (ut ita dicam) apparentes, si de proximo in-  
tueatis: superius minores & frequen-  
tiores: inferius maiores, paucæ & ma-  
ioribus intervallis. Sunt autem illæ, inquit, digestæ in margine portionis cuiusdam branchiarum, quæ à parte

subiecta deduci & elevari potest. Est & supra branchias spinea pars obli-  
qua, utrinque versus occipitium se colligens raneillis serrata denticulis, ut tactui magis quam visui pareant. Item alia pars supina triangularis su-  
periorum, à branchiarum scissura, sta-  
tim supra pinas ibidem, retrorsum spectat, & in brevissimum sed acutum spiculum desinit. Idem Gesnerus squamas rotundas esse negat, sed ro-  
tundas esse fere ut in aliis piscibus ait. Pinnam etiam dorsum unam esse obli-  
gam & continuam, ut Bellon. dixit, & Cajus in communicata icone pro-  
be repræsentavit: differre tamen par-  
tibus: nam anteriorem aculeis com-  
stare quatuordecim, quorum primi duo breviores propius iuncti sunt, me-  
dij longiores, longitudine paulatim ad ultimum usque de crescente: par-  
tem posteriorcm, molliorem esse, fi-  
bris non aculeis distinctam, brevio-  
rem, & ab anteriore intervallo quo-  
dam inchoato discerni. Iam v. res esse pinas in supina parte, unam post-  
anum, & binas summo ventre quæ nigris lituris, ut cæteræ omnes non distinguuntur. Ferunt amare *torren-  
tia*. In Hollandia copiose in stagnan-  
tibus aquis capiuntur. Rarus est in  
Tamesi, plurimum in Ranello, quod  
Oxonum præter fluit. Cum natus Gobij & Bortæ more universas pinas  
mouet, si Cardano credendum. In vi-  
varia coniectus, pisces alios exurere,  
quod ipsis aculeis molestus sit dici-  
tur. Hyeme laret, in quadragesima  
commendatur. *Lapilli* quos in cere-  
bro getit, adversus renum lapillos &  
pleuritici commendantur.

### CAPUT III.

#### De Scrollo, & Pungitio Alberti.

SCROLLUS Danubianus piscis est. TAB. XXVIII.  
15. 16.  
Aldrov. L. 1.  
c. 35. & 36.  
Color in icone, quam Raphaeli Seilero acceptam Gesnerus refert, dorso fuscus est, lateribus subvirentis, plurimis punctis fuscis intervencien-  
tibus.

buis. quales etiam in pinna dorsi (cuius aculei albicant) conspiciuntur: venter candidus est. Initium pinnae ad Branchias rubet, &c. Raro longior sit, quam figura ostendit. Quoquo modo paratus, in cibo optimus est.

**PUNGITIUM** Alberti, Rodeletius *aculeatum* vocat. Author de rerum natura *Spinochium*. Pisciculus est, inquit Albertus, minimus, qui lanceolas (aculeos) binas habet in radicibus pinnae ventris. *Ma* sub gutture rubet, *femina* rubore caret. *Squamis* non habent. Piscatores hoc genus piscium sponte *generari* ajunt, & ex ipsius alios omnes, hac observatione inducti, quod in lacunis novis primo statim anno inveniuntur, & postea sequentibus annis pisces alij diverfi, quanquam nulli fuerint immisfi.

## CAPUT IV.

*De Alburno Aufonij & Epelano fluviali.*

TAB.  
XXIX. 13.  
Belan. Ag.  
12.  
Aldrov. l. 5.  
p. 37. & 38.

**ALBURNI** meminit in sua Mosella privatim Aufonius. Bellonius circa Vercellas in amne Lagogna Ticinum influenti, *Scavardinum* a piscatoribus appellati scitavit, Germani *Weißfischlin* & *Rotaugen* id est, *weißfischlin* dicunt. Piscus est & fluvialis & lacustris, Alphyis albis similis, oculis magnis, rubescentibus, dorso vitescente, ventre candido. Bellon. lineam utrinque esse ait arcuatam, quae eius latera dividat. Sed Rondel. duabus distingui proficetur, altera à brachiis ad caudam ducta, medium corpus dirimi: alteram minus evidentem à radice pinnae branchiarum orta deficere, priusquam ad caudam perducta sit. *Nare* est parum resina. Pinnae easdem habet quas Gobio. Capite est parvo: corpore latiusculo, sed depresso, vixque ad duorum digitorum latitudinem extenditur. *Felle* caret. Argenteis tegitur *squamis* ac renuibus. Carne est molli & parum pingui. *Porax* est piscis, quam ob causam facile

homo capitur: unde Aufonius prædæ puerilibus hamis, recte dixit. Observavi Alburni duas alias species, quarum prior tergote fere ad caeruleum colorem vergit: altera ad cæruleum. Vtriusque pinnae & cauda etiam ad caeruleum vergunt. Cætera argenteo colore resplendent:

**EPELANUM** fluviale Bellonius **TAB. XXVIII.** Sequanicum cognominat, à Gallia fluvio, ubi abundat, additisque vocari quasi excellanum à præstantia, quæ catetos sui generis pisciculos excedit. Ferrarienses *Borbolum* vocant, Alburno simillimum atque hoc tantum ab eo dissidentem, quod rufas radices pinnae Gardonis & Veronis modo habet, ac lineam quæ latera ejus secat, versus caudam admodum inflexam & velut arcuatam. Quinque digitorum longitudinem, pollicis latitudinem interdum exuperat. Pisciculus est *odoratus*, de bonitate & principatu cum aliis omnibus contendens. Rothomagenses *Ovellam* eo argumento nominant, quod semper ovis prægnans sit. Epelanum si suas *Squamas* habentem conspicias, præ nimia albedinis terribilitate tibi resurgere videbitur. Squamis autem exutus *tergum* ostendit variis coloribus emicans, in iridis aut arcus cælestis morem. Marino crassior est & brevior.

## CAPUT V.

*De Lucio.*

**LUCIUS** vel *Lucius* à lupo, vel à **TAB. XXIX. l.** lucendo dictus est. Nulla ejus apud veteres Græcos mentio, & ostendit egregie contra Philadelphum Saluvianum Oxyrinchus Niloticus quod Bellonius vult dici posset, nisi Plutarchus eundem marinum, tanquam è mari Nilum intraret faceret. Et socem Plinii, quem in Rheno magnitudine excellere putat, haud difficulter concedi potest, & videtur abinde Belgicum Snock originem suam traxisse. Apud Anglos & Gallos diversa, pro diversitate ætatum sortitur nomina. Corporis figuram oblonga est, eademque ideo oblior videtur, quoniam piscis latera modice dilatantur.

Dor.

Dorsum latum est, & fere quadratum, perpetuoque æquale, donec ad postremas pinnas ventum sit: & cum reliquis fere *Squamose* piscibus dorsum ipsum magis aut saltem æque atque venet extubetate solent: huic uni ventet, quam dorsum magis extubet, potissimum ubi pinguior sit factus, quod tamen aliquando ichthyopolarum impositura etiam fieri Romæ observavit Rondeletius, piscium quorundam ventres infare ite tradens vilius herbis, atque ita cœu pinguiore carius vendere. Caput habet macrum, osseumque ac quadratum. Ossa seu *spinarum* in capite formas diversas repetiri ajunt: unam vulgo etuci comparant, aliam lanceæ, tres alias clavis seu paxillis, passionis Dominicæ instrumentis. Author obscurus de natura rerum scribit Lucium in crebro lapidem crystallo simile genere, sed hunc cum ævum in longum duxet. Gesnerus vero testatur sese in capite Lucij etiam parvi, lapillos geminos candidos reperisse. Rostum habet longum & rectum maximum, Anserino rostro comparat Rondeletius. *Maxilla* inferior superiore longior est, & cochlearis modo excavata. *Dentes* in eo plurimi, haudque uno modo dispositi, ut & Albertus ait, diversarum acierum: nam in maxillæ inferioris anteriore parte dentes parvi sunt, in os recurvi: in superiore maxilla nulli sunt, qui cum ea latior sit, dentes extra os prominentes & inferioribus non occurrentes inutiles forent. Horum igitur loco natura (inquit Rondeletius) duos dentium ordines palato infixit. *Oculi* coloris auti sunt æmuli, ante quos duo foramina in unicam cavitatem coeuntia: *Corpus* squamis tegitur parvis tenuibusve adeo, ut is caret videatur, & cum is coquatur, & inter edendum, si parvus sit piscis, negligantur: sin major, duriore & evidentiores abiciantur. Venter albeat, dorsum vero ex subflavo nigrescit, à quo lineæ plurimæ latæ, non rectæ, sed multipliciter inflexæ, obliquæ potius quam transversæ, in aliquibus magis, in aliquibus minus & flavæ & conspicuæ dedu-

cuntur, totumque piscem pulcherrime pingunt. Pinnis natat quatuor, duo sunt ad branchiarum ima: qui pinnarum situs est fluvialibus piscibus communis, ut facilius in aqua suspendantur & clierantur: contra altius sitæ sunt eadem pinne in marinis, quæ dulcis aqua tenuior est, & liquidior, marina crassior & spissior: ob id hæc potius magis sustinet, illa minus. Inferiore ventris loco dux aliq sit magnæ & validæ. In dolo nulla est, sed non procul à cauda dux sunt, una superior est nigris maculis notata. Cauda brevis, in duas pinnas desinit similiter pictas. *Linea* medium corpus dirimens vix cernitur, quia ex minutis punctis conflat. *Ventriculum* ita gutturi continuatum habere Albertus scribit, ut aliquando eum rejiciat aviditate glutendi piscem. Rondeletius permultas eius ait esse appendices, in quibus chylus coëctus servetur, ne ob gulæ laxitatem facile rejiciatur: Vidi ego magnitudine insigni Lucium, qui alium, & ipsum insigniter grandem ventrem contineret, & hic rursus mutem aquaticum, ut latissimum habere ventrem necesse sit, hoc genus piscium. *Intestina* tribus longis convolutionibus cōstant. *Hepar* ventriculum cōplectitur, in quo vesica est felle viridi disenta. Nullæ pulpæ earum *spinule* intercutant, ut alius fluvialium plerisque. In lacubus & stagnis ubique ferè reperitur, obscuras verò ulva cænoque lacunas obsidet. In mari nunquam visitur, in ostiis Rhodani & stagnis marinis aliquando, sed tabidos capi Rondeletius author est, sed & in fluminibus nonnullis haberi Ausonius in Mosella sua prodidit, in Tiberi vix quotannis denos, Salvianus. Nec difficulter dignoscuntur. Arctiori enim sunt corpore, toti argentei, flavisq; illis lineis catent. Tam est *venax*, ut non tantum in pisciculos alios, & ranas. Sed & in animalia quædā trahatur. Narrauit mihi, inquit Rondeletius, quidam vir fide dignissimus, vidisse semulæ, quam iter faciens in Rhodanum potatum duxerat, labrum inferius, à Lucio dentibus apprehensum, cujus

enius de morsu cruciatam & territa inde fugisse, & crebra capitis quassatione Lucium in terram deiecit, quem ille palpitantem & in aquam redire conantem cepit, domumque tulit. Anseris pullos duos in eiusdem repertos ventre se vidisse, quidā Polonus testatur, idem & fulicam invētam, & pedem anellæ in piscina ab eodem ad morsum prodit. Tā avidē pisces persequitur, ut prae nimio celeritaris impetu, supra aquas elarus, in scaphis incidat quodmē vidisse, cū Anno M.DC.XXXI. in meo ex Angliarēditu, Landsberga nocte scapha veheret memini, A porculo seu minore perca abstinere quidam credūt, alij apprehenso capite devorare, ne si cauda arriperet, a squamis & spinis læderetur, opinantur. Alberrus caput dentibus conterere, mortuum in ventrem propellere, vivum non devorari, prodidit. Summam ranæ cum Lucio antipathiam, elegantē Historiā expressit Dubravius, quam vide. *Pitav* ei longissimam ex Lucio Frederici II. Imperatoris cognosci potest, quem in stagno quodā vixisse CCLXVII. annis ex annulizet, quem cum stagno eum Imperator inderet, in branchiis sub cute abdiderat, inscriptione Græca colligitur, quæ talis est. *Εγώ λυών τοις ταύτη λίμνη παύσατο. & παύσατο διὰ τὴν περιτὴν φιδίον β. τὰς χιλίας ἢ τοῦ ἑξακοσίου, id est, Ego sum ille piscis huius stagno omnium primus impositus per mundi relictus Frederici II. manus, die quinto Octob.* Fuit enim inventus iste annulus in capto eo Lucio anno salutis M.CCCC.XCVII. ut testatur Conradus Celtis referente Gesnero in sua Epistola nuncupatoria. De eiusdem *vivacitate* ita Cardanus. Mirum est illud, quod à tot audivi viris, ut impudens fuerit tot testibus mendaciū non credere, quam veritatem adversus eorū auctoritatem tueti: Lucium scisso vētre ostēdēdi lætis causa; inde consuto atque inter Tincas in vivariis reposito, sanare humore earū, dū se illis Lucius vētre affricat. Martio Aprilique mensibus *ovis* rurgent & pariunt, perguntque ad Iunium usque. Alij è Tinearum semine genera-

ri credunt. Quidam & sponte & ex alieno semine provenire, quod neque solineque sati procreantur in cis, opinantur. Ex ovo editos, à quibuldā piscibus intra Branchias foveri, Encellii nugæ sunt. Quantum ad *Esom* in cibis lovis inter obsonia plebeja recenset. Poggius etiam ex Cymino lacu, & quidem præpingui, nullam unquam inesse gratiam scripsit, nisi cum solus in maxima convivarum inedia prandiis apponitur. Thrasymenus lacus laudatotes profert. Braccianus, qui olim Sabatinus, inferiores. In Galliatamen, Germania & alibi ranta puratur salubritatis, ut Adamus Lonicerus et puerperis concedat. Pinguiore tamē sunt Iulio mente & Octobri laudatotes, quibus Cyprini soboles in piscinis esse deteriores cū semina spargunt. Ab Arnolde inrer duræ carnis pisces recensetur, sunt qui caudam & partem posteriorem præferunt. Mediæ ætatis meo iudicio optimi sunt. Ova piscarororum circa Argeotinam tanquam medicata abiciunt. Gesnero sunt æque ut Barbinoxia. Apud nos absque periculo in usu. *Esom* in Medicina quod spectat, Mandibula in pulverem redacta in Calculo, urinæ difficultate, & pleuritide usurpatur. Saliti ossa pulverizata spodi vicem præstant, & ulcera exsiccant.

## CAPUT VI.

## De Cyprino.

Cyprinus Oppiano *καρχarias* dicitur. Nomen forte à Cypride, ut XXVII. Gesnero placet, quod sæcū dissimulit, sortitus est, ut *λεπιδόθη* apud Athenæum, vel à squamis seu latissimis & maximis, ut Rondeletio visum, seu ita firmiter vallatis, ut lapidis ictus facile repellarur ut Bellonius eredit. *Carpam* Cassiodorus vocat, Brachyotus ob magnitudinem *Reginam*, *Carpionem* alij. Crassior est magis quā longior, nec ulli piscium magis quam Tineæ similis. Superius enim *Labrum* rotundum est ac eroecum, ex quo uttimque (Tineæ instar) gemina

TAB.  
11. 12.  
TAB.  
XXIX. 2.  
3. 4. 6.  
Alb. d. 5.  
6. 40.  
Cass. d. 12.  
Eph. 4.

barba pender, lōgior una, mollis flavescens, in acurum deficiens; *Muraena* (inquit Rondeletius) possit appellare: brevior altera, & ideo minus evidens, nigricans. Capite est brevi pro corporis ratione, Tincis hac etiam parte similis. Ore medio, labris adipolis, carnosisque; *lingua* caret: sed eius loco palatum carnosum dedit natura saporum percipiendorum causa: quod evulsum, linguæ formā adeo referte Salvianus & Rondeletius aiunt, ut non solum vulgus, sed etiam viri docti (Alberrus linguam sapidissimam esu dixit, improprie itaque) linguam vocent, & linguam veram esse perfectè defendant. Inperfectam tamen piscibus esse linguam, & carnosum Cypriano palatum, non modo verutari & Arist. visum, sed & experientia, quæ substantiam illam palato affixam inferiori parti nullo modo hærentem, nec ullo pacto solutam aut liberam testatur. Gessnerus tamen testatur sese linguam (ut vocant) separatam à palato, in patvaetiam Carpa duos digitos laram vidisse, linguæ in quadrupedibus propriè dictæ figura: substantia quoque & gustu saporeve simili. Usus quoque eius & facultatem gustandi, similem esse, inquit, dixerim. Quare linguam appellare, nihil prohibere putat, quoniam ut lingua sit, vel dicatur, neque locus aut situs facit, cū aliæ etiam partes situ diverso nomen idem retineant. *Dentibus* carere hoc genus piscis Rondeletius asserit, horumque vice os palati medio infixū planum habere, læve, triangulare: ex adverso, in parte inferiore ossa duo incisa, in gulam recurva. Bellonius vero Cyprinum depressum quidem in ore non habere ait, sed tantum in ingressu faucium: & Gessnerus intra fauces eius dentes latere asserit, sed neque vel oculis diducto ore, neque tactui immisso digito apparere. Esse autem in maxillæ recurvæ medio dentes qui nos fere accumulatos, chara dum instar, situ & magnitudine inæquales tres maiusculos, duos exiguos præduros, cavos, superficie summa lata sive plena, obtusa, sed li-

neis quibusdam exasperata, unum tantum & candidiorem cæteris & superficie lævi in mucronem brevissimum fastigiata. Idem Gessnerus lapillum in capite habere tradit iuxta linguam, candidum, durum, ad minimi numismatis magnitudinem, interdum paulo maiorem. Habere & in medio capitis substantiam quandam maiusculam, crassum, cordis fere figura, duram sed tenacem & flexilem, dum recens est, sub dentibus mordentis, tanquam in acetabulo quodam repositam, similiter ut Leuciscus fluviatilis, quem Gardonum vocant Galli. De hac forte sensit, (inquit) Eucelius, & improprie lapidis nomine appellavit, his verbis: In Carpæ faucibus reperitur gemma seu *lapis*, forma triangulari, magnitudine proportionem pilcis, coloris candidi extra, intus flavi, *Oculus* est medijs, ante quos sunt foramina. *Pinnæ* natatilis. Duæ fixæ sunt ad branchias magnæ, in medio Ventre duæ: inter quas & caudam alia est unica: quæ serrato aculeo & valido innititur inter hanc & præcedentes est excrementi meatus. Ex medio dorso unica erigitur, ad caudam ferè continua, robusto etiam incisioque aculeo fulra. Cauda lara est ex nigro rubescens, ut & postrema pinna. Ipse vero colore est flavescens, maxime cum senuit. Iunior enim colore magis est ad fuscem inclinans. *Branchiæ* utrinque quaternas, duplici ordine, novissima excepta habere Cyprinum testatur Aristoteles: Gessnerus vero quaternas in ea se reperisse tradit, sed omnes duplices. *Squamæ* magnis, validisque regi, ideoque Lepidotum Dotioni vocari. Eas etiam *ægyptias*, id est, argenteas vocaverit Orpheus, docti haud necesse propterea esse putant, alias esse statuerendum, cum de coloribus Poetæ sæpe loquatur improprie, & epirhetis aliquando abutantur; ereditque Gessnerus commune hoc squamarum epirheton esse, quod ut facile credo, ita hic *ægyptias*, si quis splendentes vertat, cū peccatum non puto. Ipse autem ad autem inclinans. Sunt qui hunc piscem

Aristot. II.  
An. 4. c. 8.

Bellon. de  
qual. la.

piscem pro sua magnitudine, plus sanguinis habere dicunt, quam ceteri pisces, ideoque minus frigidi temperamenti esse probabile videri. *Petrus* *tricholun* mediocrem habet; *Heparus* rubrum, cui sub nigra *fella vesica* hæret, & *intestina* admodum pingua, *splenem* magnum. Crebro quinque & sex librarum pondere reperitur, aliquando etiam viginti: Iovius vero teste in Lario lacu ducentarum quoque, Maximum enim aiunt, qui in eo nascuntur piscium. De *laco* non conveniunt inter auctores. Plinius marinum facit, Oppianus littoralem. Aristoteles inter fluviales reposuit, *Ælian.* in Danubio quoque capi scribit. Doctior inter fluviales & Lacustres collocat. In Lario lacu admirandæ magnitudinis capi, Iovius auctor est. Larius, inquit, lacus, ob longitudinē à Virgilio maximus nuncupatus, pisces longe omnium maximos gignit. Troctus (Trutas) centum aliquando librarum pondere, & Bulbaros ducentarum; Sed Bulbari illi ingentes videri porius liquidis ac perspicuis in undis quam capi retibus possunt, cum ea impotenti impetu plerumque dilacerent. Subeunt solstitij diebus, umbrosos specus in rupibus Licinianis, quæ sunt in adversa Larij ripa contra Insulam, Euripumque; illum gemmeū à Oecilio Plinio celebratum. Eos industrius quidam sacerdos sagittis arcubalista emissis, cum in profundo quiescentes fuscis atque tridentibus attingi nō possent, vulnerare conabatur, neque tamen sagittæ longo alligato funiculo, nisi aversi officiebant, cum illa squamarum serie thoracati earū ictus facile repelleret. In lacubus Allobrogum maximi quoque proveniunt. Alicubi in piscinis & vivariis includuntur, alicubi in paludibus & stagna coniciuntur, in quibus plurimum proficiunt. Ut vero scribit Albertus: Hic piscis in aliquibus aquis generat, & in aliquibus grassatur & crescit, sed optime valet in fundo argilloso, tritico primo seminato, & postea argilla desuper sperfa, & postea aqua superfusa. De *paris* & quæ circa ipsum eveniunt, isthæc fere Aristoteles prodidit. Cyprini &c. vide

Scaliger. Sponte etiam *nasi* & Roti-  
deletus & experientia comprobantur.  
Vidit inquit ille, in aquis, in cava loca  
& montibus septa receptis, & colle-  
ctis sponte generatos Cyprinos, in quæ  
loca nec rivus, nec stagnum, nec palus,  
nec lacus, nec fluviussullus, nulla denique aqua præter celestē influisset.  
Fœminam *luc* ore suscipere, inde futura ova concipere falsum est.  
Herbis, luto, muro, & aliis *vestitur*,  
Athenus carnivorū dixit. Astu plurimū  
valere, & ut reti capiendus evadat, varia  
machinari Albertus atque auctor de natura rerum tradunt: primum  
circumeuntem, foramen quæ-  
rere: hoc nō reperto transilire conati,  
vibrato in ærem corpore: aliquando sub  
reti, suffodiendo sc. in fundo, effugium  
quæ-  
rere: alias herbam aliquam ore tenere,  
atque ita retinere sese, ne trahatur à reti: alias caput  
fundo ingerere, haud ignarum, rete,  
dum nisi caudam rangit, elidi. Refert  
Gefnerus se cognovisse ex homine fide  
digno, in Palatini regione Germaniæ,  
in loco cui nomen à Michaele & campo  
vel agro, in fossa circa artem Car-  
pam esse, quæ centesimū vitæ annum  
attigerit, unde longævū piscem esse  
conicere possumus. *Carnes* sunt in  
universum molliore, nec tamen ita  
insalubres, quod humiditas non sit  
viscosa, præsertim eorum, qui in  
rapidis & puris aquis nascuntur.  
Martio in primis cōmendantur. Major &  
Iunio, quod genitura vel emittat vel  
recens emiserit, non item. Mas  
fœminæ præstat, maiusculus minori.  
Caput à ganeonibus expetitur, propter  
linguā forte, quæ si assetur, prædulcis  
est, & bene cum succo citri apparatus.  
Ex ovīs Caviarium rubrum apparatus,  
quod ludæis dicatum est. *Medicinam* si  
species, lingua vim augēdæ Venetis  
habet. Lapillus de capite, crudo  
piscis extractus, febricitantiū æstum  
sedat, & sanguinis è naribus fluxum  
cohibet.

## CAPUT VII.

## De Cyprinis Monstrosis.

Miram hanc piscis speciem Lugduni in foro piscarotio vivam aliquando vendiram, nullus fuit

TAB.  
XXVII.  
Albion de  
Piscib. l. 6.  
c. 41.



quit Rondeletius) qui non demptis capite & Roſtro Cyprinum eſſe iudicari. Nam ſquamatum figura & Colore, pinnis earundem ſitu, cauda idē plane eſt cum Cyprino. Pinna dorſi initio aculeum inciſum habet, ut in Cyprino. Eundem aculeum habet alia pinna quæ excrementorum meatum ſequitur, quæ rubefcit, item caudæ pars ei reſpondens. Tota cauda lata eſt, ut in Cyprino. Duas alias pinnas habet ad branchias, ſimiliter duas in ventre. Caput habet non protenſum ut Cyprinus, ſed Delphini capiti ſimile, roſtrum ſatis ſōgum, ſed obtuſum, quale revera pictura reſentat. Ex ſuperiore roſtri parte iuxta otis ſciſſuram appendix carnoſa utrimque una dependet, ut in Cyprino, hac ſuperior eſt alia brevis & vix apparet, niſi propius inſpicias utrimque ēt unica. Hæc Rondelet. *Similem huic monſtreſe Cyprino*, ſed barbulis inſignem, quas in ſuo Rondeletius non expreſſit, Gilberrum Cognatum Nozerenē ad ſe miſiſſe teſtatur Geſnerus, in Nozerethano ſtagno repertū, anno ſalutis 1554. In Cognativivario novem tantum diebus viſiſſe. Verum longe pulcherrimum fuiſſe nec ſpecie colorib. rarum & admirandum Cyprinum illum, qui anno Domini 1546. Omburgi in Ditione Comitum Palatini, Marchionis Ioachimi Brandeburgeniſis captus & Auguſtā miſſus eſt ad Carolum V. Cæſarem in comitiſ illis agentem, qui cum Sotoxi Mariæ donavit, coctum etiam colores retinuiſſe. Picturā eius ſibi communicaffe Io. Thannmyllerum iuniorē chirurgum Auguſtanum periciſſimum, in qua longitudo, inquit, apparet trium dodrantum: latitudo digitorum novem, quæ eſt in medio dorſo ad ventrem medium. Pinnæ dorſi initū partim aureo, partim rubro colore eſt, deinceps v. pulcherrimē carulea: reliquis pinnis omnibus color aureolus, ut capiti ēt magna ex parte ac ventri, ſed paſſim etiam rubedo intervenit, quæ barbulaſ quoque quarernas tingit. Dorſum ex viridi caruleum, latera ſuperius viridia, inferius aurea, &c. In ſumma ſua viſſimis floridiſſimisque coloribus vnde-

quaque adeo eleganter pictus atque diſtinans eſt, ut vel cum tab. maris elegantiffimis quibuſdam, maximèque variis piſcibus certare poſſet. Narrat item captum eſſe aliquando apud ſuos Cyprinum hermaphroditum, in quo utriuſque ſexus notæ (hoc eſt & genitura & ovorum vaſa) comparuerunt. In piſcinis vero contrarium quandoque reperiri, nempe neutrius ſexus Cyprinos, nec mares nec feminas, & hos forte eſſe, quos ſponte naſci Rondeletius author eſt. Idem Geſnerus hac quoque forma Cyprinū alium captum eſſe teſtatur in Acronio ſive Conſtantiēſe lacu, prope Retz, duos fere dodrantes longum in præſentia illuſtris & Generoſi viri Comitum Wolff de Schamburg, anno ſalutis 1545. idibus Novemb. Picturā ad ſe miſiſſe Archilleum Pyrrimum Gaſſarum medicum eo tēpore præſtantiffimum. Pronam partem nigro colore pictam fuiſſe, latera fuſco, ſupinam luteo. Spectabilem in eo præcipue faciem, æmulam humanæ latitudine ſua, nec non oculis, ore, naſo buccis ac mento. Hæc ſcripſerat, cū eundem piſcem Raphael Seilerus juvenis Auguſtanus clariffimi medici Georyonis filius, cum omnimoda eruditione, tum iuriſciētia & comitiſ Palatini dignitate nobilis, pictum ad eum dedit, cum deſcriptione huiusmodi. Piſcem hunc omnino qualē depictum mitto, fuiſſe captum in ſumine Auſtriæ (quod vocant die Eris) in ditione comitiſ Iulij de Hardegg prope urbem Retz anno 1545. menſe Octobri, viti quidam eruditi & graves, mihi veluti teſtes oculati confirmaverunt. Faciem non averſam, pro ut reliqui, vel obtuſam ſed repreſſam, ob aliquo in planum aſpectu tendente, cum temporibus utrimque latis, oculis binis, naribus, ore, mandibula, omnia effigie humana habuit. Pinnis, ſquamis, cauda, totoque corpore poſteriore, ipſaque adeo magnitudine atque colore Carpum præſe tulit. Rete captus eſt ſolus, & obſtinate ac maxime quod ſenſibus etiam ignotus eſt et, diu conſervatus, & veluti miraculum quoddam paſſim aſportatus.

## CAPVT VIII.

## De Cyprino Lato Rondeletii.

**TAB. XXIX.** **C**Yprinus, latus Germanis *Brefem*, Italis *Scarda* seu *Scardula* dicitur. Bellonius *Abramidem* veterum nullo fundamento adiecto arbitratus est. Cyprino adiungitur, quia est squamis, corporis specie & vita similis. Piscis est maximus & latissimus, capite paruo p corporis magnitudine, doctore pando & cultellato, corpore cōpressio, *squamis* magnis recto. Linea à branchiis ad caudā ducta curva est. Ad branchias pinnae duae sunt, in medio ventre duae aliae, ab excrementi meatu alia ad caudam continua. Huiusmodi pisces in lacubus maximis nascuntur. Vidit Rōdeletius in Arvernia lacu quodā istiusmodi pisces, qui binum cubitotum, pedum totidē latitudinem exarent. Nostro in foro copiosissimē prostant: minores *Scardas*, maiores propter dorsum insignitē repandū *Gobbos* quasi gibbosos nuncupant, suntq; pedales plerumq; bipedales rarissimi. Scribit Gesnerus vadum amare argillosum, vel albicātri argillae simile: ideoq; in lacu Tigurino nō passim, sed superiore eius parte capi. Stagnantibus a. aquis praecipuē delectantur, illicquemuco, luto, herbisq; vescuntur. Quare in iis tantū capiuntur fluvis, qui tardius fluūt, turbidaq; sunt, & crassiore aqua, qualis est Araris: multi itē in Gallia Belgica: nec in his ad eandem unquā magnitudinem accrescunt, ad quā in lacubus & stagnis. Mirum q; narrat idem Gesnerus, nimirum quēdā in Polonia permultos horum piscium coniecisse in piscinam quae mox superveniente hyeme tota congelata esset: & cum parendi convivii causa, remoto gelu pisces capere vellent, ne unum quidē invenire potuissent: sequētia. vere turfus omnes apparuisse. Ad hosce latos Cyprinos referri debet piscis huiusmodi ē Polonia missus, ubi *Klofzcz* dicitur, totus ex fuscātruleo ad violaceum vergens, exceptis pinnis &

cauda quae albicant. Pinna quae ab anteriori est longiore & in exortu latiorē quam pars est, à p̄iore puto expressa est. Habentur à quibusdam in pretiis in Arvernia imprimis, ubi in lacu quodam magni & pingues capiuntur. Nonnulli partem in eis median expetunt alii plus molestiae obminutissimas spinas inter edendum quam voluptatis affert arbitrantur.

## CAPVT IX.

## De Cyprino lato alio, &amp; Ballero.

**G**esnerus ex relatione Kentmanii, **TAB. XXIX.** *iris* huiusmodi piscis generis in Albi teperriti tradit. *Primi generis* pisces esse parvos, tenues, latos, colore sub aereo, cui circa dorsum fuscus admissetur. Dupla eis ad latitudinem longitudo, caput parvum. Pinnae docti & cauda fusci coloris sunt: reliquae verò quinq; pinnae, ē fusco puniceae. *Squamae* ut in Cyprino. Genus hoc *Misena* parvum cognominant, *kleinkarass*, vel à colore *Giblichen*. Viva ces sunt admodum. E piscinis & stagnantibus aquis in Albim veniunt. Raro octo digitos longitudine excedunt. Vescuntur gramine & argilla, ut & reliqui huius generis pisces: quamobrem magis amant piscinas, quā fluentes & lapidosas aquas, propter vadum herbosum & argillosum. Itaque rarius in Albi reperiuntur. In piscinis quidem multiplicari eos non patiuntur domini, impediunt enim incrementa & saginationes Cyprinorum, quos à pabulo depellunt. *Alterius vero generis karas*, aliquanto crassiores & longiores sunt. *Squamae* similiter ut praedicti velut Cyprini, ē gilvoseo flavo nigricantes habent: vocantur autē *Halbkarass*, id est dimidii *Carasi*, quoniam ē *Caraso* & *catpa* veluti compositi videtur. Hi quoq; ut primi generis *Carasi*, & piscinis aut stagnantibus aquis Albim ingressi, pariunt in eo & crescunt. Vtrisque caro est subtilis, & in cibo viscosa, quomodo cunq; parata.

Quo diutius verò in Albi immorantur, eo lapidioris solidiorisque carnis evadunt. *Tertium demum generis* Carali terfiores & latiores sunt, quā dimidiū nunc dicti, similes primis sed maiores & pulchri, cā doris argentei, habentq; pinnas parte supina rubentes, superior vero pinna cū cauda obscurius ē fusco punicea est. Hi pisces in Albi nascuntur, non aliunde (ut prædicti) ingrediuntur. *Parvum* primū lunio mense, secundò Ianuario, sicut & superiores, quibus temporibus etiam præcipuè capiuntur. Mediocriter augentur, ut seculilibres aliquando aut belibres capiantur. Assari solent & in pretio habentur. Fœminæ ovīs gravidæ, elixæ etiam in aqua ad iuris ferè consumptionem, vel copioso butyro ad jus sub finem adiecto, non displicuerint. Est in Frisia orientali piscis, quem *keruz* appellant, Carpa multis partibus minor, tergo magis arcuato & gibboso. Sexies in anno parere unanimiter affirmant, qui ipsum in viariis servant.

**TAB. XXVII.** *De Ballero* ita Aldrovandus. Aristoteles Ballerum inter fluviatiles & lacustres bis meminit. Ballerus, inquit, & Cyprinus & ceteri fere omnes, cum parturiunt, undis se intrudunt. Et alibi: Ballero & Tilloni lumbrieus canis ex ortu innascitur, qui debilitat, cogitque ad summa stagni efferri, quæ æstu intereunt. Hunc Rondeletius cum esse conjicit, qui à Lugdunensibus, & lacum qui in Allobrogibus sunt, accolis Bordeliere nominatur, quod littora semper secūtur & quærat. *Bordenim* littus significat. Cæterum cur Ballerum faciat, nullum adducit argumentum, nisi quod vita & moribus à Cyprino, quo cum nominatur ab Aristotele, non differat. Vilis est piscis. Strymonis amnis accolæ vulgo *Plestyam* teste Bellonio vocant, in Macedonia ad Pischiacum lacum, ubi plurimus est, modo *Plasanes*, modo *Plestyam*, modo *Plasogniam*. Hollandi, apud quos cum ob copiam, tum quod per se insipidus sit, vilissimus habetur, *cen Bleye*. Bræmæ, inquit Rondeletius, tam similis est, ut parum cautis pro Bræmæ (zpe

vendatur, sed ab iis magnitudine corporis & squamarum differt & pinnarum & caudæ colore. Est igitur Ballerus capite brevi, ore parvo, sine *dentibus*, sed horum loco ossa habet aspera: sine lingua, sed *palato* carnosio: Pinna duas habet ad Branchias, duas alias in medio ventre, ab excrementi meatu unicam ad caudam usque in dorso aliam. Posteriores pinnae cum cauda rubro colore perfusæ sunt, ut in Percis fluviatilibus videre est; quæ in dorso est, nigricat. Linea à branchiis ad caudam curva producta est. Branchias quaternas habet, os in medio palato, ex adverso sita sunt ossa duo loco inferiore, altera parte serrata, quibus contrario occursu cum palatio se herbæ atteruntur. Ventriculū parvum habet, intestina pinguedine oblita, hepar ex alborubescens, in quo fel viride splenem rubrum. Multis spinis abundat, frequentes *squamas* habet, rotundas & tenues. Tergus eius nigricat, venter candicat. Oculorum pupillam Bellonius non in aliis nigram, sed veluti crystallinam esse asserit, iridem vero albidissimam, ac tredecim squamarum ordines utrinque in lateribus habere.

## CAPVT X.

## De Tinea.

**T**incam vulgatissimum ubiq; terrarum piscē, à solo inter veteres Aufonio memoratum, ab aliis quod nullo in pretio fuerit, neglectum, Io. vius existimat. Bellonius Aristotelis *fullo*, quæ Gaza *Fullonem* vocat Dorionis apud Athenzum, id est Fullonem dici, credit: metuo ne perperā. Non tantum n. Tincæ decocto, sed & aliorum glutinosorum pisciū, Ichtyocollæ, Anguillæ, &c. maculæ eluuntur. Fullo quoq; Aristotelis marinus piscis est, Tincā inter fluviatiles & Lacustres reponimus. *Manā* non esse, q. Platinæ placet, vel ob ultimā hanc rationem, quia marinus est, certū est. Quid si verò, inquit Aldrovandus, Romanam vocem esse dicamus, à qua

7.  
Aldrovand.  
de Piscibus  
l. 5. c. 44.

TAB.  
XXIX.  
7.  
Aldrov.  
de  
Piscib. l. 5.  
c. 45.

à quasententia idem Iovius non videtur declinaſſe. Celebratur enim apud Ciceronē, quidam facetus orator Placentinus cognomine Tinca, fortaliſ, inquit, ab hoc piſce cognominatus, quemadmodum Florentiæ Laurentius Mediceſ ſenior, uti erat perurbaniſ, cuidam celebriſ familiz civi, ſe domi Tinca ingentem exquiſita arte coctam falſo jaçtanti, Tinca cognomen, quod illi poſtea fuit æternum, in didit. Quemadmodum Merula ob ſimilitudinē cum Tinca, irem Callariuſ noſter, Tinca marina vocari meruerunt, quid vetabit, ſi Tinca etiam Merulam paluſtrem dixerimus? Hoc ſanè nomine uſuſ eſt doctiſſimuſ Scaliger hiſ verbis: Auſoniuſ ſui temporis ſecutuſ plebem, uſiſtat nominibuſ, pulcherrimū poemata non eſt verituſ inſicere potiuſ, quam aut iſe in ambiguo verſari, aut jaçtate Authorem in obſcuro: ſic Aſolaſ pro Clupea ſive Thrilla, Tincaſ pro Merula ſtuviaſtili poſuit. Habet quibuſ cum Cyprino ſimiliſ eſt, habet item quibuſ cum plurimuſ ab eo diſcrepat. Corporiſ enim ſpecie, pinnis earumq; ſitu, & palato carnoſo cum eo convenit: ſquamis verò nō item. Hæ Cyprino maiuſculæ, Tinca vero perquam exiguaſ tenueſque & muco ſemper obduçtæ: adhuc Tinca juxta oculoſ circuluſ habet rubruſ qui in Cyprino ſaſceſcit. Color omnibuſ haud idem, aliquæ enim ſubalbidæ ſunt; plurimæ ex albo ſaſceſcenteſ, nonnullæ virideſ, quæ verò in mariſ degunt paludibuſ, ut in multiſ Hollandiæ lociſ, ſubnigræ ſunt. Auſoniuſ viridem dixit, cū pleruſq; ſaſceſcat potiuſ. *Roſtrum* habet breve ac reſcuſum: oſ ſit rotundum, ad venterem inclinans, planè edentuluſ, at pro dentibuſ ſerrata oſta. Ex utroque oriſ latere, ubi inferiuſ labruſ ſuperioriſ committitur, appendix pendet, ut in Cyprino, cutacea, rotunda, brevis, moſſiſ, ac lubrica adeò, ut nunquam explicetur, conſpicuave ſiat, in digitiſ compreheſa extendatur. *Oculi* ſunt magni & aurei. *Pinnæ* binæ ſunt ad Branchiaſ, totidem aliz in ventre, à podice una, in dorſo alia

breviſ ſine aculeo. Cauda in latam pinnam deſinit. Branchiaſ habet quaternas duplices, lapilloſ in capite Auratæ & reliquoruſ marinoſuſ more, binos exiguoſ. Stagnanteſ potiuſ quam currenteſ aquaſ amat, id eoſque in ſtagniſ, lacubuſ ac paludibuſ quàm in fluminiſ frequentiuſ, & inter arundineſ ulvaſque pleruſque viçtitat, omniſque anni tempore hiſce in lociſ capitur. E riviaſ. flumina maiora quandoque intrat, ſed degunt maxie, ubi vadola ſunt, vadūque ipſuſ limoſuſ. Gregaliſ eſt, putreſcentiſ limi ſordibuſ veſcitur, carne nequaquam. De *amicitia* eiſ cum Lucio ſupra dictū eſt, quibuſ ſi lubet, adde, q; cum Luciuſ in ceteroſ tyrannidem exerceat, à Tinca quaſi beneficiſ memor, porroſ abſtineat. Cū occiditur, diu ſupervivere fertur. *Pſum* in cibiſ quod ſpectat, inſua vè habent carnem, quia impuruſ & damnatuſ alimentuſ: ideo commune eſt apud Italioſ mulierculoſ diverbiuſ. *Veſſano mangia Tenca, che ſebre non ſente*, & Auſoniuſ vulgi ſolatiuſ dixit. Diebuſ tamen canicularibuſ inprimiſ noxiæ putantur, quanquam Marſicana à Tucino lacu, qui nunc Celanuſ, quæ labio inferiøre trito, quod ſaxoſeuſ loco volentur, à vulgariſ diſtinguuntur, laudantur: nec non illæ, quæ parvuſ lacuſ quarto decimo ab urbe lapide, apud Bacanæ ſylvam, profert. Hæceſte Iovio, nobiliſ quidaſ propinaliſ lautiçiſ ſtudioſiſſimuſ, autumno captiſ, allio larioſque contritiſ, additiſque odoratiſ oleribuſ & multo aromate, in teganiſ ad vaporem tepidiotiſ furni ſeliciſſime percoxit. Laudatur deniq; Thraſymena Tinca, de qua idem Ioviuſ Cum in cærna Leonis X. Pontifiſ diſcumbenteſ, pelagioſ piſceſ vario iudicio certatim atq; impenſuſ laudarent, nobiliſ quidaſ Florentinuſ Tincaſ fortaliſ ſoluſ aſſeruiſ, extollatiſ, inquit, convivaſ, ut lubet marinoſ piſceſ: ego certè Thraſymenam Tincaſ conditam leucophago, hiſ veſtriſ Trigliſ, Spigoliſ & Rhombiſ præterulo: quo ſuo inſulo dicto lachrymaſ omnibuſ præ riſu excuſuſ.

Vete-

Veteres medici (inquit Medicus quidam apud Gesnerum) ad sopendos capitis & artuum dolores, torpedines admovebant, quarum loco à mediterraneis Tinea forsan usurpari potuerunt. Sunt qui non febrientium modo æstus Tincis pedibus subditis, seu alligatis vivis temperari, sed idè remedium adversus arquarum etiam morbum proficere putent. Iovius quoque scissas per dorsū longitudinè, pedum & manuum plantis applicatas, ardentis febris ardoribus plurimum adversari, quosdam tradit putare ex secta ludæorum, qui quamvis sordidæ admodum, inquit, & ridentibus aliis talia experientur, aliquando tamen ipsis æstuantibus exoptata blandimenta feliciter attulisse comperi sunt. Monet vero Rondeletius, ut id opportunè fiat, quod alioqui non modo nihil profuerit, sed contra maximè obfuerit. Frigiditate siquidem intro repellente ac magis constringente augeri incendium. Alii ictericorum jecori aut umbilico vivam imponunt. Ictericis aliqui Tincam viventem alligant umbilico, donec immoriatur, post diem rursus aliā alligant, idque etiam cerro die repetunt. Tinea immortua intus ac foris velut icterocorintha redditur, & plerique hoc remedio restituitur. De felle hoc ex libro Germanico manufacti pro habet Gesnerus: Fel de Anguilla, Thymallo, Tinea & porcellolactante, misce ad aurium remedia. Hoc enim infuso, pelliculas rumpes, fluxiones curabis, vermes aurium occides.

## CAPVT XI.

## De Lota Gallorum.

TAB.  
XXIX.  
10.  
Aldrovand.  
de Piscibus  
1.5. c. 46.

**L**ugdunenses, inquit Rondeletius piscem qui in Arari invenitur, Lotam vocant, qui à Gebennensibus Mustella quasi Mustella nominatur. Si quis Mustellam lacustrem vel fluviatilem appellaverit, non in præ mea quidem sententia fecerit, modo non eam accipiat, quæ ex mari fluvios petit, qualis est Mustella Ausonii, qui

Mustellæ nomine Lampretam nostram describere videtur. Lota Piscis est fluviatilis & lacustris. Mustellæ marinæ vulgari, de qua alibi diximus, similis admodum, nisi esset corpore rotundiore & spissiore. Ex maxillæ inferioris extremo pilus unicus veluti ex mento barba propendet, nullus in superiore eminet, ut in marina. (Gesnerus tamen in suis putat etiam supra duos pilos esse, sed in mortuis ferè latere, ut in maxima observavit.) Pinnæ quatuor natæ, duæ sunt ad Branchias fixæ, duæ in ventre, ab ano unicam continuam habet ad caudam, huic æqualem & similem in dorso, quam præcedit alia pinnula. Cauda mucroni gladii figura similis est. Parvulis squamis corpus tegitur, quod è rufis fuscum est, & maculis nigris undulatis dispositis conspersum. Dentes parvulos & tenues habet. Mucro obliquo & lubrica Lota est, ut Anguilla. Ventriculus parvum habet cum multis appendicibus, intestina convoluta; hepares albicans, in quo felle vesica, quæ ex viridi flavescit, splenem rubrum, vesicam oblongam aere plenam, branchias quaternas & duplices. Nasitur in lacubus & fluviis leniter fluentibus, ut in Arari. Hepar pro corporis ratione magnum est, & delicatum habetur. Ova noxia, quemadmodum ova Barbi, quæ ventriculum lædunt & alvum turbant. Caro tota à Lugdunensibus habetur in pretio.



## TITULUS IV.

## De Piscibus lacustribus.

## CAPVT I.

## De Umbla vulgari, &amp; Rondeletii.



Nter Lacustres pisces cent. TAB.  
sentur, Umbla, Trutta, La. XXX.  
custris, Carpio, Lavaretus Al. L. 1.  
lubregans, Bexola, Albu-  
la, Albus Salviani, Fatta, Pingu, Sa-  
rachus.

*rachus, & Schilus.* Umbla, quasi umbra, quod haud exiguum cum umbra fluuiatili similitudinem habeat, dicitur. Rondeletius *Salmonem lacus Lemani*, quod corporis specie, pinnarum numero, situque & partibus internis. Salmonem referat, vocat. Helvetii à Colore circa ventrem rubicundo, *Rotele* nomen indidere. Duo eius esse genera magnitudine maxime differētia in Lucernensi lacu Gesnerus tradit. Majorem circa Bielam Rott, alticubi Roote appellari: à Sabaudis *Routte*; circa Lemani vero Umble minorem diminutivum nomine *Rotele* privatim dici. (Est & alius in Suevia & circa Augustam *Rotele* dictus, sed fluuiatilis, non lacustris piscis, Truttis quoque affinis, Germanis cæteris ferè *Huch* nuncupatus, quo de suo loco diximus) Sabaudie circa Bielam *Ronfon* vel *Bondelle*, illo nomine colorem indicari, hoc forte bonitatem. Denique piscem qui in lacu Bavarie Amerlece vocatur, Germanice *cün Püßling*, non aliū quā Umblam minorem videri: confert enim Salmoni parvos & à dorso usque ad media latera coloris lutei esse dici, adeoque tenerū, ut statim extra aquā expiret, nec in alio ullo eius regionis lacu inveniri. *Emblama* ius corporis forma partibusque omnibus Salmonibus & Truttis similis est. Oshabet magnum, *dentes* vero non solum in maxillis, sed etiā sex magnos in lingua. Caput livecit, branchiarum opercula argentei sunt coloris in extremo auris. Magis albicat quā minor. Nullis suggillatur lituris, unicā esse parvam tergoris pinnā Bellon. scribit: Rōdel, tamen non lōge à caudæ exortu aliā sed admodū exiguā depingere videtur, & ipse Bellon. eandē in icone exprimit, & mox puto apophysim carnosam vocat. Idē Bellonius juxta vētrem, pinnā (in impressis codicibus branchia legitur sine sensu) utrinque unā esse ait, sed quā nec ipse, nec Rōdeletius quoque pingit: duas sub vētre huic oppositas, omnes sine aculeis postremas piscē in duas æquales partes interfecare, sed partē quæ ad caput est, paulo lōgiore esse. *Catim* adeo glabra esse, ut squamis carere videatur. Tergus præ multo livore opacum

apparete: ventrē præ albedine uti argentū micare: apophysim carnosam habere supra caudā. Umbræ, Truttarū, &c. more. Quaternis prædictā esse *dentium* ordinibus in palato scripturū more, *linguā* ostendere aduncis in gyrum dentibus, crenatis, exertis & hamatis senis, vel eo pluribus cōmuniā, præter hoc maxillā etiā inferiorem parvulis alius exertis & parū falcatis in ambitū vallari, brachiis habere utrimque: quatuor: latera eius virgula recta secari utrimque per mediū corpus, parū repandū versus ventrē. Tres aut quatuor dodrantes plerumque longa est. In Lucernensi lacu brachiū ferè longitudine excrefcere Gesnerus testatur, & Rōdeletius duos aliquando cubitos longas à Lemano lacu Lugdunum advehi. *Minor Umbla* (ut locum Gesnerus refert) dodranalis plerūque aut brevior, pedē raro excedit, aut amplius, increfcit. Vidi n. inquit, aliquando palmos quinque longā. Octobrimente in Lacu nostro capta corpore latiusculo, nunquā tamen Umblæ majotis magnitudinem attingit. *Venter* turgidulo aliquādo spectatur, propter *vesicā* nimium inflatā. Est a. velica ei oblonga, ut Albulis, non distincta per mediū. *Dorsum* torū cum dimidia laterū parte subroscum: inferiora latera albicat. *Venter* albilim⁹ est: caudæ color idē, quod dorsū pinnulam mollē & parvam, ut Truttæ, dorso extremo gerit. *Maxillis* est dentatis. Spinas etiā ceu dentes in lingua habet. Pinnae omnes partim subalbæ, partim crocei coloris sunt. Branchiæ quaternæ. *Lapillos* in cerebro habet. *Mares* ventre, pinnis & caudā magis rubet, fœminæ candicant: eadem capite superius & dorso magis virent. Non tantum in Lemani lacu, sed & in aliis capitur. *Vesit*ur pisciculis, quibusquiliis & aliis. Si vel parū *sancietur*, velut moribunda supernatat. Capta quā primum aquas reliquetit, expiret traditur. *Carne* est suavi, sicca, & cū senuerit dura, & quæ multorū iudicio Asellis, imo saxatilibus succedere queat. Pinguis potissimum apud Allobroges capitur tantique fit, (inquit Bellonius,) quantidictorū bursa æstimare potest. Commendatur ab Helvetiis Novembri

Y      mense,

menſe, & alijs circa initiũ Decēbris: quo tēpore Geſnerus *ova* habere ait bona & ſolida, tardius vero cato eius inſulſa, pinguiſcula & flaccida apparet, & ova diſtinctiora ſunt. Tēpore partus menſis inepta eſt. Cũ elixatur, vino prius fervido injicitur, ne nimis mollis reddatur. Apud Allobroges paſtitius includi Bellonius reſert.

Facit Rondeletius alterius mentionē, quā Lemani lacus accolz *Ymblechevaliere* forte ob magnitudinem, præſtantia & robur nominant. Neq; verò à ſuperiore ſolũ differt, vel ſexu, vel ætate, ut ex ſequenti deſcriptione perſpicuum fiet. Eſt igitur hic piſcis Salmonibus & Truttis, q̃ vulgo Salmonatę dicuntur, ſimilis, *roſtro* recurvo, quo à ſuperiore differt, id n. longius habet & acutius. Maxillę inferioris extremum incurvum in maxillā ſuperiore, eius rei gratia excavatum recipitur ut in Salmonibus videre eſt. Maxillę lineis multis diſtingit̃ ſunt. *Dorſũ* ex cæruleo nigricat. *Venter* aureo colore eſt. *Hepar* hæveſcit, in eo ſe: *ſplen* nigricat. *Ventriculus* gulę ſubjectus eſt, longus, ſpiſſus, cuius innumerales ſunt appendices, quemadmodum in ſuperiore. In inſignē magnitudinē exerciſcit. Caroe eſt ſicca & dura: in aſſulas dividitur, q̃ Caryophylli conhxz in craticula aſſantur, & oleo ſive butyro irrigantur. Paratur etiam hic piſcis Truttę modo. Caput maxime commendatur, ut Salmonis.

## CAPUT. II.

## De Trutta Lacuſtre.

TAB.  
XXX.3.  
*Aldrov. de  
Pifich. L. 1.  
6-59.*

Quam nos Truttā Lacuſtrem vocamus, eā Galli *Truttā Salmonatę*, Rondeletius *Salmonē lacuſtrem* vocat, eumq; Truttis vulgarib. grandior ſit, Salmonē minor, *Sarionem* ab Auſonio dici Bellonius & Rondeletius opinantur. An ſit *Anchorago* Caſſiodori, quod Geſnerus opinari videtur, ſuperius diximus. Ex Trutarum genere eſſe. Salmoniq; ſimilē eũ ex corporis forma, partiumq; externarum & internarum ſimilitudine, tum ex nomenclatura Gallica notũ eſt. *Differt à Salmonē* magnitudine & maculis. Minor n. & maculas in lateribus purpureas,

multo quā Salmo copioſiores habet. Truttę, itē q̃ in fluvijs rapidis & limpidis inveniuntur, nō ſunt adeo maculoſę, magnitudinēq; ſucco, carnis colore & ſubſtantia multo inferiores. Umbra vero nullis ut dictũ eſt litturis ſuggillatur. *Geſnerus hunc piſcē diligenter intuiſus, huius verbis deſcribebat: Squamulis* tegitur minimis, bene dentatus eſt, & *lingua* ē utrimq; dentibus munitur. Caput colore nigro, cæruleoq; mixto, dorſum partim glauco, partim ſubnigro, partim cæruleo, partim ſubviridi. In lateribus puncta nigra. Pinnæ in medio dorſo multis nigris maculis variatur, reliquę albent. Habet & ultimā illā dorſi mollē *pinnulam*, ut reliquę Truttę: Brachias quaternas. *Appendices* nō toto circuitu inteſtini, ſed ab una tantũ parte magnas, oblongas, bipartitas, utrimq; circiter 18. habet, & alias ſex ſeparatim ex oppoſito, ventriculũ ſeu majus inteſtinum verſus. Hęc ille. Ad duum triumve cubitorum *magnitudinē* accreſcit, in Lario lacu ad 50. quinimo, Jovio auctore, ad 100. etiam libras. Initio ætatis *caro* eius rubere incipit, duratq; iſe color uſq; ad Auguſtum, vel ſaltem ad Diſci Jacobi diē, quo tēpore partu jam abſoluto, colorē rubicundum amittit. Geſnerus loco diſſerte invicē iſtiusmodi lacuſtres teſtatur; alias n. in vado ipſius aquę degere, præſertim argilloſo, haſq; magis pingueſcere, & palato ſapidiores eſſe, alias circa ſumas aquas, ubi muſcas appetunt, minus pingues & vilioris pretii: illas apud luos *Grundforin*/ has *Schwabforinen* appellari. Duo itē genera capi in montanis lacubus quos Athetiſis facit, quorum unum ab aureo colore *Goldforinen*/ alterum à nigredine *Schwabforinen* appelletur.

*De loco & natura huius piſcis ita Aldrovandus.* Lacuſtris piſcis eſt, ſed qui ex lacubus fluvijs quandoq; ſubitæro tēpore, inſtante nempe partu. E Lemano in Rhodanum *aſcendere* ajunt vere, inquit Geſnetus, ut & circa Sedunum capi: at in Tigurino & Aetonio lacubus neq; eodem tempore migrare putat. Acronii lacus incolæ *paritura* ad Rheni influentis oſtiũ aſcendit, ubi cum perierit, curſus deſcendit.

dit. Conferri ajunt hunc piscem juni-  
pero, nam sicut hæc tertio demum  
anno fructum perficit, ita etiam eius  
fœtus ad tertium usque annum cre-  
scens, perficitur: *parere* plerumque Ju-  
lio & Augusto, alias citius tardiusve,  
prout cœlum magis minusve calidum  
fuerit. Jam vero magno licet sit cor-  
pore, suâ tamen naturâ agilis quoque  
est, aliarum Truttarum more. Tradir  
Jovius sese audivisse majores istas  
Truttas lacus tipis lascelvo excurso ex-  
tremos arenæ margines aliquâdo ju-  
sti passus longitudine pfulcasse. Lau-  
dantur vehementer *in cibis*, Carnē ha-  
bēt solidā, rubicundam, & saporis o-  
ptimi: aliquando tamen præ nimia  
pinguedine nauseâ movent, & mor-  
tux paucissimis horis, q̃ pinguis illa  
tenetudo quam sæpissimè cōputre-  
scant, gratiâ saporis amittunt. Lari-  
næ multo succo corpora replent, &  
genitalē humore copiosè suggerunt.  
Præferuntur, si Jovio credimus, Sora-  
næ aliis, in Acronii lacus parte infe-  
riore captæ, illis quæ in superiore par-  
te capiuntur: item quæ circa fundum  
pascantur, iis quæ circa summam a-  
quam. Ab Helvetiis Februario com-  
mendantur, ab aliis simpliciter æsta-  
te, dum pulpæ earum rubent. Spinæ  
dorsī & Caudæ assæ, vel principum  
mensis inferuntur.

## CAPUT III.

## De Carpione.

TAB. XXIX. **Q**ui sit apud Veteres Carpio, igno-  
ratur, Moderni quidam in solo  
Benaco lacu repetiri, & à carpendo  
auro dici ajunt. Alii ablati priori syl-  
labâ, *Pione* vocatum fuisse, ac tandem  
*Carpione* q̃ cum quidam piscem edif-  
fer, careq; suppuranti solvisset, carē se  
*Pione* edisserere diceret, perhibent  
Fracastorius à carpo nauta, à Saturo  
Benacum trajecturo, q̃ aurum ipsi  
extorqui vellent, in carpionem muta-  
to derivat. Lacustri potissimum Trut-  
tæ cōgener statui potest. Nam & cor-  
poris figurâ, partium numero & car-  
nis substantiâ ei similis est: punctisque  
similiter nigris notatur, ac denique  
pinnulam dorsī posteriorem mollem,  
ut illa habet. Evidentibus tamē ab ei

interstingitur notis. Prominentiori  
enim rostro, majoribus oculis, can-  
didiotē & turgidiotē ventre, ac ni-  
gricantiore dorso est: *magnitudo* Trut-  
tæ lacustri duorum triumve plerum-  
que cubitorum, cum Carpio pedem  
excedere nunquam visus sit. *Dentes*  
habere non in maxillis solum, sed et-  
iam in palato & lingua, *squamis* tegi-  
tur tenuibus. Ventrem habet candi-  
dum atq; argenteum, dorsum subni-  
grum. Qui ab Aldrovando extimil-  
tur, lateribus est serē rubicundis, in-  
tenius verò rubet lineæ corpus divi-  
dens. Ventre pinnisque candidat,  
*Tergum* ad cæruleum inclinat. Solius  
Benaci lacus alumnus esse omnes a-  
junt: negatque Petrus Bembus alibi  
capi, huncque piscem capere atque  
cognoscere Fridetico Imperatori vo-  
luptati fuisse. Atqui Salviaus reve-  
ta reperiti nascique assent in parvo &  
limpido lacu, haud procul ab Alviro  
Campaniæ oppido ex-oriente, ( vul-  
go illago della posta appellato ) ex  
quo Fibrenus fluvius exoritur: esse ta-  
men Benacinis minores, & vix libram  
unam implere. Profundiora aquæ lo-  
ca amat. Pisciculis vestitur & quibus-  
dam lacus recrementis. Bellonius  
Phryganiæ edacem esse tradit. Auro  
vesti paulo ante negavimus. Carne  
est duricula, siccaq; minime gluti-  
nosa, rubescente, Truttes & Salmoni-  
bus simili. Plus æ quo servatos contra-  
becent & deteriores fieri ajunt, id q̃  
& multis aliis piscibus accidit, maxi-  
mè iis qui delicatiorē & friabili sunt  
carne quam obrem Benaci accolæ, in  
sartagine frixum, foliis involutum, a-  
ceto in quo aromata pri<sup>us</sup> ebullierint,  
irrigatum, per p̃ximas urbes circula-  
ferre, quem condiendi modum vul-  
gus ab hoc pisce acatpionate, alii a-  
marinare nuncupant. Platina spinam  
in capite gerere scribit perniciosam,  
eamq; inter edendum cavendâ: cu-  
jus tamē apud alios nulla mentio est.

## CAPUT IV.

De Lavareto Allobrogum,  
& Bezola.

**L**avareus à munditiæ & candore,  
quod nunquam sordidus sit, no-

TAB.

XXX.

4.

Aldrov. de  
Piscib. l. 5.  
c. 51.

Y 2 men



menſe, & alijs circa initium Decēbris: quotēpore Geſnerus ova habere ait bona & ſolida, rardius vero caro eius inſulſa, pinguiuſcula & flaccida appareat, & ova dilutiora ſunt. Tēpore partus menſis inepta eſt. Cū elixatur, vino prius fervido inſicitur, ne nimis mollis reddatur. Apud Allobroges paſticijs includi Bellonius refert.

Facit Rondeletius alterius mentionē, quā Lemani lacus accolat *Umbra chevaliere* forte ob magnitudinem, præſtantia & robur nominant. Neque verò à ſuperiore ſolū differt, vel ſexu, vel ætate, ut ex ſequenti deſcriptione perſpicuum fiet. Eſt igitur hic piſcis Salmonibus & Truttis, quæ vulgo Salmonare dicuntur, ſimilis, *roſtro recurvo*, quo à ſuperiore differt, id n. longius habet & acutius. Maxillæ inferioris extremum incurvum in maxillā ſuperiorem, eius rei gratia excavatum recipitur ut in Salmonibus videre eſt. Maxillæ lineis multis diſtinguntur. *Dorsū* ex cæruleo nigricat. *Venter* aureo colore eſt. *Hepar* hæveſcit, in eo ſeliſplen nigricat. *Ventriculus* gulæ ſubjectus eſt, longus, ſpiſſus, cuius innumerabiles ſunt appendices, quemadmodum in ſuperiore. In inſignē magnitudinē excrciſcit. Carne eſt ſicca & dura: in aſſulas dividitur, quæ Caryophyllis conſtat in craticula aſſantur, & oleo ſive butyro irrigantur Paratur etiam hic piſcis Truttæ modo. Caput maxime commendatur, ut Salmonis.

## CAPUT. II.

## De Trutta Lacuſtri.

TAB.  
XXX.  
3.  
Aldrov. de  
Piſcib. l. 5.  
c. 59

Quam nos Truttā Lacuſtrem vocamus, eā Galli *Truttā Salmonarā*, Rondeletius *Salmonē lacuſtrem* vocat, cumque Truttis vulgaribus grandior ſit, Salmonem minor, *Salmonem* ab Auſonio dici Bellonius & Rondeletius opinantur. An ſit *Anchorago* Caſſiodori, quod Geſnerus opinari videtur, ſuperius diximus. Ex Truttarum genere eſſe, Salmonique ſimile cū ex corporis forma, partiumque externarum & internarum ſimilitudine, tum ex nomenclatura Gallica notū eſt. *Differt à Salmonē* magnitudine & maculis. Minor n. & maculas in lateribus purpureas,

multo quā Salmo copioſiores habet. Trutte, itē quæ in fluvijs rapidis & limpidis inveniuntur, nō ſunt adeo maculoſæ, magnitudineque, ſucco, carnis colore & ſubſtantia multo inferiores. Umbra vero nullis ut dictū eſt lituris ſuggillatur. *Geſnerus hunc piſcē diligenter intuiſit, huius verbis deſcribebat: Squamulæ tegitur minimis, bene denratæ eſt, & lingua eſt utrimque dentibus munita. Caput colore nigro, cæruleoque mixto, dorſum partim glauco, partim ſubnigro, partim cæruleo, partim ſubviridi. In lateribus puncta nigra. Pinna in medio dorſo multis nigris maculis variatur, reliquæ albenæ. Habet & ultimā illā dorſi mollē pinnulam, ut reliquæ Truttæ. Brachias quaternas. Appendices nō toto circuitu in teſtini, ſed ab una tantū parte magnas, oblongas, bipartitas, utrimque circiter 18. habet, & alias ſex ſeparatim ex oppoſito, ventriculū ſeu majus inteſtinum verſus. Hæc ille. Ad duum triumve cubitorum magnitudinē accreſcit, in Lario lacu ad 50. quiniſmo, Jovio auctore, ad 100. etiam libras. Initio æſtatis caro eius rubere incipit, duratque is color uſque ad Auguſtum, vel ſaltem ad Divi Jacobi diē, quo tēpore partu jam abſoluto, colorē rubicundum amittit. Geſnerus loco diſſerre invicē iſtiusmodi lacuſtres teſtatur, alias n. in vado ipſius aque degere, præſertim argilloſo, haſque magis pingueſcere, & palato ſapidioreſ eſſe, alias circa ſummas aquas, ubi muſcas appetunt, minus pingues & vilioris pretii: illas apud ſuos *Grundforſinē* haſ *Schwabforſinen* appellari. Duo itē genera capi in motanis lacubus quos Athetiſ facit, quorum unum ab aureo colore *Goldforſinen*, alterum à nigredine *Schwabforſinen* appelletur.*

De loco & natura huius piſcis ſita Aldrovandus. Lacuſtris piſcis eſt, ſed qui ex lacubus fluvijs quandoque ſubit certo tēpore, inſtante nempe partu. E Lemano in Rhodanum *aſcendere* ajunt vete, inquit Geſnerus, ut & circa Sedunum capi: at in Tigurino & Acronio lacubus neque eodem tēpore migrare putat. Acronii lacus in cola paritur ad Rheni influentis oſtiū aſcendit, ubi cum per tēpore, turſus deſcendit.

dit. Conferri ajunt hunc pisceem junipero, nam sicut hæc terrio demum anno fructum perficit, ita etiam eius foetus ad tertium ulq; annum crescit, perficitur: *parere* plerumq; Julio & Augusto, alias citius tardiusve, prout cælum magis minusve calidum fuerit. Jam vero magno licet sit corpore, suâ tamen naturâ agilis quoque est, aliarum Trutrarum more. Tradit Jovius sese audivisse majores istas Trutras lacus ripis lascivo excursu extremos arenæ margines aliquâdo iusti passus longitudine pfulcasse. Laudantur vehementer *in cibis*, Carnem habent solidâ, rubicundam, & saporis optimi: aliquando tamen præ nimia pinguedine nauseâ movent, & mortuæ paucissimis horis, & pinguis illa teneritudo quam sapissimè cõpurrefecerant, gratiâ saporis amittunt. Lariæ multo succo corpora replent, & genitale humorè copiosè suggerunt. Præferuntur, si Jovio credimus, Soranæ aliis, in Acronii lacus parte inferiore captæ, illis quæ in superiore parte capiuntur: item quæ circa fundum pascantur, his quæ circa summam aquam. Ab Helveris Februario commendantur, ab aliis simpliciter æstate, dum pulpæ earum rubent. Spinæ dorsi & Caudæ asæ, vel principum mensis inferuntur.

## CAPUT III.

## De Carpione.

**TAB. XXIX.** **23.** *Allobrogi de Pysia. l. 5. c. 50.* **Q**ui sit apud Vereres Carpio, ignoratur, Moderni quidam in solo Benaco lacu reperiti, & à carpendo auto dici ajunt. Alii ablati priori syllabâ, *Pione* vocatum fuisse, ac randem *Carpione* & cum quidam pisceem edisseret, careq; supputanti solvisset, carè se Pione edisserere diceret, perhibent Fracastorius à carpo nauta, à Saruro Benacum trajecturo, & aurum ipsi exorqui vellet, in carpionem mutato derivat. Lacustri potissimum Trutæ cõgener statui potest. Nam & corporis figurâ, partium numero & carnis substantiâ ei similis est: puncticusque similiter nigris notatur, ac denique pinnulam dorsi posteriore mollem, ut illa habet. Evidentibus tamè ab eis

interstinguntur noris. Prominentiori enim rostro, majoribus oculis, candidiore & rurgidiorè ventre, ac nigricantiorè dorso est: *magnitudo* Trutæ lacustri duorum triumve plerumque cubitorum, cum Carpio pedem excedere nunquam visus sit. *Dentes* habere non in maxillis solum, sed etiam in palato & lingua, *quamvis* tegitur tenuibus. Ventrem habere candidum atq; argenteum, dorsum subnigrum. Quia Aldrovando extimittur, laceribus est serè rubicundis, intrensus verò rubet lineâ corpus dividens. Ventre pinnisque candicat, *Tergus* ad cæruleum inclinat. Solius Benati lacus alumnus esse omnes ajunt: negatque Petrus Bembus alibi capi, huncque pisceem capere atque cognoscere Friderico Imperatori voluprari fuisse. Arqui Salvianus revera reperiti nascique asserit in parvo & limpidolacu, haud procul ab Alviro Campaniæ oppido ex-oriente, (vulgo illago della posta appellato) ex quo Fibrenus fluvius exoritur: esse tamen Benacinis minores, & vix libram unam implere: Profundiora aquæ loca amat. Pisciculis vestitur & quibusdam lacus recrementis. Bellonius Phryganiæ edacem esse tradit. Auro *vesti* paulo ante negavimus. Carne est duriuscula, siccaq; minime glutinosa, rubescens, Trutris & Salmonibus simili. Plus æ quo servatos contrahescens & deteriores fieri ajunt, id quod multis aliis piscibus accidit, maxime iis qui delicatiorè & friabili sunt carne: quamobrem Benaci accolæ, in sartagine frixum, foliis involurum, aceto in quo aromata prius ebullierint, irrigarum, per proximas urbes circumferre, quem condiendi modum vulgus ab hoc pisce acarpionare, alii amarinare nuncupant. Platina spinam in capite gerete scribit pernitiosam, eamq; inrer edendum cavendâ: cujus tamè apud alios nulla mentio est.

## CAPUT IV.

## De Lavareto Allobrogum, &amp; BeZola.

**L**avarerus à munditiè & candore, quod nunquam sordidus sit, no-

TAB.

XXX.

4.

Allobrogi de

Pysia. l. 5.

c. 51.

Y 1 men

menfotituseft. Bellonius ex Trutarum genere efle ait, at Rondeletius, Salmonum, Trutarumque generi adjungendum fuaderet, inquit, pinnula illa dorf posterior adipofa Salmonum & Trutarum generi propria nifi multa alia reclamarent, ut oris conftitutio Thriflis quam Salmonibus fimilior. *Os* fine dentibus, caput compreffum, corpus *maculis* carens, caro mollis & cãdida. Quamobrem Lavaretum inter Salmones (Truttaſque) & Aloſas, ambigere judicat. Bellonius exactiſſimè delineavit his verbis: Piſcis Lugduniſatis cognitus, Umbrę ſimilis, niſi ſimilis eſſet, *dentibusque* omnino careret: *Biſulam* (Bezolam) tamen vulgarem magis reſert: ſed Lavaretus nunquam pedem excedit, neque craſſior eſt eo quod pollex & index capere poſſunt. Capite eſt oblongo, *ſquamis* tenuibus, albis, atque ut in Trutta parviſciugum in tergote gerit pinnam, duas ad ventris latera utrimq; circa branchias, ac totidẽ ſub vêtre ei oppoſitas, quę tergoris faſtigium occupat: aliã quoq; parvam in eo interſtitio, quod eſt inter caudam & anum, quę omnes nigricantes appatent. *Linea* à ſupercilio ſubrubra per latera ad caudam protenſa inſignis eſt: *canda* bifurca, pinnis ſque ad extrema nigris, ſimbriatis ac laciniaſis. Ventre laxo & prægrandi, ut in Trutta. Hoc item à Cæteris piſcibus differt, quod *nare* eſt recurta, atque (ut in Harengiis ac Logiis) oſſiculis quibuſdam prominentibus inſigni, labiis nullum *dentium* rudimentum oſtendentibus, appendice glabra ac carnoſa *cande* indidenti, in Umbrę modum. Neq; tamẽ *dentibus* caret: oſſiculan. ad eius fauces atque ceſophagi ingreſſum utrimque conſpiciuntur, ſenis hinc inde denticulis, ut in Themolo, cõminuta. *Branchiæ* illi ſunt utrinque quaternę ac ſimpliciſſimę, quarum extrema, quę capiti inhæret, reliquis ſane minor eſt, nullis lateribus maculis eſt inſignitus, torumq; huius piſcis corpus, dempto tergore argentum eſt. Verũ tamen ſi ad eius internas partes advertas, *coſtae* quinque & triginta u-

trinque connumerabis, cernẽſque cor illi eſſe pallidum ac trigonum, pericardio incluſum: *hepar* album, unius tantum lobi, ut in Exocæto & Delphino, in cuius latere dextro fellis veſicula adſuta eſt. *Lien* à ſiniſtris apophyſibus & ſtomacho incumbit. *Inteſtina* nullas habent revolutiones. Nã gula uſque ad ventriculi fundum deducitur, qui per piſcis longitudinem delatus, ac ſurſum quidem reflexus, duodenum parit à dentibus fuſcultũ, in cuius gibbo innumertę apophyſes ſpectantur: ex quibus vena oritur, per quam ſanguis deſertur ad hepat. Apyloro ſequitur aliud inteſtinum, quod nullis anfractibus circumductum, rectã ad anum tendit. *Vulvam* utrimque bicornem habet, tenuibus *ovis* conſpicuam. Cætera in congenere piſcibus deſcribentur. Lacum Allobrogum, ut Burgetii & Æquibetii proprium Rondeletii facit. Bellonius ex Lemano quoq; ad ferri ſcribit. Caro ei candida, mollis, ſuavis, minimè glutinoſa, boni ſucci, mediocriter nutriens. Bellonius in tantis in Gallia delitiis haberi ſcribit, ut regionum œconomorum chartæ frequenter inſcriptum habent.

BEZOLA nomen huic piſci lacus Lemani accolæ dedere, Biſulam Bellonius dixit. Latine *Cephalum* vel *Mugilem Lacuſtrem*, vel potius *Lenticum* *Albulamve* lacuſtrem appellare licebit. Bellonius ſemel tantum huius piſcis meminit, Lavaretum Biſulam magis quam Umbram referre inquiens. Sed Rondeletius exactius, ut Lavaretum, inquit, Lacus Burgetius, & Æquibetii ſerunt, ita Lemanus Bezolam vulgo dictam, non admodum diſſimilem, niſi quod colore minus eſt candido ad cæruleum inclinante: roſtro acutiore, capite minore, ventre latiore & prominente. Nullum piſcem reperias, cum quo melius comparari poſſit, q̃ cum Harengo, quam in marinis depinximus. Carne eſt molliore quam Lavaretus, & ab eo ſaporis ſuavitate & ſucci bonitate multum ſeparatur, nec in pretio habetur. Proprius eſt Lemani lacus.

TAB.  
XXV.S.  
Allobrog.  
de  
piſcib. l. 5.  
c. 52.

CA.






*Trutta Lacustris. Trutta Salmonata.*



*Grond fohren Seeohrin.*



## CAPUT V.

## De Albula parva, &amp; minima Gesneri.

TAB.  
XXX.  
7.8.  
Aldrov.  
de Piscib.  
lib. 4. 53.

**A**lbula parvam non sui generis piscem esse, sed Albulam sive Bezolam cæruleam secundo tertiove sue ætatis anno ita vocari, quidam opinantur, quibus piscatores nostri, inquit Gesnerus, contradicunt quod cæruleos obseruauerint secundo etiam ac tertio anno forma coloreque à genere Albularum (de quibus hic loquimur) differre. Cognatus est hic piscis cæteris lacustribus albis. Nam & species & sapor fere omnium non dissimilis est. Albula magis quam Bezola albicat: cauda tamen & reliquæ pinne, præter eas quæ juxta branchias sunt, nigricant in extremis. Dorsus color glaucus: alicubi tamen putrei quiddam & cærulei mixtum videtur. Caput ex glauco cæruleum. Inter caput & dorsum color viridis, cuius gemma relucet. Branchiæ ei quaternæ. Hyeme aliquando memini me videre hunc piscem squamis per latera exasperatum, eminentibus per singulas squamas veluti tuberculis. Aiebant hoc indicium esse recentium & vivarum. *Capiuntur* Albulæ in summa parte Tigurini lacus, juxta locum quem *Duchberg* vocant, diebus fere quatuordecim post diem divi Martini, & ad oppidum Rappersfullam circa ipsum divi Martini diem. A *partu* in lacum nostrum descendunt (sed non tam procul ut exierit Albulæ) usque ad Ver: deinde rursum ascendunt tota ætate, usque ad divi Martini diem. Capiuntur etiam in Gryphio agri Tigurini, multo majores quam in nostro, & in Hallvillensi Bernensis agri. Augusti & Septembri mensibus præcipue laudantur, quod suaviores eo tempore solidioresque sint. Postea enim parvi, & mollior earum caro fit, & succus: si forturam consumitur.

De ALBULA MINIMA sic Gesnerus: Albulam minimam hunc piscem voco, inquit idem Gesnerus, quæ nostri Hagele vel Haling, quasi Haleculam appellant Friburgi Helvetiorum (ut audio) *Pfarten* / Lucernæ *Nachtisch* / quod noctu fere irriteriatur ut quidam putant. Sed mihi piscator Lucernensis affirmat, *Nachtisch* vocari Albulam cæruleam anno primo, cum circa diem divi Johannis ætate jam ad digri longitudinem excrevit. Tota specie accedit ad illam quam proxime albulam parvam nominavi, sed plerumque minor est, & in capite minus viridis. Si piscem erectum inspicias per dorsum aliquid coloris purpurei in lateribus apparebit. Branchiæ ei quaternæ sunt, pinnulæ albene. Ore aperto superioris mandibulæ extremitas deorsum tendit. Os habet longiusculum, dentes nullos. *Julio coëunt*. Noctu tantum capiuntur retibus ad passus quadraginta aut quinquaginta demissis. Cum cælum serenum est, altius descendunt cum nubilo, ascendunt. Densissimis gregibus præ cæteris Albulis capiuntur, non passim in lacu nostro, sed maxime à pago Vædesuilla, usque ad Insulam & versus alteram ripam à loco Surenbach usque ad arborem longam. Diebus quatuordecim fere à natiuitate Domini capi incipiunt & immixtæ eis Albulæ cæruleæ aliquot, & mox expirant. Cum capræ mox expirent, ut recentes habeantur matutino tempore potius ad prandium coëmuntur, & assi in eraticula quam calidissimi à gulonibus devorantur, quæam ob causam non universos, sed paulatim alios assari jubent, ut statim assumtis prioribus, fervidiores postea mentis afferantur. Embama additur ex aceto, sapa, pipere, sale & potri aut cepæ foliis concisis. Placet item recens in jure albo frigidum, apio copiose inspersum, maxime per mensem Decembrem. Sale idem conditus infumatus, quæ commendatur.

## CAPUT VI.

## De Albo Salviani &amp;

## Farra.

TAB.  
XXX.  
9. 10.  
Aldrov.  
de Piscib.  
l. 5. c. 55.

**A**lbus Salviani, *Capto lacustris* Gesneri est. Quamvis Squalo Alburno appellato pisci per similitudinem ab eo tamen evidentibus quibusdam notis facile internosci potest. Primum enim est uterque latitudinis ratione oblongus appareat, eadem nihilominus utriusque existente latitudine, Albus paulo longior Alburno conspicitur. Deinde rostro acutius, oculis majoribus ac dorso magis repando Albus est. Nam cum Alburni sensum atque modice, Albi repente ac plurimum à capite extuberat *dorsum*. Pinnarum autem tum in lateribus, tum in dorso ac in imo ventre existentium, situ ac numero ei cum Alburno conveniente, earundem colore ab invicem discrepant: subnigras enim Albus: subrufas verò Alburnus eas habet. Postremo amplioribus *squamis* albus tegitur. Ventreque atque lateribus, æquè atque Alburnus candidus atque argenteus est: capite vero ac dorso magis quam ille subviridis. Magnitudine non differunt. Uti enim Alburnus, sic & Albus pedalis, frequens: bipedalis verò aliquando tantum reperitur. Lacustris piscis est, non tamen in lacubus omnibus aut eorū quam plurimis, ut Tinca, Lucius, Squalus ac Barbus, sed eorum nonnullis solum reperitur. In Trasymeno enim lacu, ubi etiam Albo vulgo vocato, frequens satis in fine veris capitur. In fluminibus eum reperiri huc usque non observavimus: estque advertendum, ne quisquam eum in fluminibus etiam reperiri contendens, Squalum pro Albo nobis ostendat, in mari nec nascitur, neque ex lacubus fluminibusve ad id descendit. Duram *carne* habet Albus, & propterea ægre coquitur. Insuper adeo est, ut piscium omnium jure vilissimus censeatur.

Nec enim ulla condiendi ratione sapidus effici potest. Torrefactus tamen paulo minus ingratus est palato, solumque in aliorum piscium penuriam vesci solemus.

FARRA, Fora & Pala quoque dicitur. Lavaretos vel Thrissas refert, ut scribit Rondeletius, magnitudine cubitali, ore parvo, sine dentibus ut in Thrissis, colore cinereo, corpore depresso & lato, *squamis*, pinnarum situ & numero Lavaretis similis, linea à branchiis ad caudam recta & candida ducta est. Pinnulam dorso mollem pinguemque habet, caudam latissimam. *Carne* est candida & suavi, quæ Lavaretorum Truttarumque carni non cedit.

Æstate & autumnio capitur, hyeme in altis gurgitibus latet. Sale conditur & servatur in hyemem. Sic ille. Cæterum monendus est Lector in Rondeletii codicibus diversum piscem, quem in Lemano Vangeroni vocant, huic capti haud recte per librarios incuriam præfigi.

## CAPUT VII.

## De Pigo, &amp; Schilo.

**P**isci, quem describuri sumus, Verbanus Latiusque lacus accolæ *Pici*, *Pigi* & *Picui*, quod clavis suis seu aculeis pungat, nomen imposuere. Rondeletius *Cyprianum clavatum*, Albertus *Vergiliadem*, quod Vergiliarum ortu apparent, dixit. Cypriano, describente Rondeletio ita est, similis, ut demptis aculeis Cyprianum esse affirmes. Est enim eodem corporis habitu, pinnas totidem eodem loco sitas, os, oculos, eodem modo carnosum, interna omnia similia habet. Vita item, moribus, sapore, succo Cypriano similis, nisi quod paulo melior est. *Salvianus diligenter sic descripsit*. Pigus piscis est capite rotundo: rostro obtuso, nec admodum extento, ore mediocri & edentulo.

Bran-

Branchias habet utrinque quatuordecim, & juxta eas, pinnas binas, utrinque vnâ: aliasque in imo ventre, caudæ magis quâ capiti vicinas. In dorso fetæ medio una haud magna, nullis aculeis armata repetitur. Imo vëtri ppæ caudâ alia una etiâ minor hæret. *Cauda ipsa* in falcatam pinnâ definit. Totius *figuræ* paulo lōgior esset, ovata describeret. *Squamæ* magis regitur, ex quatuor medio albi & pyramidati *aculeis*, in fine veris & ineunte æstate, enascuntur. Quibus cum primis 40. æstivis diebus horreat, æstate procedente imminuuntur primâ, demûq; protus delitescunt. Quapropter primis illis æstivis diebus dempeis, reliquo anni tempore prædictis pyramidatis aculeis omninō caret: unde cū Plinius scribat: Duo lacus Italiæ in radicibus Alpium Larius & Verbanus appellatur, in quibus pisces omnibus annis vergiliarum ortu existunt squamis conspicui crebris atq; præcutis clavorum caligarium effigie, nec amplius quâ circa eum mensem visuntur. Dubio pcul Pigum piscem, etsi innotatatum eum relinquit, describit, cū is (ur infra monstrabimus) Lari & Verbanus lacus alumnus sit, & (uti diximus) in prima æstate (quo quidem tempore vergilæ exoriuntur) eius squamæ parte media, clavorum caligariū instar, præcutie fiant. Habent enim caligares clavi, qui à caligis militibus, quibus suffigebantur, dicti sunt, pyramidata capita. Eiusmodi aculeos, sicuti Majo & Junio tantum mensibus, in dorsoq; solum & lateribus; & nō in vëtre, Pigo enasci asseverant omnes, sic nō sceminas, sed mates tantum in hortesce, testantur nonnulli. Venter ex albo languide rubet: tergus ex cæruleo nigricat. Quod ad inctanea atinet, nil habet præ cæteris piscibus peculiare atq; animadvertione dignum. Cum maximè excreverit, quinas aut senas libras nō excedit. Solius Larii atq; Verbanus lacus accola est. Nemo enim in alio lacu fluminive eum reperiit hucusq; (q; sciam) animadvertit. Er licet frequentiores in prima æstate, cum clavis illis caligariis insigniti appa-

rent, in iis lacubus capi soleant, reliquis etiam omnibus fetæ anni temporibus, in eisdem, etsi non æque crebro, capiuntur. Majo Mense circa lacus littora *parit*. Sapore & succo Cypriano est similis, paulo tamen melior. Salvianus ei carnem tribuit teneramque sapidissimam, ideoque cum optimis quibuscunque dulcis atq; piscibus conferti posse & maxime in æstatis principio captum: hoc enim tempore nulli piscium esse secundum, & quovis denique modo conditum, probe semper sapere.

SCHILUM, qui & *Negemulus*, ita describit Gallerus. *Magnus* piscis est in Ambronis lacu Bavaricæ, qui raro capitur, quoniam raro altius natando evchitur. Longissimus ulnam æquat. Formâ non dissimilis est Lucio, nisi quod in aqua subviridis, extraquam verò diluor apparet: oculis albicantibus, ore tetro juxta maxillas miuus lato. Squamarum magnitudine, ordine & asperitate Percam testert. Pinnæ dorsi erectæ, *aculeis* tres fere digitis rigent. Præter dorsi spinam paucas alias & parvas habet. Parit Martio. In cibo quidem oprius est Majo & Junio. Elixatus, assatus & frustatim concisus etiam frigi solet. Pinguis est admodum, & carnem etiam coctus albiissimam servat.

Aldrov. l. 2.  
cap. 59.

## CAPUT VIII.

## De Saracho.

Piscem quem Albanenses *Sarachū*, TAB. Ichtyopolæ *Sarachinū* vocant. Bel-XXX. lonius *Agonum*, Jovius & Salvianus *Aconem*, Fracastorius & Jovius *Aquonem* vocant, ab ossiculis sine dubio il-*l. 58.* lis acuris, quæ asperam spinosamque in eius ventre lineam constituunt, & veluti acus quidā sunt. Rondeletius *Chakidem*, quem Gaza *Aëricam* vocat, dici opinatur, alicubi fortè *Sardanelia* dicitur. De ipsotum Genetibus *Bellonius*. Tres sunt apud Insulæ lacus in quibus piscem vulgari *Mediolanenium* idiomate, *Agonum* nominatum capiunt, varium quidem cum.

Bellon. de  
Aquatilib.  
l. 2.

Larius



Larius enim lacus, qui hodie Comienfis cognominatur, Agonos educat exiguos ac magis populares, Sardis similes, dempto quod ventre sunt latiore: neque alio quam Mediolanum transfertuntur, aut saltem raro Mantuam prætergrediuntur. Eos doliis muriâ conditos adseruant, quam etiam mediocriter sicci sine muriâ cõperiantur. Verbanus lacus, quæ lacum majorè cognominant, multo majores Agonos quâ Larius educat. Indi, enæ urbiis, quæ ad eius litus sitæ sunt, Aronan, Palenzea, Cornobio, Locaria & Eugudrà vocatos pisciculos magno proventu capiunt, mediâ magnitudine inter Laros & eos ex lacu Lugaræ, quos Indignæ urbium nominant *Campignon* & *Blisson*. Benacus autè Lacus magnitudine insignes Agonos profert. Sed nec Urbani aut Benaci Agoni muriâ conditi solent, ut minores. Hæcille, & mox rursus de Saracho. Duo, inquit, tresve lacus sunt in Epiro, in quib. Sarachi capiuntur, quos ubi sale condierint, exiccauerint, & fumo infecerint, Venetias, Anconâ & aliò navigiis transeunt. Quorum eos maximè in pretio habere solent, quos de la Boiane huius nominis flumine ac lacu cognominant. Horum verò duo competuntur *genera*, alterum minus, alterum autè Clupeæ ferè magnitudinis. Minores Sarachi quadrante longiores non sunt, maiores pedalem implent longitudinem. Ambo eadem linea sub ventre præditi sunt, quæ Clupea insignita est. Cæterum Agoni omnes (inquit idè Bellonius) *squamæ* habent levi contactu decedentes, renues, latas & transparentes: corpora argenteo colore nitentia, sed parum nigricant in tergo. *Desquamati* super argentum terisissimum resurgunt. Oris rictum habent grandiusculû sine *dentibus*: pinnâ in tergo simplicem, parvam, duas in lateribus sub branchiis, quarum omnium cæteris tegumentum spinæ in medio erenarum est. Oculos valde grandes proferunt, caudam in penicilli modum discissam. Utrinque nonnunquam lituris duabus, rotundis, ac nigris, interdum pluribus sigillatur in tergo. *Lineam* sub ventre

habent ferratam, ad anũ definentem, quam si digito in adversum cõfrices, cultri modo acutum percipias. *Branchias* habent utrinque quatuor, in crinâ parte veluti fimbriatas, quod etiam Harengis, Celerinis & id genus piscibus accidit. Cor ut seimen Cieerculæ teigonom inter anteriores pinnas sub branchiis occulratum. *Hepar* subtrubrum sinistro stomachi lateri & cælophago incubans, ipsumque pylorum amplectens. *Stomachus* figura in conum turbinatus, à cuius superiore parte pylorus exit, multis apophylibus cæcis ac circumdatur. *Lien* dextræ Stomachi parri, inhæret ruber, à pyloro intestinũ non reflectitur, sed recta ad anum tendit. Triginta sub ventree *officula* acura, aspera à in hoc pisce lineam constituentia, connumerare potes. Hæc omnia itaque Bellonius, quibus addi potest, Hæc pisces ita pinguescere referente Rondelerio, ut cum in craticula assantur, pinguitud o veluti oleũ distiller, adeo ut ab hæ pinguedine, sint qui *Liparim* appellent. *Carnivori* sunt, & pulices aquaticos venantur. De *generatione* prodiit Salvianus, Acones feminas oviv gravidas, maribus semine refertis consequentibus, ad saxosa litora Mayo menie adnatæ, ibique illas parere sua ova, hos semine fecundare, moxque pusillos inde præcreari pisciculos, qui intra paucos dies ad digiti augeantur magnitudinẽ, tuncque vulgo *Antefiros* vocari. A qua exempti mox *emoriuntur*. Gregatim *vivunt*, & temerè in retia incidunt. Adeo sunt *timidi*, ut vel à tremula umbra terreantur. A Lucis, Cyprinis & Trurtis adeo sibi metuunt, ut aliquot aliquando millia, insequentem inimicum longo per lacũ tractu pavidi fugiant, jucundo intuentibus spectaculo. Alosis sapore persimiles, vere graciosi, autumnio optimos Jovi facit. Salviano Julio, Augusto, Septembri & Octobri mensibus probantur. Crassiusculû tamè succũ gignunt, difficulter concoquuntur, & mediocriter nutriunt. Cum sciendi causa exenterantur, oleum ex interaneis ad lucernarum usum colligitur. *regium*

HISTO-



*Porcus Supinus Salinus.*



*Gobius Bellatrix Salu.*



*Alburnus Salu.*



*Melano vel Bleonius Salu.*



*Thymus Salu.*



*Coprinus Salu.*



*Saker et Varius.*



*Oliv.*



*Rubellus Salu.*



*Barbus Salu.*



*Salmo Salu.*





# HISTORIAE NATURALIS

## De Piscibus

### LIBER IV.

#### De Piscibus Exoticis.

#### TITULUS I.

#### De Piscibus squamosis.

#### CAPUT I.

#### De *Tajasca*, *Parn*, *Pira-Acangata*, & *Acaraua*.



Oterant quidem & isti, quos hoc libro trademus pisces, ad sua genera in praeteritis referri: verum cum tardè nimis ipsorum descriptiones & icones in manus nostras pervenerint, coacti sumus eos peculiari libello includere.

**TAB. XXXII.** *Tajasca* itaque prout Brasiliensis vocatur: piscis est octo aut novem digitos longus, corpore obterete & pyramidal, extenuatur enim versus caudam. *Caput* est illi grossiusculum & compressum: *Oculi* eminentes & nigri, circello aureo: os edentulum. Sex habent pinnae; nimirum sub qualibet branchia unam oblongam, sub his in medio inferius unam brevior: unam in medio dorso, aliam longiorem versus postremam dorsi partem, & è regione huius unam in infimo corpore: septima est cauda, oblonga & in exitu rotundata. Tegitur squamulis parvis, coloris hyalini pallidi, maculis variis fuscis vermiculatis variegatus per totum, exceptis pinnis postbranchialibus & infimo ventre, quae ex pallido subflavescent.

Cauda est undata fusco. Latet in arena absconditus: ideoque capitae pedibus, eos ponendo super arcnam ubi latet.

Cochus atque assatus bene sapit & convenit cum Hollandorum *Post*: est enim carne albissima & friabili.

**PARV.** Piscis est latus & subrotundus, verum haud crassus, novem aut decem digitos longus ab ore ad pinnam caudae quae duos & semis digitos longa & totidem lata. latitudo piscis septem digitorum. *Pinnae* obtinet sex: duas magnas ac latas duos circiter digitos unam in dorso, alteram in ventre, quae utrobique ad caudam extenduntur; habetque quaevis pinna in fine prominentiam instar funiculi, ea videlicet, quae in dorso quinque digitos, quae in ventre tres digitos longam. Post branchias in quolibet latere etiam pinna est duos digitos longa, unum lata; & duas in inferiori ventre sub his, duos digitos longas, angustissimas. *Capite* est parvo, ore elato, angusto, minutissimis dentibus albi coloris; oculis conspicuis, flavo circulo circumdatis. Totum corpus vestitur squamis mediocribus, quarum dimidius nuncius niger est, dimidius autem flavescit, ita ut lunulas flavas in nigricante corpore gestare videtur. Circa branchias flavedo est, & in initio pinnarum, post aures macula flava in qualibet.

Piscis est edulis.

**PIRA ACANGATA**, id est, piscis duro capite: Perex mediæ magnitudine, septem aut octo pedes longus, ore haud amplo, oculis nigris, circello nigricante aureo & rufio colore mixto. *Pinnas* habet sex & septimam pro cauda: duas postbranchiales, duas in infimo ventre junctas, unam versus postetiora in ventre, & unam per totius dorsum longitudinem usque ad caudam extensionem & erectam, firmis spinis suffultam quam in vaginam recondere potest. Pinna caudae furcata. Tegitur squamulis argenteis, aureo & igneo colore transplendente, praesertim in dorso: in ventre in argenteo thalassinus color translucet.

Z Pinna

Pinna dotfi argentea transplendens & maculis fuscis insignita. Pinnae laterales albæ, quæ in ventre cærulefcentes. Caudæ quoque pinna in extremitate cærulefcit. Est edulis.

ACARAYNA, Piscis magnitudine exæquat Paru, sed non est ita latus, & squamulas habet nigricantis coloris. Cauda est bifida, pinna tres digitos longa, duos lata. Pene utramque branchiam etiam pinnam habet, inferius in antica parte duas angustas. Per totum dorsum & per ventrem etiam pennam utrobique extensam, acutam, continuam, in postica parte corporis circiter unum digitum latam. Os parvum, angustum, denticulis minutissimis. Oculi haud magni. In utroque latere prope caudam acutissimum habet aculeum; quos in latera potest recondere & evaginare & alios pisces lacerare: quilibet aculeus ferè digitum longus esse piscino constans.

Piscis est edulis.

## CAPUT II.

### De Guaperua, Piranema, & Acarapucu.

TAB.  
XXXII.

3.

Marcgrav.  
Hist. Bras.  
lib. 4. c. 2.

GUAPERUA Brasiliensibus. Piscis est corpore lato & compresso, quatuor digitos longo, tres lato, ubi latissimus. Ore parvulo, denticulis minimis. Pinnae habet sex: post quamlibet branchiam unam, parallelogrammi figura: in infimo ventre duas oblongas: in dorso & inferiore ventre extremo longam ac latam, quæ in acumen desinunt, subulæ figura. Cauda quadrata seu potius parallelogramma, unum digitum longa, duas tertias digiti lata. Tegitur squamulis coloris nigri, splendentis instar bombycini, quarum oræ (non omnium sed quarundam) fimbrias flavas habent instar semilunularum. Pinnae sunt nigrae, Circa os linea crassa purpurei est coloris, & illi perpendiculariter altera

supposita Corpus tres lineæ latæ ambiunt, quarum duæ per latus & posticas pinnae extenduntur. Caudam etiam talis secat linea & ejusdè coloris, una pro fimbria ipsi est oculorum pupillæ nigra, circulo aureo.

PIRANEMA, Piscis mediocri Capionis seu Percæ magnitudinis novem, decem aut undecim digitos longus; latus, ubi maxime, tres digitos aut paulo amplius, Os habet amplum, subrotundum, edentulum quidem, sed acutissimis prominentis asperum: oculos magnos instar solidi Hollandici, pupilla crystallina, circulo autem splendente, qui superius ad dimidiam partem coloris est miniati. Branchias habet admodum amplas. Pone has in quolibet lacerare pinnae digitum quidem longæ sed haud latæ, & subter has in ventre duæ sibi propinquæ duos digitos longæ & sesquidigitum latæ, triangulares, spinis suffultæ. A ventris medietate ad caudæ exortum usque pinna protenditur tres & semis digitum longa, unum lata, itidem spinis intertexta, quam abscondere fere potest in rima ad hoc comparata: per unum dorsum ab occipitis fine ad exortum caudæ pinna extenditur quinque digitos longa, paulum plus digiti lata, tenui membrana constans, duabus & viginti spinis intertexta, quam erigere atque deprimere & fere abscondere potest in rima. Cauda quæ à corpore protenditur sesquidigitum est longa, unum lata, pinnam habet tres & semis digitos latam, & plusquā sesquidigitum longā. Calor rotius piscis est argenteus laccatus laeæ florentina. Squamulas habet minutulas quasi triangulares: in ventre plus albicat, seu argenteo minus laeæ inermixtum cernitur.


Capitulum in mati & boni est saporis, edulis.

ACARAPUCU, fluviatilis piscis, instar sesquipedalem longitudinem exerceat, ubi latissimus quatuor aut quinque digitotum. Os acuminatum circiter

Taiarica.

Para.

Tab. XXXII.



Guaperna.

Andino Vermello.




Pachone Verde.



Laetaria.



Carana.



Grachetys tuba.



Torvala.



Propaganda.



Acura Puma.





citet duos digitos longum, haud amplum, labia abscondere & contrahere potest ut solum hiatus appareat, nullos habet dentes. *Oculi* magni, pupilla nigra splendente, circulo ex albo & fusco mixto. *Pinnas* habet septem: unam per dorsi longitudinem ad caudam fere extensam, non latam, quam erigere & spinis sustentare, atque recondere potest: postbranchiales duas, totidem in infimo ventre, unam postanum: Septimam pro cauda, furcatam quatuor aut quinque digitos longam. Totus splendet squamis argenteis minoribus: in dorso tamen aliquid aurei admixtum: & in quolibet latere sex oblongae maculae caeruleae rustescentes, non ita conspicuae. Pinna dorsi & cauda dilute cinerei sunt coloris, ut & laterales: duae in infimo ventre flavescunt paulum, ut & ea quae prope anum. Edulis est.

## CAPUT III.

*De Pudiano vermelho, Pudiano verde, & Iurru-  
capeba.*

TAB. XXXII. **P**UDIANO Vermelho vulgo, sed re-  
ctius *Bodiano*: Brasiliensibus *Aipi-  
mixira*, & *Tetimixira*, Piscis medioctris  
Percæ magnitudine. Latitudo cor-  
poris, ubi maxima, duorum digito-  
rum prope caudam unius aut paulo  
plus. Corporis fere æqualis latitudo  
est. *Caput* parvum, acutum, superius  
in anteriori parte tres denticuli acuti,  
minimi, inferius item, & versus inte-  
riora in utraque mandibula alii mi-  
nimi denticuli. *Oculus* habet paulu-  
lum eminentes, pupilla nigra, ex-  
teriori albo, hinc flavo circulo. *Pin-  
nas* habet septem: nimirum duas plus  
digito longas, haud latas, post bran-  
chias in utroque latere unam: sub his  
duas junctas in ventre: aliam in ven-  
tre versus caudam duos digitos lon-  
gam, secundum longitudinem adna-  
tam: unam item talem in dorso, tres

& semis digitos longam: & septimam  
pro cauda, quæ est quadrata, digiti lon-  
ga & lata. Tegitur piscis squamis sub-  
tilibus, ita arctè cõplicatis, ut ad tactum  
glaber esse videatur. *Color* totius cor-  
poris flavus cum aureo mixtus. Sum-  
mitas aurem capitis & totum dor-  
sum ad media utrimque latera, & fe-  
re usque ad finem dorsalis pinnae pur-  
purei est coloris egregii cum lacca  
mixti: extrema ora pinnae majoris  
in ventre versus caudam etiam pur-  
purascit ut & pinnae illi junctæ tota-  
liter: reliquæ pinnae flavæ cum aureo  
colore mixtæ, ut & totum reliquum  
corpus. Pars utrimque pinnae majoris in  
dorso etiam flava ut & cauda. Piscis  
est edulis.

*Pudiano Verde* Lusitanis. Piscis ob-  
longus, nimirum decem digitos ab o-  
ris extremo ad caudæ initium: cor-  
pus tres digitos latum, circa caudam  
autem sesqui. *Os* acuminatum, haud  
amplum, antetius in superiori man-  
dibula habens duos dentes acutos,  
longos: & seriem denticulorum mi-  
norum: inferius in anteriore par-  
te quatuor, longos, acutos, & seriem  
minutorum candidorum. *Oculus* ha-  
bet parvos, pupilla nigricante, circel-  
lo primum auteo, dein exterius al-  
bellescente. *Pinnas* obtrinet septem, nimi-  
rum unam per dorsi longitudinem exten-  
sam, sex & semis digitos longam, di-  
midium latam, quam spinis erigere &  
sustinere potest: post utramque bran-  
chiarum unam, duos digitos longam,  
paulo plus uno latam: sub ventre duas  
parvas junctas: à medio autem ven-  
tre inferiori una tendit pene ad cau-  
dæ exortum, quatuor digitos longa,  
unum fere lata: Septima pinna est  
cauda, quæ est quadrata aut paralle-  
grammi figura, sesquidigitum longa,  
duos lata,

Torus piscis vestitur squamis latis  
quæ ita compositæ sunt, ut meri cubi  
sibi apposti videantur, lutei seu aurei  
coloris ac per totum ambitum linea  
seu fimbria elegantissima azuri seu cæ-  
rulei coloris. *Caput* superius autem  
est cum magna macula coloris ex vi-  
ridi thalassini, circumdata azureo &  
azureis flavis subvinctibus & albican-  
tibus.



tibus striis variegatum. *Pinna* duæ laterales seu postbranchiales & duæ in ventre albicant, in laterali ambitu cærulea lineola præditæ. *Pinna* dorsalis aurei est coloris & striis undulatis cæruleis secundum longitudinē notata, quæ in ventre major ex ruffo ad brunum vergit colorem, striis itidem cæruleis secundum longitudinem. *Cauda* rufescit striata thalassino ac cæruleo secundum longitudinem, in extremitate autem paululum virefcit.

Piscis insignis coloris & edulis. Capitur in mari.

*Inrhynchops*, aut etiam *Itaiara*. Piscis longus septem aut octo digitos, duos aut tres latus, ubi larissimus: ore satis patulo, & ex triangulari rotundo lingua angusta, brevi, denticulis minutissimis: oculis rotundis, pupilla crystallina & circulo rubro. Post branchias in utroque latere habet pinnam sesquidigitum longam, quadratam & exteriori circinatam: subter has, duas in inferiori vente junctas; paulo post occipitium incipit pinna anteriori medietate spinis suffulta, posteriori mollis, quæ tendit secundum longitudinem dorso ad eandem usque, & semper fit latior, prope caudam digitum lata. In inferiori corpore versus caudam etiam pinnam habet haud amplam. *Cauda* constat pinna sesquidigitum longa, plus uno lata & quadrata.

Squamatus piscis, sed squamis ita complicatis ut lævis esse videatur. Pileis universi color egregiè ruber, in ventre autem ex rubro & albo maculatus; in lateribus autem constanter maculas habet puniceas, nigras, varias, majores & minores. *Pinnae* omnes sunt rubræ & nigro maculæ.

Pinguis est piscis & boni saporis, optimus tamen assatus. Capitur in mari inter scopulos. Parieti recens appensus noctu toto corpore clare lu-  
cet.

## CAPUT IV.

*De Iaguaraca, Caranua, Cururuca, & Guatucupa Iuba.*

**IAGUARACA.** Piscis est mediocris <sup>TAB. XXXII.</sup> <sup>7-8-9.</sup> <sup>Maregnan.</sup> <sup>Hist. Brasil.</sup> <sup>lib. 4. c. 3.</sup> <sup>ore acuto,</sup> <sup>per</sup> <sup>dorsum</sup> <sup>verò</sup> <sup>secundum</sup> <sup>longitudi-</sup> <sup>nem</sup> <sup>extenditur</sup> <sup>pinna</sup> <sup>digitum</sup> <sup>lata,</sup> <sup>usque</sup> <sup>ad</sup> <sup>unum</sup> <sup>digitum</sup> <sup>ab</sup> <sup>initio</sup> <sup>caudæ,</sup> <sup>constans</sup> <sup>tenui</sup> <sup>membranula</sup> <sup>undecim</sup> <sup>spinis</sup> <sup>acutissimis</sup> <sup>suffulta,</sup> <sup>quam</sup> <sup>potest</sup> <sup>elevare</sup> <sup>&</sup> <sup>substernere</sup> <sup>prohibitu:</sup> <sup>atque</sup> <sup>non</sup> <sup>solum</sup> <sup>compo-</sup> <sup>nere,</sup> <sup>sed</sup> <sup>&</sup> <sup>abscondere</sup> <sup>in</sup> <sup>rima</sup> <sup>eui</sup> <sup>pinna</sup> <sup>insidet.</sup>

*Pinnae* habet in lateribus & infimo ventre similes præcedenti pisci: per dorsum verò secundum longitudinem extenditur pinna digitum lata, usque ad unum digitum ab initio caudæ, constans tenui membranula undecim spinis acutissimis suffulta, quam potest elevare & substernere prohibitu: atque non solum componere, sed & abscondere in rima cui pinna insidet.

Hanc sequitur alia contigua unum digitum lata, perringens ad caudæ exterrum, duos digitos longa, triangularis & superius desinens in acumen. *Cauda* autē pars reliquo corpori sub-  
rentia rotunda est, sesquidigitum longa, continens pinnam furearam, cuius pars interior duos digitos longa, superior paulo longior. Ad branchias in utroque latere, in quolibet duos habet aculeos, in quorum medio alii sunt minimi: his branchiis & aculeis ferit & vulnerat: ferit etiam cum spina dorsali & cum iis quæ sunt in infimo ventre, ad quarum singularum latus aculeus est satis longus, & quidem in pinna prope caudam in infimo ventre spina est unū digitū longa.

Totus piscis testus est squamulis eleganter dispositis; & quilibet squamula in ambitu minutissime est serrata. Color totius corporis est rufus, in ventre plane albicat. *Caput* superius incarnati est coloris, & hispida testa munitum. *Pinnae* omnes coloris sunt dilute incarnati: ea autem quæ in dorso spinis suffulta, prope spinas auro est umbrata.

*Cara* pinguis & boni saporis, præfertim si piscis alicur. Capitur in mari inter scopulos.

*CARAHA*. Magnitudinem & figuram habet ut *Iuruncapaba*, differt tamen capite & colore corporis. *Pinnæ* quoque eodem modo politas habet ut ille. *Ora* autem obtrinet lunatum; dentesque habet acutissimos, sed minutos: *Branchias* amplas, quæ aculeis in postica parte sunt munitæ. *Oculi* versus summiratam capitis in lateribus positi non longe ab invicem haud magni, pupilla ovali nigra, quam ambirculus ruber. Squamulis in universum vestitur lunatis, coloris miniatiper torum, & ubique punctula nigra, magnitudine seminis papaveris insparfa, habet, præterquam in ventre.

Capitur in mari inter scopulos: est que edulis, molli admodum carne atque boni saporis.

*CUTRACA*, species *Corvina*; Piscis fluviatilis, sesquipedem longus, corpore oblongo, ore satis amplo, oculis mediocribus, nigris. *Pinnas* habet septem: unam per dorsum longitudinem ad caudam ferè protensam, quæ divisa est & prior pars latior, tres digitos ferme; & totidè longa, triangularis, spinis suffulta, posterior longior, sed exiliot. Cauda fere quadrata. Squamas habet mediocris magnitudinis argenteas cum auro & subfusco paucio mixtas, præferrim in dorso & lateribus. *Pinnæ* in dorso & lateribus ac cauda, cinereæ; in medio ventre flavescunt, & fuscescunt. Edulis est.

*GUATACUBA INBA*, in duorum pedum longitudinem excrevit, dorso paulù incurvato. *Ora* habet triangulare, acuminatum, dentes parvos acutissimos. *Oculos* magnitudine stufeti Hollandici, pupilla magna, nigra, splendente circulo rubro. *Pinnas* habet molles sine spinis in lateribus; nimirum unam in quolibet latere, post branchias, angustam, duos & semis digitos longam: duas tales junctas & ventre subretillas unica spina munitas: & unam prope anum digirum longam ac latam, unica quoque spina armatam. Ante medium dorsum versus occiput, inci-

pit pinna desinens ad caudæ initium, quinque digitos longa, unum fere lata, quæ duabus & viginti spinis erigitur: cauda duos pene digitos longa, unù lata, pinnâ habet plus uno digito longâ & quatuor latam paululumque exterius versus interiora arcuatam. Vestitur squamis paulo majoribus, coloris argentei & stris flavis & ex argenteo rufescentibus secundum longitudinem extensis à capite ad caudam usque. In utroque latere etiam à capite ad caudam eminenti lineâ tendit. *Caput* ex argenteo, rufo, flavo puxtù. *Pinnæ* albæ sive argenteæ, caudæ pinna ruffa: venrer albus.

Capitur in mari inter senpulos. Boni est saporis, & lingua & caro circa mandibulas longè optimi ut in *Carpione*.

## CAPUT. V.

*De Pira lurumenbeca, Tamoata, Acara, & Pira Pixanga.*

**P**IRA JURUMENBECA vulgo *Boca* Tab. XXXII. *molle*, quia molli ore & aquis extractis statim moritur: vivit in mari in cæno: oblongus, piscis haud latus: novem aut decem interdum pedes longus, duos & semis latus, ubi larissimus. *Ora* habet elevatum, quod ampliari & rotundare potest: oculos magnos, pupilla crystallina, circulo ex argenteo & brunno mixto. *Septem* habet pinnas, duas angustas postbranchiales, duos digitos longas: duas in infimo ventre junctas, duos fere digitos longas, unum latus: unam post anum firma spina suffultam: sextam per dorsum extensam & bifectam; anterior eius pars sesquidigito longa, unum lata, triangularis, quam erigere & in rimam recondere potest, mollis & translucens, altera pars usque ad caudam fere porrecta, tres digitos longa, semidigittum lata, itidem mollis. Septima est cauda, duos fere digitos longa, sesquidigittum lata, figura pentagoni cuius basis inserta in corpus.

*Squamæ* habet toto corpore argenteas, splendentes, mediocris magnitudinis: in dorso viridis & aureus color transplendet. Pinne argenteæ & in medietate exteriore aureæ. In quolibet latere tinea tendit paulum elata, etiam a argentei coloris ut reliquum corpus.

Eduilis est & boni saporis.

*Idem lib. 4. c. 5.* TAMOATA, Lusitanis soldido (quia armatus) piscis fluvialis seu aquæ dulcis, edulis. Longitudo corporis ab occipitio ad initium caudæ tritum & semis digitorum; longitudo capitis unus digitus; latitudo paulo major. Crassities corporis ubi maxima, nimirum post occipitiū, tritum, circa eandem duorum. Caput latum tanquam ferre modo; non haud amplum; ad cuius quodlibet latus filum habet unū digitum longum instar barbæ, os edentulū. Oculi minimi crystallini, magnitudine seminis papaveris, circello aurato cincti. Pinna obtinet octo; ad quolibet lateris branchiam unā, digitum longam, firmam instar cornu in uno latere, directe à latere protensam: duas in infimo ventre, non ita firmas at eiusdem magnitudinis: unā in medio dorso, alteram in eodem dorso prope caudam, minimā: unā parvam in infimo ventre prope caudam & octavam pro cauda, digitum longam & latam. Totum caput superius tegitur testa dura instar elypei: & universum corpus vestitum est lorica ex oblongis squamosis corporibus composita: suntque hæc corpora per ambitum minutissime serrata & quadruplici ordine tota lorica disposita: id est, cocunt partes seu squamæ lorice in utriusque lateris medio, in dorso & in infimo ventre. Color rotius piscis obscure ferreus, præsertim in capite. Carne bona est.

Piscis hic aqua carens in fluvio ubi est, rempore sicco, per terram abire ac aquam quat.

*Idem lib. 4. c. 6.* *Acara Pinima*. Piscis est latus, dorso incurvato, sex aut septē digitos longus, quatuor latus, ubi latissimus, patvi Carpionis figura aut verius Perce mlinicæ. Os habet haud amplum, denticulos minutissimos: oculos satis ma-

gnos pupilla nigricante et transplendente, circulo rubro, fulco & albo: *Pinnæ* septem; unam per totum dorsum extensam & continuam versus anteriorem minus uno digito latam, versus posteriorem latiore; huius pinne medietas anterior spinis suffulta est & illam in rimam potest recondere: post branchias in utroque latere unā duos digitos longam, haud latam, in medio ventre duas junctas semidigitū ferme longas firma spina sustentatas: inter anum & caudā infertur itidem unam firma spina munitam: Septima pro cauda est furcata, plusquā sesqui digitum longa, totidem lata.

Totus vestitur squamulis argenteis ex auro splendentibus: in quolibet latere septē magnas habet strías secundum longitudinem ad caudam usque extensas, coloris fuscæ splendentis (in quibusdam aurei seu lutei) à summo item capite per utrumque oculum ad extremitates otis, in quolibet latere capitis lara stria nigra descendit, ad cuius ortū aliquid cærulei admixtum est. Ultra harum striarum exortum in dorso, nimirum ubi pinna dorsi initium sumit, itidem per quodlibet latus descendit nigra stria usque ad exortum pinne lateris seu oram branchiarum. Omnes pinne & cauda coloris sunt lutei seu aurei splendentis. Capitur in mari inter scopulos: & est edulis atque boni saporis.

*Pira Pixanga*, Belgis *Barotsch* quia in initio antri inter scopulos degit in mari. Longus est novem digitos, ab initio oris ad exortum caudæ. *Cauda* duos digitos longa. *Os* sesquidigitum amplū, minutis sed acutissimis denticulis præditum. *Caput* haud magnum: oculi magni, prominentes, pupilla coloris instar Turcoïdis optimi, circulo nigro, cū aureo & sanguineo mixto. Branchiæ in triangularem figuram desinunt, ampla & acuta spinula prædita. *Pinnæ* habet septem: unam per totum dorsi longitudinem extensam, unum ferme digrum latā, & in postica parte latiorē, cuius prior medietas unde cum firmis spinis sustentetur, posterior est mollis.

Post

Post branchias In utroque latere unam, duos digitos longam & totidem latam, subrotundam & carnosam: duas junctas in medio pene infimo ventre, unica spina singulas firmatas: unam mediocrem post anum spina munitam. Septima est pro cauda, duos fere digitos longa & totidem lata, non secta sed extremo ambitu subrotunda. Tegitur squamulis parvulis per totum corpus, ad tactum glaber nisi à cauda versus caput digitis fricetur. Totum corpus, caput, pinnae, cauda ex albo flavescunt: & per totum variegantur maculis sanguinei coloris dilutis, rotundis, magnitudine seminis canabis: quaedam etiam in ventre majores. Pinnae eodem modo maculatae in ambitu suo ohsecurius rufescent. Figuram ferè Auratae habet. Eduliscit ac boni saporis.

Capus per trihorium extra aquam potest vivere: bihorium postquam mortuus esset, aperiebam illum & cor adhuc movebatur exemptum: cor situm erat statim post fauces, & aspera arteria in id inferebatur, et atque digitum remotum à reliquis visceribus per media stinum; minimum utique & vix granum tritici aequans etiam quando à spiritu inflatur.

## CAPUT VI.

## De Vubarana, Capeuna, &amp; Acarapitamba.

TAB.  
XXXIII.  
1. 2. 3.  
idem II. B.  
tab. 4. 5. 7.

**VUBARANA.** Piscis figura corporis Trutæ nostrati similis, ubique ferme æqualis crassitie, paulum tamen in dorso exaltatus, versus eandem autem angustior. Corpore oblongo, quadratè cylindraceo: pedalis longitudinis, semipedem crassus. Caput acuminatum seu coactum, haud magnum: oculi stufieri magnitudine, pupilla nigra, circulo primum aureo, exteriori argenteo: Os edentulum & lapis illi pro lingua. In medio dorso upicam habet pinnam duos pene digi-

tos longam, unum antè latam, trapezii figura, non tamen duris spinis firmatam. Post branchias in quolibet latere versus inferiorem parvam pinnam oblongam & angustam obtinet & duas tales laterales ad infinitum ventrem è regione dorsalis: prope anum unam parvam. Cauda constat pinna furcata instar harengi plus duobus digitis longa. Squamulas habet ortline lineari secundum longitudinem corporis positas, ita affabre ut ad tactum quaque verius glaber videatur. Superne si aspiciatur olivacei est coloris, ateminus aut laterali rufescent: si insuearis plane argenteus ac splendens videtur, & dorsum exrufescent ex argenteo: venter plane albus: branchiae ita glabrae sunt ut laminarum argentearum videantur.

Astutus boni est saporis, nec opus est desquamare: coctus non ita commodus ob multitudinem spinarum per carnem dispersarum.

**CAPEUNA.** Piscis corpore oblongo non lato qui in septem digitorum longitudinem excrevit. Oculi obtusè acuminatum; habetque in superiore atque inferiore mandibula unam seriem minimorum denticulorum: tota cavitas oris cum lingua sanguinei coloris insignis: Oculi illi parvi, stufieri magnitudine, crystallini, circulo partim argenteo colore variegato. **Pinnarum** obtinet septem: in quolibet latere post branchiam unam oblongam, tenuem quasi triangularem: duas triangulares in infimo ventre: unam post anum firma spina munitam: unam per dorsum longitudinem excutientem, cuius anterior medietas spinis munita, quem recondere potest, posterior mollis & sine spinis: cauda bicornis, molli pinna. Tegitur squamulis parvis argenteis, in quibus aliquid aurei transplendet. In quolibet latere habet duas lineas crassas aurei coloris, unam à summitate oris per oculos & medium latus tendentem ad eandem, alteram magis superius per dorsum latus pergentem. In summitate capitis livefcit. Pinnae omnes sunt cineræ: Venter albus ut & eius pinnae.

Co-

Coctus boni est saporis. Capitur in mari inter scopulos.

*Idem. Lib. 4. cap. 3.* ACARA PITAMBA, Piscis oblongo corpore ut mullus seu barbus, in duorum pedum aut etiam maiorem longitudinem excrevit : Os habet minutum & dentes : Oculos amplos, pupilla crystallina, circulo miniaro : Pinnas septem; unam à summitate dorfi tendentem ad exortum caudæ fere, spinis suffultam, digitorum latam aut paulo amplius : post quamlibet branchias unam tenuem & longam; subtus in ventre duas junctas, & prope anum unam : cauda constat pinna quinque digitos longa; quæ in duo obliqua cornua definit. Squamæ totus vestitur modo Carpinionis, eleganter ex purpureo cæruleis. In utroque latere in medio ab oculis ad caudam tendit linea sesquidigitum lata; aurei coloris, per totum autem dorsum & latera usque ad hanc lineam puncta aurea majusculæ habet : sub linea in lateribus subtiles lineas aureas seu flavas, secundum longitudinem. Venter albicat. Pinnæ laterales & ventris ex albo flavescunt. Dorsalis pinna & tota cauda aurei sunt coloris.

Optimè sapit assatus, & melius quam coctus. Pinnæ ejus lucent noctu. Capitur in mari.

Hic piscis à crustaceo quodam animalculo vexatur, sesquidigitum longo, digitorum crasso, figuræ oblongæ, ut cauda Gammari & eodem modo formato & crustato : constat aurem septem juncturis, & habet quatuordecim brevia crura, unguiculis acutis prædita, in quolibet latera septem : anterius corpusculum paululum ampliatur. Corpus molle est sub crusta instar cochleæ lenta cutis obductum : nec oculi nec os apparent. Hoc animalculum ori piscis se ingerit & unguiculis suis arcu faucibus inhæret, nec unquā piscis se ab illo liberare potest. Postero die adhuc vivebat capto pisce & pridie mortuo : in totum albi est coloris.

## CAPUT. VIII.

*De Jaguacaguare, Curimata, Tareira, d' Alto, & Tareira de Rio.*

JAGUACAGUARE, Lusitanis *Jaqueira*, id est, interula, à colore, quia nigritæ ejusdem coloris amiciuntur. Piscis instar Percæ nostræ latus & obrotundus, ad summum octo digitos, quinque aut sex latus, Os habet parvum, cum minutulis dentibus ordine digestis : Oculos mediocres crystallinos, circulo fusco : Pinnas porro septem, unam à medio dorso ad exortum caudæ protensam, spinis suffultam, anteriore quidem parte semidigitum latam, posteriori latior è & trianguli figuram desinentem. Duas postbranchiales, duas in inferiori ventre; unā post anum lariusculam : caudam denique duos digitos longam, parallelogrammi figuræ, quæ in duo cornua definit. Squamis vestitur, instar percæ, majusculis; quæ è cinereo cærulescunt. A dorso autem per latera latæ lineæ descendunt ad ventrem nigre, in quolibet latere quinque. Superius caput quoque nigrescit, venter verò albescit atque erubescit. Pinnæ omnes è cinereo cærulescunt & quodammodo nigricant versus extremitates. Tota denique cauda nigra est. Edulis est piscis.

Haud malè convenit cum Mormyro Gesneri, nisi quod leon in eo differat, quod in Mormyro Gesneri plures lineæ nigre vel pulchre à dorso ad ventrem per latera descendant.

CURIMATA. Piscis Carpinionis figuræ, colore, carne valde similis : sesquipedem longus, quatuor & semis digitos latus : capite Carpinionis ore rotundo & edentulo : corpore oblongiori, & squamis majusculis. Pinnas habet septem præter caudam; nimirum duas postbranchiales, duas in medio ventre inferiori, unā post anum, & unā plane parvulam parallelogrammæ huic oppositam in dorso; unam denique in medio dorso, magis longā quam latam. Totus piscis coloris est argentei ut Carpio, & ejusdem saporis. Non capitur nisi in dulcibus aquis.

TAB.  
XXXIII.  
4-5-6-7.  
*Idem lib. 4.*  
c. 8.

Vulturna.



Cappone.



Scorpaenidae.



Laguncularia.



Curmala.



Tavira de Rio.

Su. fluvialis.




Tavira.



Guineaia Guara.



Prachapa.



Carpia.



Guaricupena.



Larius enim lacus, qui hodie Comensis cognominatur, Agonos educat exiguos ac magis populares, Sardis similes, dempto quod ventre sunt latiore: neque alio quam Mediolanum transferuntur, aut saltem raro Mantuam prætergerè diuntur. Eos dolis muriâ conditos adseruant, quam etiâ mediocriter sicci sine mura cõperiantur. Verbanus lacus, què lacum maiorè cognominant, multo majores Agonos quâ Latius educat. Indi, enæurbiû, quæ ad eius litus sitæ sunt, Aronan, Palencza, Cornobio, Locaria & Eugudræ vocatos pisciculos magno proventu capiunt, mediâ magnitudine inter Larios & eos ex lacu Ligaræ, quos Indiginæ urbium nominant *Campignon* & *Buiffon*. Benacus autè Lacus magnitudine insignes Agonos ptofert. Sed nec Urbani aut Benaci Agoni muriâ conditi solent, ut minores. Hæcille; & mox rursus de Saracho. Duo, inquit, tresve lacus sunt in Epiro, in quib. Sarachi capiuntur, quos ubi sale condierint, exiecaverint, & fumo infecerint, Venetias, Anconâ & aliò navigiis tranfvehunt. Quorum eos maximè in pretio habere solent, quos de la Boiane huius nominis flumine ac lacu cognominant. Horum verò duo comperiuntur *genera*, alterum minus, alterum autè Clupeæ ferè magnitudinis. Minores Sarachi quadrante longiores non sunt, maiores pedalem implent longitudinem. Ambo eâdem linea sub ventre præditi sunt, quâ Clupea insignita est. Cæterum Agoni omnes (inquit idè Bellonius) *squamæ* habent levi contactu decedentes, tenues, latas & transparentes: corpora argenteo coloro nitentia, sed parum nigricant in tergo. *Desquamati* super argentum tertissimum refurgent. Ovis rictum habent grandiusculû sine *dentibus*: pinna in tergo simplicem, parvam, duas in lateribus sub branchiis, quarum omnium exterius tegumentum spinosum in medio crenatum est. Oculos valde grandes proferunt, caudam in penicilli modum discissam. Utrinque nonnunquam lituris duabus, rotundis, ac nigris, interdum pluribus sigillatur in tergo. *Lineam* sub ventre

habent ferratam, ad anû desinentè. quam si digito in adversum cõfrices, cultri modo acutum percipias. *Branchias* habent utrinque quatuor, internâ parte veluti simbtiatas, quod etiâ Harengis, Celerinis & id genus piscibus accidit. Cor ut semen Cicerculæ trigonum inter anteriores pinnas sub branchiis occultatur. *Hepar* subrubrum sinistro stomachi lateri & œsophago incubans, ipsumq; pylorum amplectens. *Stomachi* figura in conum turbinatur, à cujus superiore parte pylorus exit, multis apophyllibus cæcis ac circumdatur. *Lien* dextræ Stomachi parti, in hæret ruber, à pyloro intestinû non tectè citur, sed recta ad anum tendit. Triginta sub ventre *ossicula* acuta, aspera in hoc pisce lineam constituentia, connumerare potes. Hæc omnia itaque Bellonius, quibus addi potest, hosce pisces ita pinguescere referente Rondeletio, ut eum in craticula aslantur, pinguitur o veluti oleû distillet, adeo ut ab hæ pinguedine, sint qui *Liparim* appellent. *Carnivori* sunt, & pulices a quaticos venantur. De *generatione* prodiit Salvianus, Acones feminas oviss gravidas, maribus semine refertis consequentibus, ad saxosa litora Mayo mense aduatare, ibique illas parete sua ova, hos suos semine fecundare, moxque pusillos inde præcreari pisciculos, q intra paucos dies ad digiti augeantur magnitudinè, tuncq; vulgo *Antefitos* vocari. A qua exempti uno emoriuntur. Gregatim vivunt, & temerè in retia incidunt. Adeo sunt *timidi*, ut vel à tremula umbra terreantur. A Lucis, Cyprinis & Truttis adeo sibi metuunt, ut aliquot aliquando millia, insequentem inimicum longo per lacû tractu pavidi fugiant, jucundo intuitibus spectaculo. Alofis sapore petimiles, vere graciles, autumno optimos Jovis facit. Salviano Julio, Augusto, Septembri & Octobri mensibus probantur. Crassiusculû tamè succèu gignunt, difficulter concoquuntur, & mediocriter nutriunt. Cum siliendi causa extetantur, *oleum* ex interacis ad lucernarum usum colligitur.

HISTO-





*Porcus Supinus Saluian.*



*Cobius Botatrix Salu.*



*Alburnus Salu.*



*Meform uel Blemus Salu.*



*Thomus Salu.*



*Cyprinus Salu.*



*Salar et Varius.*



*Obris.*



*Pubellus Salu.*



*Barbus Salu.*



*Salmo Salu.*





# HISTORIÆ NATVRALIS

## De Piscibus

### LIBER IV.

#### De Piscibus Exoticis.

#### TITULUS I.

#### De Piscibus squamosis.

#### CAPUT I.

#### De *Tajassica*, *Parn*, *Pira-Acangata*, & *Acarauna*.



**P**rerant quidem & isti, quos hoc libro trademus pisces, ad sua genera in præteritis referri: verum cum tardè nimis ipsorum descriptiones & icones in manus nostras pervenerint, coacti sumus eos peculiari libello includere.

**TAB. XXXII.** *Tajassica* itaque prout Brasiliensis vocatur: piscis est octo aut novem digitos longus, corpore obterete & pyramidalis, extenuatur enim versus caudam. *Caput* est illi grossiusculum & compressum: *Oculi* eminentes & nigri, circello autem: os edentulum. Sex habent pinnas; nimirum sub qualibet branchia unam oblongam, sub his in medio inferius unam breviorē: unam in medio dorso, aliam longiorē versus postremam dorsi partē, & è regione huius unam in infimo corpore: septima est cauda, oblonga & in exitu rotundata. Tegitur squamulis parvis, coloris hyalini pallidi, maculis variis fuscis vermicularis variegatus per totum, exceptis pinnis postbranchialibus & infimo ventre, quæ expallido subflavescent.

Cauda est undata fusco. Latet in arena absconditus: ideoque capitur pedibus, eos ponendo super arenam ubi latet.

Coctus atque assatus bene sapit & convenit cum Hollandorum *Post*/ est enim carne albissima & friabili.

**PARV.** Piscis est latus & subrotundus, verum haud crassus, novem aut decem digitos longus ab ore ad pinnam caudæ quæ duos & semis digitos longa & toridem lata: latitudo piscis septem digitorum. *Pinnas* obtinet sex: duas magnas ac latas duos circiter digitos unam in dorso, alteram in ventre, quæ utrobique ad caudam extenduntur; habetque quævis pinna in sue prominentiam instar funiculi, ea videlicet, quæ in dorso quinque digitos, quæ in ventre tres digitos longam. *Post* branchias in quolibet latere etiam pinna est duos digitos longa, unum lata; & duas in inferiori ventre sub his, duos digitos longas, angustissimas. *Capite* est parvo, ore elaro, angusto, minutissimis dentibus albi coloris; oculis conspicuis, flavo circulo circumdatis. Totum corpus vestitum squamis mediocribus, quarum dimidius numerus niger est, dimidius autem flavescit, ita ut lunulas flavas in nigricante corpore gestare videtur. Circa branchias flavedo est, & in initio pinnarum, post aures macula flava in quolibet.

Piscis est edulis.

**PIRA ACANGATA**, id est, piscis duro capite: *Percæ* mediæ magnitudine, septem aut octo pedes longus, ore haud amplo, oculis nigris, circello nigricante aureo & ruffo colore mixto. *Pinnas* habet sex & septimam pro cauda: duas postbranchiales, duas in infimo ventre junctas, unam versus posteriora in ventre, & unam per totius dorsi longitudinem usque ad caudam extensam & erectam, firmis spinis suffultam quam in vaginam recondere; ore est. Pinna caudæ furcata. Tegitur squamulis argenteis, aureo & igneo colore transplendente, præsertim in dorso: in ventre in argenteo thalassinus color transluet.

Z

Pinna

Pinna dorsii argentea transplendens & maculis fuscis insignita. Pinnae laterales albæ, quæ in ventre caerulefcentes. Caudæ quoque pinna in extremitate caerulefcit. Est edulis.

ACARAYNA, Piscis magnitudine exæquar Paru, sed non est ita latus, & squamulas habet nigricantis coloris. Cauda est bifida, pinna tres digitos longa, duos lara. Pene utramque branchiam etiam pinnam habet, inferius in antrie parte duas angustas. Per totum dorsum & per ventrem etiam pennam utrobique extensam, acutam, continuam, in postica parte corporis circiter unum digitum latam. Os parvum, angustum, denticulis minutissimis. Oculi haud magni. In utroque latere prope caudam acutissimum habet aculeum; quos in latera potest recondere & evaginare & alios pisces lædere: quilibet aculeus ferè digitum longus osse piscino constans.

Piscis est edulis.

## CAPUT II.

### De Guaperua, Piranema, & Acarapucu.

TAB.  
XXXII.

3.

Mæcgray,  
Hist. Brasili.  
lib. 4. c. 2.

GVAPERUA Brasiliensibus. Piscis est corpore lato & compresso, quatuor digitos longo, tres lato, ubi latissimus. Ore parvulo, denticulis minimis. Pinnae habet sex: post quamlibet branchiam unam, parallelogrammi figura: in infimo ventre duas oblongas: in dorso & in inferiore ventre extremo longam acilaram, quæ in acumen desinunt, subulæ figura. Cauda quadrata seu potius paralelogramma, unum digitum longa, duas tertias digiti lata. Tegitur squamulis coloris nigri, splendentis instar bombycini, quarum oræ (non omnium sed quarundam) fimbrias flavas habent instar semilunularum. Pinnae sunt nigrae, Circa os linea crassa purpurei est coloris, & illi perpendiculariter altera

supposita Corpus tres lineæ latae ambiunt, quarum duæ per larus & posticas pinnas extenduntur. Caudam etiam talis secar linea & ejusdem coloris: una pro fimbria ipsi est oculerum pupillâ nigra, circulo aureo.

PRANEMA, Piscis mediocris Capionis seu Perca magnitudines novem, decem aut undecim digitos longus; larus, ubi maxime, tres digitos aut paulo amplius, Os habet amplum, subrotundum, edentulum quidem, sed acutissimis prominentis asperum: oculos magnos instar solidi Hollandici, pupilla crystallina, circulo aureo splendente, qui superius ad dimidiam partem coloris est miniati. Branchias habet admodum amplas. Pone has in quolibet latere pinnae digitum quidem longæ sed haud latæ, & subter has in ventre duæ sibi propinquæ duos digitos longæ & sesquidigitum latæ, triangulares, spinis suffultæ. Ventris medietate ad caudæ exortum usque pinna protenditur tres & semis digitum longa, unum lata, itidem spinis intertexa, quam abscondere fere potest in rima ad hoc comparata: per universum dorsum ab occipitis fine ad exortum caudæ pinna extenditur quinque digitos longa, paulum plus digitum lata, tenui membrana constans, duabus & viginti spinis intertexa, quam etigere arque deprimere & fere abscondere potest in rima. Cauda quæ à corpore protenditur sesquidigitum est longa, unum lara, pinnam habet tres & semis digitos latam, & plusquã sesquidigitum longâ. Calor totius piscis est argenteus laccatis laccæ florentina. Squamulas habet minutulas quasi triangulares: in ventre plus albicat, seu argenreo minus laccæ intermixtum cernitur.


Capitum in mari & boni est saporis, edulis.

ACARAYCU, fluvialis piscis, instar sesquipedalem longitudinem excrefcit, ubi latissimus quatuor aut quinque digitorum, Os acuminatum circit

Taiatica.

Para.

Tab. XXXII.



lunucapcha lancia



Guatapcha



Tarsala.



Acara Pinima





citer duos digitos longum, haud amplum, labia abscondere & contrahere potest ut solum hiatus appareat, nullos habet dentes. *Oculi* magni, pupilla nigra splendente, circulo ex albo & fusco mixto. *Pinnæ* habet septem: unam per dorsum longitudinem ad caudam fere extensam, non latam, quam erigere & spinis sustentare, atque recondere potest: postbranchiales duas, totidem in infimo ventre, unam post anum: Septimam pro cauda, furcatam quatuor aut quinque digitos longam. Torus splendet squamis argenteis minoribus: in dorso tamen aliquid aurei admixtum: & in quolibet latere sex oblongæ maculae caeruleæ rufescentes, non ita conspiciuntur. Pinna dorsalis & cauda dilute cinerei sunt coloris, ut & laterales: duæ in infimo ventre flavescunt paulû, ut & ea quæ prope anum. Edulis est.

## CAPUT III.

## De Pudiano vermelho, Pudiano verde, &amp; Iurru-capêba.

TAB. XXXII. **P**UDIANO Vermelho vulgo, sed et *Atius Bodiano*: Brasiliensibus *Aipimixira*, & *Tetimixira*, Piscis mediocriter Perce magnitudine. Latitudo corporis, ubi maxima, duorum digitorum prope caudam unius aut paulo plus. Corporis fere æqualis latitudo est. *Caput* parvum, acutum, superius in anteriori parte tres denticuli acuti, minimi, inferius item, & versus interiora in utraque mandibula alii minimi denticuli. *Oculus* habet paululum eminentes, pupilla nigra, exteriori albo, hinc flavo circulo. *Pinnæ* habet septem: nimirum duas plus digito longas, haud latas, post branchias in utroque latere unam: sub his duas junctas in ventre: aliam in ventre versus caudam duos digitos longam, secundum longitudinem adnatam: unam item ralem in dorso, tres

& semis digitos longam: & septimam pro cauda, quæ est quadrata, digitum longa & lata. Tegitur piscis squamis subtilibus, ita arcuè cõplicatis, ut ad tactum glaber esse videatur. *Color* totius corporis flavus cum aureo mixtus. Summitas autem capitis & torum dorsum ad media utrimque latera, & fere usque ad finem dorsalis pinne purpurei est coloris egregii cum lacca mixti: extrema ora pinne majoris in ventre versus caudam etiam purpurea scitur & pinne illi junctæ totaliter: reliquæ pinne flavæ cum aureo colore mixtæ, ut & totum reliquum corpus. Pars utrimque pinne majoris in dorso etiam flava ut & cauda. Piscis est edulis.

*Pudiano Verde* Lusitanis. Piscis oblongus, nimirum decem digitos ab oris extremo ad caudam ininum: corpore tres digitos larum, circa caudam autem sesqui. *Os* acuminatum, haud amplum, antè in superiori mandibula habens duos dentes acutos, longos & seriem denticulorum minimorum: inferius in anteriore parte quatuor, longos, acutos, & seriem minorum candidorum. *Oculus* habet parvos, pupilla nigricante, circumloptimum aureo, dein exterius albescente. *Pinnæ* obtinet sex, nimirum unam per dorsum longitudinem extensam, sex & semis digitos longam, dimidium larum, quam spinis erigere & sustinere potest: post utramque branchiarum unam, duos digitos longam, paulo plus uno latam: sub ventre duas parvas junctas: à medio autem ventre inferiori una tendit pene ad caudam exortum, quatuor digitos longa, unum fere lata: Septima pinna est cauda, quæ est quadrata aut parallelogrammi figura, sesquidigitum longa, duos lata.

Torus piscis vestitur squamis latis quæ ita compositz sunt, ut meri cubi sibi appositi videantur: lutei seu aurei coloris ac per torum ambum linea seu fimbria elegantissima azuri seu caerulei coloris. *Caput* superius aureum est cum magna macula coloris ex viridi thalassini, circumdata azureo & azureis flavis subviridibus & albican-

tibus striis variegatum. *Pinne* duæ laterales seu postbranchiales & duæ in ventre albicant, in laterali ambitu cærulea lineola præditæ. *Pinna* dorsalis aurei est coloris & striis undulatis extuleis secundum longitudinē notata, quæ in ventre major ex ruflo ad brunum vergit colorem, striis itidem cæruleis secundum longitudinem. *Cauda* rufescit striata thalassino ac cæruleo secundum longitudinem, in extremitate autem paululum virefcit.

Piscis insignis coloris & edulis. Capitur in mari.

*Inermucpeba*, aut etiam *Itaiara*. Piscis longus septem aut octo digitos, duos aut tres latus, ubi latissimus: ore satis patulo, & ex triangulari rotundo lingua angusta, brevi, denticulis minutissimis: oculis rotundis, pupilla crystallina & circulo rubro. Post branchias in utroque latere habet pinnam sesquidigitum longam, quadratam & exterius circinatham: subter has, duas in inferiori vente junctas: paulo post occipitium incipit pinna anteriori medietate spinis suffulta, posteriori mollis, quæ tendit secundum longitudinem dorſi ad caudam usque, & semper sielatio, prope caudam digitum lata. In inferiore corpore versus caudam etiam pinnam habet haud amplam. *Cauda* constat pinna sesquidigitum longa, plus uno lata & quadrata.

Squamatus piscis, sed squamis ita complicatis ut lævis esse videatur. Piscis universi color egregiè ruber, in ventre autem ex rubro & albo maculatus; in lateribus autem constanter maculas habet puniceas, nigras, varias, majores & minores. *Pinna* omnes sunt rubræ & nigro maculatæ.

Pinguis est piscis & boni saporis, optimus tamen assatus. Capitur in mari inter scopulos. Parieti recens appensus noctu toto corpore clare lucet.

## CAPUT IV.

De *laguaraca*, *Carauna*, *Curruca*, & *Gnatucupa Iuba*.

**J**AGUARACA. Piscis est mediocris <sup>TAB. 7-8-9.</sup> Perce magnitudine, ore acuto, c-XXXII. dentulus. Oculos habet magnos, pupilla crystallina nigra, magna & ampla, circulo coloris argentei, & superius maculam sanguineam habente. <sup>Marggrav. Hist. Brasil. lib. 4. c. 3.</sup> *Pinnas* habet in lateribus & infimo ventre similes præcedenti pisci: per dorsum verò secundum longitudinem extenditur pinna digitum lata, usque ad unum digitum ab initio caudæ, constans renui membranula undecim spinis acutissimis suffulta, quam poreſt elevare & subſternere pro libitu: atque non solum componere, sed & abscondere in rima cui pinna insidet.

Hanc sequitur alia contigua unum digitum lata, pertingens ad caudæ exortum, duos digitos longa, triangularis & superius desinens in acumen. *Cauda* autè pars reliquo corpori subtenſa rotunda est, sesquidigitum longa, continens pinnam fureatam, cuius pars interior duos digitos longa, superior paulo longior. Ad branchias in utroque latere, in quolibet duos habet aculeos, in quorum medio alii sunt minimi: his branchiis & aculeis ferit & vulnerat: ferit etiam cum spina dorsali & cum iis quæ sunt in infimo ventre, ad quarum singularum latus aculeus est satis longus, & quidem in pinna prope caudam in infimo ventre spina est unū digitū longa.

Totus piscis tectus est squamulis eleganter dispositis; & quilibet squamula in ambitu minutissime est ferata. Color totius corporis est ar, en-teus, in ventre plane albicat. *Cepus* superius incarnati est coloris, & hispida testa munitum. *Pinna* omnes coloris sunt dilute incarnari: ea autem quæ in dorſo spinis suffulta, prope spinas auro est umbrata.

CARB

*Cara* pinguis & boni saporis, præfertim si piscis aësetur. Caput in mari inter scopulos.

*CARAUNA.* Magnitudinem & figuram habet ut *Iuruncapaba*, differt tamen capite & colore corporis. *Pinnæ* quoque eodem modo positas habet ut ille. *Os* autem obtinet lunatum: dentesque habet acutissimos, sed minutos: *Branchiæ* amplas, quæ aculeis in postica parte sunt munitæ. *Oculi* versus summitatem capitis in lateribus positi non longe ab invicem haud magni, pupilla ovali nigra, quam ambit circulus ruber. Squamulis in vniuersum vestitur lunatis. coloris miniatum per totum, & ubique punctula nigra, magnitudine seminis papaveris in parta, habet, præterquam in ventre.

Capitur in mari inter scopulos: est que edulis, molli admodum carne atque boni saporis.

*CORVINA.* Species *Corvina*; Piscis fluviatilis, sesquipede longus, corpore oblongo; ore satis amplo, oculis mediocribus, nigris. *Pinnæ* habet septem: unam per dorsum longitudinem ad caudam ferè protensam, quæ divisa est & prior pars latior, tres digitos ferme; & totidè longa, triangularis, spinis suffulta, posterior longior, sed exillior. Cauda fere quadrata. Squamas habet mediocris magnitudinis argenteas cum auro & subfusco paucò mixtas, præsertim in dorso & lateribus. *Pinnæ* in dorso & lateribus ac cauda, cineræ: in medio ventre flavescunt, & fuscescunt. Edulis est.

*GUATACUBA INBA*, in duorum pedum longitudinem excrescit, dorso paulū incurvaro. *Os* habet triangulare, acuminatum, dentes parvos acutissimos. *Oculus* magnitudine stufi Hollandici, pupilla magna, nigra, splendens circulo rubro. *Pinnæ* habet molles sine spinis in lateribus; nimirum unam in quolibet latere, post branchias, angustam, duos & semis digitos longam: duas tales junctas & ventre subterillas unica spina munitas: & unam prope anum digrum longam ac latam, unica quoque spina armatam. Antemedium dorsum versus occiput, inci-

pit pinna definens ad caudæ initium, quinque digitos longa, unum fere lata, quæ duabus & viginti spinis erigitur: cauda duos penedigitos longa, unū lata, pinnā habet plus uno digito longā & quatuor latam paululumque exterius versus interiora arcuatam. Vestitur squamis paulo majoribus, coloris argentei & striis flavis & ex argenteo rufescentibus secundum longitudinem extensis à capite ad caudam usque. In utroque latere etiam à capite ad caudam eminens linea tendit. *Caput* ex argenteo, rufo, flavo mixtū. *Pinnæ* albæ sive argenteæ, caudæ pinna tuffa: venter albus.

Capitur in mari inter scopulos. Boni est saporis, & lingua & caro circa mandibulas longè optimi ut in Carpione.

## CAPUT. V.

*De Pira Iurumenbeca, Ta-  
moata, Acara, & Pira  
Pixanga.*

**P**IRA JYRMENBECA vulgo Boca. TAB. XXXII.  
molle, quia molli ore & aquis ex-  
tractis statim moritur: vivit in mari  
in cæno: oblongus, piscis haud laevis  
novem aut decem interdum pedes  
longus, duos & semis latus, ubi latissimus. *Os* habet elevatum: quod ampliare & rotundare potest: oculos magnos, pupilla crystallina, circulo ex argenteo & brunno mixto. *Septem* habet pinnas, duas angustas postbranchiales, duos digitos longas: duas in infimo ventre junctas, duos fere digitos longas, unum latas unam post anum firma spina suffultam: sextam per dorsum extensam & bifidam; anterior eius pars sesquidigito longa, unum lata, triangularis, quam erigere & in timam recondere potest, mollis & translucens, altera pars usque ad caudam fere porrecta, tres digitos longa, semidigito lata, itidem mollis. Septima est cauda, duos fere digitos longa, sesquidigito lata, figura pentagoni cuius basis inferita in corpus.

Z 3 Squa-



*Squamæ* habet toto corpore argenteas, splendentes, medioeris magnitudinis: in dorso viridis & aureus color transplendet. *Pinnæ* argenteæ & in medietate exteriori aureæ. In quolibet latere zinea tendit paulum elata, etiam argentei coloris ut reliquum corpus.

Edulis est & boni saporis.

*Idem lib. 4. c. 5.* **TAMOATA**, Lusitanis soldido (quia armatus) piscis fluvialis seu aquæ dulcis, edulis. Longitudo corporis ab occipitio ad initium caudæ trium & semis digitorum; longitudo capitis unius digiti; latitudo paulo major. Crassities corporis ubi maxima, nimirum post occipitiū, trium, circa caudam duorum. *Caput* latum ranae ferme modo; æst haud amplum; ad cuius quodlibet latus solum habet unū digitum longum instar barbæ, os edentulū. *Oculi* minimi crystallini, magnitudine seminis papaveris, circello aurato cincti. *Pinnas* obtinet octo: ad quamlibet branchiam unā, digitum longam, firmam instar cornu in uno latere, directe à latere protensam: duas in infimo ventre, non ita firmas ac eiusdem magnitudinis: unā in medio dorso, alteram in eodem dorso prope caudam, minimā: unā parvam in infimo ventre prope caudam & octavam pro cauda, digitum longam & laram. Totum caput superius tegitur testa dura instar clypei: & universum corpus vestitum est lorica ex oblongis squamulis corporibus composita: suntque hæc corpora per ambitum minutissime serrata & quadruplici ordine rota lorica disposita: id est, coeunt partes seu squamæ lorice in utriusque lateris medio, in dorso & in infimo ventre. Color rotius piscis obscure ferreus, præsertim in capite. Carne bona est.

Piscis hic aqua carens in fluvio ubi est, tempore sicco, per terram abire ut aquam quærat.

*Idem lib. 4. c. 6.* **ACARA PINNIMA**. Piscis est latus, dorso incurvato, sex aut septē digitos longus, quatuor latus, ubi latissimus, parvi Carpinis figura aut verius Perce mifinæ. *O* habet haud amplum, denticulos minutissimos: oculos faris ma-

gnos pupilla nigricante transplendēre, circulo rubro, fusco & albo: *Pinnas* septem; unam per totum dorsum extensam & continuam versus anteriorem minus uno digito latam, versus posteriora latiore: huius pinnæ medietas anterior spinis suffulta est & illam in rimam potest recondere: post branchias in utroque latere unā duos digitos longam, haud latam, in medio ventre duas, junctas semidigitū ferme longas firma spina sustentatas: inter anum & caudā inferius itidem unam firma spina munitam: Septima pro cauda est furcata, plusquā sesqui digitum longa, rotidem lata.

Totus vestitur squamulis argenteis ex auro splendentibus: in quolibet latere septē magnas habet strias secundum longitudinem ad caudam usque extensas, coloris fusci splendentis (in quibusdam aurei seu lutei) à summo irem ca, ite per utrumque oculum ad extremitates oris, in quolibet latere capitis lara stria nigra descendit, ad cuius orā aliquid cærulei admixtum est. Ultra harum striarum exortum in dorso, nimirum ubi pinna dorsi initium sumit, itidem per quodlibet latus descendit nigra stria usque ad exortum pinnæ lateris seu oram branchiarum. Omnes pinnæ & cauda coloris sunt lutei seu aurei splendentis. Capitur in mari inter scopulos: & est edulis atque boni saporis.

*Pira Pixanga*, Belgis *Barotsch*/ quia in initio antri inter scopolos degit in mari. Longus est novem digitos, ab initio oris ad exortum caudæ. *Cauda* duos digitos longa. *O* sesquidigitum amplū, minutis sed acutissimis denticulis præditum. *Caput* haud magnum: oculi magni, prominentes, pupilla coloris instar Turcoïdis optimi, circulo nigro, eū aureo & sanguineo mixto. Branchiæ in triangularem figuram desinunt, ampla & acuta spinula præditæ. *Pinnas* habet septem: unam per totius dorsi longitudinem extensam, unum ferme digitum latā, & in postica parte latiorē, cuius prior medietas undecim firmis spinis sustentatur, posterior est mollis. Post

Post branchias in utroque latere unam, duos digitos longam & totidem latam, subrotundam & carnosam: duas junctas in medio pene infimo ventre, unica spina singulas firmatas: unam mediocrem post anum spinam munitam. Septima est pro cauda, duos fere digitos longa & totidem lata, non secta sed extremo ambitu subrotunda. Tegitur squamulis parvulis per totum corpus, ad tactum glaber nisi à cauda versus caput digitis fricetur. Totum corpus, caput, pinnae, cauda ex albo flavescunt: & per totum variegantur maculis sanguinei coloris dilutis, rotundis, magnitudine seminis canabis: quaedam etiam in ventre majores. Pinnae eodem modo maculae in ambitu suo obscurius rufescunt. Figuram fere Auratae habet. Edulis est ac boni saporis.

Captus per trihorium extra aquam potest vivere: bihorium postquam mortuus esset, aperiebam illum & cor adhuc movebatur exemptum: cor sicut erat statim post fauces, & aspera arteria in id inserebatur, eratque digitum remotum à reliquis visceribus per mediae sumum; minimum utique & vix granum ritici æquans etiam quando spiritu inflatur.

## CAPUT VI.

*De Vubarana, Capcuna, & Acarapitamba.*

TAB.  
XXXIII.  
1. 2. 3.  
Idem H. B.  
Pl. 4. 7.

**VUBARANA.** Piscis figura corporis Trutæ nostrati similis, ubique ferme æqualis crassitie, paulum tamen in dorso exaltatus, versus caudam autem angustior. Corpore oblongo, quadrate cylindraceo: pedalis longitudinis, semipedem crassus. Caput acuminatum seu coactum, haud magnum: oculi stufieri magnitudine, pupilla nigra, circulo primum aureo, exterius argenteo: Os edentulum & lapis illi pro lingua. In medio dorso unicam habet pinnam duos pene digi-

tos longam, unum anterieus latam, trapezii figura, non tamen duris spinis firmatam. Post branchias in quolibet latere versus inferiorem parvam pinnam oblongam & angustam obtinet & duas tales laterales ad infimum ventrem è regione dorsalis: prope anum unam parvam. Cauda constat pinna furcata instar harengi plus duobus digitis longa. Squamulas habet ordine lineari secundum longitudinem corporis positas, ita affabre ut ad tactum quaque versus glaber videatur. Superne si aspiciatur olivacei est coloris, ateminus aut laterali ter si intuearis plane argenteus ac splendens videtur, & dorsum extulscit ex argenteo: venter plane albus: branchiae ita glabrae sunt ut laminae argenteae videantur.

Aflatus boni est saporis, nec opus est desquamare: coctus non ita commodus ob multitudinem spinarum per carnem dispersarum.

**CAPEUNA.** Piscis corpore oblongo non lato qui in septem digitorum longitudinem excrescit. Os illi obtuse acuminatum; habetque in superiore atque inferiore mandibula unam seriem minimorum denticulorum: tota cavitas oris cum lingua sanguinei coloris insignis: Oculi illi parvi, stufieri magnitudine, crystallini, circulo partim argenteo colore variegato. Pinnae obtinet septem: in quolibet latere post branchiam unam oblongam, tenuem quasi triangularem: duas triangulares in infimo ventre: unam post anum firma spina munitam: unam per dorsum longitudinem excurrentem, cuius antetior medietas spinis munita, quem recondere potest; postetior mollis & sine spinis: cauda bicornis, molli pinna. Tegitur squamulis parvis argenteis, in quibus aliquid auri transplendet. In quolibet latere habet duas lineas crassas auri coloris, unam à summitate oris per oculos & medium latius tendentem ad caudam, alteram magis superius per dorsum latum percurrentem. In summitate capitis livescit. Pinnae omnes sunt cinereae: Venter albus ut & eius pinnae.

Co-

Vichana.

Cavato.

Sargamba.

Lagunacawre.

Cormaca.

Tavira. de Rio.

S'u finuablu.

Tavira.

Guamaca Chora.

Porhapia.

Carpura.

Guaracopma.





Plabura.



Nhazunda.



Guara Traba.



Amorix pixuma.



Pracaba.




Ciracoro.




Gualucupa.




Vrhuc.



Svalutia.



Camaripugasi.





*Idem H. B.* TAREIRA d'ALTO, id est mari-  
lib. 4. c. 9.

nus, piscis tereti corpore, decem digi-  
tos longus (reperiuntur & maiores)  
quinque crassius, ubi et assissimus, nam  
verius posteriora sensum minuitur.  
*Caput* habet eolubrinū, supra oculos  
in duo tubera elatum: oculos pupilla  
nigra, circulo flavescente; os acumi-  
natum satis amplum, interiori flavum  
denticulis acutissimis munitū, quales  
& lingua habet. *Pinnas* obtinet octo,  
nimirum in quolibet latere post bran-  
chias unam, uno plus digito longam,  
trientem latam, directē a latere pro-  
tensam: post has interstitio pene ses-  
quidigiti in infimo ventre duas jun-  
ctas figura trapezii, duos digitos lon-  
gas & rotidē fere latas in extremitate:  
versus caudam in infimo ventre unā  
duos digitos longā in corpore exten-  
sam, sed plane angustā, supra hanc in  
dorso parvula est instar cuspidis cul-  
telli: in medio dorso una pene qua-  
drata, duos digitos lata, plus uno lon-  
ga: Octava est cauda vix sesquidigiti  
longa & fureata. *Pinna* a, instar foliorū  
papaveris sunt tenuēs, & molli b. spi-  
nis sustentantur. \* *Squamulæ* vestitur  
peltatis, ita affabrē compositis ut ad  
tactum glaber videatur. Vēter totus  
albicat: latera & dorsum secundum  
longitudinem lineas habent alterna-  
tim flavas & virides. *Ora* squamulatū  
circum circa brunneæ sunt, & videntur  
quasi thōbi ordine positi essent brun-  
nis lineis circumscripti, & ac si per u-  
num ordinem tenderet linea, flava,  
per latera viridis. *Pinna* in dorso se-  
cundū longitudinē strias habet brun-  
nas reliquæ flavas. *Cauda* itidem stria-  
ta brunno. *Caput* superius maximam  
partem brunnum. *Piscis* assandus,  
nam coctus non ita bonus est. Sapore  
autem multo antecellit Tareira do  
Rio, qui multas habet spinas.

TAREIRA do Rio, i. e. fluviatilis,  
oblōgo corpore, dorso recto, ventre  
paululum protuberante: inferior il-  
lius mandibula lōgior superiori: den-  
tes habet acutissimos & inter eos duos  
longiores in medio inferioris mandibulæ  
& quatuor tales in superiore:  
mordet vehementer: *Oculi* satis ma-  
gnoi, prominuli, pulchri, pupilla atra,

cetera nigri. *Caput* Lucū capiti parum  
simile. Longus est piscis quindecim  
aut sedecim digitos. *Pinnas* habet sex:  
nimirum duas oblongas post quamli-  
bet branchiam unā, duas junctas ob-  
longas in infimo ventre, unam post a-  
nū parallelogrammi figura; unā in  
medio dorso magnā, rectam, paralle-  
logrammā, plus tribus digitis longā,  
duobus latā. *Cauda* parallelogramma  
pinna constat, duos & semis digitis  
longa, sesquidigitum lata, in extremitate  
circinata. Totus tegitur squamis  
satis magnis, fuscis in dorso & lateri-  
bus; verū in lateribus fuscum atq̃ teo  
est variegatum, ut ita per fuscum ar-  
genteū videatur. *Caput* tegitur dura  
testa fusca. Venter totus albicat. *Pin-  
nae* omnes fuscæ, sed nigro undulatae  
transversum ut Nisi cauda: itidem &  
cauda. Capitur in fluviis. Edulis est,  
sed multas habet spinas.

## CAPVT VIII.

De Piratiapia, Ceixupira, &  
Piquitinga.

PIRATIPIA piscis est oblōgo cor-  
pore & satis crasso, interdum tan-  
tam magnitudinem acquirit ut quin-  
quaginta libras æquet: *Ovis* pars infe-  
rior lōgior superiori. *Denticulos* habet  
acutos, in ordinare positos & tota oris  
cavitas cum lingua est rubra. *Oculi*  
prominētes, pupilla crystallina ovali  
& circulo rubro. Ante utrumq; ocu-  
lum habet foramen. *Branchia* desinūt  
in triangular. figuram, & sunt amplæ.  
A summis dorsi ad caudam usque  
extenditur pinna, quæ ad medietatē  
anteriorē spinis furrigitur, reliqua  
medietas est mollis. In inferiori cor-  
pore prope anum etiam pinnam mol-  
liem habet obrotundam: in quolibet  
latere post branchias unā, & duas in  
infimo ventre junctas, oblōgas. *Cauda*  
fere quadrata est, at in extremitatē  
paulo latior quam in exortu. *Squamis*  
vestitur parvis. *Dorsum* & infimus  
venter cinnabarii sunt coloris, latera  
ex gryseo fuscescunt.

In totum præterea est maculatus, &  
in dorso quidē maculas habet maio-  
res

res nummo mifnico, ex gryseo fufcas, in lateribus vero & infimo ventre minores eufdem coloris. *Pinna* omnes cinnabarii coloris, in extremis oris lineam albiſſimam habentes, adque eam ſimbriam latam nigerrimam. Poſtbranchiales pinnae totaliter cinnabriz ſunt ſine ſimbria nigra aut alba. Dorsalis pinnae medietas anterior tota rubra, reliqua ſimbriata albo & nigro ut reliquæ. Optimi ſaporis carnem habet ſi coquatur.

CEIXYPIRA, acquirit interdum longitudinem novem ac decem pedum, atque craſſitatem corporis humani corpore oblongo & capite atque ſigata corporis Tuberoni haud abſimilis. Quem deſcribo tantum duos pedes erat longus cum ſemiſſe. Erat illi caput cōpreſſum & latum, ſeptem digitos longum & fere quinque latum: Os haud inaplum pro mole corporis, parabolicæ figuræ, edentulū, promiſcentis tamen acutiſſimis confertim repletum: lingua lata: oculi albi haud magni, paulo maiores duplo ſuſtero Hollandico, pupilla cryſtallina. *Branchiae* habet ſatis amplas: *Pinnas* ſeptem, nimirum poſt quilibet branchiam unam, directe à latere protenſam triangularem, ſemipedem longam, duos & ſemis digitos latam, ubi latiffima. Interſtitio fere ſex & ſemis digitorum ab occipitio in medio dorſo incipit pinna quatuordecim digitos longa, in initio triangularis, & quatuor digitos alta, hinc ſenſim minuitur & ad caudam ferme pertingit, ibique triangulo deſinit. Huic oppoſita eſt eiufdem figuræ una in infimo ventre, undecim digitos longa, deſinens cum ſuperiore, ſed non cum illa incipiens. Infra duas poſtbranchiales in infimo ventre duas habet junctas, quamlibet tres & ſemis digitos longæ & ſeſquidigitum latam. Septima pinna eſt cauda, incipiens duorum digitorum interſtitio à ſine dorſalis & ventris, bicornis, ſuperius cornu fere octo digitos longum, inferius paulo brevius, nimirum ſeptem digitorum. *Pinnæ* omnes anteriores ſpinas habent, ſed molles. In interſtitio inter occiput & dorſalem pinnam, octo olleos triangulares aculeos pro-

minentes obtinet, quos recondere in carne & erigere poteſt, ac pro armis uſutpare. Ante quemlibet oculum, intervallo unius digiti foraminulū habet duplex. *Caput* oſſeum & glabrum. Totum corpus exiguis ſquamulis veſtitur, ita ut totus piſcis glaber videatur. Colore totus eſt niger, excepto tamen ventre, qui albiſſimus inſtar cretæ in lateribus (inter album & nigrum) paululū caneſcit nigredo, cætera, ut dictum, nigerrima. *Pinna* omnes nigrae, exceptis duobus infra poſtbranchiales in infimo ventre quæ albæ ſunt, oris nigricantibus. In utroque latere piſcis linea quædam profundior reliquis ſquamulis tēdit ad caudam uſque eiufdem cum corpore coloris.

Piſcis gravis ac pinguis eſt, ac pro optimo habetur inter omnes in Braſilia, præſertim quādo adhuc medio cricſcit magnitudinis. Caput in Mari.

PIXYINGA eſt duos, aut paulo <sup>idem L. 4.</sup> plus digitos longus, figuræ pene ut <sup>L. 10.</sup> *Parabucæ* à quo non multum differt ut dicam. Os habet parvulum, ſed quæ ample aperire & rotundare poteſt: Oculis ſatis magnos, nigros, circulo argenteo: branchias amplas: pinnas ſex & ſeptimam pro cauda: nimirum duas poſtbranchiales, triangulares, inferius poſitas: duas junctas in medio infimo ventre: unam triangularem in medio dorſo, unam poſt anum: cauda conſtat pinna furcata. Color capitis argenteus ſplendens ſuperius olivaceo imbutus. Tegitur ſquamulis albis, in dorſo tamen olivaceus color tranſlucet. *Pinnæ* omnes albæ. Differt à *Parabucæ*, quod ille paulo maior evadat, & linea illius lata non ſplendeat, cum reliquum corpus ſplendeat, quod in hoc contrario ſe habet. *Parabucæ* etiam pinnam habet in dorſo prope caudam, qua hic caret. Cæterum cato ſimilis, edulis.

#### CAPUT IX.

#### De Camuri, Guaracapema & Miruipera.

CAMURI Luſitanis *Robalo*, piſcis eſt TAB. duos pedes longus. Lupo noſtro XXXIII figura corporis ſimilis atque etiam ore, <sup>idem lib. 4.</sup> <sup>crat. L. 10. & 11.</sup>



crassus plus uno pede, ubi crassissimus: *caput* sesquipedem pene longum: *os* semilunare, in medio paulum acuminatum, sex digitos longum, sed quod magis dilatare atque rotundare potest, ita ut circumferentia eius fiat tredecim digitorum: *oculos* habet dupli stufieri magnitudine, pupilla crystallina, circulo aureo: *Pinnas* octo, nimirum duas in dorso, ptiorem tres digitos longam & paulo plus latam, firmis spinis sustentatam, quam in rimam recondere potest: alteram huic magnitudine parem, sed spinis destitutam, nec habentem quo condatur: duas postbranchiales, paulo plus tribus digitis longas, duas in infimo ventre quatuor digitos longas, duos & semis latas, unam talem post anum, octavā pro cauda, quæ est furcata, quinque digitos longa, sex lata. *Squamas* habet ut Carpio, coloris argentei, splendentes, in dorso autem & lateribus aureas admiscetur. Venter plane albeat: *Pinnæ* sunt aurei coloris, quibus aliquid fusci admixtum est, in quolibet latere superius à fine branchiarum usque ad medium exortus caudæ, ductam habet lineam crassam, nigram.

**GVARACAFEMA** mas est Doradæ. Piscis compresso corpore & latus, licet non ita crassus. *Caput* desinit in figuram quadratam, estque in fronte ita in aciem educum, ut facilius fluctus maris natando secare possit. In sex aut septem pedum longitudinem excrevit: latitudo sive altitudo, ubi maxima, nimirum versus anteriora & pone caput, sesquipedalis. *Os* habet haud ita amplum, pro magnitudine corporis, mandibulas compressissimas, denticulos acutos. Paulo supra os & quidē versus eius interiora oculi positi inferiiori loco, ne nimirum in aquis impetiose ageret, qui alius lineus. *Oculi* autē sunt magni, rotundi, pupilla crystallina, ceterum argentei coloris. Branchias habet amplas: *Pinnas* septem, nimirum unam insignem à summitate capitis per totū dorsum extensam usque ad caudæ exortum, latam in medio septem aut octo digitos, quæ sensim minuitur, constans

membrana ad tactum coriacea, & spinis mollibus interius sustentata: hanc natās in æquore erectam tener. A medietate infimi ventris ad caudæ initium itidem pinna producit, sed vix unum digitum lata, in exieut triangulata: post utramque branchiam pinnam habet oblongā octo vel novem digitos: sub his in infimo ventre duas propinquas paulo longiores. *Cauda* citret sesquipedem longa in duo cornua ampla distenditur. Squamulis minimis vestitur totus, quæque ad tactum vix sentiuntur: ita ut glabet videatur. Color in capite, dorso, lateribus ex viridi & argenteo mixtus, uti & in pinis, in ventre vero albicat. Per totum autem corpus (nimirum latera, dorsum, caput) maculis variegatus cæruleis, variz magnitudinis, milii, grani hordeacei, erui. Carnem habet liccam, boni saporis.

Velocitate natandi superat porcos marinos, & eodem modo saliendo progreditur. Vescitur pisce longo vulgo *Petumbo* appellato.

**MUWIPIRA & PIRABEBE** Brasiliensibus, *Peixe volador* Lusitanis. Piscis est volans, vel hirundo piscis: vaticæ est magnitudinis: maior erat *Halece*, quem hic describo, & formæ variis. Figurā corporis habet (instar Zædat Pomcranorum) tetetem & posteriora versus acutiorem. Totius longitudo ab ore ad finē caudæ tredecim digitorum: crassities, ubi maxima, nimirum circa exortum alarum, septē fere digitorum, ad exortum a. caudæ duorum. *Caput* crassum habet, superius compressum & latus, nimirum superius fere duos digitos & quasi in tubera supra oculos elatum, os non ita magnum, edētulum, at ossa eius paulum serrata instar limæ. *Oculi* magni, rotundi, stufero Hollandico equalis, pupilla nigra, circulo flavo, & exterius altero fusco. *Pinnas* habet sex cū cauda: duas in dorso, unam parvulā in medio, paulum tamen versus aq. tetiora, alterā post hanc duos digitos longam, sesquidigitum latam, tenuē, at octo spinis sustulā: duas robustas in infimo ventre, subter illa, duos & semis digitos longas, firma spina cō-

stantes sed angustas, & unam parvam in inferiore corpore ex opposito maioris in dorso: septima est canda, duos digitos longa, toridemq; lata & furcata. Præterea habet duas alas magnas, in quolibet latere unam, habentes exortum suum sesquidigitum fere post oculos, post branchias paulum estq; alarum longitudo septem digitorum, latitudo in exortu plus uno, in extremitate sex digitorum: constans alæ renui membrana instar charæ puræ (Postpaper) ex albo seu cinereo subfusci coloris: habent a. aliquot pilas & sustentantur spinis tenuibus per longitudinem extensis. Ad utramq; alam in initio eiusdem parva quasi ala exit, duos & femis digitos longa, sed planè angusta & sua spina munita. Totum caput cum initio dorsi (ab ore nimirum ad quinque digitos numerando) vestitur recta olea, dura, quæ versus suum finem dupliciter divisa in duos aculeos definit quasi spinas. Branchiæ a. ad duos digitos extenduntur in aculeos usq; sub alis. Totum a. corpus vestitur squamulis elegantibus, ordine dispositis, quæ in ventre triangulares, in lateribus & dorso verius ellipticæ figuræ. In ventre a. ita dispositæ sunt ut pisces ad tactum glaber videatur: at in lateribus & dorso quælibet in sui medio habet tuberculum, ita ut ordine naturæ dispositæ in recta linea, repræsentent lineas rectas, elatas, tuberculatas. In toto ventre albicat, in lateribus & dorso subfuscus, & splendens ut Harengus. Spine quæ alas sustent, & per eas extenduntur etiam albicant. Alæ ipsæ ex cinereo fusciscentis sunt coloris, maculis nigricantibus variegatæ. Volat hic piscis super aquas instar Hirundinis per spatium quantum sclopeto perstringi potest: nimirum usq; dum succedat alæ, tunc n. iterū aquæ se immittit alas humectandi gratia & denuo volat. Natura a. huic pisci alas dedit, ut se salvare posset, dum hostis eius Dorda magna catervatim persequitur. Szpithme mille eorum simul volantes vidi in Oceano Tropicis interiecto: interdum etiam volando incidunt in naves, ut nobis erit factum meminimus. Caro boni est saporis cocta. Adum &

de Hirundinibus superius, sed quia huius leon ab illis diversæ, addere & hanc placuit.

## CAPUT X.

## De Guaibi Coara, Guaperua &amp; Piraya.

**G**VAIBI COARA Brasiliensibus, TAB. *Buraco de Pelha* Lusitanis; Piscis est XXXIV. corpore latiusculo: dorso elevato & *Marçp. 16.* à capite arcuato, duodecim aut quatuordecim digitos longus, quatuor latissimus. *Brasil. 1. 4. 6. 12.* Caput & os acuminatum, satis amplum, habens in utraque maxilla feriem maximorum denticulorum, linguam conspicuamque una cum cavitate inferioris oris, linguinei est coloris: Oculi stufi magnitudine crystallinos, circulo coloris ex aureo & fusco mixti. Pinna obtinet septem, nimirum post brachia in quolibet latere unam, quasi triangularem, mollem: in inimo ventre duas junctas: unam post anum duplici spina munitam: per dorium a. una extenditur, cuius medietatem anteriorem unde cum spine coniungunt, quam recondere potest in cute, posterior medietas mollis & sine spinis. Cauda constat pinna bicorni, & parallelogrammi figura à corpore extenditur. Squamas habet mediocres, instar Perca, argenteas, quæ per oras sunt melini coloris, & aspectu referunt meros cubos: ip occipitio & dorso summo squamæ ex argenteo caruiscunt, & per oras itidè iunt melini coloris. Totum a. caput superius & ad latera est aurei coloris, stris cæruleis secundum longitudinem variegatū. Pinnae omnes melini sunt coloris, exceptis duabus in inimo ventre, quæ magis albescunt: platus a. utrumq; versus dorsū secundum longitudinem tendit linea melini coloris ad caudā usq;. Piscis boni saporis coctus: capitur in mari inter scopulos.

**G**VAPERUA Brasiliensibus, *Peixe Porco* Lusitanis, Græcis *κύνος*. Ab ore ad initium caudæ quindecim digitos longus, in medio ubi latissimus, octo latus: corpore paulum compresso a clato: dorso arcuato, ventre adhuc magis curvo: capite porcino: dentibus caninis, albis, longis, octo in qua-

qualibet mandibula, duo medii tam inferius quam superius longiores sunt reliquis: dentes inferioris mandibulæ aliis quasi brevioribus sustentantur, *O* subrotundum, angustum: quatuor fere digitorum interstitio ab ore superius sunt oculi, sesquidigitum à se invicem distantes, maiores grosso misnico (& ante eos quasi vestigium foraminis) pupilla crystallina, circulo aureo maculato cæruleo. Branchiarum loco rimam habet duos digitos longam, plus unâ latam. In dorso tres penè digitos post oculos, duo habet cornua, unum pennam olorinam crassum, tres digitos longum, quod versus posteriora paulum inclinatur, alterum parvum per membranam alteri adnecum, utrumque in rimam recondere potest demissum. Trium & semis digitorum intervallo post hæc pinna est, in initio fermè triangularis, hinc magis magisque angustatur ad caudam fere, quinque digitos longa, initio paulo plus duobus lata: & è regione in infimo ventre talem, initio duos & semis digitos latam, magis magisque arctatam versus caudam. *Cauda* quadrata figura à corpore extenditur, & pinnam habet quatuor digitos latam, duos longam, quæ in duo cornua dilatatur, ut totius longitudo sit quatuor digitorum. In medio inferioris corporis parvam habet pinnam & ante eam cornu sesquidigitum longum. *Pinnæ* omnes sustentantur spinis & sunt cærulei coloris, venter albicat. Squamis vestitur elegantibus, in superficie sua punctulis thalassinis cum cæruleo indico umbratis, in dorso magis cæruleis. Ab oris summitate in utrumque latus ad pinnas postbranchiales, semilunari figura, duæ lineæ crassæ cæruleæ, unius digiti intervallo, ducuntur. Comeditur assatus, coctus non valet.

Dedimus huius & in superioribus descriptionem, sed quæ cum isto non convenit.

**PIRAYA & PIRANHA** Brasiliensibus: Piscis pedalis longitudinis, lato corpore circiter sex digitos,

ubi latissimus: dorso incurvato, capite obtuso ut Dorada. *Ori* hiatus parabolicus, quod exactè claudere potest, habet labia parva quibus dentes tegit: obtinet enim tam superius quam inferius ordinem dentium triangularium, alborum, acutissimorum, quatuordecim in qualibet mandibula (minores habent duodecim) quibus uno morsu partem carnis ex quacunque parte hominis potest abripere quasi novacula esset abscessa: Si quis ingrediatur aquam vel saltem immitat pedem vel manum, statim ab illo lædi potest, ita sitiens est sanguinis & cupiens carnis humanæ, quare caute ab illo cavendum. *Oculi* habet rotundos, parvos, crystallinos pupilla nigra, & inter illos duo foramina seu spiracula: branchias amplas, exterius duras & osseas: sex pinnas & septimam pro cauda: duas nimirum postbranchiales paulum e-latas à ventre infimo, duos digitos longas, unum latas: in medio infimo ventre duas junctas parvulas, vix unum digitum longas & angustas: è regione harum in medio dorso incipit pinna, & ad duorum & semis digitorum longitudinem extenditur versus posteriora, paulo plus uno digito lata: duorum autem digitorum interstitio à parvulis in infimo ventre incipit pinna firma spina anterus munita, cætera mollis & maximam partem squamulis testæ & paulo plus duobus & semis digitis longa, extenditurque ad exortum caudæ, unum digitum lata: exortus caudæ sesquidigitum longus, ipsa bicornis, & quodlibet cornu in exitu arcuatur. *Squamulæ* tegitur: tota summitas capitis dorsû & latera usque eo si linea ducatur à postbranchiali pinna ad medium pinnæ squamosæ, coloris est cinerei dilui cum paucis cæruleo mixti, ac squamula quælibet fimbriam habet ignei & cærulei coloris transplendentis, reliquum laterum seu inferior pars & venter coloris sunt flavi obscuro, ut & capitis inferior pars, ac pinnæ postbranchiales & omnes infimi ventris.

*Pinna* dorsalis & cauda coloris est  
è cinereo cæruleo.

Edulis est, & carnem habet albifimam, paululum siccam & boni saporis. Sæpissimè comedi. Hæc species maximè gaudet cænofo fluvij fundo.

*Pyra* alia specus hic reperitur magnitudine & figura plane similis priori, excepto quod parvulam adhuc pinnam habeat squamatam inter dorsalem & caudam, & quod colore differat: nimirum summitas capitis, totum dorsum & laterum superior pars eo usque si linea ducatur à pinna postbranchiali ad medium pinnæ squamosæ, coloris sunt aurei cum cinereo mixti, & cæruleo transplendente.

Capitis inferior pars, reliquum laterum & infimus venter insigni colore croceo fulgent, cui aureus persplendet. Eiusdem coloris croceo aurei sunt pinnæ postbranchiales & infimi ventris. Dorsales duæ & cauda cinerei diluti cum paucò cæruleo mixti, ut & dorsum.

Hæc species magis gaudet arenofo fluvij fundo. Edulis est ut prior.

Reperitur & alia *Pyra* species alba, figuræ ut antecedentes, solum caput non ita obtusum, sed os paulum prominet figura conica: color ventris & laterum argenteus: dorsum & caput argentei coloris cum paucò cæruleo transplendente: pinnæ omnes argentei coloris cum gryseo mixti.

Dentes habet parvulos triangulares ordine dispositos, nec ita mordet ut cæteri. Paulò minor quoque est reliquis speciebus, cæterum non minus edulis, quam illæ.

#### CAPUT XI.

#### De Amore Guacu 3

#### Guacari.

TAB.  
XXXIV.  
4. 5.  
Idem l. 4.  
6. 13.

**A**MORE GUACU Brasiliensibus in semipedis longitudinem excrescit: corpore oblongo, capite crassiusculo, branchiis amplis, minutissimis in ore denticulis: *Oculi* il-

li parvi nigri circello aureo. *Pinnæ* habet septem: nimirum duas postbranchiales oblongas, quasi triangulares; duas sub his junctas; duas in dorso, anteriorem minorem posteriorem: & è regione posterioris unam in infimo ventre. *Cauda* oblonga iuscula, parallelogramma, in extremitate circinata. Tegitur squamis pro sua magnitudine majusculis. Piscis in totum ferrei coloris, in ventre tamen paululum è ferreo albicat. Est edulis.

**GUACARI**, piscis subrotundo seu pyramidalis corpore, pedalis vel paulo majoris longitudinis, octo digitorum crassities, ubi maxima est. *Caput* inferius planum, lateribus ellipticum describit, superius subrotundum.

*Os* parvum rotundum habet subter in plano capitis: loco dentium in utroque latere processus habet quasi setis equinis factos: inferius labium explicatum, lunatum, membrana constans, quæ in lateribus oris in suis extremitatibus in citrhum definit, triennem digiti longum, qui citrhi pro barba serviunt. *Oculi* parvi, rotundi, nummi misnici magnitudine, cinerei fusco maculati, superne positi & inter quemlibet foramen, distans dimidium digitum ab oculo versus interiora. *Branchia* angustæ inferius versus & ante quamlibet proxime corpusculum parallelogrammum, semi ferme digitum longum, quod extendere & recondere potest, ita ut reconditum vix videatur. Continet illud corpusculum in extremitate denticulos acutos setaneos, quibus alios pisces pungit. Et post branchias in quolibet latere inferius ad planum, triangularem quasi pinnam, quatuor digitos longam pene, plus uno latam, oblongam, spina ossæ in extremitate laterali sustentatæ & aliis minoribus secundum longitudinem discurrentibus: spatio autem sesquidigiti versus posteriora directæ post has ita descriptas, iterum duas inferius pinnas habet quadratas, in quolibet latere unam, duos & semis digitos longas, duos latas, eodem modo

Pirata et Piranha.

Guaib. Coora.



Amore Guaca.

Guaperua.



Guacora.



Pirambu.




Acarina.

Acia.



Guacora.

Guacora. Guacu.



Pirba.

Maturaque.



Carapa.





16

modo spinis hispidis ossibus sustentata. Post anum in infimo ventre angusta est pinna, parallelogramma, duos digitos longa. In medio dorso pinna est, quatuor digitos longa, duos longa, spinis hispidis ordine dispositis sustentata, ac anteriore spina dura crassiore suffulta, post hanc prope ortum caudæ superius parva quædam est pinna, membranosa, quæ anteriore corniculata spina fulcitur. Cauda constat pinna tres digitos longa inferiori, duos superius, bicornis, spinis firmis suffulta. Totum caput testa vestitur dura ad ractum hispida: totum corpus squamis triangularibus, versus anteriora maioribus, ordine positis.

Sunt autem squamæ omnes ad tactum asperæ, quasi exsculptæ, quælibet in sui medio extuberantiam habens: scilicet totum corpus lorica tum est, & quælibet pars lorice habet quatuor angulos, & in quolibet existit tuberculum, ita ut in quolibet latere sit quadruplex ordo tuberculorum. Color totius piscis croceus dilutus, in ventre saturatior; ac per totum maculatur maculis rotundis, magnitudine seminis sinapi, fuscis. Maculæ hæc in lateribus & pinnis paulo sunt maiores, in capite minores, ac in summitate capitis maculæ ruunt quasi rivuli. Posterior medietas ventris nullas habet maculas. Pinna omnes ut corpus coloratæ & maculatæ, excepta pinnula prope caudam, quæ constat membranula nigra, corniculata autem illius spina crocea est & maculata ut reliquæ.

Diu vivit extra aquam, ad quinque horas. Editur defracta lorica, sed paucam habet carnem: intestina longissima, æqualis omnia crassitie, instar crassioris filii quo vela consuunt. Habebat unus piscis quindecim digitos longus, in aestiva viginti octo pedes longa, quæ dimensus sum.

Repetitur & hic *Guacari*, magnitudine & figura plane similis priori, qui in flumine S. Francisci capitur solo colore differens & bonitate carnis: est enim torus umbræ coloris obscuri, & per totum maculis adspersus

obrotundis; nigris, seminis sinapi magnitudine: Caro huius boni est saporis.

## CAPUT XII.

*De Pirambu, Acaraja & Acara.*

**PIRAMBU** Brasiliensibus; *Chay-quarena* Lusitan. Piscis Carpio <sup>TAB. XXXIV. 6. 7. 8.</sup> magnitudine & figura, decem digitos longus ab ore ad initium caudæ, paulo plus quatuor digitos latus, ubi <sup>H. Bras. l. 4. 4. 14.</sup> latissimus: versus caudam angustior & æqualis latitudinis, duorum nimirum digitorum. Or habet instar Carpio, oculos magnos prominentes, pupilla crystallina, circulo aureo cum albo mixto. Pinnas obrinet octo, nimirum unam in medio dorso, paulo plus tribus digitis longam & unam laram, quam in rimâ recondere potest, & erectam novem firmis spinis sustentare: huic contigua est alia tres fere digitos longa, minus uno lara nullis innixa spinis: post utramque branchiam unam habet tres digitos longam, unam latam in exortu: in infimo ventre duas junctas, duos digitos longas, vix unum latus, firma spina munitas; post anum unam, digitum latam, dimidium longam, itidem firma spina sustentatam: octava est pro cauda, tres digitos longa, rotidem lata & furcata. Squamas habet maiores, instar Carpio, argentei splendentis coloris, pauxillo aureo mixti: quælibet autem squama mediam partem usque ab insertionem suam coloris est *seuilemorni* sub capite & ventris priore parte magis argenteus est: Omne pinnæ dilute cinerei sunt coloris. In ore superius & inferius lapidem habet, denticulis minimis præditum, vix sensibilibus.

Edulis est ac boni saporis.

**ACARAJA** vulgo corrupte *Garanhã*: Piscis qui trium pedum longitudinem adipiscitur, figura Carpio, *Dentes* in inferiori mandibula habet acutos, instar acicularum: in superiori duos longos paulo crassiores, quibus interjacent minutissimi

VIX SENS.

vix sensibiles. *Oculi* ipsi magni sunt, pupilla crystallina, circulo sanguineo primus, hinc argenteo. *Pinnam* longam habet per dorsum longitudine expansam, cuius mediam partem versus anteriora spinis surrigere, & in rimam recondere potest: reliquis quinque pinnae communes habet cum aliis piscibus: septimam pro cauda, quae lata & penè bicornis est. *Squamae* vestitur argenteis, mediocri magnitudinis, quae sanguineo colore umbratae sunt, ita ut maximam partem sanguineus videatur, argenteo colore transplendente; in ventre totus est albus, ut & sub faucibus. *Pinnae* omnes sanguinei coloris, exceptis iis quae sunt in infimo ventre, quae albae sunt, in extremitatibus tamen sanguineae.

Eduis est piscis. Sale etiam conditur & servatur.

**A C A R A** piscis palmum longus, dorso curvo, & alto corpore ut Petca. Os habet angustum, & dentium loco limam. *Oculus* habet magnos, nigros, circulo aureo. *Pinnas* obtinet sex, nimirum sub qualibet brachia unam longam, triangulum acutum referentem: à summitate autem dorsum pinna extenditur, firmis spinis sustentata & in triangulum acutum prope caudae exortum desinens. *Cauda* oblonga est, parallelogramma, in extremitate recta. Vestitur squamis satis magnis, argentei coloris, sed in capite, dorso, & lateribus ita umbra mixtis, ut fuscus videatur. Venter albicat. *Pinnae* omnes & cauda fusci sunt coloris ex umbra. In medio quolibet latere magnam habet maculam nigram, ut & prope exortum caudae.

Eduis est piscis, & capitur in dulcibus aquis.

### CAPUT XIII.

#### De GUARU-GUARU, Cucupu-Guachu, & Matuque.

TAB.  
XXXIV.  
p. 10. 11.

**G U A R U - G U A R U** pisciculus est minutus, nunquam maior sesqui-

digito, exili corpore, oblongo, instar minimi *Eldris*. Capitulum habet compressum: ocellos nigrissimos, circulo aureo: pinnulas quinque, nimirum duas postbranchiales, & duas subtus ferè in infimo ventre, & unam in posteriore medietate dorsum. *Cauda* constat pinna parallelogramma, in extremitate circinata. Vestitur squamulis, & totum caput superius, & dorsum anterior medietas sunt fusci coloris, posterior & latera aures, squamulis umbratis umbra: caput inferius & venter albi splendentis ut mater perlarum, pinnulae flavae. Prope caudam utrumque maculam habet nigram.

Eduis est & capitur in lacubus & stagnis.

**CUCUPU-GUACU** Brasiliensibus, Lutaris *Aleris*, Belgis Jacob *Eversen*: ingens sit piscis: habui, inquit Maragravius; quorum corpus cum capite, quinque pedes erat longum & cum cauda sex. Corporis ambitus quatuor pedum, octo digitorum, altitudo unius & semis. *Caput* & *Os* magnum habet, quod apertum in rotundum dilatat, edentulum: oculus mediocres, pupilla crystallina nigricante, circulo flavo: *Branchias* in ambitu rotundas, medio aures in triangulum desinentes: *Pinnas* quinque, nimirum unam à summitate dorsum incipientem & non ita longam à cauda desinentem, ad anteriorem partem seu medietatem plane angustam & acutis spinis munitam; posterior autem medietatem lata est, & semilunata in ambitu, spinisque haud firmis erigitur: prope anum unam eiusdem figurae, cum medietate posteriore dorsalis, sed dimidio minorem: Post brachias prope infimum ventrem duas longas & latas, tenuioribus spinis intertextas. *Cauda* magnam pinnam habet quadratam, in extremitate latior, quam in exortu. *Squamae* habet parvas. Totum caput, dorsum ac latera cinerei sunt coloris, seu umbra mixti, & versus dorsum paulo saturatioris. *Venter* albicat. *Pinnae* omnes cum cauda dilute brunneae. Per totum caput, dorsum, latera & pinnas post-

Idem L. 4.  
c. 14.



postbranchiales maculæ parvæ nigre, seu puncta frequentissima dispersa. Venter verò & reliquæ pinnae cū cauda his punctis carent. Bonam habet carnem. Capitur in mari.

MATURAQUE piscis est corpore oblongo, & fermè parallelogrammo, figura scilicet *Tamate*. Quinque aut sex digitos longus, sesquidigitum latus ubi latissimus. *Caput* habet latiusculum, dura testa tectum. Oris pars inferior paulò longior superiori : & in inferiori sex denticulos acutissimos habet, in superiori aliquot minimos : Branchias satis amplas : oculos rotundos, nigros, circello aureo, exteriùs fusco : Pinnae sex, nimirum duas postbranchiales oblongas, haud latas : duas tales in medio infimi ventris, & unam post anum trapeziji figura, & similem in medio dorso. Cauda constat pinna quadrata, unum fere digitum longa, in extremitate circumnata. Tegitur magnis squamis ordine positis. Totum caput superius, dorsum & latera nigra sunt, venter ex albo obscurè canescit. Pinnae omnes nigrae.

Capitur solum in lacubus & paludibus, non in fluviis. Boni saporis est.

## CAPUT XIV.

De *Carapo*, *Piaba*, *Piabucu*, & *Nhaquunda*.

**C**ARAPo prima species, corpore oblongo figura cultri, dorsum nimirum crassum & obrusum, venter acutus ut culter : posterius autem corpus definit in acumen : unum pedem circiter longus, duos digitos latus, ubi latissimus. *Caput* acuminatū, sed compressum, inferius labiū paulò longius superiori, os angustum, inferius ordinem denticulorum minutorum, superius nullos habet. *Oculi* minimi, nigri, vix prani papaveris magnitudine. Branchiae angustae, & postquamlibet parvula pinna oblonga. Unius fere digiti intervallo à capite in infimo corpore incipit pinna te-

nui, angusta, & per totum ventrem aequaliter porrigitur ad finem corporis : nam caudam nullam habet, nec ullam aliam pinnam in toto corpore. Squamas habet mediocres. Totus piscis est coloris ex fusco & paucò rubro mixti, ac in dorso & capite magis nigrescit. A branchiis in quolibet latere linea tendit ad finem corporis usque, quasi cultri acie tracta, & sub hac linea maculae nigrae per corpus dispersae, seminis sinapi magnitudine.

Capitur in lacubus & est edulis.

In flumine S. Francisci capiuntur Carapo huic priori speciei similes, excepto quod longiores sint, & in extremitate acuminati instar subulae, ad trium digitorum longitudinem squamulas parvas habent.

CARAPo secunda species, priori figura, colore & lineis laterilibus similis, excepto quod dimidiae ranum sit latitudinis, nec ullas maculas habet. Capitur in lacubus, Caro spinosa, sed boni saporis.

PIABAMA nitidine *Phoxini*, pisciculus duos aut tres digitos longus (interdum quatuor aut quinque : quando maximus) ocellos habet nigros, circello aureo. Squamulis vestitus. In medio dorso pinnula erecta triangularis : post quamlibet branchiam unam habet oblongam : duas in medio infimo ventre & post has unam, quae ad caudae exortum protenditur : cauda est furcata. *Caput* ad latera aureo & argenteo splendet : rotundum dorsum argenteo viridi & multo Indico : medium laterum secundum longitudinem argenteo & Indico mixtum. *Venter* aureo & argenteo & paucò Indico. Post quamlibet branchiam maculam habet rotundam, satis magnam Indici coloris, & statim post hanc eiusdem coloris maculam lineae corniculatae figura, eiusdem coloris oblongam in quolibet latere ad caudae exortum. *Pinnae* omnes & cauda aurei coloris, quae in infimo ventre rubrae. Capitur in omnibus fluviis currentibus Brasiliae, ac summa vi contra aquae cursum nititur.

Brasiliiani involvunt foliis arboris,  
Bb & ci-

& cineribus condunt, de super ignem imponentes; sic præparatos comedunt. Saporis sunt haud contemnendi.

**PIABUCU** pisciculus sex digitos longus, sesquid. itum latus, ubi latissimus, ventre paululum extuberante, oculis elegantibus, pupilla crystallina, circulo argenteo, cui superius parum rubri admixtum. *Septem* habet pinnas, octavam pro cauda furcari: nimirum postbranchiales duas in infimo ventre, unam in medio dorso, circa anum unam longam extensam versus caudam; & è regione huius in dorso parvulam. Tegitur squamulis argenteis splendentibus. Per mediū laterum secundum longitudinem tendit linea alba lata, nō splensens. Dorsum autem ad hanc lineam olivacei est coloris, cui viridis hyacinthinus persplendet. Pinnae albae.

Capiuntur facillimè aciculis, vel corbe, aut olla immissa in aquam, cui parum farinae de mandioca, aut mica panis intrita. Costi comeduntur & trixi. Si quis vellevir vulnerrato uno aut altero membro, vel ulcusculum tenens aquam ingreditur, statim hic piscis vulnus petit mordendo, ita fitiens est sanguinis humani.

**NHAQUYNDÁ:** Mas & femina reperitur. Mas corpore est oblongo, ferè ubique æquali, septem, octo, aut decem digitos longus, duos altus, ubi altissimus; *Caput* & os ferè *Lucij* habet, superius labium extendere, & oris hiatus rotundare potest: Dentiū loco habet limas, linguam tenuem, branchias amplas, oculos conspicuos, pupilla nigra, circulo fusco: septē pinnas, post quamlibet branchiam unam, duos ferè digitos longam; sub his in infimo ventre duas junctas, & post anum unam penè quadratā. Ab initio ferè dorsi una propenditur penè ad caudæ exortum, tres digitos longa, unū ferme lata, æqualis, mollibus spinis suffulta, quæ in fine paulo latior, & in triangulum definit. *Cauda* testā dura tegitur nigra. Totum corpus squamis mediocris magnitudinis vestitur, ac totum dorsum & late-

ra obscuri grysei sunt coloris cum argenteo transplendente. Venter albus. In utroque latere unum ordinē habet macularum, rotundarum, nigrarū, pisci magnitudine, & inter has dispersa punctula multa cærulea. Pinnae omnes aureæ, ut & cauda: & pinna dorsi insuper variegatur per totū punctulis cæruleis. In utroque latere per ordinem macularum nigra tendit linea, incipiens à fine superioe branchiarum, & ad regionem finis pinnae dorsalis desinens, & semidigitū ferè interstitio sub huius fine, alia linea incipit, ac in medio exortus caudæ desinit. Lineæ hæc elatae sunt ac aureæ.

Capitur in fluviis, ac boni est saporis.

Femina mari per omnia similis, excepto quod punctulis cæruleis in lateribus & pinna dorsali destituitur, & quod venter circa anum rubescit. Comeditur ut mas.

#### CAPUT XV.

#### *De Amore Pixuma, Amore Tinga, Guara Tereba, Piracoaba & Cocoroco.*

**AMORE PIXUMA** Brasiliensibus, TAB. vulgo corrupte *Amorea* piscis XXXV. magnitudine *Tamoata*, capite lato, ore amplo, & edentulo, corpore oblongo, ita ut ferè *Tamoatam* referat. Coloris est obscure feretū in ventre, qui extuberat, albi. Tegitur cute molli: pinnas habet septem & octavam pro cauda in ambitu circinatam. Carne est sicca & bona, ut *Tamoata*. 3.4.5.6. *Marigraz* H. Bras. 4.4.17.

**AMORE TINGA** Brasiliensibus, piscis est eiusdem plane figuræ cum *Amore Guacu*, sed tantum minor: habetque squamas in totum albicantis, seu pallidi coloris, & in totum maculatur maculis fuscis, ut *Tajassica*. Cauda ramen illius est fusco undata. Edulis est ut præcedentes.

**GUARA TEREBA.** Piscis magnitudine septem aut octo digitorum: capite obtuso, oculis crystallinis, circulo argenteo:

reo: os denticulos habet minimos: Branchias amplas: dorsum incurvatum, unde & *Corcovado* minor potest appellari. *Pinnas* obtinet septē: post quamlibet branchiam, unam longā: sub his duas junctas in infimo ventre: in medio autem ventre duas spinulas acutas, quæ membranula cōnūguntur; & post hæc triangularem, quæ deinceps angustata ad exortum caudæ extenditur: in summirate dorsi triangularem mediocrem, & post illam altam similem majorem, quæ angustata ad exordium caudæ porrigitur. *Cauda* in duo cornua extenditur. A branchiis linea tendit ad medium piscis, quæ dein obliquè deorsum vergit, & directè usque ad eandem porrigitur: hæc posterior lineæ medietas hamulis postetius versis armatur, & utroque latere triangularibus vestitur squamulis, quæ minimæ sunt, ut ad tactum glaber videatur. Colotis est in dorso & lateribus usque ad medietatem longitudinis exhyalino exarulescentis: reliquum laterum & venter albicat, sed autem color transplendet. *Pinna* venteris albæ, reliquæ cum cauda aurei sunt coloris.

Edulis est piscis.

*Piracoba* piscis pedalem longitudinem adipiscitur, corpore oblongo, ut *Zander* Pomeranorum. Os habet acuminatum, amplum, edentulum: mandibulam superiorem longiorem inferiore, & superior pars otis prominet in rotundum conum è cartilagine constantem: *Oculus* illi satis amplus, pupilla crystallina, circulo auteo. *Pinnas* habet octo: nimirum duas in dorso triangulares erectas, interstitio sesquidigiti: post quamlibet branchiam unam longam, angustam: duas his breviores in infimo ventre junctas, & prope anum unam triangularem: octava est cauda furcata. Sub quamlibet pinna postbranchiali barbâ habet sex pilis crassiusculis constantem, tres digitos ferè longis, estque eius exortus prope exortum pinnarum, vergens retorsum. Totus vestitur squamis medioctis magnitudinis argentei coloris, & in dorso a summ-

tate capitis paulum cānescit. *Pinnæ* quoque omnes cani, seu cinerei sunt coloris: postbranchiales tamen nigredine dilutæ sunt, Barba alba. Capitur arenosis locis in mari. Boni est saporis.

*CORO CORO* piscis dorso incurvato, capite & ore obtuso: pedalis longitudinis. Denticulos habet parvos, haud acutos: branchias satis amplas, quarum anterior pars in spinam definit acutâ: sex pinnas: nimirum in quolibet latere post branchias unâ tres digitos longam, subter in infimo corpore duas triangulares fere, sed in extremitate circumatas: & anterior firmâ & acuta spina suffultas, post anum una crassa, dura & acuta ipina nixam, cui parvula spina antistat. A summirate dorsi pinna incipit, quæ arcuatim ad medium dorsum tendit, firmis ac acutis spinis sustentata, hinc definit & contigua illi est mollis, quæ & arcuata fere est, & pene ad exortum caudæ protenditur. *Cauda* duos digitos longa, quatuor lata. *Squamis* majusculis vestitur totus argentei coloris, sed in toto dorso, & eius summirate diluta umbra mixtus & per latera transversim (non tamen ad ventrem usque) in quolibet octo strig, digitum latum eralliz, ex diluta umbra descendunt: venter totus albus, ut & illius pinnæ. Pinna dorsalis, postbranchiales & cauda ex argenteo & diluta umbra mixtæ. Pinnam autem anteriorem dorsalem in rimam potest recondere. Capitur in mari, & est edulis.

#### CAPUT XVI.

##### De *Guatucusa*, *Vribaco*

##### & *Guarervia*.

**G**UATUCUSA Brasiliensibus, *Labella* Congensibus, *Corvina* Lusitanis. Piscis corpore oblongo, dorso paulum, ventre minimum curvo: lû- idem ibid. <sup>XXXV.</sup> <sup>7.8.9.</sup> longitudinem duorum pedum non raro adipiscitur. Os habet acuminatū, cuius inferior pars paulo longior superiore, quodque ample potest diducere; dentes minimos, linguam conspiciam, branchias amplas; oculos stufieri magnitudine, pupilla nigra, circulo

Bb 2 argen-

argenteo. Pinnae obtinet septē; postquamlibet branchiam unam oblongam; duas sub his in infimo ventre paululum versus posticam partē, unam post anum triangularem, unam triangularem ac latam in summitate dorsi, duriusculis spinis suffultam, & huic fere contiguam alterā in posteriore parte dorsi oblongam, quæ æqualis fere latitudinis, atque ad exortū penē caudæ protenditur. *Cauda* consistat pinna fere quadrata & lata. Parvulis rotundis squamis totus vestitur, coloris per totum argentei splendētis, cui tamen in dorso aureus transplendet, & ad tactum videtur lævis. Pinnae & Cauda ut & venter albiēat. A summitate autem branchiarū per medium latus ad caudæ exortum tendit linea argentei coloris. Capitur in mari, ac optimi est saporis.

URIA a corpore piscis dorso ineurvato, ventre protuberante, quindecim aut sedecim digitos longus, quinque, aut sex altus, ubi altissimus. *Caput* & os obtusum, conum referens triangularē: dētes parvuli, acuti, lingua lata: brachiæ amplæ in triangulum delinētes: Oculi dupli stufeti magnitudine: pupilla crystallina, circulo argenteo, cui aliquid cinnabrij mixtum est. *Pinnae* habet sex, nimirum post quamlibet branchiā, unam longam triangulum acutum referentem, sed exterius paulum circinatam: sub his in infimo ventre duas triangulatas, anteriū firma spina munitas: post anum unam oblongam, in exteriori ambitu circinatam, molliuscule spinis per medium suffultam, anteriū autē dura & acuta spina: à summitate autem dorsi ad exortum fere caudæ pinna latiuscula, latitudinis fere ubique æqualis, & acutis spinis suffultata. *Cauda* itidem lata in duo veluti cornua distenditur. *Vestitur* squamis magnis, in totum argentei coloris, sed cui parum cinnabrij translucet. Pinnae laterales, & infimi venteris albæ seu argenteæ, dorsales & cauda plus cinnabrij, quā argentei habent. A summitate deniq; branchiarū ad caudā usq; (paulum arcuatim) tendit linea rubra, & supra eam in posteriore parte corporis, in utroq; latere, maculā ha-

bet nigram magnitudine grossi n. inf. niei. Capitur in mari. Edulem habet carnem & bonam.

*Guarerva*, piscis corpore lato, compressoq; quatuor digitos longo, tres lato, ubi latissimus, ore parulo, denticulis minutis. *Pinnae* habet sex, nimirū postbranchiales duas, parallelogrami figura; duas oblongas & latas in superiori dorso, & infimo ventre posteriori, quæ in acumen definūt, figura subulæ. *Cauda* quadrata, seu potius parallelogrami, unum digitum longa, & duas tertias partes digiti lata. Squamulis tegitur nigri coloris splendentis instar bombycini, quarū oræ (quarundā tantum, non omnium) fimbrias habent flavas instar tenuilunularum. Pinnae omnes nigræ. Circa os linea crassa est ferrei coloris, & alia illi perpendiculariter superposita. Corpus tres lineæ latæ ambiunt, quarum duæ per latas & posticas pinnas extenduntur; (caudam etiam talis linea fecat, & eiusdem coloris) una pro fimbria ipsi est. Oculorum pupilla nigra, circulus aureus.

## CAPUT XVII.

De Camaripuguacu, Piratia  
pua, Curema, Parati,  
& Aramaca.

*Camaripuguacu* piscis dorso recto, TAR. XXXV.  
ventre paululum extuberante; 10.  
pinguis ad tactum & revera. *Caput* ha- Marcgr. 10.  
bet anteriū acuminatum, os amplū, H. Raf. 10.  
edentulum, quod in rotundum di- 4 c. 18.  
ducere potest, nimirum superiore mandibula, inferiori immota permanente, ita ut duos pugnos humanos iuxta se, vel etiam humanum caput possit admittere. *Lingua* habet conicā, crassā, superior autem mandibula brevior est inferiori, ita ut clausum os superius habeat: *Oculus* latior Imperiali, rotundos, crystallinos, & argenteos, branchias amplissimas. Longitudinem adipiscitur undecim aut duodecim pedum, crassitiem viri, *Pinnae* obtinet septem; duas haud procul distitas à branchiis, in lateribus proximè ventrem anteriorem, longas, triangulares; cuiuslibet autem harum parvula subest, quæ tamen

nata.

natando vix videri potest: in medio inferiore ventre itidem duas coniunctas, triangulares, latiores prioribus, sed breviores: has versus posticā partem corporis inferioris sequitur alia solitaria pīna, triangularis, lata, squamata, quæ appendice continua, angusta, protenditur ad caudæ ferè exortum: in dorso altera medietate versus posteriora, pinna est elata triangularis, lata, quæ appendicē habet versus posticam partem vergentem, elevatam, triplo longiorem, instar funis crassioris. Septima pinna est pro cauda, quæ secta est, & in amplam extenditur furcā. Squamis vestitur magnis, obrotundis seu peltatis, maioribus Imperiali, in dorso tamen minoribus materia squamarum alba, pellucida instar matris perlatum: sunt autem arctè sibi impositæ squamæ, ita ut quadruplices aut quintuplices jaceant, ac de qualibet ante aliam prominet pars figura lunæ bisectæ, quæ argenteo obducta est (revera repræsentat argētum.) & titulos hinc inde discurrentes monstrat argenteos in argenteo campis totus piscis argēto obductus videtur, præterquam in dorso, ubi cæruleus est, argēto tamen translucente. Pinne omnes argenteæ, præter dorsalem, quæ eundem colorem habet cum dorso. Carnem habet lentam, quæ diu coqui debet, multæ in carne spinæ, sed satis crassæ, ut facili inter edēdum extrahi possint. Magis aspectu quam esu piscis delector.

Comedi sæpius eius carnem, sed lenta est, & tantū famelico conveniens. Os superius ossa habet duritie æqualia ossibus alicuius animalis.

*Piraria* Puatigentē adipiscitur magnitudinem, ut *Capuripima*. Inferior mandibula paulo longior superiori: dentes acuti in tota mandibula inferiori, in superiori solum in medio, qui longiores, quemadmodum & mediū in inferiori: Os ampliare amplissimè potest in rotundum foramen. *Oculus* obtinet non ita longos pro corporis mole, pupilla crystallina. Branchias amplas, duras seu armatas. Corpore a. est oblongo, dorso paulū incurvato versus caput, & ventre mediocriter amplo. Pinnas habet septem: Vnam à

summitate dorso (incipientem versus capitis ferè exortum) ad caudæ usque initium protensam, quoad medietatem anteriorem spinis suffultā, quoad posteriorem mollem sine spinis, in medio a. sui angustior, antèrius latior, postèrius adhuc magis latam & quasi circumatam in extremitate. In quolibet latere post branchias, unam latam, & in extremitate circumatam, cætera quasi quadratam: sub his in infimo ventre duæ propinquæ sunt oblongæ, haud latæ, firmis spinis nixæ: prope anum unam habet satis ampliā, itidem circumatā fimbria postèrius, utrica quæ in dorso. Corpus postèrius quadratè extenditur, & continet septimam pinā pro cauda, quæ ampla est, & figuræ penè quadratæ. Squamulis vestitur parvulis, ita ut ad tactum glaber videatur, etiā si antrorsum mulceatur. Coloris est per totū corpus ex obscuro aureo epatici, qui tamen obscurior in dorso & summo capite huic a. coloris per totum retis in modum cinerei coloris lituræ obtenduntur. Pinne omnes eiusdem cum corpore coloris, laterales a. præterea fimbrias habent aureas, reliquæ epaticas. Carne satis probata est, si junior sit, nimirū sex, septè aut octo pondos & assatus magis quam coctus, nam pin. uis est: a. adultior verò ducentorū aut plurium podo catnem habet probatius, nec delicatiorē carne *Camarupim a. su*, nimirum lentā, tenacem, ac difficilis coctionis. Capitur in mari.

*Curema* species *Tainha* grādis & crassa. Piscis marinus, in duorum pedum longitudinē excrefcens, corpore oblongo, ferè cylindræco, more *Trutæ* fluvialis, crasso & præpingui. *Caput* in conum obtusum definit, superius compressum & latum, durum, squamis duris rectum. *Os* pro mole corporis parvum, parabolicū, labio superiori conspicuo, mobili, inferius a. os triangulare, obtusum discubiz, & paulo brevius est superiori, edentulū. *Oculi* magni, rotundi, antèrius positi, nigri, circulo argēteo. Duo narium foramina sup. a. os. Branchiæ semilunares, haud amplæ. Pinnas habet septem (octavā p. cauda, quæ in duo cornua definit) nimirū duas postbranchiales, triangu-

latus duas, magis versus posteriorem in infimo ventre, junctas in summo dorso parvas, tribus suffultam duriusculis spinis: post anum unam bicornem, & illi oppositum in dorso eiusdem ferè magnitudinis. Tegitur squamis magnis clypeatis, planis: color rotius piscis in summitate capitis, dorso & medietate laterum obscurè cinereus, cui hyalius transplendet: reliquum laterum, venter & caput inferius argentei splendentis coloris, uti & pinnae ventris, reliquae pinnae cum cauda eiusdem cum dorso coloris. Præpinguis est & coctus vel assatus sine oleo vel butyro comedi potest. Salit<sup>r</sup> & in sole siccatus asservatur magna copia. Salitus quoque & in muria servatur. Optima illius pars venter.

TAB.  
XXXVI.  
12.

*Parati Lusitanis Tainha*, piscis est in longitudinè pedis excrefcens, figura corporis ut *Curema*, cui per omnia similis est excepta magnitudine, & quod circum auro habet circa oculos. Carne est sicciori, & quæ intercoquendum pinguedinem flavam de se fundit. Magna copia saliti in sole exsiccantur & recoduntur. Capiuntur retibus, ut & *Curema*, transiliunt a retia eleganti spectaculo, quando illud trahitur: quando malacia est magno numero ex aquis exsiliunt.

*Aramara Lusitanis Lingoda* & vulgo *Cubricuncha*, solex est species compresso corpore, & figurâ habens solex quæ Belgæ vocant *Tonge*. Os denticulis acutis peditur: caret lingua: *Oculus* habet duos in uno latere (ubi lapidei est coloris) in altero nullum, pisci magnitudine, unum prope latus posterius oris, alterum superius & magis versus posteriora vergentem, pupilla lunata, crystallina, hyalino colore et transplendente. Branchiae satis amplae, in quolibet a latere post brachias est pinna una, duos digitos longa, angusta, superius in pilum tenue desinens; ad brachiarum finem in infimo corpore sunt duae parvae pinnae junctae. Per totum a. corpus tam superius, quàm inferius secundum longitudinem habet pinnam usque ad caudam extensam, tenuem, vix semidigitum latam; cauda se è quadrata cõstat pinna tenui. Venter squamulis parvulis, & in toto sinistro late-

re, ubi oculos habet, lapidei est coloris, in latere dextro albi, vivit in mari inter arenas. Edulis est & boni saporis.



## TITVLVS II

### De Piscibus Exoticis Lativibus.

#### CAPVT I.

### De Piscibus in totum levibus.

#### ARTICVLVS I.

### De Guamaia, Ape & Ptimbuaba.

**P**lures Exotici laeves sunt in TAB. XXXVI: duplici differentia: Vel enim sunt in totum laeves, vel cum aliqua lativitate spinosi. Existis sunt quos hic describemus.

**GVAMAIA CV APE** Piscis triangularis, duplex est, unus cornutus, alter sine cornibus. Cornutus ab ore ad initium caudae septem digitos est longus, (in rerdum & longior) à ventre ad dorsum summitatem tres digitos latius seu altus: venter vix duos digitos latitudine complet: cauda unum digitum lata, desinens in pinnam duos digitos longam & totidem latam. Os ipsi parvulum, & pisci tantum capax: habens in superiori mandibula duodecim denticulos angustos, acutos, in inferiori quinque. *Caput* ab ore ad cotnua usque in gibbum assurgit, convexitate sesquidigiti: dorsum autem ad eundem modum in gibbum atcuatur: & unicam tantum habet pinnam in postica parte versus caudam, & quidem exilem. *Oculus* habet satis amplus, diametro trientis, superne in capite in fronte positos prope cornua, ab ore circiter sesquidigiti intervallo: & ante singulos oculos foraminulum unum. *Pinnas* in universum obtinet quinque: unam in extremo dorso, ut iam dixi, & in quolibet latere unam, longè infra oculos versus posticam corpor-

torporis partem paulum vergentes, unum digitem longus: & prope utraq; rimā, unam plus semidigito longam. branchiarum loco unā denique pinnā inferius in ventris extremitate prope exortum caudæ, unum pene digitem longam, dimidium laræ: quinta facit caudā. *Cernua* duo directe anteseptotenſa in fronte gerit prope oculos, magnitudinem & calcario galli galinacii, duo itidem æqualis magnitudinis in infimo vētre verſus quartam pinnam. Carer(quamvis, ſed regitur denſa cure, in ventre quidē alba, reliquo a corpore ſuſca, atque in ventre & lateribus uſq; ad altitudinem oculorum figuris trigonis, tetra, onis, pentagonis, ſexagonisq; mirē diſtincta & notata. Vbiq; a. (excepto infimo ventre) eadem cutis variis maculis nigricantibus eſt inſignita. De altera ſpecie ſuperius egimus.

*Idem H. B.  
Ab. 4. c. 4.*

*Perimboſa* piſcis eſtes aut quatuor pedes longus: corpore inſtar Anguillæ. *Oſ* edentulum acuminatum, ſuperiori manibula breviori quam ſit inferior: eſtque lōgitudō oris ſeſquidigiti, amplitudo, ubi maxima, vix unius. *Caput* novem digitos longum eſt ab oculis ad oris extremum, craſſities eiꝯ poſt oculos quinque digitorum, hinc paulatim minuitur, ita ut prope oſ ſit tritium tantū digitorum. In ſumma a. longitudo capitis à ſine branchiarum ad oris extremum eſt unius pedis & unius digiti. *Oculus* habet ſatis magnos, magnitudine nucis avellanæ & pene figura, pupilla ſplendida cæruleſcente, quā tunica ambit argentea, in parte anteriori & poſteriori macula miniata notata. Poſt branchias in utroque latere, pinna directe p̄tenditur à latere ſeſquidigitum laræ & longa ruſeſcentis coloris: hinc ſex & ſemis digitorum intervallo verſus poſticam corporis partem, duæ pinnæ parvæ ruſeſcunt in quolibet latere una, ſed magis verſus ventrem.

Poſthas pedis intervallo ſequitur pinna ruſeſcens duos digitos longa, ſeſquidigitum laræ: ſub hac autem eiuſdem magnitudinis & coloris una in infimo ventre: demum à ſine hatū intervallo ſere quinque digitorum,

ſunt adhuc duæ pinnæ ruſeſcentes paulo minores ſuperioribus, una ſuſum, altera deorſum elata, & inſer has ortum ſumit cauda inſta murene tenuis, cetes, ſex digitos longa. Corporis a. longitudo à ſine branchiarum ad caudæ initium eſt duotum: pedum & trium digitorū. Cute eſt inſtar Anguillæ glabra, coloris in toto corpore & lateribus ab oſe ad caudam, hepatici, in dorſo triplici, in lateribus unica ſerie macularum cærulearum magnitudinis nummi Miſnici ſerē: hæc maculæ à medio corporis in lateribus ad caudā uſq; in lineas coeunt: inter omnes a. maculas cæruleas ordine intercedunt maculæ viſcentes. In inferiori corpore ram ſub capite quā ventre albeſcit, & videtur aliqua rubedo inſperſa. Corpus a. univerſum non exadē teres eſt, ſed compreſſum & latiusculū, ventris n. latitudo prope ſecundum par pinnarum, ubi latiffimus, duorum digitorū, craſſities ibidem totius corporis ſex digitorum. Hinc paulatim attenuatur, donec prope exortum caudæ ſit ſeſquidigitum paulo plus aut minus craſſum. Edulis eſt piſcis. Poſſeſt *Acus* piſcis vocari. Iconum quas ſupra dedimus, nulla cum hac convenit, niſi fortē *Acus* minor Bellonii.

## ARTICVLVS II.

*De Nhambdia & Guape-  
rua.*

**N**HAMBIDIA Braſilienſibus, *Sagre Tab. do Rio Luſitanis*, piſcis corpore XXXVI. oblongo, obelo, ventre molli, verſus 5. 6. poſteriora anguſtiori. *Capite* compreſſo, & ore parabolice figuræ, & denticulis minimis prædito. *Et* autem corpus duodecim aut quatuordecim digitos longum, duos & ſemis altum, ubi altiffimum. *Oculi* parvuli, paululum protuberantes, rotundi, pupilla nigra, ciculo ex auro & umbra mixto. Branchiæ ſatis, amplæ, & barba ſex filiis conſtans, duobus ſupra & quatuor infra oſ: Eorum quæ ſupra oſ verſus laſus ſtant

stant quodlibet crassitiem habet fili, quo literæ obſignantur, quinque digitos longum, & poſt cuiusque exortum fovea eſt oblonga, in quâ barbæ initium incumbit, vertèdo illam poſtica parte, ut ſemper facit: quatuor inferiorum quodlibet exterius duos & ſemis digitos longum, interius ſequidigitum: ſuntq; inferiora fila barbæ non ita craſſe ut ſuperiora. *Pinnæ* habet ſeptem, & oſtava eſt p cauda: nimirum poſt quamlibet branchiam unam oblongam, firmiſſima & acuta ſpina munita (quemadmodum & in exortu ipſius poſt branchiam os durum eſt, triangulare) ad medietatem corporis ante anum duas junctas oblongas, in extremitate circinatas: verſus caudam in inferiore ventre unam ferè quadratam & in extremitate circinatas: in ſummitate dorſi magnam quadratam multis ſpinis ſuſſultam & poſt illam unam longam anguſtam, cute carnoſa conſtantem, qua & corpus eſt teſtū. *Cauda* biſecta eſt, & quilibet pars in exitu circinata. *Cute* tegitur non ſquamis.

*Caput* dura teſta teſtū, osque ſuperius totum umbræ coloris: dorſum & latera cinetæ cum pauxillo cæruleo mixti: Venter albus: pinna dorſalis priot prope exortum eiſdem coloris, cætera in totum nigri, ſpinis cinetæ: poſterior eiſdem coloris cum dorſo & lateribus: pinnæ poſtbranchiales totæ nigræ: barba nigra, uti & pinnæ ventris & cauda, licet in exortu paululum ruſſæ. A ſummitate branchiarum per quodlibet latuſ tendit in medio linea rubra uſque ad caudæ initiū. Capitur in fluviis, & eſt optimi ſaporis, vulgoque comeditur.

*Gnapterna* piſcis cuius longitudo ab initio oris ad exortum caudæ paulo plus duorum digitorum (reperiuntur tamen & duplo maiores) corporis medi crassiſſis, ubi maxima, etium: laterum quodlibet unum digitum alrum. Caret omnino brachiis: habet ſatis amplum & elatum, proiectum inſtar canis, miniſſimis denticulis: loco linguæ lapidè habet inſtar Carpinis ocellos vix grani milii magnitudine, colore egregie turcoïdis. Inter ocellos in medio ſuperioris labii,

ſeu in fronte corniculū gerit ſurſum erectum, & paulū retrorſum verſum, & ante illud corniculum etiam ſilum tenue, & dimidium termè digitū longū verſus anteriora directè ppenſum paululum tamen elevatū, cui appendiculum adhzret ut in Liliis: ſilū hoc retrò recedere poteſt: nam poſt corniculū fovea eſt in vertice, hinc parva eminentia & iterum vallis, tunc ad unū digiti longitudinè pinna in dorſo porrigitur quadrantem lata. *Cauda* pinnulā habet plus ſemidigitum longam: à cauda interſtitio aliquo verſus anteriora circa ani regionem iterum pinnula eſt ſemidigitum longa & due parvulæ in inferiori corpore ſub peſtore. In medio a. ferè corpore, magis tamen verſus anteriora, in quolibet latere brachium obinet, deſinens in pinnā duas trientes digiti longam, & penè ita latam, pinna a. brachiorum octo conſtat ſpinis, quæ per pinnæ longitudinem diſparguntur, & anterior prominent inſtar octo unguiculorum acurorum. Brachiū quodlibet unica conſtat junctura ac verſus anteriora deſceſcit, ut ita naturæ piſcis e comodiſſe ſerviat. Caret in totum ſquamis, ſed tegitur cute in ventre molli, reliquo corpore ad tactum aſpera & ſcabra, ut in Tiburonibus. *Color* cutis eſt obſcurè rubricans, cui ſcuſcus admixtus, & per totum corpus maculas habet nigras, figura undarum. Pinnæ & brachia etiā eiſdem ſunt coloris cū ſuſco mixti. Sed pinna in dorſo in quolibet latere quatuor habet maculas nigras maiores: cauda verò & omnes pinnæ minores eleganter variegatæ ſunt. Ventriculū habet duos digitos longum, cum oriſicio tres digitos longo, & duos circiter amplo, q; in ipſas fauces inferitur: Vnde ventriculum inflare inſtar utriculi poteſt. Caro eiſ non comeditur. Ad orbium claſſem pertinet. Veſcitur ſquillis: natans egregie explicat pinnas & inflat ſe, ut inſtar orbis, ſeu pilei appareat rotundus. Habui alium totum colore differentem, duos & ſemis digitos longum qui totus erat coracini coloris ſplendentis, & ſe inflabat. *Cutis* horum piſcium facile detrahi poteſt, & tomento impleta ſervari.



*Perca fluviatilis*



*Clupea*



*Gadomus apr.*

3



*Petromyzon*



*Gymnotus*



*Nemodus*



*Ceriodon*



*Purpur*

8



*Pylae inominatus*

9



*Harle*





## ARTICVLVS. III.

De Curvata Pinima, Puraq,  
& Pisce innominato.

TAB.  
XXXVI.  
7-8-9.  
Nucgray.  
Holl. Bras.  
H. 4-c-5.  
6-6.

**C**VRVATA PINIMA, Lusitanis *Bo-into*. Piscis est *Cordovadi* magnitudine, veletiam maior, corpore oblongo, satistamen lato & crasso, amplis branchiis, oculis grandibus atq; teis. Caret squamis, & tegitur solummodo cute præterquam in medio laterum: nam cuiuslibet lateris mediū à branchiis usq; ad caudam per meat lata linea aurei coloris; hinc à branchiis incipiēs alia parallelos superius ducitur ad duas partes totius longitudinis hinc hæc parallela secat oblique auream, & pergit parallelos usq; ad caudam: linea hæc parallela autem antecius, & usque dum auream secat, duplici squamularum serie minimarum insignitur, & tota est glabra, postica parte, ubi secat auream, & infra itidem duplici serie squamarum notata, sed maiorum, & linea ipsa nō est glabra, ut antecius, sed aculeata quasi denticulus piscium. Color piscis in dorso & lateribus subviridescens, in ventre albus & splendens. *Pinnæ* habet septē, nimirum post quamlibet branchiam unam oblongam: duas sub his versus posteriora iunctas in infimo corpore: unā in medio ventre, & huic oppositam unam in summo dorso, & adhuc in dorso unā magis versus anteriora. Ab ultima dorsali & ventris pinna continua, haud lata, acuta utrobique: ab utroque exordium caudæ: quæ fuscata est. Capititur frequentius in mari, & boni est saporis.

**PURAQVE**, Lusitanis *Pixe viola*, ob figuram quam cum *Cithara* communem habent qua ludunt Lusitani. Piscis est latus, non crassus, cartilagineus. Longitudo eius ab initio capitis ad finem caudæ unius pedis, & novem digitorum. Ab initio seu acuminis capitis ad octo digitorum intervallum versus posteriora, cordis latitudine figuram habet, uti pingi solet, latitudo eius, ubi maxima septem digitorum, excurritque ibi in latere in pin-

nas instar *Raijæ*, estque penè transparens cum luci obvertitur. Caret branchiis. *Caput* in coniformam definit. Ab acuminis capitis tres digitos & semis retrō numerādo, occurrunt oculi unum digitum ab invicem distantes, rotundi, prominētes, mediocris avellanæ magnitudine, pupilla nigra, circulo autem. Ad utrumque oculum versus posteriora habet fistulam, minimi digiti apicem capientē, per quam aquā evomere potest. Sub oculis, in inferiori tamen corporis parte, os habet, distans tantum ab initio capitis quantum oculi, sesquidigitum amplum, edentulum, & duo spiracula sesquidigitum post os versus posteriora: In quolibet latere quinque incisuras habet, ut *Raijæ* & *Tiburones*.

Post anteriorem illam cordiformem corporis partem reliquū corpus rectes, aliquantulum tamen compressum, & ibi latū tres digitos, & in quolibet latere habet pinnā mollem, tres digitos longam, & sesquidigitum latam: hinc angustius fit corpus usq; ad caudæ pinnam, ubi digitum est crassum. *Caudæ* pinna ferme duos digitos longa, paulo plus uno lata, superius longior, q̄ inferiori, ut in *Tiburones*. Inter duas a. illas pinnas secundas laterales versus caudam in dorso, distantia duorum digitorum ab invicem adhuc duas pinnas erectas habet, ad tactum instar membranæ crassioris, triangulares, duos digitos longas, sesquidigitum latas. Tegitur cute molli, nullis squamis, ac in toto inferiori corpore in medietate anteriori est albus, in posteriori incarnati coloris cum albo mixti. In dorso, antepetiori corpore glutinis est colore, fuscis maculis variegato, in perispermiaque egregia varietate puncta ex albo caeruleiscentia. Pinnæ quoque glutinis habent colorem, ac in lateribus aliquid rufescentis mixtum. Acumen capitis cartilaginis colorem obtinet, quæ etiam constat. Per totius dorso longitudinem ad tactum spina dorsalis, quasi tuberculis minimis eminet. *Caput* illius tenebris lucet noctu. Caro eius non comeditur. Sed si comeditur,

Cur,

tur, asserunt piscatores, per tres horas semifatus reddi homines, dein sponte adseredire. Vnius attactus, crepitum articulo rum manus, & brachii causat, qui tamen statim desinit: & si in medio tangatur, artuum tremore efficitur.

Capitur menibus pluviolis, quando tempestuosum est in Bibrubi fluvio, longè ex terra adueniens, cum Raijs & Pastinacis.

PISCIS INNOMINATUS in septè digitorum longitudinem excrecit; figura similis illi, quem vulgo *Harder* appellamus; pinnis tamen aliter firmatis: duz enim quz in infimo ventre anterlore sub branchiis sunt, magnæ & latæ, duz post branchias in lateribus parvæ, in dorso duz mediores, & in inferiori ventre posteriori parvæ. Cauda constat pinna furcata. Os parvum, oculi magni. Cutem habet glabram, sine squamis: in dorso nigricantem, ac in utroque latere quatuor nigricantes maculæ magnæ à dorso protenduntur, in ambitu suo violacei coloris: Inter maculas autem versus dorsum prominet thalassinus color: reliquum corpus argenteum. Pinna nigricantes cum violaceo mixtæ, & duz illæ magnæ sub ventre quinque argenteis maculis singulæ insignitæ. Insignis coloris piscis, quando natans videtur. Vicinat venenis illis Beseaenæ.

#### ARTICVLVS IV.

#### De Mucu, Abacatuia, & Acaramucu.

TAB.  
XXXVII.  
1.2.3.  
MARGRAY.  
H. Bras. 1.4  
6. 16.

**M**Vcu Brasiliensibus, piscis tereti corpore, ut *Ennecephalmus*, vulgo *Lamprea*, Germanis *Neunaugt* nec crassiori: circiter duos pedes sit longus, magis aut minus: Capitulum habet acuminatum, conicum; ocellos parvos nigros: os irem parvulum: guttur inflare aliquo modo potest. Caret pinnis: per latera lineas obliquas nigras habet, angulos obliquos per medium laterum invicem facientes.

Edulis est & capitur in lacubus &

paludibus. Iconem eius Nobilissimus de Laër in Americæ descriptione, sub nomine *Phirre* dedit verum descriptio *Mucu* cum iconone non sitis convenit, ideo non est mirum, quod diversum à *Mucu* esse sentiat.

*Abacatuia*, Lusitanis *Peixe gallo*. Faber & Gallus marinus. Pailieris magnitudinem habet, altus & latus instar illius, subrotundus, nequillo crassior: Orilli est haud amplum, edentulum; Oculi nigri, circulo argenteo. Pinnae habet quinque, unâ in dorso, unâ in ventre, utramque descendentem, & continuam ad caudam usque: itidem post branchias utrimque unâ: Cauda constat pinna furcata. Præterea habet duo quasi fila in longum extensa ab inferiore corpore, & unicū tale in dorso ante pinnam dorsalem. Caret squamis, sed tegitur cute levislima, splendente, coloris argentei: totusque est illius coloris, exceptis filis illis, quæ nigra sunt. Carnem habet boni saporis. In descriptione Americæ sub nomine *Arwah katte*, sive *Tavoke* datur. Icon superius data, non in totum convenit, ideo repetimus.

*Acaramucu* Piscis corpore est cōpres- Mem. Hist. 1.4.12.  
so, nec crasso, verum oblongo, decem enim digitos longus est, quatuor latus, ubi latissimus. Orilli parvulum, angustum, rotundum, alicem minuti digiti admittens, ut piscis triangularis. Superius & inferius in anteriori parte oris utrimque dentes triangularem acuti. Oculi stuferi magnitudine, crystallini, pupilla nigra. Distât oculi ab ore, duos digitos & semis, plane in alto positi, tres quartas partes digiti à dorso sub utroque oculo, in quolibet latere, branchiarum loco fissurâ habet oblique factam, unum digitum longam, trapezii figura. In dorso summate directè supra oculos, instar fili maioris, seu crassioris cordæ violæ, corniculum habet oblique erectum versus posteriora, quatuor digitos longum & teres. In postica corporis parte inferius & superius utrimque pinnam habet tenuem, tres digitos & semis longam, tres quadrantes digiti latâ, quæ desinunt circa caudam, quæ parallelogrammi figura exoritur à corpore, habet

2. *Macoma*.

1. *Mura.*

*Anarhichas*.

4. *Pomus*.


5. *Pomus*.

6. *Timon*.

7. *Gadus*.

8. *Nip. Pictorn.*





haberque pinnā sesquidigitum longam, paulo plus duobus latam. Caret squamis, sed tegitur cute glabra, parum tantum hispida, ut Xiphiz, coloris albicantis, cui cryseus est admixtus, & in dorso paulum fuscus; pinnæ quoque grysei coloris. Non est edulis: in ventriculo algæ seu masei marini multum inveniēbam. Parieti apensus noctu clarissimè lucebat in tenebris.

## ARTICVLVS V.

De *Punaru*, *Timuch*, &  
*Guebici*.

TAB. XXXVII.  
4.5. & 6.  
Marsy. H.  
Brasil. l. 4.  
6.13.  
**P**VNARV pisciculus est quatuor digitos longus, corpore oblongo, capite crassiusculo, & antèrius obtuso. Or habet parvum, in maxilla inferiore duos solummodo denticulos, longos, acutos instar acicularum: oculos superius & in fronte positos, pupilla nigra, circello aureo: & supra hos duo subra fila brevia, prominula: branchias amplas: ut poce quæ una ei est è duabus conflata. Pinnas postbranchiales duas oblongas, & sub his duas plane angustas. Paulo post occiput incipit pinna, quæ ad caudam usque produciētur, spinulis p̄tominulis fusculis. In medio infimo ventre incipit similis, ferè ad caudam usque p̄tingens. Cauda longiuscula, & parallelogramma. Tegitur cute fulca, & pinnæ sunt eiusdem coloris.

Reperitur hic & alia PVNARV species, figura corporis prioris similis, sed mandibulas habens rostratas, quasi è minimis denticulis compositas. A summitate capitis pinna latiuscula exerēditur usque ad exortum caudæ, quæ mollioribus textitur spinis non p̄tominulis. Postbranchiales habet ferè ut priores, ut & in ventre & cauda. Color ut prioris, sed variegatus est in lateribus lineis curvis obscurè purpureis. Vtraque species inter scopulos vivit, & intrat etiam testaceorum domicilia.

Idem H. B. TIMVCV Lusitanis *Peixe agulha*, l. 2. c. 14. Piscis duos est pedes longus, corpore tereti instar Anguillæ. Rostrum habet osscum, trēs vel quatuor digitos lon-

gum, acuminatum, utrobique denticulis minimis refertum: inferior rostri pars paulò longior sup̄etiori, & id quod prominet molle, non osscum, caret lingua. Oculos habet rotundos, crystallinos, circulo argenteo: sex pinnas, nimirum duas oblongas postbranchiales, duas junctas in infimo ventre ante anum parvas, post anum unam, quæ ferè ad exortum caudæ porrigitur, & similem huic oppositam in dorso. Cauda pinna quali bisecta constat. Caret squamis, sed tegitur cute. Summitas capitis & rostri ac dorsum cum medietate laterum olivacei est coloris: inferior medietas cum ventre argentei. Per utrumque autem latus secundum longitudinem linea tendit virefens, distinguens olivaceum ab argenteo. Pinnarum color respondet parti cui appositæ sunt.

Edulis est. Capitur in mari, & fluviis salis. Boni est saporis, præsertim, fixus butyro: Caro eius non est spinosa.

GVEBVCV Lusitanis *Bicuda*, piscis Idem H. B. l. 2. rostratus: oblongo & ferè tereti est c. 15. corpore, ut *Dorada*: capite porcino, rostrato, cauda in duo cotnua diducta ut *Albacara*, rostrum acutum, osscū, durum: partis superioris longitudo sedecim digitorum, inferioris decem. Crassities totius prope insertionem septem digitorum: utramque autem rostri partem movere potest. Branchias habet amplas: Or interius orbicularis figuræ, in medio sui hyperbolico foramine: lingua oblonga, alba, dentibus omnino caret. Oculos habet solidi magnitudine, pupilla crystallina, circulo argenteo. A rostri insertionem caput in altum asurgit, ut in *Dorada* mare: Est autem caput ab oculis ad occiput longum septem digitos, novem altum. Corporis longitudo ab occipitio ad caudæ exortum quatuor pedum, & altitudo lateris post occiput unius pedis; in medio autem corporis decem digitorum, & prope caudam duorum. Cauda in duo cotnua exēditur & ampliatur, quodlibet octodecim digitos longum, ad cuius exortum in quolibet latere due

C. 2. auri-

auriculæ membranaceæ. *Pinnæ* habet sex: proxime post quilibet branchiam unam, directè à latere protensam, dura membrana constantem ut in *Tiberone*, figura trianguli acuti, undecim digitos longam, & in exortu, ubilatifima, duos tantum latam: è regione harum in infimo ventre duo bacilliformia corpora juncta habet, ex osse nigro constantia, dura, plane ut os *Sepiæ*, quodlibet novendecim digitos longum, utrumque junctum, intima longa, profunda recondere potest, quæ à natura secundum longitudinem ventris facta est ad caudam usque. Interstitio duorum pedum à fine huius fissuræ seu ano, in infimo corpore pinnam habet triangulatam sex digitos longam, latere anteriori firma spina munitam, etiam hanc in rimam quandam recondere & rursus surrigere potest: Octo digitorum interstitio ab hac pinna, parvam habet versus caudam, in acutum triangulum versus posticam partem desinentem, & è regione huius similem & æqualem in superiore corpore, has duorum digitorum intervallo sequitur cauda, quam supra descripsi. Maxima a. omnium est pinna dorsalis, incipiens à summitate occipitis, quæ attenditur p. dorsum in trium pedum longitudinē, constans membrana pergamini æmula, costis intertexta, hanc quoque totā demittere potest ac in profunda rima cōdere: lata est sesquipedē, ubi latissima, & versus posteriora paulū angustatur. *Cutecras*sa, subaspera vestitur, tota subfusca: spinulis oblongis, trientē digitis longis, ut ita solida sit & aspera, cum squamis careat. Venter & caput inferius albicant, latera cinerei & argentei coloris: dorsum ex cinereo argenteo obscurē fuscū, ut & caput superius & rostrū: reliqua rostrū cinere scit flavo. *Pinna* omnes cū cauda ex cinereo argenteo fuscæ sunt, ut & dorsalis, quæ præterea maculis orbicularibus, nūmī mīnisci magnitudine est variegata, illa post anum paulū undulata maculis fuscis: Carnem copiosam habet, non spinosam, pingue, non glutinosam, ideo ad comedendum aptiorem, quam caro *Mariorum*. In ventriculo interiore

multos integros pisces pedales inveniebat author.


## ARTICVLVS VI.

*De Bagre aliquot Speciebus.*

**B**AGRE piscis sex ponit author Species. *Prima* est oblongo corpore, initio dorsi paulum elevato, capite acuminato seu conico, q. dura testa est testum ad initium elevationis dorsi, pedalis longitudinis: Barbæ habet sex cirrhis constantem, quorum quatuor inferiores sesquidigitū longi, duo superiores longitudinem totius piscis æquant. *Pinnæ* obtinet septem, octavā pro cauda: nimirum duas postbranchiales loco inferiori positas, & ante quamlibet fortem aculeum, dentatū osseum, unā in summitate dorsi elevatā, & ante illam item aculeum fortem, æqualis cum pinna longitudinis: duas junctas in medio ferè infimi ventris, magis tamen versus posteriora, unam membranaceā sine spinis versus caudam, & huic oppositā medietatem mollibus spinis suffultam. *Cauda* constat pinna furcata, caret squamis, sed tegitur cute per totum argentei coloris splendentis. *Pinnæ* omnes argentei sunt coloris, ut & barba & caput. Per medium utriusque lateris tendit linea argentea ad caudā usque, constituta ex 77. protuberantibus. *Oculi* nigri satis amplios parvulum, edentulum, labiis elevatis. Piscis est edulis, si quis ab eo læsus fuerit, difficulter sanatur, & magnos patitur dolores.

*Secunda* corpore oblongo, capite compresso & plano, ore inferius parabolice figuræ, obtuso, edentulo. *Caput* octo digitos longū, testa dura pūctulata testum. *Oculi* parvi, rotundi, crystallini, quatuor ferè digitos ab invicem distantes. Barbam habet sex cirrhis constantem, quorum exteriores longiores, quatuor digitorum, reliqui breviores: septem illi pinnæ, octava pro cauda: una nimirum in summitate dorsi, firma spina anteri<sup>9</sup> munita, erecta, tres digitos longa, totidē lata: dux postbranchiales, eisdem firma spina munitæ, quatuor digitorum longæ, duos latæ. Interstitio sex & semis digitorum post branchiales







thiales in infimo ventre (qui paulum exuberat) duæ junctæ, tres digitos longæ, duos latæ, in ambitu circinatæ: septem digitorum intervallo à dorsali, alia in extremo dorso, carnosa, sesquidigitum longæ, unum lata, in extremitate mollihus spinis munita. & sub hac in infimo ventre alia paulo major cauda sequitur trium digitorum intervallu, in duo cornua diducta, crassa seu molli membrana constans duos & semis digitos longæ, in quolibet cornu duos lata. Totum caput superius, & ad latera, dorsum totum & latera ad protuberantiam ventris usque, candidi cum diluto flavo & aureo mixti est coloris, in testa capitis etiam aliquid viridis transplendet: *Pinna* nimis & cauda gryseæ sunt: Venter & laterum inferior pars & caput inferius (quod planum est) albi coloris. Caret squamis, sed vestitur cute. Bona satis est carne, melior quam Camarupi, cuius magnitudinem ferè æquat.

*Tertia* figura & magnitudine ut præcedens, sed barbam habet quatuor tantum cirrhis constātem, duobus nimirum longis nōn digitos, & latiusculis instar ligulæ, duobus brevibus: ad pinnam dorsalem similis ligula novem digitos longa, & postbranchiales pinnae eodem modo: cætera similis præcedenti.

*Quarta* Belgis vulgo *Clipbæge* decem digitorum longitudinem habet; corpore oblongo: Capite lato & compresso: ore parabolico, edentulo. Barba constat sex cirrhis, quorum quatuor inferiores unum digitum, superiores duos longi. Oculos habet parvos, cæruleoscentes, quatuor digitorum interstitio ab ore in summitate dorsi tegitur testa dura nſca, & postbranchiales in quolibet latere pyramidalis testa angusta tegit latera. Pinnae habet septem, & octavā pro cauda: nimirum unam in summitate dorsi, elevatam, mollem, sesquidigitum altam, plus uno latam, antèrius spina nſca crassa dupliciter serrata, duos & semis digitos lata sustentatā. In medio ventre infimo duas parvas: in fine penè dorsi, carnosam, parvu-

lam, angustam, & è regione huius inferius aliam parvulis spinis suffultam: cauda diffusa in duo cornua sesquidigitum longæ. Tegitur cute: ac in capite, initio dorsi & lateribus, ubi testaceus est, umbræ est coloris, per reliquum totum dorsum & latera umbræ dilutis, & fuscis maculis mediocris magnitudinis variegatur: in ventre albicat. A testa latiore sine ad caudam usque in quolibet latere, per lineam testam tendit ordo denticulorum acutorum, posterius versus, qui clypeo dum serrato in medio insunt, nam anguli nſtri figura positi sunt usque ad caudam hoc modo 7.

Edulis est, sed pauca carne, quæ non magni fit.

*Quinta* præcedenti similis, & maculis nummi mſnici magnitudine variegatus: Verum caret denticulis illis in lateribus: lineam solummodo habet: & duos cirrhos, & sex longiores quam alter. Hæc species habet carnem bonam & pinguisſimam.

*Sexta* magnitudine & figura similis illi, quem secundo loco descripsi-mus: sed barbam habet tantum quatuor cirrhis constātem, duobus nimirum longis octo digitos & latiusculis instar ligulæ, duobus admodum brevibus. Ad pinnam dorsalem similis ligula est novem digitos longa; & ad postbranchiales eadem modo; cætera per omnia similis illi, quem diximus; nam & ventrem ita protuberantem habet.

## ARTICVLVS VII.

*De Ajereba, labebirete, Niqui, & Guatacupn.*

**A**IEREBA Brasiliensibus *Raja* species, piscis planus, citrinatus, unum pedem & novem digitos longus, & toridem latus (reperiuntur & duplo maiores.) Quatuor digitorum interstitio ab anteriori circumferentia in superiori superficie duorum foramina habet satis ampla, res digitos ab invicem distantia, prope cau-

dz exortum orbiculatis incisura est in quolibet latere: *caudæ* teres, quatuor pedes longa, & circiter in medio sui, duas oleas spinas crassas retro dentatas habet, quibus pungit, quando ad spiracula apprehenditur, caudam incurvatam supra corpus levando. *Os* inferius habet, haud amplum, edentulem, incisuræ quasi parabolicæ. *Cute* tegitur in superiori corpore ferrei coloris, & in medio dorso insignitur tuberculis nigris, parvis: inferius corpus totum album. Caro nihili æstimatur in cibis.

*Labebirete Raja* species, ejusdem magnitudinis cum *Ajereba*, figura autē obtusi vomeris ad latera extuberantis: sectiones prope caudam ut in illa, & præterea duo corpora cylindracea digiti crassitie protuberantia. Cauda longa. Color piscis superius è cinereo fuscus, inferius albus, carne ptobata est & bona.

Reperitur hic & alia *Raja* species præcedenti similis: excepto quod processibus illis cylindraceis prope caudam destituitur. Color totius corporis superius umbræ, punctulatus per totum maculis nigris, seminis sirapi magnitudine: *Cauda* aculeis caret. Carnem habet bonam.

Reperitur hic & *Raja*, quarum caudæ res & semis pedes longæ, crassæ in initio tres digitos, & in fine plane acuminatæ, plenæ tuberculis nigricantibus in totum coloris, flexiles ut icutia.

TAB.  
XXXVII.  
8.  
PL. G. 17.

Nique Belgis Pieterman: Piscis est capite crasso, ore ranz amplo, edentulo, crassa lingua, inferiore mādibula paulo longiori quam superiot. Anterior corporis medietas est paulo latior, posterior angusta & retes: estque ut plurimum sex aut septem digitos longus, latus antierius quidem lesquidigitum aut paulo lator: Ocelli ipsi parvi quidem, sed exserti, cylindracei more cancrorum terrestrium, pupilla nigra, circulo è cinereo fusco. Branchias habet amplas, & post quamlibet pinnam unam, digitum longam & latam, in ambitu circinatam: in ventre sub his paulo inferius duas junctas: à medio

dorso pinna ad caudam pene continuatur, semidigitum lata, at in fine paulo angustior, cui responder similis in infimo ventre: *Cauda* plus digitum longa, minus lata, parallelogrami figura, in extremitate circinata. Ante exortum pinnae dorsalis duos habet aculeos fortes, & supra postbranchialem utramque unum acutum. Tegitur cute, cujus color ex nigro & umbra, gryseoque mixtus, nimirum in toto dorso, capite & lateribus, pinnisque omnibus: Venret albicat, & in lateribus etiam plus albi, quam nigri aut grysei est. Per totum dorsum, caput & latera, puncta nigra, magnitudine seminis papaveris, dispersa.

In arena absconditus jacet prope littus Maris, ac incedentes vulnerat.

Edulis est, si jecur & fel bene separetur, aliis lethalis.

*Guerapuca* Lusitanis *Cavala*, Belgis *Roningsfisch*, est corpore oblongo, teræqualis ubique crassitie, excepto versus posteriora, ubi magis magisq; attenuatur. Ut plurimum in septem pedum longitudinem excrescit, & crassitiem corporis humani. *Caput* & *os* habet acuminatum, dētt sacutos, rotundos, ordine positos, oculos magnos crystallinos, circulo argenteo: *Pinnæ* octo, videlicet post quamlibet branchiam unam triangularem, directæ à latere protensæ: unam tenuē angustam ferè in initio dorsi, post hæc unam in eodem dorso triangularem erectam, sub hac in infimo ventre triangularem, duas mediocres triangulares in infimo ventre subter postbranchiales. *Cauda* constat magna pinna in duo cornua amplè extensa. A pinnis autem triangulatis, tam in dorso, quam in infimo ventre, parvulæ ordine pinnulæ oblongæ sunt dispositæ usq; ad caudam. Vestitur cute argentei coloris, cui in ventre paulum extulæ, in dorso multum miscetur, ut color resplendeat. In quolibet latere linea subtilissimis squamulis contorta describitur ad caudam usque. Boni est saporis. Est quidem *Scomber*, sed quia Icon quàm supra dedimus, non cōvenit, ideo & hæc adjicere placuit.


CAP.

TAB.  
XXXIX.

*Cavacipora*



*Guacunia*



*Guamaincu Atinga*




*Piraaca*



*Cucure*



*Narinari*



*Tiburoni*



*Iporogiba & Piragiba*





## CAPUT II.

*De Piscibus non omnino  
lavibus.*

## ARTICULUS UNICUS.

*De Guacucuja, Guamajacu  
guara, & Guamajacu  
Attinga.*

TAB.  
XXXIX.  
23.  
Marteg. av.  
H. Bras. l.  
4. f. 1.

**G**UACUCUIA, *Monscerus* piscis: *Pes-  
pertilio* Aquaticus posset appella-  
ri. Corporis figura antierius est in-  
stat vomeris: Corpus octo digitos lon-  
gum, quinque latum in medio, ubi  
latissimum: medietas autem corpo-  
ris posterior rotunda est, & versus  
caudæ pinnam fastigiatur in conum:  
medietas autē anterior vomeris seu  
lati cordis si, utam obtinet. Piscis  
autem non crassus, sed latus: caput  
vix prominet seorsum à corpore, est-  
que illi inter oculos supra os cornu  
impositum, durum, duos pene digi-  
tos longum, conicum. *Oculus* habet  
nummi mifnici magnitudine, pupilla  
crystallina lenticulari, reliqua pars  
variegata maculis, & lineis flavis al-  
bisque. *Orbita* castaneam potest  
capere, ipsum edentulum est. Supra  
os carnea prominentia est instat ton-  
sillæ humanæ ferè. In utroque late-  
re in medio piscis, brachium emi-  
net, quatuor digitos longum, una  
iunctuta constans, inferior medietas  
brachij duos digitos longa est, unum  
lata in infimo ventre inter brachia  
duas habet pinnas sesquidigitum lō-  
gas, quæ quasi pedes sunt. *Cauda* cō-  
stat pinna duos digitos longa, sesqui-  
digitum lata, ac fere quadrata. In  
interiore corpore, sesquidigiti inter-  
stirio à cauda etiam pinnulam habet  
parvam, & talem etiam in dorso,  
triūm digitorum intervallo à cauda.  
*Cute* tegitur, non squamis, quæ supe-  
rius fusca est, multis tuberculis du-  
ris, per dorsum insignita versus anti-  
cam partem, & utrumque latus. In  
utroque autem latere undecim ni-  
gras habet maculas lentis magnitu-

dine & figura, binas ac binas iuxta se  
positas. Prope insertionem utrius-  
que brachij etiam multas ejusmodi  
maculas nigras habet, & ibidem in  
quolibet latere foramen parvum in  
corpus.

In summa, in lateribus, circa oculo-  
los, in extremis branchiis, mirè va-  
riegatur punctulis albis, nigris, line-  
isque itidem albis & nigris, ut vix ex-  
primi possit à pictore. In toto autem  
inferiori corpore egregij miniati est  
coloris, atque ibi cutis æqualis, ve-  
rum ad caudam paulum hispida.

*Guamajacu Guara*, Lusitanis *Peixe* TAB.  
*porca* & *Diabi*: Orbis est species. Lon- XXXIX.  
girtudo ejus ab initio oris ad pinnæ 9.  
exortum in cauda quatuordecim dia. *Idem* l. 4.  
gitorum: pinnæ caudæ longitudo 10.  
plus duorum digitorum: Rotundo  
est corpore, & crassities ejus duorum  
& viginti digitorum. Caret squamis,  
tegitur cute, per totum corpus ex fus-  
co ochræ coloris pallidi, in ventre  
albi. Totum corpus aculeis muni-  
tum est, qui in lateribus longiores, in  
reliquis partibus breviores (longio-  
res autem sunt duorum digitorum)  
teretes, in extremitate valde acuti,  
& singuli tribus insertionibus, quasi  
triquetris cuti infixi. Inter aculeos  
cutis ubique maculis nigris scater,  
excepto ventre. Oculos habet ma-  
gnos eminentes: Os parvum obro-  
tundum, edentulum: pinnas tantum  
quatuor, duas in lateribus duos &  
semis digitos longas: unam in dorso  
versus caudam ejusdem magnitudi-  
nis, & minorem sub ano.

Potest orbis muricatus Gesneri  
dici.

Habui inquit author, alium mino-  
rem vivum Mense Febr. anni 1639.  
item alios duos mense Septembris vi-  
vos. Cutis eorum erat e fusco vire-  
scens, in ventre nigricans: aculei ut  
prioris, & planè similis figura cor-  
potis: prope quamlibet pinnam, ma-  
culā habebant nigram, ut & utrim-  
que ad latera prope os. Pinnarum co-  
lor erat flavus: oculorum pupilla ni-  
gricās, circulo luteo. Supra utrumq;  
oculorum cotnu exile, satis longum,  
molle, cutacea substantia constans,  
quod

quod pte se fert natans, quando autem extra aquam est, flavescit. Inflare se potest & iterum confidete. Sonum edit *Dich/Dich*. Si velis ut se inflat, trahere pinnam quæ in dorso est.

Idem l. d.  
c. 14.

*Guemaiacu Attinga* Brasiliensibus, Mategravio *Orbis muricatus* Ranæ rictu, septem digitorum longitudinem habebat, & corpus oblongum; Ranæ simile, & loco dentium tam superius, quam inferius; os durum; oculos magnos, rotundos, proruberantes, pupilla crystallina circulo flavo: Branchiarum loco foramen in utroque latere digitorum admittens, & pone hoc pinnam trapezii figura, unum digitorum longam, duos latam: In extremitate dorsi versus caudam etiâ pinnam oblongam, haud amplam, & e regione huius similem in infimi ventris extremitate. Cauda constat pinna sesquidigitum longa, unum lata. Totum corpus regitur cute spinosa, quæ in capite in duram testam abit. Spinæ illæ constant duris ossibus & acuris: in infimo tamen ventre caret spinis, sed mollis est instar Ranæ. Totum corpus & caput superius ex gryseo & fusco est maculatum: magis tamen sufficit, inferius totum ex albo flavescit, ut & spinæ totius corporis. Pinnæ omnes flavescunt. Post utraq; pinnam postbranchialem maculam habet nigerrimam stufi magnitudine, & supra hanc utrobique, paulum tamen magis versus anteriorem aliam minorem nigerrimam. Ad utrumque latus exortus pinnæ dorsalis etiam similem habet, parvulas item sub oculis & ore. Vtrius modo se inflare potest. Edulis est, & capitur in fluviis dulcibus.

### CAPUT III.

#### De Narinari, Tiburone, & Iperuquiba,

TAB.  
XXXIX.

**N**ARINARI. Sunt aliquot illius species, hæc quam hic describimus, appellatur *Narinari pinima*:

Lusitanis *Raja*, Belgis *Puisseert* vel *Deicle*. Pastinaca marina. Corpus habet magnum, latum, ferme triangulare: constas ad utraque latera latissima pinna triangulari, carnosa: & prope caudam habet duas pinnas, palmi magnitudine, subrotundas æqualis longitudinis: caput magnitudinem habet medioeris porci, crassum, compressum, in medio quasi fossam habens. Os triangulo subrotundum, compressum paulo & in promuscidem declinans: nam oris hiatus quinque distat digitos ab extremitate promuscidis versus ventrem: amplitudo oris duorum & semis digitorum edentulum, sed loco dentium os habet lingue figura inferius in ore, quatuor digitos longum, sesquidigitum latum, ad fauces usque pertingens, & simile os superius, transversum positum, duos digitos longum & totidem latum. Inferius os constat e septendecim ossibus, albis, duris literæ U figurâ habentibus, quæ arcu per membranas coniunguntur, hisce alia septendecim subiacent, singula singulis, spongiosa ad aspectum, nec ita dura, superius os constat quatuordecim ossibus literæ J figura, quæ eodem modo per membranas sibi invicem agglutinantur, hisque etiam alia quatuordecim ossa superiacent: duo autem illa ossa per membranas annectuntur aliis ossibus capitis. *Cranij* cavitas sex circiter digitos longa est, vix duos lata, in qua cerebrum latet. Promusci tanrum constat cattilagine. *Oculus* habet parvos, nummi minici magnitudine: post oculos in quo libet latere spiraculum amplum, pomi vulgaris capax; intra hæc branchiarum folia recondita jacet: ad latera inferius à fine capitis in quolibet quinque oblongas infissuras. *Color* totius superius ferreus, maculis albis per totum inspersus, magnitudine nummi minici, inferius totum album. *Cutis* tora glabra lævisque. *Corporis* longitudo ab occipite ad exortum candæ sesquipedalis, latitudo inter extremitates pinnarum triangularium, trium pedum, & decem digitorum.

Pinna.





*Insano Brasil.*

*Pranchira*



*Ptini Luaba.*

*Tabac pipe.*



*Sallena seu Salma.*



*Camurçuputius.*



*Leo marinus.*



*Frator*

*Hugo.*



*Galerita*

*See moncl.*

*Synagris.*





Pinnarum prope caudam longitudo septem digitorū, latitudo quatuor. *Capitis* longitudo decem, latitudo septem digitorum, crassities sesquipedis. *Caudæ* longitudo quatuor pedum & trium digitorum: crassities sesquipedis. *Caudæ* lōgirudo quatuor pedum & trium digitorum: crassities in exortu quinq; digitorum, quæ sensim gracilescit. Paulo post exortum caudæ superius parvam pinnam curtam habet, paulo plus digito longā, & mox post eam duos hamulos sub invicem super erectos, piscatoriis hamulis similes & in curvatos, longitudine trium digitorum. Caro boni est saporis, sufficiens quadraginta hominibus saturandis.

TAB.  
XXXIX.

*Tiburoni* species minor, Belgis een Crupshape, à figura. Convenit eum majore, excepto capite, quod triangulare habet seu prout cor vulgo pingitur. *Oculi* parvi ad latera ipsius capitis. *Os* parvum, triangulare longe infra positum, triplici ordine dentium minorum, unde ita nocere non potest, os quippe habens angustum. Caro melius sapit, quàm majoris.

TAB.  
XXXIX.

*Iperuquiba*, & *Piraquiba*. Lusitanis *Pieze pagador* & *Pieze piebho*, nostratibus *Dapper*, quia Tiburoni adhæret fugens. *Ostodecim* digitos longus, fetē tetes, quatuor digitos crassus, ubi crassissimus, in postica parte attenuatur. *Os* habet triangulare, cuius pars superior brevior inferiori, etiā linguam. *Caput* superius ad dorsum usq; duos digitos longū, circiter planum & figuratum, ut palatum alicuius piscis itris transversis, hac parte Tiburoni firmiter adhæret in ventre, & capto illo simul capitur. *Oculi* parvi, flavi, pupilla nigra, semicirculo flavo. *Dentes* nulli, sed eorum loco multæ minutissimæ prominentiæ. Post branchias utrobique pinna obtinet triangularem, duos & semis digitos longam, subter in ventre duas junctas: à medietate corporis tam superius, quam inferius, etiā pinna extenditur angusta usque ad caudā, quæ pinna constat sesquidigitum lōga. *Cute* tegitur per totum corpus cinerei coloris.



## TITULUS III.

De aliquot aliis, & inter hos  
monstrosis piscibus.

## CAPUT I.

De pisce *antipiscipiscis* & Remoranti.

**P**iscem *antipiscipiscis*, ita describit Kircherus. Capitur cettis anni temporibus in mari Orientali Indiz ad insulas Vissajas, quas insulas *guer. l. 3.* Pictorum vocant, sub Hispanorum dominio, piscis quidā *antipiscipiscis, p. 675.* id est, humana prorsus figura, quam ideò *Pecche* muger vocant, ab indigenis Duyon. Caput habet rotundum, nulla colli intercapedine trunco cōpaetum. *Extremæ aurium fibræ*, quæ & auriculæ nominantur, ex cartilaginea carne eleganter vestita, quarū interior pars amplissimis formata anfractibus, vetam hominis referr aures, Oculos suis ornatos palpebris, utique & colore non piscis sed hominis iudicantes; naso non nihil aberrat: malam inter utramque non usquequaque eminet, sed levi tramite bipartitur: sub eo verò labra magnitudine specieque nostris simillima. Dentium non quales insunt piscium generi serratiliū, sed plenorum & candidissimorum continuā series. *Pectus* alba cute contectum, hinc atque hinc paulò latius quàm pro corpore in mammas extuberans; neque eas ut feminis pendiculas, sed qualis virginibus globosas, plenas lactis cādidissimi. *Brachia* non longa sed lata ad natandum apta, nullis tamen ipsa Cubitis, ulnis, manibus, articulisve distincta. In administris soboli propagandæ membris, in utroque sexu nulla ab humanis distinctio: posthæc in piscem cauda desinit. Hactenus ingeniosissimus Kircherus. Ossa huius piscis insignem vim sanguinem su-

TAB.  
XXXX. 1.  
Kircher.  
Artu Ma.  
guer. l. 3.  
par. l. 6.

D d stendi

præstaret: nemine interim juncturam proportionem satis observantē. Conglobatus, nulla, vel vi, vel machina divelli aut expediti poterat: relictus tamen, sponte se iterum pandebat aut explicabat, & qua via patebat errabat.

## CAPUT III.

De pisce ludicro, *Pusta*, & *Michipillin*.

Nieremb.  
H.N.L. 11.  
c. 13.

**I**lluvies menstrua, & ludicrus gestus, unde nomen meruit, commendant *Axototl*, h. est, lusum aquarum. Genus quoddam est piscium lacustrium molli cute intactum, ac laceratarum more quadrupes, dodrantis longitudine pollicemq; crassum, etsi interdum cubitum excedat. Vulvam habet muliebri simillimam, ac veteris eius maculis fuscis distinguitur, eoque medio ad caudam usque, nempe prolixam & quæ juxta finem tenuissima sit, paulatim ac sensim gracilescit. Pro lingua est cartilago brevis ac lata. Quaternis natat pedibus, in totidem digitos, persimiles ranarum, fissis. Caput depressum est, & reliqui corporis proportionem magnum. Hifcens rictus, aterque color. Huic menstrua singulis quibusque mensibus fluere observatum sæpe sæpius est, haud aliter ac mulieribus tum venerem abunde excitare, haud secus ac scinci facere solent, quos terrestres cotocodilos quidam vocant, ad quorū genus fortasse pertinet. Salubre ac gratum præbent alimentum, nec dissimile anguillarum carni. Multis modis parari solent, frixi nempe, assi, elixique. Verum ab Hispanis magna ex parte ex aceto mullis, addito pipere, caryophyllis, atque siliquaestro Indico: à Mexicanis veto siliquaestro solo, seu intacto, seu integro, familiarissimo illis ac prægrato condimento. *Pusta* capiuntur in luminibus Panucino, minimi digiti vix æquantes longitudinem atque crassitudinem, sed vespere ranuncolorum in-

star paulo protuberantiorē, quibus simul cum miltomame petmixtis & admotis, subvenitur passis erisypelata, brevitare & facilitate mirabili. *Michipillin* seu ova piscium, dicitur genus quoddam lacustre, album, quod ex omni piscium in lacu degentium Mexicano conflatur multitudine, unde factum est illi nomen. Statis anni temporibus eadem capitur palude, haud aliter quam rhynni, trichiz, scombri, similesque pisces, alij gregatim vagantes in Oceano. Agmen pisciculorum esse creditur, haud lencibus majorum. Medio id procedit alveo, in neutrum litus inclinans, tã numerosū à multitudine, ut quinque cubitorum intervallum aut amplius occupet. Non prætermittunt occasione piscatores, sed diligenti observatione & cuncta vagantes pisciculos captant excipiuntve retibus, atque ita non mediocriter solet se penumero fieri captura. Coquuntur iidem alienis siliquisve vasis, ferculisque ubi opus est, adiiciunt, addito siliquaestro chillive: quo apparatu neque modico neque ingrato cibo constant, sed quo non modo Indi, verum advenæ quoque Hispani sæpenumero vesci gaudeant.

Nieremb.  
H.N.L. 11.  
c. 41.

## CAPUT IV.

De *Ambiza* & pisce *mulari*.

**A** dnectam quod Philippus Pigafetta scribit de quodā pisce *Zauri*, qui membra duo habet manus hu-  
manas referentia, & caudam clypei & forma & magnitudine. Vocatur hic ab incolis *Ambize angule*, id est, *porcus aquatilis*, propter pinguedinem qua porcum refert. Caro, quæ ab incolis fumo induratur, & ad lautitias reservatur, & gustu & odore est grato. Aquam dulcem non relinquit. Pabulum ejus est gramen, & omnis generis herbæ in litore enatæ. Ore bovem refert. Tantæ interdum &  
Dd 2 magni-

Nieremb.  
H.N.L. 11.  
c. 55.

Nieremb.  
H.N.L. 11.  
c. 14.

magnitudinis, ut quingentas libras pondere eleve. Capitur à piscaribus non ut pisces, sed fere ut bos. Observato enim loco diligenter, ubi pasci solet, scaphis suis expectant, & advenientem contis aut remis occidunt: occisum ad aulam regiam deferunt; aliter enim capitali proposita pœna (ut & alios pisces, qui hinc Regij dicuntur, nempe trutas, & cæcongo piscem singularem, salmonem figuræ referentem, sed colore diversum, caro enim ea est alba; & tam pinguem, ut prunis superimpositus eas exstinguat) vendi non potest. Unde diligenter ne impunitas audaciores reddat, observantur piscatores ab Aulicis, & deprehensi absque ulla remissione plectuntur. De *pisce mulari* sic scribit Nierembergius.

Nieremb.  
H. N. J. II.  
6.62.

Sub Philippo II. visa in Oceano bellua duabus velificans alis, navis specie. Fregit unam bombardæ ietus. Irrupit per fretum Herculeum bellua furens, & horribilibus frendens mugitibus atque illapsa per mediterraneas Hispaniæ oras, Valentiam appulit, ubi demum exanimata, centum & quinquaginta dodrantes prolixa, molis circuitus centum, vacuitas cerebri septem homines capiebat.

Eques in os consistere posset. Maxillæ servantur in Escoriali usque ad decem & septem pedes porrectæ, viginti armatæ dentibus duorum dodrantum, minimi unius. Genitalia immodica. Appellatum idcirco monstrum piscis mularis. Aliqui etuditi lamiæ fuisse putarunt ob fauces & ingluviem. Duo cadavera in stomacho reperta. Creditum quoque aliquibus huius generis belluam devorasse Ionam Prophetam. Quis certo sciet?

#### CAPUT V.

#### De *Pisce tauriformi* & *Amilosl.*

*Piscis tauriformis* est Francisco Her. Nieremb. mando pisculus vix duos palmos H. N. I. 11. longus, sed pinna munitus caudæ instar, sed pæne prolixa digitos: corio intertus duro, fusco, sed circa ventrem candenti, & ubique pentagonis sex angulive distinctos figuris. Os est minimum, sed longiulculis munitum dentibus: Oculi magni, pinnae circa aures binæ satis parvæ, quemadmodum & alia duæ, quarum altera circa extrema ventris est, altera verò juxta postremum dorsum; mitum est, in hoc pisciculo duas prominere juxta frontem spinas acuminatas, infraque duritiei, instar corniculorum, ac totidem alias eadem magnitudine & forma circa ventris postrema. Vide an ad Boopa vel Acanthiam referri possit. *Amilosl.* vero est piscisteres, lacustris, squamosus, candescens, maculis aspersus pullis, seiquidodrantem longitudine, & pollicem crassitudine excedit. Binas pinnas habet in dorso, totidem in ventre, utrinque unam, ac infra ventrem alteram. Caput est oblongum, rostrum acuminatum: sed interna maxilla prominentior. Oculi sunt nigri, iris aurea. Aureum caput, venter luteus, adeoque reliquum pæne corpus. Viætu eius sic commendat Franciscus Hermædus. Optimum & concoctum facile præbet alimentum inam & ovis capitur magna ex parte onustus, adeoque gratum, ut cum gravem quamdam evasissem ægritudinem, mihi que nutrimenta omnia, à sanis hominibus & sagacioris palati vehementer expectata, sorderent displicerentque vehementius, hoc uno cibi genere suavissime usus sim, & ad vires instaurandas non mediocriter adjutus. Sed magnitudo ipsa adeo gratiam commendat, ut quo in majorem amplitudinē adoleverit, eo majori habeatur in precio, expectatur avidius, tarius inveniatur venalis, inventusque ematur carius.

Nieremb.  
H. N. I. 11.  
6.26.



# HISTORIÆ NATVRALIS

*De Piscibus,*

LIBER V.  
DE CETIS.

## CAPUT I.

*De Cetis in genere.*



Erurum nomine sæpè tam apud Græcos † quam Latinos ingentis molis pisces intelliguntur; hic pro illis duntaxat sumimus, qui pulmones, attetiam, collum & alia membra cum terrenis quadrupedibus communia habent, quibus omne propriè dictorum piscium genus destituitur. Specialius aliquando, seu pro Pistice, seu pro Balæna sumi, apud Cicetonis Atatum, & Oppianum videbis. Integuntur corio, qui Macedonibus, dum è Mesambria Tocam navigarent, visus, corio squammoso, tam crasso ut cubitum æquaret, ostreisque patellis, & algis oppletus, pro monstroso habendus est. Lora ex eo sunt, quibus maxima pondera per cochleas sublevantur, simili dutitie & nervos esse, & chordas exiis ad bellica instrumenta confici, prodidit Ælianus. *Pulmones* habent, quod plus caloris, quia ingentis molis animalia, ut possint moveri, requirunt. Branchiis † ideò carent, sed *ssinus* (ora vocat Plinius, nates Ovidius, Cardanus oscula) accipere. Ductus hæc ab ima palati ad extimam parte duplex, septo distinctus, & nostratum narium foraminibus ad palatum deductis, proportionem quodammodo respondens. Vnicum in extima parte lateris C. figura foramen apparet, quod

carne pingui, tanquam opetculo, tegitur. Respirationis gratia datas, vel exinde colligas, quod obturat, citius motiuntur, quod in Delphino Rondeletius observavit. *Osplos* subter habere, Aristoteles & Plinius reliquæ, ut dum resupinantur, pisces quos captant, evadendi tempus habeant, in promptu habere, observavit Rondeletius. Resupinatos tamen cibum capere, tum ob dictam causam, tum propter longam & multum infra descendente oris scissuram. Carent quidam *Dentibus* instructi quidam, serratis, planis, exsertis, aliquando hominis similibus. Eboris instar candidos, ad opera firmos, anteriores latos, ne hæreret cibis, posteriores acutos, ut promptius divideretur, apud Cardanum legimus. *Nannus* femina habent; detractos aliquando ex una in Aquitanico litore duo lactis cados, Rondeletius prodidit. Audire certum, & nulla manifesti instrumenti vestigia, ut putat Aristoteles, Rondeletius tamen in Delphini cranio, meatum qui ad cetebrium utque excutrit invenit. Vehementer *pinguescunt*, quod piscium carne alantur, & moveantur tardissimè, quod tardo motu digerere posset, densitate corii præpeditur. *Internas partes* verbis Rondeletii describam. Sub peritoneo, inquit, patet quæ ad nutritionem & generationem conformata sunt, ad quadrupedum terrestrium magis quam ad piscium partes accedunt. Nam *Epiploon* habent, sed minus pingue, quo ventriculus & intestina incallescunt, & foveantur. *Ventriculum*, magnum, cum ad justam magnitudinem accreverint: in recens natis exiguum est, & geminus videtur. Eius fundo *pancreas* hæret, desinit in *intestina*, quæ in multos gyros convolvuntur, eadem ferè ubique crassitudine, præterquam in extremis, quæ mediis paulo sunt latiora. *Mesenterium*, vertebribus annectitur, glandulas nigras, venas, arteriasque intertextas habens. *Renes* venæ magnæ trunco, arteriæque magnæ per emulgentes annectuntur, sunt inter epat & testes siti. *Urina* per

Aristot. Hist. Nat. 9. c. 3. & 4. de partib. 13

Cardan. Variet. 4. 37

Arist. Hist. Nat. 9. c. 2.

† Galen. 3. de Alim. facult. c. 21. & 37.

Ælian. Hist. Nat. 17. c. 6.

† Plin. Hist. Nat. 9. c. 7.

*ureteris* in vesicam percolatur: quæ terrestrium animalium vesicis similis, sita est inferiore ventris parte. In iis qui utero adhuc gestantur, in uterum definit, per quem urinam deponit in allantoidem tunicam ad diem usque partus. Editi in lucem, per pudendum urinam veluti terrestria emittunt, & per museulum sphincterem retinent. *Fræcho* arteriæ umbilicales adherent, arteriæ magnæ inferioribus ramis insertæ. Utrinque sunt *testes* oblongi, quibus præparantia vasa præposita sunt, infiniti scilicet venarum arteriarumque: è magna vena ortarum ramuli, qui post varios & multiplices anfractus, in epidymis inferuntur. Cum enim magna sanguinis eopia, multo semini generando necessaria sit, quæ longo vasorum ductu, ob spatii brevitatem transmutari & elaborari non potest, solerter admodum natura gyros illos vasorum constituit, ut illis, id quod longitudini deest, pensaretur, & quibus singuli meatus capreoli torti dependunt, & glandulosa corpora radici pudendi ad hæta desinunt: ex quibus meatu urinario, nervo cavo *genitale* constat humano simile, cuius extremum foris propendet, in glandem tenuem linguæ avium similem desinens, quæ præputio non omnino integritur: intus replicatum latet, ad veneris usum exoritur. Venas suas, nervos, arterias, idem pudendum habet. Ossi innititur, quod ossi pubis proportionem respondet. *Thorax* costis veris ac mendosis, sterno, vertebis, musculis constat: cuius capacitatem *pulmones* magni complent, densiore substantia quam in terrestribus: crassitudine & colore hepar quadrupedum referunt, tum, ne aqua in ratiorem substantiam penetrans, ejici non posset; tum ne in magnis expirationibus, quibus in aquis ferè semper coguntur, tenuior substantia ferè disrumpere. Hi in duas partes divulsi sunt, parte inferiore adeò gracilescunt, ut membranam esse affirmes. Utrique *Cor* complectuntur pericardio conclusum, in mediò thora-

ce locatum, nulla in re porcotum cordi ab simile: duos sinus, totidem auriculas, denique omnia similia habet. Ad hæc, asperam arteriam, Oesophagum, musculos & quæcunque in terrestribus corporibus sunt, clavícula exempta, reperire est. *Caput*, cum vertebis articulatur. *Cerebri* dispositio diversa. Nam in anteriori & posteriori divisum est, nō in dextrum & sinistrum, ut in homine. *Nervorum* conjugationes ex eo nascuntur, plexus *xiphoidei*, in eorete mirabile, meninges duæ pro integumento. *Fulva* in formis cervicem palmum unum longam habet: ea deinde in ramos duos distribuitur, veluti in quadrupedibus terrenis videre est, testes ad uteri cornua positi, pudendum inter umbilicum & podicem. De *Magnitudine* in singulis speciebus dicitur. *Locum* si spectes, in solo nec tamen omni mari (Pontus Euxinus nullum habet) reperiuntur. Semperque ferè in alto versantur. Circa solstitia maximè visuntur, quod tunc illie ruant turbine, tunc imbres, tunc delectæ montium jugis procellæ ab imo vertant maria, pulsataque ex profundo, belluas cum fluctibus volvant. Aliàs in fundo maris ferè degunt, molis suæ pondere. *Cibus* ipsis pisces, harengi imprimis, quos quandoque tam avidè persequuntur, ut in littora vadosa impingant, *Generant* intra se, & catulos enituntur. Hi teneri sequuntur matrem, quod à nautis visum. *Mors*, ob corporis molem, & ventris ingluviem tardo feruntur. *Pisus & auditus* ipsis hebetior. Hinc curiosæ omnium naturæ beneficio, pisciculis, si credere fas est, tanquam duce utuntur. Odore picis adeò delectantur, ut sese navi affricent. Strepitu terreri Arrianis in rebus Alexandri M. prodidit. *Vivunt* in cibus, apud Ichthyophagos, prodente antiquitate invenere.

Præparationem vide apud Aldrovandum.

## CAPUT II.

## De Cetis in specie.

## ARTICVLVS I.

## De Balana.

TAB.  
XII.  
TAB.  
XII.

ET hæc de Cetis in genere sufficiant, in specie jam de iisdem agentur. Numerantur autem inter eos, *Balana*, *Balana vulgi*, *Physeter*, *Prifis*, *Orca*, *Delphinus*, *Phocæna*, *Scolopendra*, *vitulus marinus*, & *Manati Indorum*.

*BALANA*, Græcis *φαλάνα*, vel *αἰγάρι*, id est emittere, quod maris aquas per fistulas emittat, vel à *φαλιν* quo vocabulo Græci meatum in galeis militaribus, cui plumas inferebant, indigant, vel à *Χαλδæων*, quod & devorare dicitur. Ingentis est magnitudo. Visa in Indico mari, quaternum iugerum, seu non-gentorum sexaginta pedum longitudine. Centum & quinquaginta cubitos obtinebat, quem Nearchus eiectum vidit. Describitur à Bello-nio, Rondeletio, & Aldrovando. De suo scribit Bellonius, adipem eius velut oleum non concrefcere: pinnas habere utrinque unam & tertiam in dorso, qua totum corpus dirigit. Caudam lunatam, Corium nigrum, cui pinguedo pedis altitudine subit, laridum quadagefimale appellant. Lingua eidem aliquot librar. pondo. Ante oculos prætenturæ, seu tenues quædam asulæ, quatuor ulnas longæ, ac se-quipedem latæ, longissimis villis præ-ditæ, quibus iter prætentat. Ossa tam magna, ut postea ex iis fieri soleant. *Rondeletius* suæ parvam linguam, & quæ quatuor duntaxat vel quinque vasa salsamentaria ad-scribit. Alibi, penem se unius vidisse, qui à procero homine humeris depottatus tertiam contingeret, scribit. In eius quam *Gesnerus* de-scribit ventriculo tria dolia crudo-

rum pisciculorum, inter quos salmo unius ulnæ longitudine, inventa sunt. Pelle nigro undique tegebatur, nisi quod maculæ duæ candidæ, utrinque supra medium oculi inciperent, & retro renderent. Tota maxilla inferior erat candida, & pars quædam sub ventre. Plura apud *Gesnerum* vide. *Aldrovandus* prior colore erat subæruleo, tota maculis nigricantibus conspersa, ventre candido. Altera, quam *Busalina* vocat tota nigricabat. Capta erat An. M. D. LXXVII. in Scaldi decem ab Antverpia miliaribus monstruosa, quam *Pareus* descripsit. Longitudo eius erat pedum octo & quinquaginta, altitudo sexdecim. Cauda quatuordecim pedes lata, ab oculo ad extremum rostrum intervallum sexdecim pedum, Maxilla inferior senu in singulis lateribus pedum erat, viginti quinque; dentibus armata, qui rotidem foraminibus in superiore dentibus omnino carente excavatis, recondi poterant. Tot dentium longissimus sex pollices non excedebat. *Locustipis* procul à tetra ubicunque degit. Plurimas *Schönfeld*, aurem circa Islandiam, Gronlandiæ, in *Ichtyol.* & vicina Septentrioni loca, à Biscainis, Anglis Hollandis, circa æstivum inprimis solstitium, quo tempore sinus recessusque maris pacatiores quærant, capiuntur. In Ta-probanæ mari Thunnis insidiari, apud *Ælianum* legimus: in Gaditano Oceano non ante brumam conspici: stas temporibus in quodâ sinu placido & capaci, mirè gaudentes ibi parere, condi, *Plinius* pro-*Plin. H. N.* didit. *Vilius* ipsos pisces, visus qui *L. 9. c. 6.* quadraginta alicellos devoraverat, *Schönfeld*, eosque adhuc recentes, quos ocula-*in Ichtyol.* tus restis dissectos & sale conditos ad solem liccavit. Sunt qui comedere masticando negent: pisces deglutire integros, eosque minutos, quod interna gutturis membrana nil magnū ingredi sinat, dicunt. Quidam carne vesci negant, quod in capæ viscibus præter mucum & spumam nihil reperiat. Pisciculum *Lodel* venatoribus dictum, si copiose voravit inobviatur quasi, & in furorem

*Vegetius de*  
*Idol. l. 4.*  
*c. 32.*  
*Plin. H. N.*  
*l. 9. c. 3.*

*Ælian. H.*  
*Ad. 16. c. 18*

*Plin. H. N.*

*L. 9. c. 6.*

*Schönfeld.*

*in Ichtyol.*



rem acta, nec hominibus nec aequalibus suis parcat. De *Coitu partuque* (verba sunt Schonfeldii) venatores referunt, Balænas contrafacta societate & consuetudine in amorem mutuum, quem coniunctione, saltatione, aliisque affectuum coniugalium significationibus inter se testantur coire; hinc unâ natæ semper, amicitiamque captam conservare, donec accensa ad libidinem femina, erecto ad perpendiculum & in caudam corpore, marem eodem positu obviam, pinnis suis, tanquam brachiis duobus amplectatur, mutuoque complexu per horæ dimidiam, vel integram utraq; hæreant: Inde coniugium & conversationem ad mortem usque colere. Fæmellæ factum autumno inter Octobrem & Ianuarium pariunt, unicum, tauro non minorem, imò maiorem pro matris quantitate, qui sub matris pinnarum præfidiis & tutela tutus, non deserit parentes, nisi ablactatus. Philostratus faucibus ab eis filios abscondit, si quando maiorem belluam fugere contigerit, prodidit, quod & apud obscurum de natura rerum authorem invenies. Terræ defectu aquæ affinis, aquâ ore recepta & ejaculara succurrere, fide eiusdem dicitur.

Philostat.  
L. 2. de vita  
Apolloni.

Aristot. H.  
A. I. 4. c. 10.  
Oppian.  
Halicut. I.  
L. 7. c. 404.  
Alcon. H.  
A. I. 9. c. 50.

Galen. L. 3.  
Alim.  
Schonfeld.  
in Ichthyl.

*Dormire* edita per eum, fistula Aristoteles author est: stertentes audiri, Plinius: in sicum exire utâ Solis radiis calefiant, Oppianus & Elianus. *Inimicitiam*, cum Delphino, Thunnis & Orca gerit. A gladio pisce ut septem diximus vehementer timetur. Ziglerus castoreo aqua diluto & in mare effuso adeò terri, ut totus grex dissipetur prodidit. De *venatione & captura* vide Schonfeldium. *Vsur* adipis, in lucernis, ad inungenda coria, currum rotas, & alia. Cardanus viscera quia pinguis, & sapore & violæ quasi odore commendari scribit. Galenus eis mucosum saporem tribuit. Vingt balænarum genera apud Hartenium inveniuntur, ex quibus *Primum* quot Ninting vocatur hominem fugit, & comestibile est. *Decimum*, quod Fûcraake, haleces versus tetram fu-

gat. *Vndecimum*, quod triginta ulnarum, ultra septuaginta dentes habet, & eos tam magnos, ut inde tabulæ ac manubria cultellorum fiant. *Duodecimum*, non habet pinnas in dorso. *Decimum quintum*, quod Rodkemling vocatur, subvertit naves, & XL. est ulnarum. *Decimum sextum*, quod Nahwal, antèrius in superiore mandibula, dentem longitudinis septem ulnarum, adeò exactè tortum in circuitu, ut humano ingenio melius fieri non posset, habet. *Decimum septimum*, quod Skelling, octuaginta ulnarum, diversos superciliorum supra oculos habet ordines. *Decimum octavum*, quod Nordhwal, nonaginta ulnarum, non vivit nisi de pluvia & rore cælesti, quod fabulosum credo. *Vicesimum*, quod Haffnegruffæ, magis insula esse videtur quam piscis. Fides sit penes authorem.

## ARTICVLVS II.

### De Balæna vulgi, & Phæteræ.

Bellua hæc ut plurimum triginta sex cubitos longa est, octo alta, ut Rondeletius describit. *Oris* scissura ad duodeviginti pedes porrigitur. *Dentes* in conuli, sed horum loco in utraque maxilla, cornæ sunt laminæ nigæ, sensim in pilos suillis similes desinentes, quæ in anteriore & posteriore sive interiore otis parte breviores sunt, in media longiores. Ab interioribus *Lingua* intus continetur & coercetur: inde abducta vel abscissa ita diffunditur, ut in eundem locum iterum recipi non possit. *Oculi*, quatuor ulnarum spacio à se distant, toris parvi apparent, intus capitis humani magnitudinem superat. *Pinnæ* duas maximas in lateribus habet, quibus natat, & catulos in metu occultat, in dorso nullam habet. *Cauda*, sive caudis Delphinumque similis est, figura non multum absimilis, quam cum movet, ita mare agitat, ut naviculas submergat. *Rostrum* est

Albr. de  
Cetiv. 7.

Balaena

Walfisch

Tab. XLII.



Balaena

Walfisch



Balaena

Monodon



Balaena

Ein andrer art Walfisch



Phocaena


Meer-Schwein Braunfisch





Baleen. Ein großer Walfisch von 60 Schuh lang und 4 Schuh hoch.





est breui. *Fistula* caret. *Corio*, duro, nigro, integritur, sine pilis, cui lepadēs, & ostrea h̄erentia aliquando reperiuntur. *Interna partes*, veluti in Delphino. In ventriculo mucus, spuma, aqua, alga scetida, ambra inveniūtur, ut exinde Carnivora nō esse colligas. Vitulos vivos parit. Carnis nullus in *Cibus* vsus, sola lingua commendatur, sale condita. Viginti tria s̄epe vasa ei implentur. *Aristoteles* Aristotelis esse, vel exinde colligitur, quod pro dentibus setas, quibus intus os hirsutum est, habeat. *Plinius* musculum manuum benē dixit, sed pro dux Balæne malē posuit.

**PHYSETER**, qui & *Physalus*, *ῥομφαία*, id est à stando dicitur, quod copiosiorē aquarum eluviem præceteris efflare scribatur. Gesnerus eadem vel saltem affinem cum *Pusti*, qui *πυκνίς*, *πυκνός*, & *πυκνός* dicitur, facit, quem vidē. Diversum esse à *Physalo* maris rubri, ex descriptione videre est. Magnitudine hic adulti *Gobionis*, sine ore, cum branchias tamen habeat, perniciem ei qui gustaverit cteat. Intumescit enim, tandemque ventris profluvio vita finitur. De Descriptione inter authores non convenit. *Plinius* ingentiū columnæ modo se attollere scribit. Solinus super antennis navium velis quondam diluvium eructare addit, quod *Strabo* communē cetis in mari exteto circa *Turdetaniam* facit. *Turner*us portentosæ magnitudinis cetum facit, & singulos se eorum tantum aquæ è fistulis, quas in capicibus habent ejaculantes vidisse, ut singulis singulas naves aquarū copiā in profundum submergerent, adjicit. *Bellonius* hoc solo à *Balænis* differre, quod nullas prætenturas habeat, neque tam vastā corporis mole, figuraque sit magis tereti. *Rondeletio* est ore maximo, dentibus acutis, serratis, linguā carnosa & magnā, fistula longē quam reliquis crassiore, pinguedine multa.



## ARTICULUS III.

De *Puste* & *Orca*.

**PUSTES** à secādo, quod perniciosissimè <sup>TAB. XLIII.</sup> nater, dictus est. Perperā à *Bellonio* capire vasto, rotundo, & cacabi <sup>Aldrov. de Cetis. l. 3.</sup> figuram exprimente describitur, quomodo namque aquam velociter secaret. *Rondeletio* est tostro, valdē <sup>Bellon. de longis, osseo, urring; aculeato. Aculej Aquarū. l. 1.</sup> longo, osseo, urring; aculeato. Aculej validi sunt, & *Delphinorum* dentibus <sup>l. 1.</sup> similes. *Aloystus* *Cadamustus* serram aquaticam vocat, eaque in assamenra <sup>Aloystus l. 6. Ne-rgat.</sup> secari ligna scribit. *Clusius* ipsius formæ ratione inter *Galeos* seu caniculas reponi debere affirmat: eumque ita ex pictura describit. Erat hic piscis, inquit, corporis formā & colore <sup>Clusius Exot. l. 6. c. 19.</sup> *Galeorum* generibus, aut *Caniculæ* *Aristotelis* valdē similis: nullis tamen maculis n̄ illa, conspersam cutim habens, perinde tamen rudem, & instar *Zygænæ* cutis asperam, fusci in dorso coloris, in ventte candicantis, & sex pinnas habet; in lateribus, medio videlicet p̄nē corpore binas, &c. Caput in longum & angustum, planum & firmum rostrum porrigebatur, n̄trinque cum iis dentibus, sive ossis firmisque & testis spinis, ex adverso sitis serræ instar munitum, viginti vel etiam pluribus, &c. Binos oculos in prona capris parte habebat, binas nares in supina, & infra illa oris scissurā, ut *Zygana* ferē transversam. Reperitur plerumq; in Oceano occiduo.

**ORCA** Latinis à vasis olearii aut vinarii similitudine dicitur. Quodnam <sup>Aldrov. l. 6.</sup> apud Græcos habeat nomen, vix cōpertum, nisi vocabulo *Orygis* apud *Strabonem*, quē in mari exteto circa *Turdetaniam* ponit, veniat. *Bellonius* *ocrynū* *Oppiani* esse credit, sed <sup>Strabo Geogr. l. 3.</sup> perpetam. *Thunni* enim hic genus maximum. *Delphino* est corpore totū vigesies crassior, potissimum circa ventrem: Toto tergo atrā, ventre ex alboroseo, ad latera serē cærulea. Rostrum habetissimum, sursum repandum: cuius labri inferioris tanta est crassitudo, ut à superiore se jungatur.

Es dum

dum piscis pronus est, quadraginta triculenti in eo dentes, quorum anteriores obtusi & graciles, posteriores acuti & crassi sunt. *Oculus* eidem sunt parvi, pinnæ pro corporis magnitudine pusillæ. *Cutis* glabra & politissima. *Cauda* lunata, & ulnam distenta excedens. *Pudendum* mari in medio ventre abstrusum, duor. pedū longitudinem excedens; in femina ano vicinum est, ad quod utrinque duorum digitorum intervallo, quædam foramina videntur, in quibus mammarū papillæ delitescunt. Sæpe octingentes, aliquando & mille libras excedunt. *Lienem* unico orbiculari globo in placentæ formam effectum habet. Plurimum aquæ per fistulas ejaculari, Plinius auctor est. *Oreæ*, inquit, in portu Ostiensis visæ est oppugnata à Claudio Principe. *Venerat* tunc exadificante eo portum, invitata naufragii terrorum; *Gallia* advektorum, satansque se per complures dies, abveum in vado sulcaverat, accumulata fluitibus in tantum, ut circumagi nullo modo posset, & dum saginam persequitur, in litus fluitibus propulsa, eminente dorso, multum super aquas, carina vice inversa. *Præterea* iussit Cæsar plagas multiplices inter ora portum, profectusque ipse cum pratorianis cohortibus, populo Romano spectaculum præbuit, lanceas congerente milite, & navis affluantibus, quorum unum mergi vidimus restat belluæ oppositum unda. De earum & Balæna pugna ita quoque Plinius. Balæna & in nostra maria penetrant. In Gaditano Oceano non ante brumam eas conspici tradunt. Condi autem ætatis temporibus in quodam sinu placido & capaci mirè gaudentes ibi patere. Hoc scire oreas, insectam his belluam, & cujus imago nulla representatione exprimi possit alia, quam carnis immensæ dentibus truculentæ. Irrumpunt ex, & in secreta, & vitulos earum & feras vel etiamnum gravidas lacinant morfu, incussæque ceu Liburnicarum rostris fodiunt. Illæ ad flexum immobiles, ad repugnandum inertes, & pondere suo oneratæ, tunc quidem & utero graves, patientiæ pænis inva-

lidæ, solum auxilium novere in altum profugere, seseque opponere, & cautum angustis trucidare, in vada urgere, saxis allidere. Spectantur illa prælia ceu mari ipso sibi irato, nullis in sinu ventis, fluctibus verò ad anhelitus impulsusque, quantos nulli turbine volunt.

Hucusque Plinius.

#### ARTICULVS IV.

##### De Delphino.

Piscis quem Latini Delphinum vocant, is Græcis δελφίν & δελφίν & li XLIV. minutus δελφίνος, plurisque Euro. Alder. de cetis u. 71. nationibus, Porcus marinus dicitur. Ex Cetis esse, quod branchiis careat, pulmonemque & arteriam habeat, Aristoteles reliquit. Repando dorso incurvum esse plerisque proditum, unde incurvæ cervicis pecus Pacuvius vocavit, seu quod talis oculis nostris, dum abundis exiliens in mare præceps fertur, propter celebritatem motus appareat, seu quod, quia branchiis destituitur, revera corpus, cum se vibrat, incurvet, ut promptior in guttitem pronus feratur.

*Rostrum* ei est simum, unde Simo. Phil. H. 84. nis nomine gaudere Plinius scribit. *Lingua* mobilem, brevem, latam, carnosam, exertam in ambitu ferratam, suillæ non absimilem. *Dentes* parvos, acutos, pectinatim coeuntes. *Oculos* magnos, sed cute adeo tectos, ut pupilla solum appareat, non longe ab oris scissura, quin in eadem pro modum linea sitos. De *Fistula* litu non convenit inter auctores. In dorso esse scribunt Aristoteles & Plinius, ante cerebrum Rondeletius, cuius vetior sententia, inter oculos Bellonius. In dorso esse creditum veteribus, quod magis ad posteriorem partem quam in balæna spectet. *Pinnæ* duabus validis natæ, quæ veluti hominis brachia cum omoplatis articulis iunguntur. Earū musculi quatuor robusti dorso pectori; annectuntur. Hæc in v. ètre sunt, ita ut, ut nō solum nata-

Cepus Delphinus.

Delphinus Kopf.

Tab. XLIV.

Glaucos yfios Senec.

Der Kopf des Schwanzfischs.

Scolopendra cetacea.

Uhalur marinus.

Uhalur

Schwanzf.

Schwanzf.

Uhalurus

Walfisch.

Uhalur.

Ein Alt Meer-Fos.

Uhalurus luscus.

Ein Jung Meer-Fos.





Plin. H. N.  
l. 9. c. 9.

Plin. H. N.  
l. 9. c. 3.

Cardan. in  
variis.

Arist. H. A.  
l. 8. c. 13.

bio Plinii verbis, qui Turfiones Delphinorum similitudinem habere scripsit, Phocænā Turfionē vertit, & pro iisdem, Scaliger, Bellonius, Gesnerus, Jovius & alii agnoscunt. Differt tamen & ab eo qui Athenæo ducitur, dicitur, & à *Platanista*, quem Plinius in Gange Indiæ rostro & cauda Delphini, magnitudine verò quinque cubitorum, tacit. *Descriptionem* si attendas, ita de iis Plinius. *Delphinarum similitudinem habent, qui vocantur Turfiones. Diffans & tristitia quidem aspectus: abest enim illa lascivia, maxime tamen rostris. Canicularum maleficientia assimilati.* Nobis ex Bellonio & Cardano, ista placet. Phocæna Delphini est magnitudine, brevior tamen crassiorque corpore. Captus aliquando in Neustria, quimille libras pendebat, adeò pinguis ut teres videretur. Caput habet obtusum, Rostrum tam firmum ut cum capite ferè rotundetur, *Meatus auditivos* admodum obscuros si reperire volueris, ab oculi majore cantho, sex digitor. intervallo caudam versùs accuratè disquirere, illucque grandem culmen inferere oportebit. *Pinnæ* eidem solidæ ac nigre. Tergoris colore ex cæruleo in obscurum livens, Cauda lunata. Cardanus eum qui Diepæ in Neustria captus erat, *fissulam* in medio per quam aquam effunderet, digiti magnitudine habuisse scribit: dentes quoque obtusos, & hominis molarib. similes. Minxisse, ore aperto respirasse & suspirasse; *Lachrymas* fuisse, p. fluentib. ex oculis guttulis; diuque supervixisse, quamvis sanguis è vulnere, nō secus ac vinum è siphunculo fluere, addit. Nullius non maris est incola. Bellonius sæpius in Oceano Gallico quam Delphinos capi scribit. Rondeletius etiam in Ponto vivere, & in loco illo, Aristotelis, *ἡ φώκαιος τοῦ δελφίνος ὡς τοῦ ἰσίου ἔστι πύρρον, &c.* quædam: pro *φώκαιος* ex eodem Aristotele, qui antea Phocænam in Ponto nasci scripserat, legendum esse putat. Hoc alii de vitulis marinis accipiunt. *Parit* magna ex parte binos vel singulos ut Aristoteles prodidit. Bellonius in for. Parisiis, diebus Veneris inprimis adferri reliq. Del-

phino tamen est deterior, quia pinguior.

**SCOLOPENDRÆ CETACÆ,** Ælian. H. A. l. 13. c. 13.  
Ælianus solus meminit. Exerunt aliquando totum è mari caput. Narium pilos magna excelssitate apparere, caudam perinde atque locustæ latam conspici, reliquum corpus aliquando in superficie æquoris spectari, & cum tiremi iustæ magnitudinis conferri posse: Permultis pedibus, utrinque ordine sitis, tanquam ex scalmis apensis natæ. Addunt inquit harum rerum periti ac fide digni, ipsos etiam fluctus ea natante leviter subsonare. Pro hac Cetacea Scolopendra, hanc quam exprimi curavimus Aldrovandus exhibet. Tota ad colotem cæruleum vergebat; ad latera tamen & in ventre nonnihil rufescebat.

## ARTICVLVS VI.

## De Phoca, seu Vitulo marino.

**ET** Phoca animal sit amphibium, quia tamen humore potissimum vivit, nec diu extra aquas vivere potest, inter aquatilia referte placuit. Græci *φώκαιος* dicunt, seu ex *φώκαι* beatu quem edit, unde Servius apud Virgilium, Phocas, *marinos boves* interpretatus est, seu aliunde ducto vocabulo. Plinius & Gaza vitulos marinos; ille, quandoque Vitulos simpliciter dixit. Festo *Bocæ*, ut Gesnerus cōiicit, vocatur. Varinus in *Δελφίνος*, Oppianus *φώκαιος* dicitur dixit. Differt *Corporis figura* ab omnibus tum piscibus, tum Cetis, adeò ut quadrupedem vocaverit Aristotel. Habet quippe, ut oculatus testis Rondel. scribit, veluti *brachia* sine cubito, sine ulna, brevissima: Quod sequitur, Carpo nostro respondens, ex multis ossibus constat: Metacarpium verò, ex quinque ossibus quæ pelle tantum reguntur: inde tanquam manus indivisa, præterquàm in extremo, in quo quatuor linearum distinctiones, tantum spectantur; ungues autem quinque distincti. Quia pinnarum vicem agunt, ideò Homerus *φώκαιος* *ρινοδός* cognominavit. *Corio* tegitur duto, solido, pilis nigricanti-

TAB.  
XLI.

Ec 3 bus

bus & cinereis, quædam maculas parvas albicantes in ventre habent. Plinius *Cartilagineæ* non ossa habere scribit, sed Aristoteles carne abundare mollemque esse, & cartilaginibus consistere, auctor est. *Caput* est breve, & pro corporis magnitudine parvum. *Collum* longius, quod pro arbitrio extendit & contrahit. Inferior *maxilla* Lupinæ similis est, superior quæ in lupo latior, hacque & naribus virgulis terrestribus affinis est. Oris scissura mediocris. *Superciliorum* locum & superius labrum pili duri alius nigri, alius albi tegunt. *Dentes* sunt serrati & lupinorum similes. *Oculi* splendunt & subinde in mille colores ut hyænx transeunt. *Lingua* est scissa, id est bifurca. Plinius duplicem facit, Rondeletius latam esse addit. *Auribus* caret, quod vitam in humore trahat, partes verò aurium meatibus additæ, ut motus aeris à longè delatus servaretur: sed loco eorum meatus angustissimos & exiguos habet, qui in viventibus sunt evidentes, in mortuis difficillimè inveniuntur. Lato est *pectore*. Omoplatas enim habet quareris musculis conexas, superiore vel posteriore in parte quam canes terrestriaque alia animalia, quæ in lateribus cava habent. *Fel* in hepate habere negat Aristoteles, omnino habere, Bellonius. Plinius tribuit, sed partem non exprimit. *Renes* ei sunt firmissimi & solidissimi, cum reliquorum omnium magis minusve cavi. *Genitale*, maribus oblongum, foeminis ad terrestria accedens. Aristoteles simile Rayæ esse ait. *Locus* Phocæ aqua & terra. Nec penitus illa carere potest, nec in ipsa agere secus, nisi per intervalla quædam respiret.

Aristot.

*Vesuntur* piscium carnibus, & in varia immisæ, furibundi in eos sæviunt; apud Troglodytas extra sinum Arabicum piscium capturæ non minus ac homines intenti. In retia delapsi, dilacerant eadem, & piscibus una capitis effugiendi ansum præbent. Leporum & aliorum retro mingentium ritu *mingunt* & coeunt, nempe aversi, inque medio coitu cohererent. *Pariunt* in terra pecudum more, nun-

Plin.

quam geminis plures, ut scribit Plinius. Secundinas emittere scripsit Aristoteles. Prolem circa duodecimum à partu diem in mare deducunt, quod Calpurnius inter insensibilia recensuit. Maxima ex parte per littora vagantur, & vicinos agros, vinea & pomaria deperdunt. Si quando colliculum ascenderint, indeque secedere coguntur, pedibus accipite in ventrem contractis, ac toto corpore in globum constricto, maximo impetu in mare devolvuntur. Non procul tamen à littore recedunt, quod ipsis difficilis pedum in terra usus sit. Difficiliter *interficiuntur*, nisi capite eliso, quod corpus rotundum carnosum sit. Extra aquam ad solem in arena littoris vel super saxa dormiunt, ut liberius respirent. Nullum animal graviora somno premi auctor est Plinius. Nos aliquoties, Plin. cum Andreapoli in Scotia studiis. *Juvenc.* peram daremus, tam prope ad stertentes accessimus, ut lapidibus infestari poruerint. Postquam se in aquas coniecissent, elato ex undis capite nos intuebantur. Inter dormiendum tam altè stertunt, ut mugitum edere videantur, quod Aristoteles quoque & Plinius meminere. In causa pituitosus humor, qui in aspera arteria, inspirando & expirando agitatur. Sed & in aquis fortè dormiunt. Nam & ranæ, quarum more sub aquis diu urinantur, longissimo anni tempore, sub aqua latere possunt, ne quicquam de *pulmone* dicam, qui exiguus, spumofus, nec sanguineus *Ingenium* huiusmodi. Sæpissimè mitescit, & naturam ferinam deponit, & quod miretis, accipit disciplinam, voceque pariter & visu populum in spectaculis exhibitus salutat, & in condito fremitur, nomine vocata, respondet, sed & in hominem amore fertur, hac in parte nihil à Delphini natura abhorrens. Visus aliquando vitulus marinus, qui ad principis Christiani nomen gaudio perfundi videbatur, obmutescerebat ad Turcæ. Is etiam cuius Rondeletius iconem dedit, in Lerini insulæ Cænobio, nullo metu cum hominibus

per

## ARTICVLVS VII.

## De Manati Indorum.

per multos dies versabatur, adeò ut & gradus ascenderet. Damnis apud Philostratum, Phocam à piscatori-  
bus captum, filium quem in cavea pe-  
peterat, ita deplorare mortuum vi-  
dit, ut per triduum à cibis abstinue-  
rit. Tzetzes verò testatur, cum suis  
catulis mori, istos cum suis matribus,  
parentesque senio confectos, in na-  
tando iuvare. Summa ipsi cum mati  
*Sympathia*. Pili enim excoriati si mare  
turbatum in fluctus surrexit, similiter  
eriguntur; si desedit, in planum ster-  
nuntur. Quod cum non cederetur,  
facto in Indico mari circa Hispanio-  
lam insulam in periculo, non amplius fa-  
bulosum haberi Catdanus asserit.  
Plinius sensum æquorum retinere,  
semperque æstu maris recedente in-  
horrescere scripsit: Rondeletius verò  
mutationes ætris significare, austri-  
nis ventis surrigi, borealibus ita desi-  
dere, ut nullos planè affirmes, sæpius  
observavit. Fulmina & grandines co-  
rurio prohibere Plutarcho & Palla-  
dio proditum. Ideò, & summas velo-  
tum partes eo obtegi, & Augustum  
Cæsarem pellem vituli marini per-  
petuo circumferre cõsuevisse, & Se-  
verū Imperatorē eadē tectū voluisse  
legitur. Grandini verò obviare Pal-  
ladius credit, si per possessionis ter-  
minos circumferatur, & in villæ aut  
cortis ingressu suspendatur, cum ma-  
lum videris imminere. Urso metue-  
re Oppiano debemus, congressos a-  
liquando cum iisdem in spectaculis,  
Lycostix rusticus apud Calphurnium  
fugere & arietes marinos, & forti  
anhelitu è cavernis extrahi, Æliano.  
Negligitur etiam ab infima plebe in  
*Cibis*. Caro enim ipsius, mollis est,  
spangiosa, & pinguis, adeò ut lique-  
tur si diutius manibus contrectetur.  
In *Medicina*, dextra pinna capiti sub-  
dita somnum adfert, quòd nullum a-  
nimal graviote somno prematur. *Pel-  
lū* à podagra præservat, si ex ea cal-  
ceos gestaveris. Adeps in muliebri-  
bus morbis vehementer ab Hippo-  
crate laudatur. *Coagulum* quod evo-  
mete dicunt, ne in hominum manus  
incidat, cum panace, vel succo puni-  
ci, Comitiales morbos sanat. Cælius  
Aurelianus tamen id teptehendit.

**H**UJUS piscis nemo veterum me-  
minit, nisi fortè Bos sit Aristote-  
lis, quem in Historiis inter Cetacea  
reponit. Belgæ vaccam marinam vo-  
cant. Nec in congruè iste diceret, cū  
quòd capite terrestrem bovem refe-  
rat; tum quòd ejusdem mote herbis  
in terra pascatur. Utri est similis, ideò  
fœdissimus aspectu. Caput habet bovis  
instar, Oculos exiguos, Pedes circa ca-  
pur binos, crassos tanquam alas bra-  
chiorum loco, quibus natat. *Anrium*  
loco duo foramina exigua quibus au-  
dit. *Lapides* seu ossa in cerebro bina  
parvæ pilæ palmaris magnitudine,  
orbicularia. Circa *caudam* strictior  
est & quasi præcinctus, quæ etiam ab  
inde ad extremum tota conspicitur  
nervosa. Fœminæ duo sunt ubera  
in pectore, quibus catulos lactat. *Co-  
rium*, quo integitur est simile ustula-  
ti porci corio, digitum densum, cine-  
raceo colore, rarissime pilis præditum.  
Adeò magnus est, ut iugo boum opus  
sit ad unum vehendum. Nonnun-  
quam quatuordecim aut quindecim  
pedum longitudinem superat, octo  
verò palmarum crassitudinem. Circa  
insulam Hispaniolam in mari capitur.  
Subit tamen & flumina, & secundum  
ripas eorum herbas depascitur. *Man-  
suescit* aliquando. Aluit quandam per  
vigtntifex annos in lacu Gvaynabo  
Caramatexi Regulus, tam mansue-  
tum, licet jam grandem, ut nomine  
Matonis inclamatus, è lacu egrede-  
retur, & ad ædes cibi sumendi gratia  
petreptaret, iterumque in lacum re-  
mearet, pueris atque viris, quorum  
cantu delectari videbatur comitan-  
tibus. Idem denos simul pueros ter-  
go exceptos ex una lacus parte non  
positam transvehebat. Cum quidam  
ex Hispanis hastam in eum vibrasset,  
etsi non læsus, nunquam tamen im-  
poster emergere voluit, si viros vas-  
te indutos, & barbatos conspexisset. In-  
tumefcente fluvio Hayboaco, & in  
lacum illum se effundente, in mare

Ee 4 regres-

Philosfr.  
l. 2. de vita  
apollonii.

Plutarch.

Sueton. in  
Augusto.Pallad.  
l. 2.

Ælian.

Plin.

Plin.  
Therop. l. 1.  
l. 9. c. 12.TAB.  
XLIII.  
Arist. H. 4.  
l. 6. c. 11.  
Lopez  
Hist. Ge-  
ner. l. 13.  
Clus.  
Exer. l. 6.  
c. 19.

regressus est. *Usum* & in *Cibus* & in *Medicina* præstat. Caro enim ejus reficcata, Anglicæ bubulæ similis est, & diutissimè incorrupta manet; cocta Thynni carne est præstantior. Cauda in partes concisa, & soli per quinque dies exposita, tandem in patella cocta, multa pinguedo elicetur, quæ, quia rancorem non contrahit, ad ova in fatragine frigendo

adhibetur. *Ossa* in capite colicæ passioni & doloribus nephriticis valde adversantur, si primò adusta, contrita & per cribrum transmissa, in vino drachmæ unius vel alterius pondere, assumpta fuerint. Ex *Cotio* cingula etiam & calcæorum soles fiunt.



ADDITA-

natatum, sed & motum, quo sursum se effert respirandi causa, adinvenit. In dorso quæ est, aculeatam Plinius, & Pausanias faciunt, propter duritiam sine dubio. Nam rigidam satis esse Rondelietius testatur, dux quæ in cauda, ex ejusdem lateribus, altera dextram, altera sinistram partem versus, ita ut cauda, quæ lunata, aquam latitudine sua verberet. *Sextum* si attendas, pudendi in *femina* orificiû, ano vicinum est ad terrestria animalia accedens, binas eadem, sicut Plinium sequimur in ima alvo papillas tantum gerunt, nec evidentes, & paulò in obliquum porrectas. Aristoteles mammas propè genitale continere ait, papillas quadrupedum more conspicuas habere negat, sed velut alveolos quosdam humoris duos esse scribit, utroque de latere singularem, è quibus lac fluit, quod ore catulorum parentem sectantium excipitur. *Fulva* cervicem palmum unum longam habet, quæ deinde in ramos duos veluti in quadrupedibus terrenis videre est, distribuitur. Testes ad uteri cornua, pudendum inter umbilicum & podicem gerit *Mari* foramen quoddam in medio ventre apparet, è quo pudendû quadrupedibus simile exit, quod in congressu erigitur, & extra eminens profertur. Ideò fortè Aristoteles genitale foris esse dixit, testes intus, qui secundum Plinium prolongi, ad alvum necti. *Felle* omninò caret. *Locum* si spectes, nullum ferè sine Delphinis mares adeò ut & in Ponto, quem nulla piscibus inimica belluâ ingreditur, reperiantur, & in Adriatico quamvis raro capiantur, sed & aquas dulces subit, & Nilum ipsum, ibique piscibus aliquandiu pascitur. Illos tamen non esse, quos Solinus serratas cristas habere. Crocodilos studiù ad natandum elicere, demersosque astu fraudulentò tenera ventrium subternatantes secare & interimere, scribit, facile mihi persuaderi parior, quod Marcellinus non Delphinos, sed Delphinis similes vocat. Accepit à Græcis qui circa Propontidem habitant Bellonius, eosdem instar alio-

rum piscium migrare, è mari mediterraneo videlicet Septentrionem versus, Hellepontum & Propontidem emetiri, Euxinum ingressos certo tempore immorari, tum denovo loca prius relicta repetere. *Cibus* Delphinopiscees, in quos crudeliter grasatur, habetque Cephros aves comites, quæ ab eo occisorum sanguine pascuntur, ut Oppianus scribit. *Vita* latis lōga, ad tricenos sæpe annos producit, fortè quod felle careat. *Coi-* tus humano similis, illeque paulò quam piscium qui attritu ventrium coeunt, diuturnior. Aristoteles tamen ceteror. more congruendi scribit. Gestat utero \* decem mensibus, & singulos uno partu, interdum & binos edit. Parere ætate, nec ullo alio in vulgatis Plinii codicibus legimus. Rondelietius factum verè aliquando extraxit, alterà femina Octobri dissecuit, inque eius utero tum demum formari ceprû factum invenit. Chorio amnio & allantoïdo tunicis, in utero involvitur, sanguine per venas umbilicales nutritur, & spiritum per easdem arterias recipit. Proles celeriter adolescit, quippe quæ annis decem ad summam magnitudinē perveniat, ut tradit Aristoteles. Pro voce ipsis gemitus est humano similis, ut Plinius prodidit. Rondelietius stridorem edere scripsit, vocisq. nonnihil. *Visum* habent acutissimum, ita ut piscem etiam sub lapide vel in caverna aliqua latitantem videant. Omnium terrestrium tum aquaticorum velocissimos Aristoteles dixit, ocyores volucres, ocyores telo. Nam cum fame concitati fugientem in vada ima piscem, diutius spacium continuere, *Ælian. H.* ut arcu emissi ad respirandum, *A. A. 12. 4. 13.* emittant; tantaque vi exiliunt, ut plerumque vela navium transvolent saltu. Pernicie si sæpe causata velocitas. Nam aliquando, dum Mugiles persequuntur, nec incitatum cursum inhibere possunt, terræ impacti, præda fiunt; quod & tum fit, cum vel assylo instantur, ut Rondelietius observavit, vel nimio piscatorum strepitu gravantur. Plinius tellure tactas mori *Plin. H. N.* ait, repugnante experientia. Nam & *1. 9. c. 8.*

Aristot.  
H. A. 1. 9.  
c. 5.  
\* Aristot.  
H. A. 1. 6.  
c. 13.

Aristot.  
H. A. 1. 9.  
c. 48.  
Plin. H. N.  
1.

Ælian. H.  
A. A. 12. 4. 13.

Plin. H. N.  
& 1. 9. c. 8.

Ec. 2. Aristot.

# ADDITAMENTUM

De

## CANE ARISTOTELIS.

Nicom.  
H.N. l. II.  
c. 10.



Is est qui hodie Tuberō dicitur, Canis Carcharias esse vulgō creditur. At quia ille quem Franciscus Hernandus describit,

exactly descriptioni, quam attulimus, non respondet: ideo placet & hanc apponere. Cetaceus inquit piscis est, ex genere oblongorum, Oceani incolā, quindēcim interdum dodrantes longus, voracissimus, cursu velocē, nec omnino stupidus, & bina humana corpora sepe numero crassus; ore quod rostro unciarum decem intervallo subjacet, lunato, vallatoque supernē trino dentium præacutorum, ac sepe multo ferræ modō subinertantium, ac quater no infernē binum dodrantum rictu, & brachiis utrimque quinis: rostro tanx obrotundo, pinnis singulis utrimque juxta branchias, totidem juxta pudenda, juxta caudam unicā alterā omnium maxima imminente dorso statim à branchiis, alteraque juxta caudam modicā, à contrario alterius parvæ, sed in oppositam partem vergente caudā magnā, crassā, falcataque, & superna parte triplo aut quadruplo longiore atque latiore, & juxta exortum quibuidam parvis cavitatibus insigni: oculis modicis longo inter sese distantibus intervallo: pupillā magnā, & sub lutea inde, corio verō ceterorum cartilagineorum, cum sese tendit, nullis ictibus penetrabili: dorso ac lateribus exruleis exlaturatis, ac ventre candenti. Mirum est, bina pendere mari, offea pudenda, cava, alba, dodrantem longa, & ternis singula, glandis loco,

longiusculis noxia acuminibus, quibus novaculæ modo facili quidvis obvium abscondit. Maleficum animal est, atrox, ac hominum devorator: adeo vivax, utin perquam renues etiam divisum apalectos, affixumque veru, ac vitam adhuc videatur mordicus retinere. Mediocre præstat, & quale aliis congneres pisces, dum parvum est alimentum: sed provecius, durum, ingratum, infalubre, & fluxum alui ciens. Vnicum est illi intestinum, satis amplum; unde tam improba contigit voracitas. Cor parvum subalbidum, laxum, & usque adeo vivax, ut eductum, & in varias partes sectum, diutius conspiciatur moveri, ventriculisque distinctū. Stomachus vastus est, hepar candens, in duas partium ternas, quatuor dodrantes longas, ac decē uncias latas. Splen vero jocinoris longitudine, sed duas tantum uncias longus.

Cæterum solent circa tuberones <sup>Nicom.</sup> pisciculi quidam natate <sup>Romeri dicti, H.N. l. II. c. 10.</sup> de quibus ita Hernandus. Piscis est spinosus, Oceani Septemtrionalis alumnus, dodrantem plus minus longus, tres uncias crassus, corio tectus molli & pæne teres. Lunatū constat caudā, & rostro resmo atque compecto, oculis magnis, si magnitudini corporis comparentur, pupillā nigrā ac luteā iride. Senis natat pinnis, quarum altera medio pæne dorso in caudamque procedit, sensim sese attenuans, & à quibusdam præacutis spinulis sumens exordium: altera à pudendo pæne ipsa in caudam sese descendit, utrimque à brachiis singulæ, binæque paulo ante initium ventris.

Colot

Color universi ex albo in cæruleum tendit, quamquam dorsum caputque cyaneo exsaturato videantur nitere, universumque corpus senis pavonini coloris transversis in discurrentibus orbibus ambiatur. Extrema corporis caudam contingens quadrata sunt, & quaternis veluti dorsis distincta quarum bina quæ in latera excurrunt, desinunt in acumen. Caudæ initium pavonino exsaturato splendore. Micant medix utrimque partes, dilutiores sunt sequentes exsaturatæ, ac demum postremæ candentes.

### DE GLAUCO ÆLIANI.

Næmbo.  
H.N.I. II.  
6.21.

AD Glaucum Æliani videtur referri debere, & hic quem Clusius exenteratum & resiccatum ita describit. Erat, inquit, corpore longo, trium ferè pedum longitudinem explente coloris (resiccatum enim & exenteratum duntaxat conspiciebam) ex cineraceo fusci, in quo tamen quidam candor, præsertim in tergo, adhuc elucebat: vivum enim & recenter captum argentei præne coloris fuisse intelligebam. Medii corporis ambitus pedis, hoc est, duodecim unciarum longitudinem æquabat.

Cartilagineus verò erat, & lævi cute prædicatus; tostrolato, sed in obtusum deinde acumen desinente. Oculi magni erant, è quorum infima parte enata erat membrana, quæ sursum sese attollens, velut nubes caliginem illis offunderet.

Oris tectus non valde latus, in supina capitis parte maxillas in obtusum angulum desinentes habebat, ferè ut simiz: quaternis autem dentibus os præditum erat, binis in superiore maxilla, totidem in inferiore: illique firmis, quorum singuli quibusdam sulcis erant distincti, ut pluribus dentibus armatum os esse videretur. Corpus à cervice sensim gracilescerebat: spina sive a-

culeo in eâ parte, quâ dorsum cervici connectebatur, sito, eoque sex uncias longo, infimâ parte lato & cavo supernâ autem valdè acuto. Pinna surrecta innitebatur quatuor præne uncias longa. Binas duntaxat in lateribus branchias valdè apertas observabam, utrumque videlicet unam, cum aliorum galeorum genera denas habeant, in singulis lateribus quinas.

Has sequebantur duæ pinnae ad natandum idoneæ, longiores quam in ullo galeorum genere conspexerim, novem videlicet unciarum longitudinem æquantēs. Binas alas habebat ex utraque podicis parte, quatuor uncias longas, illasque bifidas, hominomne industria sic fissas, an à natura nihil pronunciare possum.

Alia deinde pinna in dorso paulò infra eam, quæ ad aculeum erat, exoriebatur, ad extremam ferè caudam usque inæqualiter potrecta, hoc est, ad eam usque caudæ partem, quæ tenuissima, & septem uncias longa, muris caudam quodammodò æmulabatur. Podici, qui in supina parte, ut in reliquis piscibus, sius, vicina apparebant bina foramina, in quem usum, ignoro.

Capitis porro cutis siccitate adeò erat contracta, ut nulla circa oculos, nulla ante eos, foramina observare potuerim.

### De Pisce Gibbo.

Hic similis est *Acacana*, qui est Næmbo.  
H.N. III.  
lixitate inferioris labri, & eminenti-  
tis gibbâ, quæ à capitis exordio usque ad os, quod per exiguum est, arcuato descendit flexu.

Dorsum lateraque cyanea sunt, venter ac laterum pars alba, ac præter duas pinnas quæ circa branchias sunt utrumque, unicam angustam & longam, & aliam parvam, duæ alix visuntur breves, altera à medio ventre, altera vero à dorso in caudam usque procedens.

Squa-

*Est. admodum form.*



*Cisti. gaur.*



*Heter. pinn.*

*Oris spinosa.*



*Oris. Rana. mhu.*



*Pis. triangulari.*



*Sarg. Crist.*



*Sarg. subru.*

*Oris oblongus.*


*teradma Capite.*







*Albula nobilis*



*Albula*

2



*Albula nobilis*

3



*Albula nobilis*

4



*Albula nobilis*

*Tuna Cornuta*



*Idem superius*



*Micula marina Vulpata*

8





*Ailanthus marinus Major*

Tab XLVII

*Lupus**marinus Schenckelley**Lycostomus Pallidus**Sargassum flavum alter**Idem Lupinus**Sparus**Silurus asotus affinis*



Ubi Pteris pinnam ad oculum Pteris habens.



*Delfinatus prior*

*Delfin*



*Delfinatus alior*

*Delfin*



*Anty*  
*Mit*

*Anty*

*Mit*



*Delfinatus*  
*Delfin*

*formis*  
*Winklan*



*Delfinatus alior*

*Ein ander art Delfin*





Squamofus non est, & tamen bono conſtat alimento. Mare illud ad me miſit Australe; etſi quidam referant, in Septentrionali quoque reperiri.

### De Oſtracione Gefneri.

Oſtracioni affinis eſt *Catan* qui piſcis eſt quindecim pedes, cum in perfectam magnitudinem adolevit longus, corrice rectus duriffimo, laminis rhomboidis figuræ, paucisque contexto, teſtaceæ præne duritiei, nitidis, ac cireæ ilia elatis, qui vicem lorice præſtare poſſet. Roſtrum eſt prælongum & acutum, ſerrati dentes, & quaternario ordine diſpoſiti, ac pinne craſſiſſimæ binæ juxta branchias, ac juxta caudam unica. Vivit in lacubus aut magnis fluminibus provincię Panuceniſis. Salubri conſtat nutrimento: ſed cum parandus eſt, hic piſcis, ſpoliatur corio. Vivit ex aliorum piſcium canumve captu, homines quoque interdum aggreditur.

Egitur vero aſius, non coctus aut elivus.

### AD LIBRUM V.

#### De Phoca.

Phocatum generis eſt Wallruſſen Mors, animal amphibium, quod Vorſtius apud Delactium ita deſcribit. Belluam hanc marinam vidi, magnitudine vituli, aut canis Britannici majoris. Phocæ non diſſimilem: capite rotundo, oculis bovillis, natibus depreſſis ac patulis, quos modo contrahēbat, modo diducebat, aurium loco utrimque foramina; riſtu oris rotundo nec ita vaſto, ſuperiore parte aut labro myſtica geſtabat ſetis cartilagineis, craſſis ac rigidis conſtantem. Inferior maxilla trigona erat, lingua craſſa brevisque, atque oſinterius dentibus planis utrimque munitum, pedibus antetioribus

poſterioribusque latis, atque extrema corporis parte Phocam noſtram planè reſerebat.

Pedes anteriores antroſum, poſteriores retroſum ſpectabant cum ingrederetur.

Digiti quinque membrana inreſpiciente diſtincti, eaque craſſa. Poſterioribus Digitis ungues impoſiti, non prioribus caudā planè carebat. Poſtica parte repebat magis quam incedebat.

Cute craſſa, coreacca, pilisque brevibus ac tenuibus obſita veſtiebatur, colore cinerco. Grun- nitum apri inſtar edebat, ſeu croci- tabat voce gravi & valida. Repebat per arēam extra aquam, quotidie per ſemihoram aut amplius doſio aqua pleno immerge- bant, ut ſe ſibi oblectaret. Catu- lus erat, ut ferebant qui attulerant ex nova Zembla, decem hebdoma- darum, dentes ſeu cornua exerta, ut adultiores, nondum habens, ru- borecula tamen in ſuperiori labro præcipiebantur, unde brevi pro- ditura facile apparebat. Fe- rum & validum animal calebat ad raſtum, valideque per narcs ſpi- rabat.

Pulmentarium ex avena, milio- ve comedebar lentè & ſuſtu magis quam deglutiendo, herumque ge- ſtantem cibum ac offerentem mag- no niſu ac grunnitu accedebar, ſequēbaturque; nidore eius alle- ctus. Latdum eius guſtandibus haud inſuave viſum eſt.

Conſpiciēbantur ibidem duo majorum capita, dentibus duobus exertis Elephantorum inſtar, lon- gis ac craſſis & albicantibus muni- ta, quideorſum verſus pedus ſpe- ctabant. Eorum coria cccc. aut lxx. pondo pendisse ferebant Angli qui attulerant.

Hiſce dentibus rupes aſcendere, ſequē ſuſtinere ajebant. Et prodeunt in continentem ſeu terram ut ſom- num ibi capiant gregatim.

Pabu-



THE  
OF  
THE  
OF



## HISTORIÆ NATURALIS

De

EXANGVIBUS  
AQUATICIS

LIBER L

*De Mollibus, seu Molluscis.*

TITVLVS L

*De Molluscis in genere.*



**U**A TUOR Exanguium  
genera Aristoreles  
constituit, *Mollia*, nem-  
pe seu *Mollusca*, quæ  
catne molli foris ob-  
ducta, solidum inte-  
rius modo sanguinei generis conti-  
nent. *Crustæ*, quæ crustis collisus re-  
guntur. *Tessæ*, quæ testis duris  
fragilibus muniuntur, & *Insecta*,  
quæ Græci *inipia* dixere, *Zoophyta*, his-  
tice adnumerari meliori iure possunt,  
quàm ut inter plantas, numeren-  
tur.

*Mollusca prazmittimus*, tum quod nobiliora sint, & partium numero ac robore longè præcellant; tum quod idem Aristoteles & Plinius fecerint. Nec malè Aquatica Piscibus subiungentur, cum & Plinio, ea, pisces nuncupare placuerit. *Mollusca* seu *marina* dicuntur, quòd neque asperam, neque testaceam cutem, neque squammam habeant, Athenus *μολύδα*, seu Lolligini familia dixit. Dicit & *μαρμαρίσκει* Gamz & Rondeletio visum deceptos, &

Cartilaginea Aristotelis Italia dici Sal. Aristot. de  
vianus ostendit.

Naturam inter carnem & nervum  
mediam obtinent: fissilis hæc, in an-  
fractum, ut ad vires commodior es-  
se possit: loco ossium, quod piscium  
spinis proportionetur omnia, Poly-  
pum si excipias. Exteriores partes  
tres præcipue habet Caput, pedes si-  
ve brachia, quos Aristoteles quan-  
doque *extremities*, Gaza crura, bar-  
bas, cirros vocat, & n. *κίρκας* adhe-  
rent id est, *alveis indifferens*. Caput omnibus *fin. H. N.*  
inter pedes & ventrem, seu ut A-*l. 9. c. 28.*  
ristoteles, *ἐν μέσῳ τῶν κειμένων*  
*ἰσχυρίων*. In capite Os est &  
bini dentes, qui potius, cum immo-  
biles sint, neque ad retinendam  
prædam firmè initantur, *εἰς τὴν* seu  
rostrum dicendi sunt. Est enim hæc  
pars, (os & dentes) adunco carnivo-  
rarum rostro per quam similis, ex  
duabus partibus composita, superio-  
re & inferiore commissura pyxidata,  
ut loquitur Rondeletius, ita ut infe-  
rior superiori inferatur. Loco *lingua Aristot. de*  
carnosum quiddam in ore gerunt, *part. l. 4.*  
quo esculentorum voluptatem dis-  
cernunt. In capite oculos binos  
grandiusculos, quibus exigua quæ-  
dam cartilago, discernimen cere-  
brum

11

brauns

Arifol., H.  
A.I.C. 4.  
O S. 1. 4.  
S.L.

Wright, H. A.  
L. A. C. I.

Source:

Pfau, H.N.  
I. g. c. 28,  
Galen.  
de Alim.  
facult. I. 3.

brum parvulum continens, præstat. *Pedes* habent parti priori, circum caput, infra oculos circa os & dentes viatos, quod pars eius posterior ad priorem adducta sit, extremaque coeant ac confundantur, hinc fit ut excrementa meatu ori vicino infra emittant. Oætoni hic sed singulis eorum generibus diversis. *Acetabula* sunt quibusdam, circumstantaque, implicamentis illis quibus digitos antiqui medici indere solebant, similia fibris implexa, quibus carunculas cæteraque cedentia trahunt. Aliis breves & inutiles, binæque promuscides prælongæ, quibus veluti anchoris innituntur, seque contra æstus marinos navigii modo stabiliunt. *Fissulam*, supra caput, & brachia ante alveum, gerunt, cavam, quam modò in dextram modò in sinistram partem transferunt, & hac, mare transmittunt. Aristoteles hæc modo, *alvæ* modò *juvæ*. Gelnus *juvæ* legiit, Gaza & Plinius narem transulere. *Pinnulam* quoque habent circumdantem alveum, ut natate, & se in natando dirigere possent.

*Alveum* à capite amplioris capacitatis propendet, cuius caro non in directum, sed in orbem fissilis & cute integitur. Cutem tamen Salvi-nus denegat, & Plinius, nulla, Polypos vestiri scribit. *Capillamenta* in toto eorum latere conspiciuntur, quorum is, qui branchiarum in aliis piscibus, usus. Scholiastes Nicandri *ἀνάλυσιν*, Aristoteles *σπυγδα* vocat. *Interiora* si spectes. *Osgula* exceptit angusta, quam sequitur ingluvies, *σπυγδα*, ampliuscula, neque avibus absumilis, cui jungitur *venter*, tanquam *ἐντροπὴ* facie buccinorum claviculæ.

*Intestinum* ab eo tenue, partem versus repens superiorum ad os fertur, quod laxius est quàm gula. De *Cerebro*, vel quod ipsi proportionem respondet, superius diximus, *vesica* carent.

*Mutur* adhuc superest, quam Aristoteles, principatum sentientis *δι. 4.* di. obtinere dicit, ac si hæc cordi esset *ἀνάλυσιν*. Humida ea & corpor-

lenta pars per quam gula in ventrem pertendit, adnata magis tergo. Atet humor, quem quidam *τὸ γάλακτος*, alii ut Athenæus & Dioscorides *τὸ γάλακτος* vocant, pro sanguine ipsis inest, si Plinio credimus: probile, ut Rondeletio placuit. Non solet, scilicet, natura, id quod pro sanguine fervat, in quolibet metu effundere: nec ullus meatus venæ proportionem respondet, quo alendi corporis causa in univertum corpus distribuatur. Secretus is ab alimento in vesica, seu tunica membranæ; Aristoteles *μύκρον*, Gaza Papaver appellavit exitum finemque habente, quæ alvi excrementa emittunt, parte quæ fistula vocatur, quæ in supinis polita est.

In falsis aquis degunt: sed in potu. *Locus.* lentioribus non inveniuntur, idco *Arist. H. A. l. 9. c. 18.* frustra in Ponto quæras.

*Vesuntur* carnibus. Nec *sex* ipsis Cibus, denegatus. Aristoteles enim vulvas *Arist. H. A. l. 4. c. 1. de Gener. l. 1. c. 1. & 3. Scæus.* bifidas, ac testes geminos juxta genitale in omnibus reperiri ait.

Differunt fœminæ à maribus, quod mas prona sui corporis nigriora supinis, partesque omnes asperiores habeat quàm fœmina, & lineis intervenientibus variis, caudamque acutiorem. In mare quoque meatus quidam subditus gulæ, à Cerebro in ima alvei pertendit, idque ipsum ad quod fertur, speciem mammæ imitatur: in fœmina duplex illud idem, supraque positum habetur.

*Generationem* quod spectat, Tet. *Generatio.* *g*is copulari, & diu in venere, quia *tio.* frigida, morari, compertum. Ore coire, & renixu atque complexu mutuo brachiorum jungi, prodidit alibi Aristoteles.

Semen per meatum emittunt, idque parte corporis supinâ, quæ *putamen* distat, & mare illabitur, faciunt. Continent fœminæ primò ova indiscreta, mox discreta in plura: sed quia imperfecta excluduntur, augescunt more vermium, postquam vim vitalem ab asperso maris semine acceperunt. Sic glutino uvæ instat cohererent, & quam primum

*Plin. H. N. l. 9. c. 19.*

*Arist. H. A. l. 4. c. 1. & 3. Plin. H. N. l. 9. c. 12.*

*Arist. de part. Anim. l. 4. c. 10.*

*Plin. H. N. l. 9. c. 12.*

*Arist. de Gener. l. 1. c. 15 & l. 1. c. 8.*


Tab. I.

Blagus.

Blagus.


Sepia.

Black necked black head.




Loligo

minor. major. black head.



Sepia

Mercipin.



Loligo

minor. major. black head.




Loligo minor.



Loligo

minor. major. black head.



Sepia

Black necked black head.





primum vitale virus attingere, animalcula ex ijs nascuntur.

*Defensibus* nullum est dubiū, Dormire & somnare apud Aristotelem habemus.

Apponebantur olim mensis : & probabantur maxime gravida. Nec nunc à culina exulant, quædam Polyporum genera si excipias. Succum falsum exiguum crudum copiosum habere scripsit Galenus. Flatus parere, elixataque probiora effici, quod humor noxius eluatur, Diphilus. Ova an aliquando in cibo fuerint, dubium.

\*\*\*\*\*

## TITULUS II

### De Mollibus in specie.

#### CAPUT I.

#### De Polypo.



ANTUM de Molluscis in genere sufficiat, iam in specie de iis agemus. Numerantur autem inter ea, Polypus, Sepia, Loligo, quibus Leporem marinum adijcimus.

*Polypus*, qui pro ratione Dialectorum, *πολύπους*, *πολύ* multus, *πούς* pedes, & *ποδός* vocatur, à multitudinis pedū, nomen sortitus est. Antiphyllus Byzantius in quodam Epigrammate *πολύπους* dixit. Lacones *ἀνέμους*, alij *ἄνους*, seu asinum marinum, in finem ætatis Græci Octapodia, seu Octapodos vocaverunt.

Descriptionem quod attinet, *Pentrem* tum figura tum tactu, cū Sepiis similem habere, stomachum nimirū sive gulam ab ore prælongam, quam ingluvijs excipit, tum ventrem coniungi, ac intestinum simplex ventri annexū, & usque ad exitum tendere, Aristoteles prodidit. *Cerebrum* in dissecto duplex conspici, citat ex Aristotele Athenæus, qui & *assamentum* eius subitissimum esse, & in vesica, quā *πέσωνα* vocant, quoque supra ventrē, auctoribus Eliano & Scholiaste in Aristophanē, sita est, contineri, scri-

bit, minusque huius quàm Sepiam, & quidē ad mutum habere, quod brachia habear coloreque muter, ubi amissum est, ac crescere, & nunquā eius copia defuit, Aristoteles addidit. *Caput* ei prædurum quam diu vivit, & quasi inflatum est. Alveus id in cæteris mollibus dicitur, quod brevior & rotundior conspiciatur. *Oculus*, supra duos pedes: *Osi* & dentes in pedum medio. *Pedes* habet ut reliqua octo-

nos membrana interiecta magnos, non solum ad natandum, sed & ad ambulandum utiles, quorum mediū quatuor habentur maximi, ut bina sæpe cubita superent, cum acetabulorum ordine duplici, quibus orbiculi ad movendū reliqui quatuor, duo c. 9. superne, totidem inferne, memini.

A quibusdam brachia, ab alijs, Crura, Cirri, à Plinio barbæ, vocantur. Acetabula Aristoteles *παρεσπόμενα*, alij *κατασπόμενα*, Antipylus Bizantius *ὀδόντες*, Antipater Thetallus *παρρηγίαι*, Ovidius flagella, dixere, *παρρηγίαι* à Hesychio & Vatinio dici, nonnulli credere, aliū id capiti tribuunt. *Dorsum*, Plinius partem lævem appellat, à qua acetabulorum ordo inchoatur. *Cervicē*, habet imbecillam, cum premittitur *Pinnulam* ipsi angustam, de medio ortam, quod parvum habeat alveum, quem pedibus suis dirigere possit, Aristoteles tribuit. Plinius ob eandem causam, habere negat. Tam esse exiguum, ut minimē aut vix conspici possit, experientia didicimus. *Fistula* ipsi in dorso, cava, quæ mare transmittit: eamque modo in dextram partem, modō in sinistram transfert.

*Rostrum* Plutarchi, si Scaligero & Belonio, fides. *Cuscu* nulla, quamvis Belonius pedes cute contegi reliquerit. *Caro* alba, cæavernosa, meatuumque plena, quod apud Galenum & Plutarchum legimus.

In mari Adriatico sunt frequentissimi: Thalus & Cania optimos, Corcyra magnos alit. In exterioribus Carteje locis ad talenti pondus accedere, Strabo scribit. In Ponto Euxino non teperiuntur magni, si Oppianum sequimur: circa Hellespontum nulli, quod hoc mare ad Boreā Oppianus spectans Halitus.

*Rostrum* Plutarchi, si Scaligero & Belonio, fides. *Cuscu* nulla, quamvis Belonius pedes cute contegi reliquerit. *Caro* alba, cæavernosa, meatuumque plena, quod apud Galenum & Plutarchum legimus.

In mari Adriatico sunt frequentissimi: Thalus & Cania optimos, Corcyra magnos alit. In exterioribus Carteje locis ad talenti pondus accedere, Strabo scribit. In Ponto Euxino non teperiuntur magni, si Oppianum sequimur: circa Hellespontum nulli, quod hoc mare ad Boreā Oppianus spectans Halitus.

*Rostrum* Plutarchi, si Scaligero & Belonio, fides. *Cuscu* nulla, quamvis Belonius pedes cute contegi reliquerit. *Caro* alba, cæavernosa, meatuumque plena, quod apud Galenum & Plutarchum legimus.

In mari Adriatico sunt frequentissimi: Thalus & Cania optimos, Corcyra magnos alit. In exterioribus Carteje locis ad talenti pondus accedere, Strabo scribit. In Ponto Euxino non teperiuntur magni, si Oppianum sequimur: circa Hellespontum nulli, quod hoc mare ad Boreā Oppianus spectans Halitus.

In mari Adriatico sunt frequentissimi: Thalus & Cania optimos, Corcyra magnos alit. In exterioribus Carteje locis ad talenti pondus accedere, Strabo scribit. In Ponto Euxino non teperiuntur magni, si Oppianum sequimur: circa Hellespontum nulli, quod hoc mare ad Boreā Oppianus spectans Halitus.

In mari Adriatico sunt frequentissimi: Thalus & Cania optimos, Corcyra magnos alit. In exterioribus Carteje locis ad talenti pondus accedere, Strabo scribit. In Ponto Euxino non teperiuntur magni, si Oppianum sequimur: circa Hellespontum nulli, quod hoc mare ad Boreā Oppianus spectans Halitus.

Vfin.  
Arist. H. A.  
L. 4. c. 14.  
Arist. de  
Gen. A. 1. c. 6.  
19.  
Galen. A. de  
ben. &  
mali succi  
cub.

TAB.  
L. I.  
Aldrov.  
Exangu.  
L. I. c. 2.

Nomen.

Descriptio.

Arist. de  
part. A. 2.  
c. 8.  
Athen.  
Dipnosoph.  
L. 7.  
Arist. de  
part. L. 4.  
c. 5.

Arist. H.  
A. 1. c. 37.

Athen.  
Dign. L. 7.

Arist. H.  
A. 1. c. 4. 1.

Arist. de  
part. L. 4.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.

Arist. H. A.  
L. 4. c. 9.



pisciculus exedantur, persacile quoque abstrahi à cubilibus. Ante id tempus, nihil

*Elan. H. tale.* Aelianus hoc Veneri adscribit, *A. l. 9. c. 30.* eui & Oppianus assentitur. Vivit a-

*Mosm.* Natant & pinnis & pedibus, & quidem obliqui. Pedes in eam pottingunt partem, quæ capitis nomine appellata est, ita, ut cum natant, in adversum prospiciant, & caput ex adverso habeant. Sub aquis, ita in solido ingrediuntur, ut humoris beneficio suspensi fluctuent. In sicco (in sicco exeunt asperum, & levitatem odore) eum cumbulario cum pulsus & tractu fiat, alrerum solum est in Polypi motu. Aerabulis enim iactis procul, ut, cuique applicuere id apprehensum tenent: tum brachiorum contractione corpus admovet, ita subvehunt se in eam partem cui adhaerent.

*Ingenium.* Ingenium & sagacitatem si spectes, mirum quidem Athenæus, & brurum Plinius vocat, quod ad homines adnaret, nec persequentem fugiat: est nihilominus calidus & solers. Nam primo, omnia in domum comportat, dein putamina erosa carne egerit, ad natantesq; ad ea pisciculos venatur. Idem Conchasartificiosè discuneat, & earundem carnibus vescitur. Non

*Arist. H. A. l. 9. c. 37.* sunt, inquit Plinius, praterunda & L. Lucullo Procons. Betica comperta de Polypio, qua Trebii Niger è Comitibus eius prodidit, avidissimos esse Concharum; illas ad tactum comprimi, pracidentes brachia eorum, utroque sciam ex pradante capere. Carens Concha visu, omnisque sensu alio, quam cibi & periculi. Insidiatur ergo Polypi apertis, impositoque lapillo extra Corpus, ne palpiatum ejiciatur, ita securi grassantur, extrahuntque carnes: alise contrahunt sed frustra, discuneata. Tanta solertia, animalium hebetissimis quoque est. Colorem eum mutare, sic pisciculis imponere, vulgare; in eo non convenit, quod Theognis, Phocyllides, Ion, perrar. duntaxat mentiti colorem scribingunt. Plinius verò & Antigonus ad similitudinem, ille loci, hic retum, quibus appropinquat, quod & de arena Sealiger innuisse videtur, eandem suscipere, prodant.

Causas huius rei diversi divetras assignant. Plutarchus id altu facere & quod corpus porosum & transparents habeat, ait. Alij, ut Theophrastus scribit, merui id assignant, ut cū hominis genæ, pro varia cordis concitatione, hoc vel illo colore tinguntur. Bellonius, ob mollem pellem, quæ facile deglubi potest, id fieri ctedit. Cuius colorem, nunc album (hunc assumere non posse, apud quosdam invenies) mox rufum, postea lividū, mox variis coloribus distinctum videas. Huc pertinet & illud quod apud Plinium extrat. Polypum hamos *Plin. H. N. l. c.* apperere, brachiisque completi, nō morfu, nec prius dimittere, quam escam circumtoserit, aut harundine levarum extra aquam: Monstro verò propiora sunt, quæ Trebii Niger, apud eundē prodidit. *Carteja*, inquit, *Plin. H. N. in Cetrarij prodire assuetus, exire in lacus l. 9. c. 30.* eorum à mari apertos, atque ibi salsamenta populari, convertit in se custodum, indignationem, assiduitate fortis immoedi. Sepes errant obiecta, sed has transcendebat per arborem, nec deprehendi potuit, nisi canum sagacitate: Hircudeuntem circumvafere noctu: Concitij custodes expavere novitatem. Primum omnium magnitudo inaudita erat, deinde color muria oblixi, odore diri. Quis ibi Polypum expectasset, aut ita cognosceret? cum monstro dimittere sibi videbantur. Namque & afflatu terribili canes agebat, nūc extremis crinibus flagellatos, nunc robustioribus brachiis elavarum modò incussos, ægreque multistridentibus confici potuit. Ostendere Lucullo caput eius dolij magnitudine, amphorarum quindecim capax, atque (utriusque Trebij verbis utar) barbas, quas vix utroque brachio amplecti esset, clavarū modo totos, longas pedū XXX. acetabulis sive caliculis urnalibus, pelvium modo: dentes magnitudini respondentēs. Reliquiz asservaræ, miraculo pepēdere pondo DCC. Quæ de alio, mercatorū res salsamenta; *Ælim. N. A. l. 13. c. 8.* Puteolis depopulare, dicuntur, *Athen.* apud Aelianum vide. *Dipnos. l. 4. v. 1.*

Quantum ad usum appositos olim menis, nullum dubium. In convivionu-

*Athen. Dipnos. l. 2. Plin. H. N. l. 9. c. 37.*



vio nuptiali Sphicratis, qui Cotys Regis Thracum filiam ducebat, erant centum. Mnesimachus in Hippotropho apud Athenarum, eisdem apparat. Apud Græcos, quoque cum

Athen.  
Dipnos. 9

Amidæum celebrarentur, ab amicis mittebantur. Duræ tamen sunt carnis, & ad concoquendum difficilis. Ideo ligno contunduntur, vel ad lapidem atteruntur, ut fibrosæ carnis durities frangatur. Caput suavissimi saporis esse perhibetur. Caro, si concoquatur, copiosum alimentum, sed succo crudo scatens, suggerit. Plinius muriam ex sese emittere, scribit, & ideo non debere in coquendo addi, & arundine secari: ferro enim infici, vitiumque naturæ, natura desinente. Elixi magis probantur quam assii. Philoxenus Dythiramborum Poeta, quod totum excepto capite devorasset, in egritudine incidit, & mortuus est. Idem Diogeni Cynico accidit, quod crudum † deglutivisset. In-

† Plin. l. 1.  
An aqua i-  
que melior.

venere & in Medicina locum. Polypotuso & apposito sisti sanguinem, scripsit Plinius. Myrepsus in clibano cū lignis oleæ eundem urit, donec in cinerem vertit, pulveris unciam, cum dimidia Chalcanti miscet, & naribus ad tollendum Polypum insufflat. Secundum Hippocratem, costii puerperii purgamenta purgant, bene ad concipiendum dantur, menses in vino albo suffocati, movent. Uteros molliunt, & in dislocatione eorundem bene præscribuntur. Ad Venerem stimulare, præter Diphilum, Æginetam, Dioclem, Alexis & Xenarchus apud Athenarum testantur. Iovius verò, sale inveteratos Venetias ex Dalmatia & Illyrico deportari, & à senibus acetabula & extremitates cirrorum, ad sobolem ptoctendam expecti, scribit. Causam Mnesitheus in flatuositatem, Iovius in salsedinem Aldrovandus, in seminis copiam, quam suppeditant, coniungit.

Antipathia.

† Plin. H. N. l. 9. c. 62.  
Ælian. H. N. l. 10. c. 38.  
† Plin. l. 6.

Inimicitias cum Locusta, Cammaro, Congro, & Muræna exercet. Locusta cum in tantum paver, † ut si juxta viderit, omnino moriatur, quod & Ælianus prodidit. A Congris † laceratur. Muræna eidem den-

tium firmitate brachia † abscindit. † Ælian. Cum apud Epidaurum easdem secaret Bellonius, ventriculos cirris Polyporum refertos comperit. Immobiles manere si quis rutam coniiciat, Ælianus auctor est.

Quantum ad Differentias & Genera, variant circa ea auctores. Apud

Athenarum ex Aristotele & Speusippo, Heledonem, Polypodinem, Bolyborynem, & Osmylem, species Polyporum invenies. Apud eundem Nau-

tili & Trepfichrotis fimentio. Arist. H. N. l. 4. c. 1.

Stotelis hæc sunt verba, ex Scaligeri interpretatione. Polyporum multa sunt genera. Unum genus est frequentissime

summa aqua natans, quod & maximum est. Horum litoris accola longe sunt maiores quam qui in alto degunt. Aliud genus parvorum, ij vario sunt calore, neque estantur. Item alia duo. Nam Ele-

ledonem peculiari crurum longitudine: tam, quia molluscorum sola singularibus tantum acetabulis præditæst. Cum bina alij habeant. Et quam alij vocant Bolyborynam, alij Olentiam. Postremo alij duo in conchis. Unus, à quibusdā & Nautilus & Nauticus, appellatur, ab alijs autem o-

rum Polypi. Ejus testa pectunculo similis est, eava: neque ei connexa natura. In prope terram pascitur sæpe numero: quare à fluctibus ejicitur in aridam, ubi elapsus de Concha, aut capitur, aut in humo perit. Hoc genus & pusillum est, & simile Bolyboryni. Alter in testa tanquam limax, ut ex ea nunquam exiit: sed interdum brachia exerit. Tantum Aristoteles: Quinque itaque Polyporum genera sunt, quorum duo in conchis hærent, tria, sine conchis conspiciuntur, inter quæ levem & exiguum moderni differentiam esse putant. Eleledone non tū in aridam, quod comprehendat, vel non tū in fluctibus, quod se seipsam rodit, dicitur, & eava, & o, & i, & a, & a, à gravi capitis odore nomen habet: Osmylus adeo bene olet, ut Gyllius, nihil moscosius se sensisse, etiam tum cum mortuus esset, scribat. Pollux tamen inter cirros & caput fistulam gerere, è qua tetrum emittit odorem, prodidit.

Bolyboryna, quo & Ceryn, Scaligero olentia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

entia, vel potius Putilia dicitur. Gyllius eam, ut & Nautilus, nomine

ab Ol-

ab Ofmylo duntaxat diffetere, scribit. Epicharmus apud Athenzum, mare olere ait. Non alit eam Euripus: in Laconia frequens est. Illa Menulas Sepiolaſque venatur. Ad venerem plus cæteris valet. Exſiccatur à quibuſdam, ut veſtibis fragrantiam in aquis conciliet.

Plin. H. N.  
l. 9. c. 30.

## CAPUT II.

## De Sepia.

TAB. I.  
2. 3. 7. 8.  
Nomen.

**S**epia, quæ Thebanis *Opistholia*, Arabibus *Sarathan* & *Sarthan* audit, Græcis ita dicitur, non quod ſepibus intercluſa facilius capiatur, ut ſlido- ro placer, nec quod profuſo atramēto ſe ſepiat, ne capiatur: ſed quod atramento, veluti putrida quadam ſanie, quam Græci *caridina* vocant, abundet.

Deſcri-  
ptio:

*Deſcriptionem* quod attinet, multas cum Polyſis, plurimas cum Loligine, communes habet, partes quasdam etiam proprias. Cum Polyſo convenit, quod pinnas exiguas habeat. Anguſtius eſſe, & per totum alveum circumductam apud Ariſto- telem legimus, ventrem tum ſigura tum tactu ſimilem. Cum Loliginibus, fortita eſt alveum corporis magnum, qui tamen Sepiæ latio- ri, Loligini longiori: crura ſ breviora; pedes ſupra dentes ſenos exiguos, eorumque noviſſimos duos infra, omniū maximos, promuſcides binas longas acerbulo parte extrema bino alpe- riuſculas, quibus veluti anchoris innituntur, ſequē tempeſtate urgen- te modo navigij ſtabiliunt, venan- tur, & prædam ori è longinquo admovent, pedes Plinius vocat. Vul- vam quoque articulatam habent, ut biſida cernatur, cum Polyſi rotun- dum conglobatumque uterum ha- beant. Proprium Sepiæ eſt præter fi- ſtulam inter caput & alveum promi- nentem, atramenti copia, & vel id- eò quàm cæteris maior, quod vitam littoralem traducat, & nihil aliud quo ſibi auxilietur habeat, cum Po-

lyſis & brachia, & mutatio coloris inſerviat. Continet hoc non ea quæ *muſca* vocant, quam Plutarchus veſi- culam collo dependentem facit, ſed infra ad alveum, qua inteſtinum pe- tere incipit ſuperiora, foramenque ſuum eadem obſolutum habet. Vo- catur hoc Galeno *διὰ τὴν ἀνιέναντα* & *ἐν τῇ φερίᾳ*, Nicandro *χολαί*, Aliano, *ἀνιέναντα*. ſat. Ariſtoteles noctu præfulgere ut quo- rundam piſcium capita, addit. Ha- bet & *Cirrus*, in dorſo, robuſtum & latum, inter ſpinam & os, mediam præ ſe fetens naturam, fungoſam in- tra ſe complectens & friabilem cor- pulentiam. Athenzus, & Dioſcori- des *ἐν γαστρί*, Columella teſtum vel re- ſtam vocavit. Exemptum id è Sepiæ dorſo, candidum eſt ſuperiori parte, durum ac læve: inferiore autem fun- goſa quadam medulla repletum, quæ & leviter aſpera, & ligni modo fre- quentibus venis diſtincta viſitur, Germani *Fiſchbein* vocant. Sæpè binum cubitorum magnitudine capiuntur.

In Ponto nullas *reperi* Sepias, Pli- nius author eſt. In ſeptentrionali O- ceano degere, cum ſint frigida & ex- angues, mirum. Major earundem in Gallia quam Italia copia, maior in Adriatico quam Tyrrheno mari. Ar- cheſtratus, eas quæ prope Abderas & Maroniam capiuntur, laudat. Littoralem tantum vitam vivere, apud Ariſtoelem, cavernas maris in- colere, apud Oppianum habemus. *Viſitas* piſciculis, ſæpe & mugile, quem longis promuſcidibus vena- tur, Aliquando & majores piſciculos vincit.

*Generatio* ſic peſcificur. Coeunt corpora inter ſe amplexæ, adaptan- teſque mutuo ex adverſonarem (*μυ- κτίζα*) & brachia, quod ote coire & lingua Plinius falſo dixit. Vere uterum ſcæmina gerit, contrinet partum diebus quindecim: Ova ſtatim can- dida ſpecie grandinis: magnitudine myrtillo- rum grandiuſculorum. Edi- tis ſuperinfundit de ſuo atramento. Itaque & nigra fiunt: & quaſi glutino hæreſcunt inter ſe ad racemuli ſi- guram. Mas quoque genituram ſuam effuſit.

Locus.

Albion. l. 2.  
c. 4.

Ariſt. de  
part. l. 4.

Viſitas.  
Ariſt. H. N.  
l. 9. c. 37. &  
l. 8. c. 2.

Genera-  
tio.  
Plin. H. N.  
l. 9. c. 31.

Ariſt. H. N.  
l. 15. c. 17.  
Scal. edit.

Ariſt. de  
part.  
Anim. l. 1.  
4. c. 8.

† Ariſt. H.  
A. l. 4. c. 1.

Ariſt. de  
part.  
Anim. l. 4.  
c. 9.

Plin. H. N.  
l. 9. c. 28.  
Ariſt. de  
gen. c. 8.

effundit, qua illa & nigriora & duriora sunt, atque augescunt usque ad acini magnitudinem: Ex candida fit Sepiola, exitque die quinto decimo cute obrupta, exitque in caput & ventre annexo, ut aves. Quanquam nexus ille umbilici nondum satis constat. Crescenre itaque Sepia, decrescit albumen, ut in avium ovium vitellus, ac tandem deficit: Oculi Sepiolarum ut in cæteris quoque animalibus grandissimi. Perfecta iam Sepia cum est egressura, se membrana secare occipit. Sepiola perterrita & sterces edit, & rubescit. Parit verò juxta terram inter arundines & sicubi enata alga, aut aliud quiddam è mari ejectum, ut materia samentorum aut lapides. Bimatum non completere Aristoteles prodidit.

Arist. L. 6.  
Plin. H. N.  
L. 9. c. 31.  
Arist. L. 6.

**Sexus.** Sexus dignoscuntur faciliè. Mares prona sui parte nigriores sunt, partes omnes asperiores habent, & lineis intervenientibus variis, caudam etiam acutior. Femina intestina continet duo veluti mammas, quæ alvo dissecta facillime conspiciuntur.

**Ingeniū.** Ad Ingenium pertinet, quod percussæ tridente femina auxiliatur mas: at femina isto mare fugit: quod soli suo utitur atramento, non solum cum metuit, sed & abscondendi causa: quod ambo ubi sensere se apprehendi, effuso eodem, quod pro sanguine his est, infusata aqua abscondantur: quod à collo acetabulum instar funiculi, quo hamus dependet, dimittit, & pisciculis mordendum exhibet, eodemque retracto prædā ad se adducit: quod denique tempestate urgente, propriis scopulis devincta flagellis hæret, & nativos dura connectit caute rudentes.

Plin. L. 6.  
Elian. H.  
A. L. 1. c. 34.  
Philes in  
Lambu.

Oppian.  
Halieut.  
L. 2.

**Vfus.** Habent ut olim ita & nunc in Ciliis locum. Nam & cum Amphidromia celebrabantur, mœnas cum Sepis mollire, & plurimos curros diligenter stringere solebant, & in Ipsicratibus nuptiis, assarum fit mentio. Optimæ putantur gravidæ, mensibus imprimis Ianuario, Februario, & Martio. Elixantur magna ex parte, assis-


que præferuntur. Majores sale conservantur in Illyride, indeque Venetias deferuntur, ut & Genua Mediolanum. Ad Venerē ciendam quiddam cum nucibus adhibent. Ova in siccū ejecta, nonnulli in sartagine coquunt. Sethi difficulter concoqui, parumque in se continere succi, scripsit. Est & in Medicina earum usus. Ad dentium dolorem, cum ovorum putaminibus & oleo misceat Galenus. Hippocrates in morbis mulierum sæpissimè præscribit. Celsus & Dioscorides atramentum alvum emollire prodit. Ova urinā movent teste Plinio. Marcellus ad tincturas & maculas corporis abolendas ex ipsius remediū facit. Dentifriciis aptissimum est os Sepis: quod & eboracis vitis cum aqua porum prodesse Gesnerus scribit.

**De Differentiis** nihil occurrit. Rō. Differentius deletius pisciculum hunc, quem ita tæ. descripsit, Sepiolam vocavit. Sepiæ, inquit, nascenri similis est, pollicis crassi magnitudinem non superat: octo pediculis constat: duas proboscides habet, nec sepium in dorso, nec gladiolum habet: utrique lateri pinna, veluti ala parva affixa est, rotunda, nec figura, nec situ pinnis Sepiarū & Loliginum similis, &c. Colore est vario, parvulus enim punctis in dorso notatur. Ore, oculis, fistula, partibus internis à Sepia non differt. Carne est molliore.

### CAPUT III.

#### De Loligine majore & minore.

**L**oligo major 713. Græcis, Gazæ Tab. L. Lolium, Gallis Calamar, à thecæ 4-5 scriptoris similitudine, sive quod in Nomen. ea reperiuntur, quæ ad scribendum necessaria sunt, dicitur. Minorem 714. vocare. Quænam cum Polypto & Sepia communia habeant, capite de Sepia explicatum est: hoc solum addimus, Loliginum promusci-des, Ligulas vocari Apulejo: id vero Apul. Apol. quod durum ac solidum intus per i. corpo-



*Lobster marina*



*Adiant marina*

Sir Krebs



*Adiant marina*

Sir Krebs



*Adiant marina*



*Adiant marina*

Sir Krebs

*Adiant marina*



*Adiant marina*





corporis prona continetur, *ξίφος*, seu gladiolum dici. Differunt à *Scopia*, quod alveum, quem *Aristoteles* *κοιλία*, *Athenzus* *ζυμώτης* vocat, longiorem habeat: & bina quidem conceptacula gerat, quæ ventris ferunt speciem: sed alterum minus ingluvies imitetur & tactu disceperet, quoniam & *Corpus* totum carne molliore constat. Quin & præter atramentum, quod prope murum habet, gerit & succum purpurascens, *οὐχίον* *Athenzus* vocat, *Oppianus* *στεινόν*, *Gladiolus* autem, quem *Athenzus* *στέφανος* dixit, cartilagineus est, pellucidus, & ab uno parte cultrum, ab altera calamus referens.

Oppian.  
Hal. 3.

*Aldrov. de*  
*Mal. lib. 1.*  
*1. c. 6.*  
*Descrip-*  
*tion.*  
*Bellon. de*  
*Presch. 1. 2.*

Aldrovandus crystalli instar splē-  
 didum depinxit. Peculiarum *descrip-*  
*tionem* si attendas, Teuthos, delcri-  
 bente Bellonio ipsa quidem Loligine  
 major est, ut cubitorum interdu-  
 m quinque esse, inquit Aristoteles. Ex-  
 teriore quoque corporis nota aliqua-  
 rum ad Loligine discernitur. Pars e-  
 nim Lolii, quæ exit in acurum, in Lo-  
 liginē latior est. Quin etiam pinnae  
 totum Lolium ambiunt, junctæ per-  
 peræque, quæ alioquin in Loligine  
 partem aliquam relinquunt. Minus  
 autem accedit ac Polypū quā Sē-  
 pia. Nam corpus ei oblongū est, car-  
 tilagineū, duabus pellibus obductū;  
 gladium arctior ē & magis cartilaginō-  
 ium in tergore continens, translu-  
 cidum vitri modo, tenui theca inclu-  
 sum: rostrum aquilinum, plicatæ fi-  
 gura. Sed eodem modo *astracamentum*  
 quod Sēpia emittit, & cirros octonos  
 habet, breves tamen: in quibus tot  
*acetabula* conspicies quot in Sēpiis. Ac  
 præter illos octonos duo quoque lon-  
 ga flagella, seu promuscidæ, multis  
 in extremo acetabulis circumfessa  
 videbis. Hæc acetabula præter  
 Sēpiarum & Polyporum morem,  
 tribus introforum orificiis aculeis robus-  
 tis, in gyrum munita sunt. Latas in  
 gyrum diffundit pinnas: a cuius ore  
 corneogula prætenditur angusta, &  
 usque ad stomachum longa, quem  
 habet amplissimum, atque adeo in-  
 gluvium, quæ hunc præcedit. *Loligi-*  
*niæ minoris* descriptionem, quæ ferè

nihil ab ista differt, vide apud eundem.

*Reperiuntur in profundo mari, etiam propè Eubœam, quin & in Ponto, in quo nulla Sepia. In nostro mari, inquit Plinius, quindm cubito- rum capiuntur. Piffidus pifcidus: nec à Cancris Paguris & Aftacis ab- stinent; diligenterque, quoequid in stomachum dimiserint, rostro, quod robustissimum habent atterunt.*

De *Coisulidemin* *Loliginibus* occurrunt, quod in *Sepiis* di-  
cimus. Pariunt in alto, & conferta ova edunt.  
Apparēt hęc gemina, quod vulva ca-  
pitula articulata sit, ut bifida cerna-  
tur. Neque his bimatu † longior vi-  
ta. Mas à femina differt, quod intus  
meatus duos habeat, quibus mas ca-  
cer, sicuti in *Sepis* e- enit. Non tan-  
tum suis pinaculis natant, † sed eti-  
am iisdem extra aquam se effe-  
rentes volitant: & spē tanta multitudine, ut,  
quod ex *Trebio Nigro* *Plinius* prodi-  
dit, navigia quoque demergant. Dum  
volitant tempestatem prænunciant,  
quod caro ipsarum nuda & glabra,  
grigoris quoque sit impatiens, ut *Plu-  
tarchus* prodidit.

*Vfus Loliginum ut olim in Cibis Vfus.*  
fuit, fic nunc eit. In cœna lauta ap-  
pofitos Pherecrates apud Athen-  
zum testatur: Scholiaſtes Ariſtopha-  
nis, & Suidas inter viles reponunt.  
Præferuntur gravidæ, & quas Am-  
bracia dedit, Romæ menſibus frigi-  
dis laudantur. Et aſſarum, & in ſarta-  
gine coctarum, Athenæus meminit.  
Antiphanes ſarctæ delectatur. De-  
terius jus ſine atramento confici o-  
pinantur. Quomodo ſapidiores  
reddantur, vide Aldrovandum. In  
*Medicina*, ſtomachicis convenire in  
cibo apud Galenum legimus. Tor-  
minofis aſſarum prodeſſe Ma-  
cellus Empiricus pro-  
didit.

Galen, de  
Comp. fac.  
gen. l. 1.

## CAPUT IV.

## De Lepore marino.

T. A. I. 6.  
Nomen.

**L**epus marinus, Græcis λεγώς & λεγώς ὁ θαλάσσιος, à colore leporis terestris, quem ἰππίσιος vocant, nomen sortitus est. Monspelienses ebrum vocant, quòd vivus colore ex rubro nigricante sit, quali plerūque ebrui conspiciuntur. Mortuus ex fusco albicat.

Descriptio.

Alia, H.  
A. I. 2. 4. 5  
Apulej. in  
Apo loget.

Variè à veteribus describitur, quicummodò offæ informis, ut Plinius, modò cochleæ testa exemptæ ut Ælianus; modò Lollyini parvè, carnem si respicias, ut Dioscorides: asimilarunt. Apulejus cætera exossem, duodecim tamen numero ossa ad similitudinem talorum suillorū connexa & catenata gerere, reliquit.

Differen-  
tia.

Rondeletius tria genera descripsit. *Primum* genus maximè lethale est, cochleæ nudæ admodū simile, maxime posteriore corporis parte. Os habet in dorso veluti Sepia, volutæ instar contortum, qua parte caudam spectat; in lateribus Sepiarum modò pinnas habet alveum ambientes replicatas: mox cornicula duo carnosa, qualia sunt in cochleis, altera tantum capitis parte Zygenæ caput imitatur: altera parte foramen est, per quod carnosam quandam substantiam exerit, quam etiam pro atbitrio retahit. In harum duarū partium mediocrima est pro ore, *atramentosa* & reliquis partibus internis loli-ginem refert. Idque in hoc genere est mirabile, quòd cum in omnibus animantibus partes sinistræ dextris similes sint, in hoc sint valdè dissimiles, idèò ossa informis meritò dicitur. Odore est Pisculentò tetroque. *Alterum* genus superiorem est maius, partibusque & aliis superiori simile, sed parte priore duas laryas appendices carnosas habet, in quarum medio rima est. Paulò infra cornicula duo, qualia in superiore descripta sunt, nisi quod acutiora & breviora sunt. In dorso os nullum, neque posterior pars, cochleæ exenteratæ similis est. *Tertium* posterioris partis utroque la-

tere, veluti in Sepia pinnæ sunt magis replicatæ & expansæ. *Tertii generis* prona & supina pars exhibetur. Quod in partis supinæ medio conspici-tur, est os: Supraposita ori pars alveus, qualis in Sepis, ovi figura, sed in ambitu crenatus. Ori subiecta pars membrana est tenuis, carnosa, magis ex papsa in rotundum, cuius ora simbrata est, simbræ nigræ sunt. Intrus cerebri nigri parum est, gulam excipit ventriculus, ex quo oritur intestinum instar capreolorum vitis convolutum. In medio substantia quædam est fungosa, succum fuscum continens, fortassis pinnarum cum atramento suo. Toto corpore est splendido: Crystallum vel pituitam concretam cum elatamque dixeris. Odore est ingrato & pisculento nausæumque movet. Hoc genus Bellonius pro communi lepore descripsisse videtur. Fulvum inquit leporis terrestris colorem imitatur. Pulmonis marini more per mare divagatur, tamen si pinnis careat. Pellucidū habet corp⁹ ovi asnerini magnitudinē non excedēs, q̃ pro lubidine huc & illuc trāsferit. Septē habet appendices innumeris promuscidibus stipatas ex Indico in cyaneum vergentes, quibus sugendo corpori alimentum suggerit: appendicum autem substantia fungosa est. Ex aqua emergens naturam suam emittit, & in seipsum concidit. Linguam demorsus vellicat utari radix, paulò tamen remissius, &c.

Addit Ælianus & *Indicum*, quod Ælian. H. ex omni parte ad terreni lepotis similitudinem accedit, præter pilos, qui 19<sup>o</sup> spinosi & erecti. Tertium illud genus in alto mari degit, idèòque rarissimè capitur. Primum in stagnis marinis lutulentis, & alga limoque vescitur. Frequentes inter cycladas insulas occurrere Bellonius prodidit. Dari in hoc genere marem & feminam apud Plinium habemus. Cum ad Rondeletium delatus esset qui lingua carnosa caretet & ore in dorso, marem esse iudicavit, primo loco descriptam feminam, quod in ea Polyporū ovis simile quid sepeant: tux-  
Adhi-

Plin. H. 2.  
L. 12. 2.

Ufus.  
Galen. l. 11.  
de sympt.

*Adhibitus est in Medicina olim.* Galenus & Plinius inter Philothra referunt. Archigenes ad xylophas lanæ tomentum sanguine lepotis marini tinctum indit. Iubent quidam & lepote marino recenti podagram fricari, prodente Plinio. *Venenatum* esse certissimum est, cum inprimis qui in Indico mari. Eo Titus à fratre Domitiano sublatus est, & Plinius ait. Non sunt minus nūta quæ de lepote marino traduntur. Venenum est aliis in potu aut cibodatus, aliis etiam visu. Hi quidem gravidæ si aspexerint formidant duntaxat ex eo genere, statim nausea & redundatione vitium fatentur, ac deinde abortum faciunt. Remedio est mas induratus sale, uti u brachialibus habeant: eadem res in mari & tactu quidem nocet. Alibi tamen, mortem sæpè inferre, & si nihil aliud ventrem doloribus acerbissimis torquere scribit: quod & Aelianus prodidit. Quæ de mulieribus dicta sunt, à Rondeletio experto confirmantur, sed remedii non meminit. Symptomata quæ insequi solent, egregiè vetustissimus Poëta descripsit

Plin. H. N.  
l. 2, c. 1.

Aelian. H.  
A. l. 2, c. 24.

Nicand. in  
Alexiphar.

*Possit bibitum hoc virus viridius flagrantia fellis  
Excrementa manent, tenebrosa lumina visu,  
Caligant, liquida abeunt in corpore carnes:  
Nausea adest, tumet alta cutis, talisq;  
calefcunt:  
Subque carui oculis roseo fucata rubore  
Apparet facies, sistensque urina moratur,  
Qua nunc purpureo nunc sanguineo esse colore  
Cernitur, & quemcumq; videt consemnere piscem  
Assuet averfians, ut qualibet aquorū ager.*

Hinc patet vix pulmoni propriè intestum, cum rot affectus sumpto eo oboriantur. Fatendum tamen plerumque tabem invadere. Alexipharmacorum quæ contra adhibentur haud paucus est numerus. Exhibetur primo helleborus niger, hinc lac asini

inum inprimis: nec non decoctum malvæ, & alia de quibus Aldrovandum vide. Rondeletius mulieri quæ nauseam ex odore conceperat, cantharorum usum præscripsit.

Aldrov. de  
Moll. c. 11.



## HISTORIÆ NATURALIS

### De Exanguibz Aqueis.

#### LIBER II.

#### De Crustatis.

#### TITVLVS I.

#### De Crustatis in genere.



*Vx Crustata* Plinio, illa Latinis aliis Crustacea, quod molli crusta operata sunt, Græcis παραστρεγγα, eandem ob causam dicuntur. Medium inter Testacea & Mollusca sortita locum videntur. Nam quatenus fortis crusta, etiam fragili & tenui obteguntur, cum testaceis conveniunt; quatenus molle catnosumque intus continent, Mollibus comparantur.

Plin. H. N.  
l. 11, c. 34.  
Nomen.

Ossibus carent, quod ossa juncturis Deseri indigerent, ut Cardanus scribit, nec potest sub crusta extendi possent. Communes ipsis cum cæteris exangnibus partes, Caput, Alveus, Gula, venter, & intestinum. *Alveum* totius corporis indiscrētus est: nec caput distinctum, nec aliud quicquam. Ideo ea Galenus capite truncare voluit: quod cave de Caudatis accipias, hæc ista dicuntur, non tam quod magnum caput habeant; exiguum enim hoc: quam quod maximum inter cætera crustata. Et videtur Athenæus apud quem ista leguntur, & catachresticè pro thorace & capite sumere. In Capite or est quod protinus ventrem in omnibus, præterquam in Locustis excipit, mox à ventre intestinum. Exiguus is, si proportionis in

Plin. H. N.  
l. 11, c. 34.  
Nomen.

Aristot. H.  
A. l. 4, c. 3.

Athen. Di.  
p. 13.

Arist. H. A.  
l. 4, c. 3.



corporum magnitudine ratio habeatur hoc, simplex usque ad exitum excrementi deiecitur. *Dentes* in ore habent duos priores, & quia hi ad exactam ciborum contritionem non satis, quoad intima coram oris penetrare queant, tres in ventriculo, aliternus singulos, inferius tertium. Longi qui in ore & tegmine duplici operiti, inter quæ talia quædam interiacent qualia locustarum dentibus annecti suo loco dicemus. Intra hos binos dentes carnosum est illud, quod linguz proportionem eiusque effigiem gerit. Supra os *Oculus* situs est, uque duri omnibus, apti intro, foras, & in obliquum & quidem celeriter moveti, ideò palpebris carent: *Cardanus* in latus moveri ait nostri comparatione, directè autem oculorum suorum. Melius enim esse ut altero utrinque prospiciant et si diversis oculis, quam utroque simul nec ante nec post. Prominere autem quia à lateribus: quia aliter ante penitus prospicerent: à lateribus autem collocari, quia si supra caput non viderent, ante verò non poterant, quia os infra reponere necessarium fuisset, quia caput habent immobile: neque ante simul os & oculos esse, quoniam oportuisset esse latam faciem, unde in motu etiam tardiores evasisent. *Caput* etsi exiguum, appendicibus tamen & cornibus munitur, quæ & ad pugnandum & ad prætendendum inter data sunt. *Pedes* omnibus octoni, omnes in obliquum flexi. *Brachia* forcipibus denticulata sunt bina, quæ Græci *χελαι*, Apuleius furcas, alii nomine Græco servato Chelas nominant. Horum pars superior in primoribus his, ut loquitur Plinius, movetur superiore immobili: hisque pro minibus utuntur, & contra quam pedes flectant. Omnibus magna ex parte grandior & validior dexter quàm laevus *forceps* est. *Caro* colore sanguinis rubra & tactu lento. In alveo humor est pallidus, & minuta quædam oblonga & albida, ruffa etiam alia maculis dispersis. *Papaver* eis parcius, brachior. annexus communis. *Tabellæ* quidam Latini vo-

Plin. H.N.  
l.12. c. 37.

Arist. H.A.  
l.4. c. 2.

Carden.  
parit. l. 37

Plin. H.N.  
l.9. c. 31.

Arist. H.A.  
l.4. c. 2.

cant quas *μαλακ* Aristoteles, quibus cor crustæ coagmentantur. *Lapides* sub crusta genitos refert Cardanus, de quibus in Cancris agemus.

In stagnis potius marinis & juxta Locos amnium ostia, saxorum foraminibus & limosis locis morari ex Aristotele & Arhenzobabemus. Lapillis, alga, limo & stercore videntur: nec à carnibus abhorrent. *Coeunt* more eorum quæ in aversum mingunt, ineunte vere, & cum ficus maturescunt, propè terram, & quidè quod exanguia sint & naturæ frigida, diutissimè. *Fœmina* ovum rubidum, membrana præcui obvolutum, ventri, lateri, & utrique intestino annexum, & ad carnem usque adherens parit. Imperfectum illud, quod foris editum, incrementum capit. *Diversitas Sexuum* ex nonnullis cognoscitur. Maior & crassior mas, tenues genitales meatus habet, & primum pedem simplicem. Nec non duabus particulis candidis, quas in carne pectoris habet, sed à forina discretas tum colore tum concretionem similes Sepiatum promiscidi. Vorticose hæ sunt, quem Græci *μύκανα*, id est, papaver vocant. Oriuntur ex ab acetabulis, quæ sub extremis sunt pedibus. *Fœminæ* operculum distantius, hirsutius, & opacius: vulvæ membranæ & intestinum hinc atque inde fissæ, in quibus ovum gignitur; primus pes duplex, & cauda latior.

Longæ *vita* esse scripsit Plinius, *Plin. H.N.* Nulla *respirant*, sed aquam per fistulam egerendo refrigerantur. *Vita.* Humorem ore accipiunt, & meatu oris superiore emittunt. Hebes omnibus *visus*, tum quod oculos habeant duriores & promittentes, tum quod à latere positos. Valent *gustus* & *odoratus*, & ad morem aquatillum dormiunt. Nullum sonum vel vocem emittunt, & obliquo motu incedunt, caudam tantum narant.

Ad *Naturam* & *Mores* pertinet, *Mores.* quod hyberno solum tempore conduntur, vere & autumno pinguescunt, quod autem annis potius & cornibus quàm chelis quibus tamen magis valent

Aristot. de Gener. l. 3. c. 17. & Athen. Dipsosaph. l. 3. Generatio. Arist. de Gener. l. 1. c. 11. & l. 4. Arist. H.A. l. 4. c. 2. Arist. H.A. l. 4. c. ult. Plin. H.N. l. 9. c. 31. Sexus.

Plin. H.N. l. 9. c. 31. Vita.

Arist. H.A. l. 4. c. 10.

Plin. H.N. l. 8. c. 1. lent

*Arifl. H. A. l. 5. c. 17. l. 8. c. 17. Vfus. Plin. H. N. l. 9. c. 37. Arben. Di. prof. l. 3. Lem. de Oc. cult. N. a. tur. l. 3.*

lent inter fe depugnant, iftis cum aliis, quod denique vere & autumnopoft partum operculum exuant.

*In Cibo* laudantur plenilunio, quia fydus tepido fulgore mitificat tempore verno & autumnali, & cum uterum gerunt. Grati funt faporis, fed duræ carnis, idè coctionis arduæ. In *Medicina*, ad canis rabidi morfum, tabem, & fervidorum humorum deufionem conferre, Lemnius tradidit.

\*\*\*\*\*

## TITULUS II

### De Crustatis in specie.

#### CAPVT I.

#### De Crustatis caudatis.

#### ARTICVLVS I.

#### De Locusta.

**TAB. II. I.**  
**Nomen.**

**C**RUSTATA in Caudata & Rotunda Coprimè dividemus. Illa funt, *Locusta, Aftacus & Squilla*. *Locustam* Ifidorus, à pedum longitudine dici putat. Græcis est *καρχήδον*, *αἰχμή τῆς καρχήδονος*, quodd capite incedat, vel eo fit multum prominente, *καρχήδον* apud Trallianum, Helychio & Varino *αἰχμή* à caudæ motu, *καρχήδον* & *καρχήδον*. Ab aliquibus *καρχήδον*, ab aculeis, *αἰχμή* τῆς *καρχήδονος* id est, ad scribendum & sculpendum idoneis. Aristophanis scholiastes *καρχήδον* τῆς *αἰχμῆς* *καρχήδονος* exponit. Hirto asperoque funt corpore.

**Descriptio.**

Duo eis ante oculos cornua magna, initio aspera & aculeata, deinde rotunditate præpilata, (circa Oppianus & Elianus, Aristoteles *καρχήδον*, nos antennis vocamus) in exortu crassissima, quæ paulatim magis ac magis ita gracilefcunt, ut tandem in tenuissimum cirrum desinant, in omnemque partem pili instar flecti possint. *Oculi* cornei semper prominentes, & exerti, in obliquum mobiles, aculeis acutissimis firmisissimisque utrinque tanquam propugnaculis

muniantur. Oris lateribus additz appendiculæ tanquam parvi pedes ad tutelam. *Dorsum* asperissimum est & aculeatum, velut è fronte aculeus magnus emerit. In lateribus *brachias* habet veluti è pilis coagmentatas, *pedes* utrinque quinos annumeratis extremis chelis, quas Gaza modò forcipes denticulatos, modo brachia forcipara interpretatus est: flectunt eos in obliquum, ut chelas interorsum. *Cauda* lævis & sine aculeis ex quinque tabellis contexta, in pinnas quinque desinens, natandi causa, ei tanquam remoinnuitur, & in ea totius corporis robur situm est, quod experietis si ea parte *Locustam* apprehendas. *Dentes* habent primores binos maiusculos & *gulam* ante ventrem exiguam, in quononnulli dentes, & similis muti humor. *Coxæ* nigro rufescere observavit Bellonius. Mare cum excipiunt ore, transmittunt id ad suas branchias, quarum plures quàm alia crusta inretracta obtinent. Præterea *meatus* pectoris dependet usque ad exitum excrementis: pro vulva foeminis est: genitale verò semen continet in manibus. Iacet autem in concavo carnis, ita ut interiaceat caro. Nam intestinum ad partem curvam situm est, meatus ille ad cavam: non alio modo quam in quadrupedibus continetur. Neque verò id alia specie est in masculo & foemella, sed utrisque & tenues & candidi, ac pallidum continent humorem. Et utrisque eadem origo à pectore. Quem Aldrovandus appinxit dorsum habebat inter atrum & cæruleum medium, dentem superiotem triplo maiorem inferiore. Vterque intus tuberculis caret, & utrinque est acutus.

*Reperiuntur* in mari, circa Sigæon Locust. inprimis Athon & Ligustico. In Indico quatuor sunt cubitorum. Hyeme *Plin. H. N. l. 9. c. 1.* verò aprica littora sestantur, æstate in opaca gurgitum recedunt, petrosissq; locis vivunt. In Ligustico nigricantes Pietius Valerianus conspexit. *Arifl. H. A. l. 5. c. 17.*

*Videntur* ipsis pisciculi, quos circa cubilia capiunt, & captos ori forcipe suo admovent. Murzænas & congras maiores devotare, & cibos ore terere, quod

*bellon. A.  
quatil. l. 2.*

*c. 3.  
Genera-  
tio.*

*Aryst. H. A.  
l. 5. c. 17.*

re, quod oris constitutio & gulæ angustia ostendit, observavit Bellonius.

*Vita* omnib. diuturnior. De *Generatio-  
ne* ita Aristoteles. In genere crustato-  
rum locusta post coitum impletur, &

continet ova circiter menses tres, Maio, Iunio Quintili. Deinde edit ea

sub ventre ad plicaturas: ubi crescūt, quomodo solent vermiculi. Id quod

commune est & molluscis & piscibus oviparis, ut omnium ova crescant.

Locustarum igitur ovum est solutile in arenæ modum, octo in

classes partitum: pro numero scilicet cooperulorum, quæ lateri ad-  
hærent. Quorum singulis cartilagi-  
neum quiddam adlitum est: circum

quod hærent cumalata specie rami: unum quodque enim horum cartila-  
gineorum in plura scinditur. Quod

deprehendas, si diducas: si aliter in-  
tuere, unum corpus concretum putes.

Grandissimum quodque non est ad foramen, sed ad medium: pos-  
trema autem minima. Minimis ma-  
gnitudo quanta fici granulo. Neque

continuo ipsi mearui hærent, sed me-  
dio. A cauda namque ad pectus, duo, singula utrinque sunt potissi-  
mum intervalla. Sic enim etiam co-  
opercula ipsa disposita sunt, ut à late-  
re tegere non possint. Quare extre-  
mitatibus suis imposita cooperculi  
modo contegunt omnia. Videtur  
autem parturiens producere ova ip-  
sa ad illa cartilaginea caudæ ap-  
plicatu. Comprimens enim sese  
atque statim curvans parit. Cartila-  
ginea hoc tempore augescunt ita, ut  
ovorum ipsorum capacia esse possint.  
Nam ad cartilaginea pariunt sicut  
Sepiæ ad malleolos, aut alia quæ flui-  
tant. Is est pariendi modus. Conco-  
quit autem ibidem potissimum vice-  
nis diebus. Tum abiecit cuncta simul  
consistentia sicur cum eiecit, viden-  
tur: inde ex his locustæ oriuntur die  
ferè quinto decimo: capiunturque  
sepè numero minores digito. Ante

*Aryst. H.  
A. l. 4. c. 2.  
Sexus.*

*Sexus* differentia in eo consistit, quod femina primus pes bipartitus sit, mari continuatus uno ungue.

Femina quoque pinnulas quæ sub-  
tus sunt magnas habet, sed collum  
versus decrescens. Mas omnes  
æque minores. Maris etiam pedibus  
postremis quasi calcaria quædam  
sunt: eaque tum magna, tum acuta,

feminae eiusmodi pars parva & in-  
offensa. Rondeletius addit in caudæ  
supina parte femina habere ap-  
pendices duplicis pinnis similes, ad  
contegenda & conservanda ova;

mari simplices & parvas. Vulvam  
bifurcatam habere, Aristoteles tes-  
tis est.

*Aryst. de  
Gener. l. 2.  
c. 8.*

De *Natu*, pedes anteriores, in eo  
qui maiores sunt moveri Bellonius  
negat, sed pinnulis quas partim sub  
cauda gerit, partim in extremo e-  
iusdem, tum quærennis reliquis pe-  
dibus natæ asserit. Cum nullius  
rei metu afficitur anteverfus progre-  
ditur non præteris sed obliquatis  
ad larera cornibus, ne aqua contra  
natantem ruens reprimat cornua, &  
ulterius progredi prohibeat. Retro-  
cedens in metu, demittit & laxat ead-  
em, & tanquam remis altius de-  
missis Scapham propellens, multum  
itineris conficit. Latent menibus

*Morus,  
bellon. A.  
quatil. l. 2.*

*Ellen. H.  
A. l. 9. c. 25.*

Pin. H. N. l. 9. c. 30.  
quinis, & more arietum cornibus  
dimicant. Lædi non posse nisi sub  
cauda tradit Rondeletius. *Antipathia*  
si atrendas, tantum Polypum paver,  
ut si juxta viderit omnino moriatur.  
Murznam eadem aggreditur, & ex  
victa prandium instituit.

*Pin. H. N.  
l. 9. c. 30.  
Antipathia,  
Pin. H. N.  
l. 9. c. 30.*

*Vsum in Cibi* species, Collime-  
don idè Carabi accepit nomen q  
hoc cibi genere impensè delectaretur.  
Eleguntur gravidæ & tempore  
plenilunii. Præteruntur in Italia ab  
Octobri usque ad Aprilem: præ-  
feruntur & maximæ, quales capiun-  
tur in mari Indico, & circa Africæ  
quoddam littus loco petroso, ut scri-  
bit Synesius. Plus carnis habent  
quàm Cancræ, ut Diphilo Siphinio  
apud Athenzum visum, difficulter  
concoquuntur, sed admodum nu-  
triu salis humoris sicciq; participes,  
& si aqua dulci sæpius coquantur,  
ventrem cohibent. Condituras vide  
apud Aldrovandum. *Vsum in Medicina*  
q spectat, Hippocrates puerperæ ut  
melius

*Ufus.*

Hippoc. l.  
de morb.  
mulier.

melius purgetur præscribit. Simeon Sethi testas combustas ac cum mero vino potas renes calculosos expurgare scribit.

## ARTIUVLVS II.

## De Astaco.

## PUNCTUM I.

## De Astaco marino communi.

T A B. II.  
2.  
Nomen.

**A**stacus ex sententia Rondeletii, quali *sericita*, id est, non destitutus sed abunde fluens dicitur, quod tubercula plurima, tum alba tum purpurea guttarum, sive lachrymarum specie foricibus inspersa habeant.

Descriptio.

Aristot.  
H. A. l. 4.  
c. 2.

Est vel Marinus vel Fluvialis. Ad eum Leo seu Elephas Plinii, & ista quem hic descripturi sumus pertinet. Est autem Astacus colore rotundus, sed nigritia inspersus. Pedes inferiores grandes, ad octo usque habet: ab his grandes spicos duos multo majores & mucrone latiore, quam locusta, sed specie diversa. Dextri namque summum latum oblongum tenue est: sinistri crallum & teres: utriusque verò bipartitum ac quasi mandibula cum dentibus infra supraque. Quanquam dextro dentes serrati sunt omnes, alterius primores serrati: at interiores tanquam molares. Inferiorum ordo quaternis æqualibus, superiorum ternis inæqualibus expletur. Movent partem superiorem utrique, & ad inferiorem premunt: ac valgi quidem sunt sicut inferiorem, tanquam à natura destituti ad protendendum & premendum. Supra hoc duo alii hispidi paulo infra. Mox haud longè infra, branchie circumosae multæ & hispidæ, quas assidue motat. Hi pedes qui ori præstati sunt, extantibus quibusdam reouibus barbulis asperantur. *Dentes* duos habet ut locusta: supra hoc cornicula breviora ac tenuiora quam locusta. Tum alia quatuor eadem

specie, sed breviora & tenuiora, super his oculos pusillos breves. Prominet pars cui subsunt oculi, acuta & aspera quali frons, major quam locustis. Omnino facies acutior, pectus autem latius: totumque corpus carnosius ac mollius quam locustæ. *O*cto pedum quatuor bifidi, quatuor non: quod collum appellatur, quique in partes divisum est extrinsecus. Tum est sexta pars lata quinque producta plagulis, hæc Aristoteles. Gasterus Chelam faciem hominis ridiculam representantem exhibet. Nam Chelæ pars minor maximum & aequilum nasum refert: & quæ in utriusque partis confinio apparent verrucæ, oculos, si supercilia addantur. Superiorem partem quatenus seu cornicula quatuor supra nasum & fronte prominent, cæruleo aliove colore si pictor inducat, ad representationem pili auriti & ad latera descendentes, ita tamen ut aures lateant: retrò & circa tempora pili prominent nigri. Facies partim albo inducatur pigmento, partim roseo fuso niteat. Lingua instar parvis chelæ majoris tubero rubicundo colore insigniantur. Quod si cristam quoque pennis præsertim gallinaceæ, capri aut pavonis nutantæ, foraminum summo indideris, planè Gorgoneam & terribilem habebis faciem.

Nunquam non in Oceano frequenter in Euxinio tamen nulli. In saxis habitare Oppianus prodidit: Aristoteles in terrenis. Circa Thalum & Hellespootum nascuntur. *Codunt* eodem modo quæ cætera crustacea. Mas formæque nulla nota insigni inter se differunt. Nam utriusvis utramque liber forcipem majorem deprehendens; quanquam utramque æqualem unquam neutri. Ote mare ex-cipit, cum locustæ ad branchias transmittant. Sine humore longius à mari deferri nequit: & tam est lociparis amantissimus, ut non longè deportatus, eodem adtepat. Polypum extimecit.

Quantum ad *Usum in Cibis*, optimi Ufus in illi apud veteres qui in Methymna Capie-

Oppian.  
Hærent.  
l. 1.  
Arist. H. A.  
l. 5 c. 17.  
Elian. H.  
A. l. 8.  
c. 22.  
Elian. H.  
A. l. 6.  
c. 22.

capiebantur. Omnes difficulter coquuntur, & tardè descendunt: ritè confecti & præparati non imbecilliter alunt. Mnesitheus alios elixis prætulit.

## PUNCTUM II.

*De Leone seu Elephanto &  
Aftaco parvo Rondeletij.*

**TAB. II.** **C**RUSTATUM quoddam hic descriptum sumus, nomē Leonis vel à magnitudine, ut Aldrovando videtur, vel à colore flavo, quo vivus conspicitur, ut Rondeletio placet, sortitum est: Bellonius cum Elephanto Plinii idem facit, quod eadem sit Leonis apud Ælianum & Elephantis apud Plinium descriptio.

**Nomen.** *Belon. de Aquatilib. lib. 3. cap. 11. Aldrov. lib. 6. cap. 11. Defect. prio.*

Corporis specie Aftaco affinis est, sed brachia longiora habet, forcipes tenues & latiusculos, quorum scissura major, quam in ullo alio Crustatorum genere. *Pedestres* qui proximè brachia sequuntur, longiores sunt, aculeati, in calcaria terminati: ultimus exiguus brevis & tenuis, neque aculeis, neque pilis munitus. Præterea ab Aftaco dorso aculeis differt, quibus cum locusta convenit. Utrunque *cornu* duo longissima tenuissimæque habet, item alia in fronte brevia, inter quæ unum in fronte eminere acutum, neutrà parte serratum: hæc sunt oculorum propugnacula, qui cornei sunt & prominent. *Corpus* totum undulatum est, instar panni ex hircorum camelorumque pilis contexti. *Cauda* perinde ac in Aftacis in pinnas quinque definit, sed lineis magis distincta. Scaliger unum vidit, cujus brachium puerilis brachii magnitudinem æquabat, quantum & ille quem Aldrovandus Brundisio sibi missum describit, habebat.

**Plin. H. N. lib. 9. cap. 11.** Plinius Elephantum suum nigrum esse vult, id est, violacei exsaturati coloris. Nam *μαυρί* Græcè de nigro, ut de Æthiopo, & cæruleo, ut de mari dicitur. *Forcipibus* adeo valent, ut ob-

servatum sit, Massiliæ vulpem per totam noctem, ab uno decendam fuisse.

Apponuntur lautis in Italia con-  
viviis, Ælianus, adipem squalidæ & infuscatæ faciei nitorem asferre, reliquit.

**ASTACVS parvus marinus Ronde-  
letij** semper est parvus. *Corpus* ei vivo 6. rubescit, alioqui lineis cæruleis transversis variatum. *Capite* & thorace est rotundiore quàm fluviatilis, in lateribus inciso. E capite eminet *Cornu* latiusculum, magnum si totum corpus spectes, utrinque serratum, inter oculos situm, quas recondit & exurit. Cornua quatuor oculis præfixa sunt, dum & breviora cornu serrato viciniora, alia duo multò longiora, flexibilia, articolata. Chelam utrinque unicam habet denticulatam, quaternis articulis connexam. Utrunque pedes sine forcibus. *Collum* tabellis constat, & in pinnullas definit. Sub cauda appendices sunt ovales teponendis destinatæ.

## PUNCTUM III.

*De Cammaro seu Aftaco fluviatili & aliis.*

**A**STACI fluviatiles Galeno καμαρά-  
δαι, Athenæo καμαράν, modernis  
Græcis Caranides & Caranidia di-  
cuntur.

**TAB. II.** **Nomen.** *Defect. prio.*  
Circa eot. *Descriptionem* non est quod multum laboremus, hoc tamen poni potest. Ventrículum mutimundique ambire, quam quidam stercus esse credunt, Bellonius hepar, sed falsò, quòd hoc trilis sanguineis datum sit: Eundem tam miro artificio fabricatum, ut etiam in ejus fundo alterum os compertas suis maxillis & denticibus resectum. Utrunque etiam spectaculum seu feramen sub cortice ad latera oris videas, per quod aquam ore acceptam referunt. Branchias habere ex Aristotele Gaza & Rondeletio prodidere. Philo-  
**Philos. Arist. H. A. lib. 4. cap. 2.**  
phus enim βραγχίαι, hoc est, partibus branchiis similes dixit.

Gefine.

Tab. III.

Canalis. See Krebs.



Atlant. Minor. Kleine Krebs.



Atlant. Minor. großer Krebs.



Atlant. Major.





Helmont.

de Lithiis

47.

Gefnerus cirros potius esse iudicat, ad motum progressionis natationisque à natura datam, vel ne aqua memorabilia prodidit Helmontus, quæ sequuntur. Per plurimas inquit atque uniformes cancrorum discretionis ista comperi. In primis stomachum cancri esse in capite propè verticem. Mares enim quotannis ægrotare incipiunt, à mensis Junii medio: tæmellæ dein in Julio ante testarum exuvium. Sunt enim per dies novem & amplius velut semixanimes ad immori. Quatempestate stomacho illorum exterius obducitur membrana nova, inter quam & stomachum veterem, est liquor quidam lacteus, qui sensim exterius in globum stomachi convexum, quæ parte attingit, obduciturque stomachum veterem, contrahitur utroque latere in concavum, statimque lapidescit. Interim nec tunc nec multò post cancer elicitur quicquam. Ideoque (penè incredibile) vetus sive interior stomachus, sensim in mucilaginem alimentariam absorbetur; exteriorque ac novus alter stomachus, in vicem absorbempe, succedit. Siquidem isti lacti, ad stomachi veteris convexum subnato, obtenditur statim pellicula, per modum lacti repenti solitum: erefcitque lac istud, inter utramque præfatam membranam, utriusque scilicet stomachi. Quæ eundem ducentis fortè cancris dissectis, diecim observavi, jucunda admiratione. Tandem residua pars lactis, cancro cedit in alimentum. Nihil autem cancer edit, aut in eius stomacho reperitur, quantisper isti lapides sunt in stomacho eius, vivitque circiter XXVII. dies tam ex veteri suo stomacho, sensim absumto, quam ex usure solutorum postea lapidum. Hucusque Helmont. Albertus plenilunio crefcere putat.

Locus.

Reperiuntur passim in fluminibus, lacubus, & rivis. In Pannonia tam frequentes ut Julius Alexandrinus sæpe supra triginta currus Astacis onustos, in foro Gammario Viennæ numeravit. In Hispania non haberi affirmant quidam.

Videntur cadaveribus, & carnibus, Viæ. & quidem his adeò delectantur, ut in Danubio de navibus suspensis, magna multitudo adhæreat. Ranas quoque appetere, Albertus testatur, & nos experientiâ comprobatum habemus. Per tredecim dies vivum absque cibo conservavit Gefnerus. Sexu notis distinguuntur. Mares in ea parte quæ corpus ad caudam continuatur subtus, quatuor longas prominentes virgulas habent, quibus foemina destituuntur. Cauda etiâ illius, rotundio, planior & spissior; tenuis, vacua, & lachrymæ, majorque tabellarum in eadem distantia.

De Generatione hoc sciendum, Matrem in coitu primò supra dorsum foemina ascendere, mox hæc istam supernâ vertere: per solam meatu appellatione coire: membro n. q. alterius corpus ingreditur destituuntur: Ova per anum, per quem & excrementa reddunt, parere: & sæpe minimos Astacos caudæ matris adhuc adhærentes conspici. Albertus ova foemina primò in corpore valde compressa esse, dein paulatim exire & virgulis curtis sub cauda donec complectantur adhærescere, scripsit. Hyeme mensibus quinque latent, si cõmunem opinionem sequaris. Aliqui enim tunc etiam apparere ac ad litora prodire; æstate ad optatas aquas gregatim concedere dicunt. Novilunio emaciantur, plenilunio pinguescunt.

De mirâ quædam inter Cancros Antipathia, & parvos antipathia, sic Helmontus. In Marchia Brandenburgica locupletissima est cancrorum piscatio. Vectores autem coguntur noctu excubias agere, ne fertè porcus aliquis vel leviter subter cutrem transcurrat. Nam id si contigerit, manè quotquot cancri, in eurtu fuerint inveniuntur mortui. Tam exitialis est porcus cancro.

Dividuntur in Minores & Majores. Illi, quod sub saxis degant, saxatiles dicuntur, parte supinâ albicant, proni nigricant, elixi non undique rubescunt. Majores, rotundiores sunt magisque crenato in Pado eor-

c 2 porce,



Vfus.

pote, quàm in squama, cuius dexter pes sinistro tenuior est.

Locum in *Cibis* habere, omnes norunt, quamvis etiam difficilius concoctionis esse certum sit: quia & longiore in ventriculo morâ, mandatis frigidis & humidis in caput vaporibus, soporem inducunt. Martio & Aprilis mensibus à quibusdam comendantur, lunâ imprimis accrescente. Venæ quæ in eis interdum reperiuntur, improbantur. Varias præparationes apud Aldrovandum vide. *Medicis*, contra canis rabidi morsum, phisicū, febrem hecticam, urinæ retentionem, calculum, inflammationem linguae & gutturis, & Cancrum in mammis inserviunt. Contra anginam sic à quibusdam præparatur. Astacos circiter decem vivos contere: & stillatitios liquores in tybrosarum & papaveris erraticia affunde, inde expressus succus vinum rubellum refert. Eo linguam abluere & diligenter ac penitus gargarizare oportet, deinde et haustu eius mediocrè bibere, Linguâ absterfam & purgatam lario in sulfo percinge, post horam & dimidiam, quicquid viscidæ pituitæ insederit, rursus absterge, & succo Astacorum præscripto denuò lava. Reliqua in Aldrovando vide. Præparatio contra mammarum cancrum apud Hartmannum optima. *Lapides* quod spectat, rarissimum ex iis diureticum, febrifugum, & vulnerarium parari posse existimat. Helmontius, si in formam pristini lactis resolverentur. Usurpantur quoque contra calculum, cum nucleis persicorum & mespilorum: Contra sanguinis grumos, cum carbonibus è tilia aceto restinctis, &c. Huc pertinet *Astacus Caraboides*, & *Gammarus terrestris*. Ille colore est omni parte corporis cinereo, antennis quatuor, duabus longioribus, reliquis brevioribus, pedibus & chelis hirsutis. Pedes duo priores chelis proximi tabellas in extremitate circum undique serratas habent, ad natatum faciliorem fortè utiles. Quantum ad hunc, Crustacei quoddam genus in terra latitat, maxime in India Occidentali, Cuara-

fas vocant, tam prope Gammarorum formam, ut cum effusum è terra conspexisset Julius Cæsar Scaliger, acroganti quid esset, in sepulchris inveniri alii dicebant, à Gammaris abstinerit diu.

## ARTICVLVS III.

## De Squilla in genere.

Crustata, quæ Latinis Squillæ, TAB. IV.  
*Græci* *ναυίδας*, *ναυίδας*, & *ναυίδας* vocant, seu *Σκίλα* capite, quod 1. 4. 5. 6. 7. 8.  
Squillis majusculum est; seu *Σκίλα* Nomen. Aldrov. de Crustat. c. 8.  
*Colybdænas* apud Athenæum vocat, quo nomine Epicharmus, ut Nicander vult pudendum marinum intelligit.

Descriptionem si attendamus, *Cancer* habent, sed forcipe carent, fortè quod pluribus pedibus, in quos redundantia illa absumitur, instructi, si Aristotelem & Rondelctium sequimur: At Bellonius pedes forcipatos habere scribit, quas etiam *Ælianus*, & quidem maximas Indici in Gange fluvio attribuit. *Corpora* sunt vere nigrescente, sed postea albedinem recipiunt. *Cornua* etiam habent Opiano teste acuta, & in summo capite posita: *Ælianus* aculeum acutissimum triremis rostro similem, & scuturas, ferræ modo habere scribit. *Oculi* sub eodem munimento præduri eminent. *Intestinum* quoque rectè in caudam veluti Locustis & Astacis finit, qua excrementa emittunt & ova pariunt.

*Vivunt* in marinis palustribus & saxosis locis. Ab illis *Indici*, *Æliano*, ab his petreæ Oppiano dicuntur. Indicum mare majores alit, quæ in profundo hærent, ut minores littoribus gaudent. In distictis faxis in mari rubro repetiri, prodidit Theophrastus, quod de vivis an de figuris sumendum sit, dubitatur. Habentur & in Oceano Germanico, & Gallico, mari Tyrrheno & Adriatico. Circa Jafum magnas celebrat Arcestratus.

*Vivunt* ostreorum carnibus: *Ælianus* quoddam alga vivere prodidit. TAB. IV. c. 10.

Aldrov. de Crustat. c. 6.  
Hartman. in præxi Chymia. trica.

TAB. IV.

1. 4. 5.

6. 7. 8.

Nomen.

Aldrov. de

Crustat.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

c. 8.

*Actaeus flu*

Edel Krebs

Tab. IIII.

*Actaeus fluviatilis*



*Squilla lata*

*Squilla lata* Rondel.



*Squilla gibba* Gärner.



*Squilla parva*



*Squilla vfa minor*



*Squilla mantis*



hoger Krebs

*Squilla*



*Squilla lata* Bären Krebs

Leo Rondel.

Leo.



*Squilla gibba*





Arg. H. A.  
L. 4. c. 2.  
Sextus.

De *Sex* ita Aristoteles. Distinguitur à forma nam duabus particulis candidis, quas ipse peculiare habet in catne pectoris, sed ab ipsa discretas tum color, tum concretione, similes sepium promuscidi. Vorticose hæ sunt, quemadmodum buccini anfractus, quem Græci *μύσκα*, id est, papavervocant: Oriuntur ex abacribulis, quæ sub extremis sunt pedibus. Est etiam in pectore caro rubra, sanguinis colore, quæ tamen atrectata dilabatur, neque similis carni sit. Ab ea meatu qui in pectore buccini refert speciem, alia est linuatio funiculi crassitudine, sub qua duo, quædam sunt appensa in festino arenacea genitali semini destinata. Atque hæc mas habet. At femina ova ibi, colore rubra, quæ annexa ventri, atque utrinque latus intestini, ad carnosasque partes, membranam tenui continentur.

Generatio.

*Coëunt* more quadrupedum retrò mingentium, scilicet, ut femina caudam lupinam exponat, mas suas superimponat & applicet; & coëunt in eunte vere juxta tetram, & cum sic maturefcunt.

Antipathia.

*Inimicitias* cum Laboracæ exercent, & à Phycide ac Lupo comeduntur. Quo semodo ulciscantur, apud Ælianum habemus. Cum se, inquit, intercepas sentiunt, fastidium quod eminet à capite, quodque simile est acutissimi mortiremis rostro, atque in summa parte secturas habet, modo sectulæ unclatæ, hoc, inquam, anlmofæ illæ bestiolæ cum incurvantur, summa lævitate saliant, & tanquam saltatorium versant orbem. Lupo ore hianse squillam lassam comprehendit, hæc in gutturi laxitate saltat, ut gula intumescat.

Vfus.

*Vfus* earum & in *Cibis* est & in *Medicina*. In *Cibis* preciosum piscem juvenalis nominat. Apicius tanti grandiusculas faciebat, ut earum gratia in Africam navigaret, cumque priusquam navi exiliret Minturaensibus minores animadvertetet, gubernatorem, nulla excensione factâ, eadem via Italiam repetere juberet. Hodie elixantur & cum aceto comeduntur:

stinguntur etiam in Carragine cum oleo satina adpersâ. Olim ficus folis afflatæ involuebantur. Difficiliter concoquantur, stomacho nocent, & Veneris desiderium excitant. Hoc & sibi contigisse Cardanus testatur. Hæcicis eximie prodesse nullum dubium. Ajunt eritas & particulæ impositas, cuspidem vel sagittam, si quæ infixâ, singulari attrahendi vi educere. Quidam escæ ad mugiles capiendos admiscunt. Iisdem & lupus piscis inescatur.

## ARTICULUS IV.

## De Squilla in specie.

## PUNCTUM I.

## De Squilla lata sive Ursa.

Quam Squillam latam Rondeletius vocavit, hanc nos *Ursam* & *IV*. quidè Aristotelis cū Bellonio & Scalligero dicimus. Ubi enim porrecta jam Nomen. cet, urli corium extensum representat. A Squillis eam separavit Aristoteles, quod sub Squillatum nomine non notet. Neapolitani Messanenses in Sicilia Messacaram, quasi sit *μυρίστρα* & *ερί*, vocant. *Scalig. Ec. 243.*

Rondeletius eam ita descripsit. Locustarum est magnitudinis, sed latior, *Deferi. prio.* multo & magis depresso corpore & hirsuto, in fronte ossa duo, utrinque unicum, in ambitu serratum, in quibusdam acutius, in aliis latius. Hæc pinnae dux alligantur. Inter hæc duo enascuntur coroua, initio articolata, circa media bifida, ut ex duabus quatuor fiant, non valde longa. Brachia duo habet cum aculeis, veluti clavibus eminentibus, pedibus majora, non bifida, quæ in os flectuntur, quibus ori cibum tanquam pedibus admovent. *Pedes* utrinque quatuor sunt. *Oculi* parvi prominent. *Frons* quadrata, & latior quàm in ullo Crustatorum genere. *Tumores* multi per dorsum sparsim sunt, ex quibus exstant tubercula, quorum summa pars adeo rubet, ut carbunculus in annulorum pala inclusas dicas.

Scalig. Ex.  
245.

In Cœnosis vivere argumento est, quòd luto obfita è mari extrahatur. Raro in Gallia capitur: Romæ & Neapoli frequenter: in Africa frequentissimè. Circa Minturnas Campaniæ oppidum majores sunt Smyrnæis. Idem eis pariendi tempus natura statuit q. Locustis. Per hyemem & vere prius q. ova excludunt laudantur, Et hæc de Vrfa, quæ Major dicitur, accipienda sunt. Est alia quam *Minorem* & *Calatam* vocant. Scaliger *Cangren* Aristotelis credit, Rondeletius *Cicadam marinam*, quòd cum Cicadis terrestribus magnam similitudinem habeat. Quinque tabellis constat, & dorso egregio naturæ artificio variè cælatis & sculptis. Tota rubet. Dodrcentalem magnitudinem vix superat.

## PUNCTUM II.

### De Carangone & Squilla gibba.

TAB.  
IV. 6.

Descriptio

Quas Aristoteles *καρχήδονες* aut *καρχήδονες*, Hesychius *καρχήδονες* vocat, ex Gazæ sunt Crangines.

Est verò hæc Squilla, si *Descriptio-nem* attendas, palmi majoris longitudine. Contegitur crusta tenui, lævi, candida, nonnunquam ex albo parum rubescente, quæ cocta, tota rubescit, cornu instar pellucida. E dorso enascitur *cornu* in fronte serratum, sursum recurvum, cuius denticulæ asperitates in superiore & inferiore sunt paræ non in lateribus. *Oculi* sunt corni, in quibus subiecta pars cava cochlearis modo. *Cornua* sunt quatuor, ex quibus duo bene longa, tenuia & flexibilia. *Pedes* habet quinos; quin calcar terminantur terni sunt.

Posterior pars pro reliqui corporis crassitie & magnitudine longa, septem tabellis constans, in quatuor pinnas definit: è quarum medio extat aculeus latior quàm in Squilla gibba. Quam Gesnerus vidit, parum rubebat, partim dilutius

albicabat, ad latera flavescebat.

Sunt omnium crustatorum sapientissimi. Carne teneta dulci, bonique & multalimenti constant. Caudæ in primis crusta spoliata, cum pipere, sale & aceto, mensibus Februarii, Martio, Aprili, Maio, laudantur.

*Squilla gibba* *καρχήδονες*, propter gibbum quem habere videtur dum se curvat dicitur. Alii *καρχήδονες* & *καρχήδονες* vocant. Græci moderni Caridas & Caranidia nuncupant. Crangonibus sunt tenuiores maxime in cauda extrema. Senos ante frontem gerunt valde tenues cirros. Caudam contractam, in cuius extremo pinnae sunt quinque: quarum quæ medio loco posita est, serrata duram, atque in acutum fastigiatam formam habet. In Santorum littora *Aristot. H.* maxima earum copia. *Ova parvius* *A. l. 5. c. 17.* & generant Locustarum more. Ceterum menses citèter quatuor gerunt. Cornu frontis elatum in palatum Lupi piscis infigunt, eumque interimunt. Ubi tanguntur saltant, ac tangentem sæpè expavescunt, corpusque in aqua gibbosum arcuato motu promovent erucarum modo. Vendebantur olim in sportulis ex junci rimine contextis, fringuntur cum oleo in farra, ine: aut elixantur in aqua & comeduntur cum aceto.

## PUNCTUM III.

### De Squilla parva, & Squilla Manti Rondeletij.

*Squilla parva* nomine proprio catet. *TAB. IV. 7.* *Squilla* Aristotelis, non est, ut perperam Gaza convertit. Chelas enim hoc, Astaci modo habet. Quidam *Arist. H. A. l. 5. c. 15.* à colore fortasse, quem vivis Rondeletius obscurum tribuit, dici volunt. Alii *μακροχέλας* apud Athenæum propter suavitatem in cibo. Duplex istarum est *genus*. Unum *Macrida*, durioris crusta quàm Squilla gibba, q. vivit in æste saltat, & noctu ut candela lucet, *Cambaretto* Romanis. Alterum *Minimum*, ut tam exiguum,

TAB.  
IV. 5. 13.

Descriptio.

*Alexander. in Pindar.*

TAB.  
IV. 7.

*Arist. H. A. l. 5. c. 15.*

*Macrida & deba, q. vivit in æste saltat, & noctu ut scripto.*

guum, ut mille vix libram æquent pondere, Venetiis frequens. Cocis quibundam Brava, Valconibus, Civade, id est, avena, pugillatim enim devoratur. *Caput* habet pro Corpufculi magnitudine crassum & latum, sine cornu. *Caudam* tenuem, gibbum parvum. *Oris* appendicibus & aliis Gibbæ similes, punctis aliquot variatur. Bellonius vias subfufvaspectari ait, coctas rufefcere.

Locus.

Et in mari, & in fluviis nascuntur: etfi Bellonius longè à mari provenire dicat. De Garumna canistris excipi, Scaliger testis est. Tarentinus fluviatiles nominat.

Vfus.

Carne sunt adeò dulci, ut fastidium patiant. Vix ullum aliud Cibi genus, teste Rondeletio; dulcius degustaveris. In aqua hordei locæ, & in carnis jure coctæ, hæticis maximè conveniunt. Cum crustis adjecto pipere clixæ, venerem stimulant. Icon quam hic damus, Gesneri squillam parvam exprimit.

TAB.  
IV. 9.  
Aldrov.  
l. 2. c. 16.

SQUILLA MANTIS, nomen à bestiola quadam ex Locustarum genere accepit, nec antiquis est dicta. Occitani eam Preguedicus, id est, precantem Deum appellant, quod semper manus junctas teneat, & corpore sit, jejunantium in stat, gracili & macilentio. Divinare eandem vulgus credit, & de itinere quæritam alterum brachium extendere.

Mathiolus *Hippocampum* appellat, Bellonius *Cicadam marinam*, quam *Speusippe Nymphæ* esse suspicatur, eandem ita descripsit.

Descriptio.

Tenuis est, inquit, huius crusta, crudalita albicat, ut ferè transpareat. Una cum pisciulis marinis sæpe suo cortice contexta extrahitur, & simul cum carplionatis, cocis, mænis, & trachuris canistris infertitur. Natura incredibili ferè artificio. Cicadæ oblongum corpus decem *tabellis*, affabrè articulatis loricavit: quarum prima, quæ caudam extremam conficit, caudam in lateribus expandit. Cauda porro duabus maculis

phœniceis subrubris insignita est, quæ duorum oculotum speciem præ se ferunt, estque aculeata & crenata. Prima tabella à cauda incipiens, versus secundam, tertiam, quartam, quintam, & sextam, pinhulis fimbriatis multiplicibus subtus munita est, quibus, dum in mari natat, aquam percutit, & corpus incitat.

Tres *tabellæ*, quæ sex prædictas subsequuntur, ternis utrinque pedibus communitæ sunt; ad eervicis autem initium, duo brachia majora oriuntur, quibus cibum apprehensum ori suggerit: sed ea cancris, alter quam locustis forcipantur. Sint enim in longum exportectæ, atque in extremo grandioribus crenis suffulta, quibus eum cibum corripit, ex uno brachio, ad aliam brachii articulationem transfert.

Horum autem extrema velut in duritiem ossicam abeunt denticulatis conficiendis ob id expetita. Pars quæ capiti contigua est, in exile quiddam terminatur, & contra quam cauda se in latum diffundit. Extra aquam prorsus immobilis & imbecillis est.

*Aculeum* unum habet utrinque ori præfixum, ut Phalangium & Scolopendra, quo mordicus cibum à pedibus suggestum continet quem postea dentibus conficiat, & in stomachum derrudat.

*Dentes* illi natuta in oris lateribus protulit, unico utrinque ossi crenato, V. litteræ formam referente infixos. Cujus anterioris partis officium est, ea incidere quæ manditi posterioris verò quæ crenas habet, conterere. Nam idem os, duos habet dentium ordines.

*Prætentoria* duas in fronte breves, urfinis similes, ostendit, trifariam in extremo diffusas: ac rursus duas alias in lateribus prædictis breviores. *Oculi* habet virides, exertos, quos non alveo ut Cancrarium & Locustarium genus condit: sed ante hos pinnulas exporrigit eis similes quas in cauda gerit: ex quo multi decepti caudam caput esse crediderant. Serias rectas intergore, atque in capitis tabellâ ductas

ductas profert. Pisces dissecto, *dentes*, fortib. musculus movere conspiciuntur. *Cerebrumque* adeo esse exiguum, ut vix hordei grani magnitudinem æquet: Optici tamen ad oculos perducere apparent. Rondeletius toto corpore pellucido esse addit. Eodem modo parit & coit, quo aliz squillæ.

Vfus.

T A B.  
LI.Marguar.  
Hist. Brasil.  
L. 4. c. 20.

Carne est molli, dulci, delicata. Huic affinis est *Tamarygus* Brasiliensis, *Camaron de Salgado* Lusitanis dicta. Caput habet triangulare. Barbam cancerinam octuplun. Et incoctum a Manti differt, quod in anteriori parte corporis pedes non habeat, nec brachia interius serrata.

## CAPUT II.

## De Crustatis rotundis.

## ARTICULUS I.

## De Cancris ingenere.

Crustata quæ Latini Cancros vocant, Græcis *καρκίνος*, quasi *καρκίνος*, quod *καρκίνος*, id est, pupillas, & oculos mobiles habeant, dicuntur. Siculi *καρκίνος* vocant, Helychius *καρκίνος*. Apud Varinum *καρκίνος* vel *καρκίνος* Cancer dicitur, quod ostrea lapillo inter testes seu valvas (*καρκίνος* & *καρκίνος*) injecto, venetur. Caudam habent revolutam, sine *καρκίνος* *καρκίνος* Aristoteles vocat, quæ ex tabellis constat, & corpus posteriore parte integer: Caput indiscretum *Cerebro* carent, etsi partem quæ cerebri fungitur munere habeant. In obliquum aspiciunt inclusis crustæ fragili oculis. Pedes quin obliquum feruntur eis deni cum forcipibus, quorum dexter in omnibus major, & in primoribus superior pars movetur inferiore immobili.

*Dentes* interius bihi primores, & post. 4. c. 8. inter eos caruncula linguæ effigie. *Stomachus* ori continuo junctus exiguus.

Plin. H. N. L. 9. c. 31. Mollibus & petrosi locis gaudent: quin & sub terra inveniuntur. Hye-

me aperica littora sectantur æstare in opaca gutgitum recedunt.

Vesuntur conciliis. Polypum ob nimiam Venerem imbecillum devotant, nec à suo genere abstinere. A. Arif. H. N. L. 4. c. 2. & L. de Br. perat.

Galenus dulci & salsa aqua vivere se ribit. Lacte potatos sine aqua diutissime, author de natura rerum.

Generationem sispesces, Cancris parte priore copulantur, sua opercula, loculo sa illa rago facie, mutuâ confectione cõponentes. Primum Cancris minor ab averso supervenire solet, tum major, ubi ille supervenerit. Obsedunt in operculo, hinc cistudinem latius, & hirsutius ita à maribus discernuntur.

Addit ramentum Plinius, scemina primum pedem duplicem, mari simplicem, eundem duas inter ventrem & caudam spinas habere, quibus illa caret.

Soli è crustatorum genere non nant, sed incedunt, & quidem transverso latere quod limis & uris, propter posteriorum pedum latitudinem competit. Cum enim motus tractione & pulsione fiat, & sic secundum artuum flexiones, quæ Cancris innotum ad pedes sunt; ideo quæ cum tritremes circumaguntur, lateris unius remiges impellunt, alterius inhiibent, aut retrò trahunt, ita quam in partem processurus est canceris lateris unum cruribus ad arpendu solū alterius lateris ad aspellendum. Insidias incredibili sagacitate subdoranant, & confestim se vel luto obdoranant, vel inter saxa subducunt. Univerſi ubi aliquando congregantur, os Ponre evincere non valent: quæ motum regressi circumcunt, apparet que tritum iter. Concurrent inter se ut Arietes adversis cornibus. In capiendis ostreis & conchis, summa calliditate uruntur. Calculos enim & lapillos, patulæ hiantique eorum testæ ingerunt, ita ut occludi nequeat, mox dentato forcipe pisculentâ carnem abra-

Locus.

Vicus.

Arif. H. N. L. 4. c. 2. &amp; L. de Br. perat.

Galen. de cib. bon. &amp; mali. fac.

Generatio. Arif. H. N. L. 4. c. 7.

Plin. H. N. L. 9. c. 31.

Motus.

Natura. &amp; ingeniu.

Plin. H. N. L. 9. c. 38.

abradentes devorant. Sole figum  
Cancri tranſeunt, Cancrorum cum  
exanimati ſunt corpora in ſiccō trāſi-  
gulari in Scorpiones Plinius author  
eſt. Ovidius, brachiū ſorbo, ſcorpio,  
ſi ſub terra occultetur producere, ꝑ-  
didit. Latent menſib. quinis, & veris  
principio fenēſtrem anguinū more  
exuunt renovatione tergōrū, & tum  
molliſ ad modum cruſta ſubnatiſcitur,  
& vix ꝑꝛ tēneritate ambulare poſ-  
ſunt.

Duræ sunt carnis, ideò difficiles, concoctus, sed firmi alimenti. Id apud Galenum, Athenæum, & alios invenies. Nec in *Medicina* spernuntur. Plinius Sole cancri signum transcutit contra serpentum iñtus mederi tradit. Sues percussus hoc pabulo sibi mederi Thrasyllus author est. Pro hyosciamo devotato Cancros pro remedio querunt. Cervi à phalango vel quovis alio ad morsu iisdem tibi medentur. Carbunculus & carcinoma in mulierum parte, præsentissimum remedio sanari, tradunt, Cancro femina cum flore salis confuso, post plenam lunam, & aquâ illicta, ut apud Plinium legimus. Ad stranguriam, tres, in aceti cyathos cocti, in mortario confusi & expressi propinantur. Succus cum aqua florum Cyani destillata expressus, gingivis puerorum in dentitione salubriter illinitur. Pulverem Ranzovii ad diffestionem nervi apud Aldrovandum vide. Lapis in capite repertus, & aceto acerrimo immisus, motum manifestum habereprehenditur.

## ARTICVLVS II.

*De Cancris in specie, Et quidem de Cancris extra conchas in falsis aquis degentibus.*

## Р И С У Н О К 1

*De Cancro marino.*

**C**anceri degunt extra conchas, vel  
in istis. Illi vel sunt in aquis salis,  
vel in dulcibus. Inter illos qui in aquis  
salis sunt. *Cancer marinus, Cancer Maja*  
*dictus, Pagurus, Cancer eques, Cancer flo-*

*vires, undulatus Rondeletii, Cancer varius, Cancer cordi figura & alii Chelarii legitime differetes. Cancro marino generis nomen inditum est, nec in eius descriptione Rondeletius, Bellonius, & Gefnerus conveniunt.*

Rondeletii acuminatus magis est 3.  
parte anteriore prope oculos, & duo  
habet cornicula, quibus horū caret. Defect.  
Rorundo est ac cincto corpore p<sup>rio</sup>.  
Bellonii, anteriore parte crenis divi-  
so, crustaceo tegmine cōvestito. Majores trium aut quatuor digitorū la-  
titudinem non excedunt. *Hepar* ha-  
bet rubrum, quod Aristoteles mu-  
tim neminare videtur. Intestina mul-  
tiplicibus cirris obfessa, moventur  
que horum partes solidiores albis  
musculis agentibus. Aldrovandus a-  
liam observavit speciem, cujus pes ul-  
timus qui ab utraque parte est,  
brevioribus & crassioribus constat  
internodiis, & aliis pedibus est cur-  
tior, in fine duabus, aliis articulatio-  
nibus latior. Plurimi prope insulam  
Canibalorum, quæ hodie Domeneca  
dicitur, reperiuntur, & quia in saxis  
habitant, *scorpius* Oppian. dixit. Er-  
mores & *famina*. Illis color rubentior,  
his ex livido in cyaneum tendit. Ma-  
res fœminas opprimere videntur an-  
tequam in eant. Crura in ventrem in-  
flectunt dum incedunt. Rondeletius  
fœminæ partem inesse quandam cro-  
ceam scribit quâ mares carent. Ovo-  
rum putat esse materiam. In Bosphoro  
Thracio, vento violento ingruente,  
contra fluctus nituntur: Circa pro-  
montoria, ubi major vis venti, singuli  
in sinuoso loco se tenent.

Maximè, in *Cibis*, fecerint: cum o-  
vis turgent laudantur, ideo majus ea-  
rundem Bononæ pretium. In India  
succo dulci cù luna parturit turgere,  
plenam eodem destitui, à quibudam  
proditum. In *Medicina*, pituiticis car-  
nem prodesse Rondelietus experi-  
tâ docuit, quod & apud Marcellum  
invenies. Stranguriam sanant si dua-  
rum drachmarum pondere ex lacte  
materno vel nutritis infantibus por-  
rigantur. Ad quartanam, scabiem, &  
oculorû lachrymas ab Avicenna; ad  
Carcinomata à Plinio laudantur. Il-  
dem pilosâ mamma tollunt.

Post-



## PUNCTUM II.

## De Cancro Maja dicto.

TAB. V. **C**ancer Majas dictus, nomen à  
 TAB. magnitudine sumit. Nam *μᾶϊα*  
 VI. 2. quæ amitam & nutricem significat,  
 Nomen. aliquando etiam pro grandiore natu  
 fumebatur.

Defcri- Eo à Pagnro differt, quòd hic parte  
 ptio. anteriore latus sit, Maja se poste-  
 riore in latitudinem diffundat, ante-  
 riore coarctetur, & magis orbicu-  
 lata sit.

*Corpus* illi tam grave, ut ad inces-  
 sum sit ineptissima, idque vivæ li-  
 vet, aut virescit, aut rubore phæniceo  
 aspersum est; quam si supinam con-  
 templeris, tria parte anteriore bre-  
 via specula ab ipsius crustæ regmine  
 continuata cernes, inter quæ præ-  
 tenturæ duæ delitebant. *Cruca*  
 quaternis articulis intercepta sunt,  
 alta & exilia. *Pedes* utroque latere  
 quaterni, quinque articulis intercepti,  
 unguibus benè muniuntur. *Tibiae*  
 multa scabritie exasperantur. *Femina*  
 operculum latiusculum habet, sub  
 quo duo foramina membrana occlu-  
 sa, in ipsis posteriorum tibiæ radi-  
 cibus collocata apparent. Quatuor  
 præterea semicirculis utitur in natan-  
 do, à quotià radicibus octoni pdeunt  
 pinnati ramuli, quibus hærent ova in  
 fortis. *Interanea* si spectes, in capite at-  
 que adeò ore ipso duos osseos dentes  
 gerit: in palato, carunculam quâ lin-  
 guæ vice fungitur: ante dentes bina  
 denticulata ossicula, atq; in ejus ore  
 cavitatem statim ante gulâ, in qua q.  
 rubrum continetur, habet multipli-  
 ces flexus. Vulvam esse Bellonius pu-  
 tat. Ex hac enim ova prodire competi-  
 tum est. Subsequitur cavitas satis  
 capax, vacua quidem ea, dum jejunos  
 est piscis, ut vel os alterum, vel ven-  
 triculus ejus esse dicas: cui etiam  
 dentes adiunt numero quaterni, inci-  
 siori, & unus molaris, à quibus gula  
 incipit, in cujus summo epiglotti-  
 dem manifestè videas: ea autem ad  
 apophyses meatibus cõmittitur adeò  
 exilibus, ut vix appareant: & quem-  
 admodum vulva adimplebat majorem

partem recessu, sic apophyses ubiq;  
 per cavitates immittuntur, tendunt  
 tamen ligamenti adstrictæ, & maxi-  
 mè musculis. Nec est aliud intesti-  
 num manifestum, quam illud in quo  
 desinunt apophyses, excrementici-  
 licet receptaculum. Est autem id te-  
 res, exteris partibus incumbens, ad  
 caudam usque protensum. Sed & ves-  
 ticam utrinque unam in ipsa alvo, ro-  
 bustam, magnam & membranofam  
 eernas, cuius exitus est per ea duo so-  
 ramina, quæ sub operimento latent.  
*Branchiæ* habet utrinque sub testa ii.  
 lateribus numero senas: quæ certâ  
 membranâ ab ipso tegumento distin-  
 guuntur. Aquam cum in ore acce-  
 ptam permeatus qui ad radices cru-  
 rum sunt egerit. Hæc omnia ferè Pa-  
 guro suo Rondeletus adscripuit, quæ  
 vide. Ad Mazam pertinent & aliquot  
 sequentes.

*Primus Hippocarcinus* à magnitudi-  
 ne, cum addito *hipsidus*, quod univer-  
 sum tergus aculeis spinosisque qui-  
 busdam operculis oblitum sit, quæ ad  
 latera majora videntur, dicitur. Su-  
 pra oculos emissitios è tabulis qui-  
 busdam ad latera protensos fronte  
 media, duo velut cornicula acuta  
 exeunt. Os infimo loco situm, duo ve-  
 luti brachiola intus tota villosa mu-  
 niunt. Quinque ab utroque latere  
 pedes, si brachia annumeres, in toti-  
 dem articulos distincti. Chelæ ante-  
 rior parte, brachiû puerile æquant,  
 forcipibus fuscis colotis, è quibus vil-  
 losa quædam prominentia stamina  
 instar penicilli.

*Alter* est parte supina Hippocar-  
 cino non dissimilis. *Cauda* est ovalis  
 ferè figuræ, & extremo in angustam,  
 appendicem scutiformem quinque  
 angulorum seu pentagonam desinit.  
 Insignis in eadem scutellata cavitas  
 apparet. Os multis veluti brachiolis  
 villosis, supernè & infernè circumse-  
 pitur. In ventre plana cavitas, ovis re-  
 tinendis aptissima.

In *Tertio* senæ spinæ majusculæ la-  
 tera utrinque ambiunt: & binæ maxi-  
 mæ frontè muniunt. Duos palmos est  
 longus, chelis, brachiis, & supina cor-  
 potis parte tuberosus, & hispidus.

Quartus

TAB.  
IV. 6.



*Pagurus formosus*



*Cancer*

Tab. VI.



*Pagurus prae-*



*Pagurus*

*Supine*



*Cancer Varus*

*juv. mar. morosus.*



*Araneus*

*Araneus speciosus prae-*



*Cancer Varus*

*juv. mar. morosus.*



*Araneus speciosus prae-*



*Araneus speciosus prae-*



*Cancer brachycheles. Pandal.*



*Cancer pinnatus.*



*Cancer minutus.*



*Cancer brachycheles.*



*Cancer pinnatus.*



*Cancer minutus.*



*Quartus* eiusdem est figuræ, sed pluribus spinis ab utroque latere & in dorso horret, pedibus & brachiis hirsutus, & supina parte, variis coloribus sed præsertim rubro maculatus.

**TAB. IV.** *Quintus* quem Heracleoticum Rondeletius vocat, aculeos in fronte habet & in lateribus. Pars testæ prona aculeis aspera est, & hirta, coloreque fusco.

*Sextus* asperitatem in testa tomentosam habet, coloreque est cinereo & fusco.

**Locus.** Reperiunt in *Ægeæ*, *Jonin* & *Adriatici* mari.

**Vitus.** Mares eliguntur autumnò, hyeme & Aprilis mense ad *Cibum*, in plenioris ætatis femina verò reliquo anni tempore usque ad Septembrem. Afantur etiam in furno ano & ore clausis, ne quod intus est liquidum effluat.

## PUNCTUM III.

## De Paguro.

**TAB. V.** *Paguro*, *pagurus* est, quod in locis præruptis versetur, nomen inditum est. Simeon Sethi eum Carcini appellatione dignatur. A Palladio Cancer marinus dicitur. Scholiastes Aristophanis Caraburi exponit. Moderni Græci Paguri nomen adhuc retinent, idemque in Dalmatia, teste Massario retinetur. Latior est quam longior, & ex Oceano in pedalem longitudinem abit. *Vitus* in Anglia decem libras pendere. Valida crusta integritur & in lævi, eaque novem in gyrum crenis imbricis modò incisa est. Color vivorum viridiorum præ nimia rosei exhalatione veluti subnigra tergo apparent. *Cruca* utrinque bilæa quatuor habent, villis hirta, ternis articulationibus geniculata, in quibus ungues acuti oblongi sunt, medio bifidi. *Brachia* bifurcata parte anteriore binis articulis intercepta forcipibus crenatis munita, in extremo nigra: quibus quæ constringunt ut edant, etiam dura confringere possunt. *Branchiæ* utrinque in latere o-

stendunt dispositas, ut reliquum genus *Locustarum*, sub tergoris crusta senis ordinibus ad tibiæ radices insertas. In ore tot comperies naturæ secreta, tot adstantes appendices, tot pelliculas, ut coactus incredibile artificium necesse est fatearis. *Mutim*, **TAB. V.** quæ hepar est, habet dulcissimam, maximè ex parte subrubram, cum infinitis præ apophysis flavis grandi stomacho adjacentibus. Reliquæ partes internæ musculis albis constant, quibus externæ moventur. Rondeletius sub nomine *Cancris* *Majoris* describit. *Differentia* si species, alius est *Mas*, alius *Fœmina*. Scaliger alium orbiculatiorem, fusciorum, & majorem facit; alium quadratiorem & minorem, colore dilutiore, & penè pallida viriditate. *Poreffos* vocant Veneti.

Huc pertinet *Cancer Heracleoticus* Bellonii ab urbibus Heracleis, quarum una *Pomæ*, altera *Propontidi* adjacet, dictus. *Cruca* firmiore munitur ut *Maia*, *Tibiæ* utrinque quaternas habet, *brachia* duo admodum firma, binis articulis geniculata, forcipibus robustis bifurcata, hispida, & benè armata, quorum pars superior elatis crenis vallata est. Nonnulli *Gallum marinum* vocant, quòd *brachia* eius in crista galli modum tornata videantur. *Dorsum* tuberculis exasperatur & coloris est miniacei.

Huic similis est *alter* pilorum densitate *Ursi* corium referens. Differt à priore prius chelis, quæ longiores sunt, & in extremo pars utroque, quæ forcipem facit, & instar dentium sibi invicem dum clauduntur contingit, colore miniaceo: præterea pedibus brevibus, quorum duo posteriores utrinque brevissimi, antennis & oculis magis à se invicem distantibus. *Invenitur* in mari *Tyrrheno* & *Adriatico*: sed in Oceano maximus. Vidit Rondeletius unum, cuius latitudo palmum majorem superabat, longitudo ad semicubitum accedebat. Alexander apud *Ælium* genus quoddam *Cancrorum* commemorat, quorum testæ circumferentia undique pedis mensuram impleverit. Miras eo-

d a rum

Differen-  
tia.Ælian. H.  
A. 17. c. 11.

rum magnitudines in sinu quoque Persico Strabo refert. Suctum ipsis in tumento se exuere. Hoc cum luxari & a corpore abscedere sentiunt, furis quasi agitari huc & illuc feruntur, & pleniorum visum querunt, ut tumore inflatis facibus crusti rumpatur. Elapsi similes mortuis in sabulo jacent, sibi restituti sabulum gustant, & postquam se abdidere, non citius ex latebris, egrediuntur, quam pristina armatura instruit. Muscæ sunt adeo amantes, ut eadem capiuntur. Captos aliquando foramina subire, & mortuos in Scorpions mutari Nicander prodidit.

*Ælian. H. A. l. 9. c. 45.*

*Nicand. in Thersia. Vfus.*

Inter lautissimos numerantur cibus, sed difficillime digeruntur. Cum coquantur parum tuffeunt & parum nigrescunt.

#### PUNCTUM IV.

##### De Cancro Equite.

**C**ancer Eques à velocitate cursus nomen accepit. Hefychio est ἀγέμων, *Æliano* ἀγίπιος Cursor, aliis Græcis ἰπποκράτης Eques. Major est Castaneæ parva, colore subalbido, pūctis subrubris consperso, & ut Pagurus, tornato. Soli obiectus totus pellucidus est, præterquam in ea corporis parte, quæ interanea continet. Oculis grano phascolinō habet maiores, quibus acutissimè cernit. Tibiæ sunt villis levibus obsessæ, utrinque quinque: quarum duæ anteriores brachia sunt forcipata, quibus cuncta cōplectitur: reliquæ graciles vnguibus rectis & obliquis variatæ. Huius generis fortè erit, qui *Rondeletii* *Cancer latipes* dicitur, nunc juglandis magnitudine aliquando paulo maiore. *Chelæ* habet denticulatas & articulatas, pedes utrinque quatuor. Postremus & minimus, qui in offeam latitudinem desinat, nomen Cancro imposuit. *Testa* est lævi, parte superiore albescente, quodammodo nigricante. Cum maris purgamentis in litus eicitur. Huic similis est quem *Bellonius* Græcis ἰπποκράτης, Romæ Grancetum vocari scribit. Punctis frequentibus cæcidis in tergo variatur *Ophitæ* modo. Singulares digiti quaternis constant articulationibus. Amphibii sunt, & in maximis ardoribus meridiano

tempore à mari egrediuntur, diemque, sub sole, trāsigunt, circa vespertim mare repetunt. Tanta velocitate ferri vidit *Bellonius*, ut ne unum quidem unquam cursu consequi potuerit: quin nec laertam ex ambrosia sub qua delitescbat exilientem, assequi eundem potuisse. Volare potius quam currere videbatur.

*Dromonem* Hefychii quidam in *Locus* maris æstuariis capiscribunt, sagittæque modo per aquas summum decurrere. Facit *Ælianus* quorundam mentionem, quos *πτερόπδια* a volando (*Gillius* legit *πτερίδες*) vocat, quod per parvis alis volatum exerceant, quibus curretes non utuntur. Potest ipsis *πτερόπδια* titulus, qui ex Cratete Comico ab Athenæo datur, tribui. Negliguntur in cibis propter exilitatem.

*Ælian. H. A. l. 7. c. 30.*

#### PUNCTUM V.

##### De Cancro flavo undulato *Rondeletii*, *Marmorato*, *Coridis figurâ*, & aliis *Chelarum longitudine differantibus*.

**C**ancer flavus undulatus, à colore & *T. A. B.* lineis, quæ in prona parte sunt *VI. 6.* noster undarum modo, non aliter *Aldrov. l. 2. c. 12.* quam Cameloto vulgò nuncupato, *c. 12.* nomen sortitus est. Pedes quaternos habet longos & hirsutos: Chelas duas magnas, etiam hirtas: Cornua duo satis longa: in fronte appendices duas, in lateribus alias. Capitur circa Antipolium & Letinum insulam.

*Cancer Marmoratus* fructu varius, quod *T. A. B.* testa sit lævi, ac perpolita, & maculis *VI. 5.* vitidibus cæruleis, albis, nigris, cinereis, Jaspidis instar & marmoris *Aldrov. l. 2. c. 12.* perspersus sit. Simortuus in sole exsicceatur, totus sit flavus, maculæ verò in mortuo statim evanescent. Forfices habet alius breviores & crassiores. Tubercula veluti gemmæ in eis eminent, ut in *Astaco*. Cornicula duo è fronte exrunt. Post oculos, qui satis à se distant, testa est serrata. In saxorum cavernulis degunt, & ita pedibus hærent, ut vix avelli possint. Crusta sunt cæteris

*peripatetis* *naupactio*, Romæ Grancetum vocari scribit. Punctis frequentibus cæcidis in tergo variatur *Ophitæ* modo. Singulares digiti quaternis constant articulationibus. Amphibii sunt, & in maximis ardoribus meridiano

exteris duriore. In faxis Agathenſis littoris degunt.

**TAB. VII. 4.** *Cancer cordis ſigurá*, Còrnua dno è fronte prominètia habet, brachia quoque duo brevi forſice, & quater-nos pedes. Pelagius eſt, & panagro ex alto mari cum piſcibus in littus pet-rabitur. In maiotum Aſellorù ven-triculis æpiſſimè reperitur.

**Aldrov. l. 2. c. 23.** *Cancris chelarum longitudine differen-tes*, vel ſunt Μακρίχελαι, vel Βραγχίχελαι. Chelis vel tenuib. vel craſſis. Μακρίχελαι chelis tenuibus, ſub Aranearum marinarum nomine apud Aldrovan-dum veniunt, & ſub tribus generibus exhibentur.

**TAB. VI. 7. 8. 9. 10. 11.** *Primum* eſt fulco & cinereo colo-re, parte priorè quæ caput eſt, acutum, oculis parum à ſe invicè diſtantibus, cornibus duobus acutis.

*Alterum* corpore eſt rotundiorè, quod ſub Aranei cruſtacei nomine venit.

*Tertium* magis rotundius, eolotè cinereo & fulco, chelis quàm priores craſſioribus, cui Aranei marini cru-ſtacei alterius in Tabula nomen in-ditum.

Differt ab his *Aranea marina*, cuius Ariſtoteles in Cancelli deſcriptione meminit. Formâ enim ſimilis araneis eſt, niſi quòd partem capiti & pectori ſubjectum araneo maiorem habeat. Brachia forcipata habere pro corpo-ris exilitate longiſſima Rondeletius addit. Μακρίχελαι craſſis brachiis, ſunt hirsuti & aſpeti, ut aculeati videântur. *Primus* eſt pronaparte corpore & pedi-bus albus, unde albicantis nomen. Chelis cærneis, ſupina verò rubet. *Alter* priorè minor colore nigricante, unde nigricantis appellatio.

**TAB. VI. 12. 13. 14. 15.** *Βραγχίχελαι* aliquot ſunt ſpecies. Ex quibus Rondeletii ex rubro nigricat, Chelis valdè brevibus ac tenuibus, pedib' proximis longiſſimis pro cor-porisatione, craſſis, acutiſſimis, lan-guine quâdam obducta. Frequens eſt in Lorino inſula.

Reliqui ſunt tennes & læves, ſupi-na pars aculeos habet. Ex his unus o-re eſt acuto admodum, & oculis à la-tere utrinque prominentibus, corpo-pote andiq; alpeto. *Minutior* dicitur.

*Congener brachichela* Aldrovandi la-genam craſſo ventre reſert, caudam ſudemas. Capite eſt valdè acuto, cor-pus parte ſupinâ aculeis horret, co-loteque eſt cæruleo, pronè albicat, forcipes Chelarum rubent.

## ARTICVLVS III.

*De Cancris ſtuviaſilibus.*

**TAB. III.** *Cancer ſtuviaſilis ſeu ſtuviaſis*, *καρκίνος ποταμίου* Græcis dicitur. Simeon Sethus & Galenus, Pagurum ſtuviaſilem vocavere. Eo à marino differt, quod ſit teſtâ duriorè & craſſiore; tibiis aſterioribus, brachius ru-guloſioribus, & cum marinus lividum loti corticis colorem referat, ſtuviaſilis ex ruſſo nigreſcit. Marino, præ-terea, ungues extemam tibiærum mul-taſculatione faciunt: ſtuviaſiles autem ſcraſinas in gyrum circa ungues ha-bent.

Fruſtra eos in Gallia, & Germania quæras. In Græcia, Creta, Sicilia, & Etruria inveniuntur. Bellonius in Atho Macedoniæ monte vidit, & in Ciliciæ rivulis, qui non longè ab Iſſo de-fluunt. Tanta aliquando corſibico-piâ, ut temporis momento mille capi poſſint. In Nilo habitare apud *Ælia-N 1. 5. c. 52.* num habemus.

**Vicius.** Sunt Sarcophagi, & cum invicem tãgunt, pedes ſibi arrodunt & vorant. Rondeletius cū ducentos Romæ e-miſſet, denique in aquam ut ſeſe reſi-cerent conieciſſet, ita inter ſeſe con-ſiſtati ſunt, ut plures quinquaginta mutilatos reperiret. Eorandè deven-tum eſt, ut omnibus necatis, unus tã-tum ſuperſtes fuerit. Ibidè ligonibus eſſoſſa ſcrobe vel paropſide capiun-tur. Juxta Epheliâ metropolim ſer-pentes, qui ex caverna quodâ egreſſi paludè tranare conantur, forcipibus atreptos interficiunt. Romæ in foro piſcario, filo appendi ac trajecti, pro-ſtant.

Eduntur omni tempore, ſed æſta- te ſunt meliores, & poſteaquam durū eorum exuerunt, magnatum men-ſis apponuntur. Lactè à quibuſdam ſuffocantur. Avicenna in hæctici fe-bribus cū aqua hordei valde probat.



*Limulus* *Günther*



*Cancer* *marinus*. *Walb.* *Tab. V.*



*Cancer*

*Stomatium* *Ravall.*

*Cancer* *Horadecticus* *Ravall.*



*Cancer*

*marinus* *Walb.*



*Hippuriscus*



*Cancer* *Horadecticus* *alt.*



*Cancer*

*Crabbe*

*Cancer* *Horadecticus*, *s.*

*Cancer* *Ravall.*

*Cancer* *Crabbe*.

13

*Pagurus* *fam.*

12

*Pagurus* *mar.* *Walb.*





*Cancer Melanocephalus* varus.

*Cancer Melanocephalus*  
*supinus*.

*Cancer figura Cancer*.

*Cancer parvus*  
*ovatus*.

*Cancer*

*Cancer*

*in testis*

*Cancer in Bucca*.

*Stylariae fuit canalis in Nerite*  
*concha*.

*Cancer Hirsutus Rondel. specier.*

*Cancer*


*ovatus*.

*Cancer oblongus*.





*Amphistoma marina.*



Tab. VIII.

*Cancer Horvathius luteus prae.*




*Cancer Horvathius luteus prae.*




*Stella*

*marina minor.*



*Testudo marina.*



*Stella marina trochus rotis.*



*Stella marina minor.*





## PUNCTUM II.

## De Cancellis.

TAB.  
VII.  
Nomen.

**Q**ui Latinis Cancellus, Græcis est *καρκίνος*, Oppiano *καρκίνος*. Plinius eum & Cancrum parvum sub Pinnotheris seu Pinnopbylacis nomine cōfudisse videtur, ut Aldrovandus ostendit. Gallis Eremita, Bernard l'Eremita dicitur. Eremitam, quod alios fugiens in testa quasi in solitudine vivat. Bernardum autem, quod vulgo in Gallia Bernhardus fatuos proverbio dicitur: hunc autem fatuam, quod crusta testis, chelas habens, quæ ad vitam tuendam satis esse possent, alienas domos in quibus latet, querat. Exactissime ab Aristotele describitur.

Aldrov. J. 2.  
p. 26.

Descriptio.

Arist. H. A.  
l. 4. c. 4.

Communis setæ est, ait Philosophus Crustatorum & Testatorum socius, quippe qui specie locustis simili spectatur, nascique seorsum per se solitus est. Verum quod testam deinde perit, quam ingressus est, hinc similis testæ cōtectis animantibus est: quapropter is in accipiti esse, genusque sibi vindicare utrumque videtur. Formitamen, (quod simplicius dixerim) similis Arapeis est, nisi quod partem capiti, & pectori subditam ampliore quam Aranei habent. *Cornicula* duo ruffa tenuia gerit, quibus oculi totidem subjacent, qui nunquam intro recedant, ut Cancrorum, sed semper eminentes appareant. *Os* sub iis est, quod veluti capillamentis pluribus circumdatur. *Is* pedes subijuncti duo, bifurci, quibus cibis ori admovent. Binisternæ utrique adhærent lateri, & tertius parvus. *Thoracis* pars inferior mollis tota est, dissectoque sine palidum intus cernitur. Meatus ab ore ad ventrem pergit. Foramen excrementi perspicuum nullum potest. Pedes ac thorax duritiem præ se ferunt, sed minus quam Cancri. Nexu nullo restis adhæret. Buccinarum ac Purpurarum modo solutus liberque vagatur. Omnes sinistram pedem crassiore dextro habent. Cum enim in testa circa medium corporis complicati vivant, quantum dextræ parti cōpressæ alimenti ac proinde incrementi

recedit, tantum sinistra libertati a laxiori accrescit. Bellonius addit, *Oculos* instar Astaci elatos habere, quos porrigit ac contrahit, maculis albis distinctis. *Dentes* ossiles. Ab ore *asphagus* tenuis ut filum ad stomachum protenditur. *Intestina* bis tantum revolvuntur: ac qui in eius stomacho viridis humor spectubatur, is in intestinis appareret candidus.

Tres ipsorum species Aristoteles facit. *Oblongiores*, qui Turbinem scilicet ingreditur, quæ qui Neritum. Qui in Narice degit, dextram bifurculatam pedem parvum habet, cum lævum grandiusculum habeat, eoque potissimum in rediatur. Ad tertiam spectare videtur, de quibus idem ita. Sunt inter Cochleas, quæ inter se bestiolas habent Astacis parvis similes, quæ in fluminibus gignuntur. Sed eæ differentia, ut præmollem intra suam testam earunculam habeant, formæ qualesnā sint ex dissectionibus contemplare. Nos hic ternas Icones damus.

Scaligero Squilla minima, Vascobus Civada, Pugillatim enim devoratur. Reperiuntur in pisciculis, pedes novissimos latiusculos habent, ut ad mandū utiles sint. In saxosis locis, cæno, & luto versantur. Ex eodem gigni credidit Aristoteles, sed perperam. Ad latera enim adhærent tanquam racemū aut globuli ova filo annexa. Et observatum est mares à feminis aperte distingui. Nari conchylas ingrediuntur; ubi excrevere in ampliores transeunt.

Arist. H.  
l. 5. c. 29.

*Psium* & in Cibis habent. Dorian enim apud Athenarum, in herpestes refert. Gescnerus, Coctum odorem colorem & saporem fluviatilis babuisse scribit. Bellonius non esse edulem, sed Julidibus, channis, Percis, & id genus saxatilibus gratissimum ait. Galenus eorum usum Mullos deteriores, & mali odoris evadere testatur: sed forte hoc de Cancellis, qui in spongiis, & qui quibus à fortis colore dicuntur, sumendum est.

Vfus.

Et tantum de Crusta-  
cels.

APPE N.

## APPENDIX.

*De quibusdam Crustaceis  
Brasiliensibus Cancris  
inprimis.*

## CAPUT I.

*De Guaja Apara, cancro  
maximo.*

TAB.  
IX.



**G**UAJA APARA, cancer maximus elegantissime variegatus. Corporis figura est Lunæ bissectæ similis, in latitudine habens tres digitos, in longitudine duos & semis (quamquam & majores reperiantur) Testa, ut dixi, lunata est, in utroque latere posterius exsecta, & in acumina desinens. Anterior pars testæ ultra medietatem coloris est obscurè brunni, & variegata maculis ex albo flavescens: posterior pars ex albo flavescit, striis brunnis secundū longitudinem ornata.

Pedes habet octo; singulos quatuor interno diis constantes, subrotundos, ex albo flavescens: brachia duo, quodlibet duos & semis digitos longum, & sesquidigitum latum, quodlibet parva forcipe præditum, quibus non ita arctè comprehendere potest, ut alii cancri. Est autem quodlibet brachium superius armatum & dentatum instar cristæ galli, ita ut quando vivus brachia corpori applicatis ca componit, uti aptissime potest, cristas duas galli sibi invicem appositae esse appareat. Tenacula repræsentant rostrum galli, brachium itaque totum rostrum galli cum sua crista. Brachia autem etiam ex albo flavescunt, & maculis brunnis sunt variegata. In aquis natans per os

aquam exsufflat, quasi ex fonte exsilit.

GUAJA alia species. Corpus rotundum, paulo oblongum, juglandem cum suo viridi cortice æquat, octo habet pedes cancrinos: duo brachia, quodlibet ferè duos & semis digitos longum, at exilia: in parte extrema corporis tres habet aculeos obtusos, & oculos planè exiles. Color totius corporis, brachiorum & pedum est albus: ac tota testa dorso egregiis maculis brunnis ordinatim distincta, in summitate majoribus, at in lateribus, minoribus. Brachia parvulis maculis ex ruffo purpureis sunt variegata: pedes albicant in totum, ut & venter.

GUAJA alia species quæ rarius capitur. Corpus ellipticæ figuræ, latum, tres digitos & totidem longum, aut paulo minus: testa est elliptica, in ambitu multis corniculis prædita, superius autem convallibus: ocelli parvuli, ut alii: in quolibet latere pedes quatuor cum quatuor juncturis, Crura subhirsuta, & in extremitate unguem nigrum corniculæ figuræ habentia. Anterior autem crus tres digitos longum, reliqua semper breviora unum altero. Brachiorum cum forcipibus, cujuslibet longitudo trium digitorum, crassities humani digiti, forcipes sesquidigitum longa & satis crassa. Ipsæ extremitates forcipis paulo plus sesquidigitum longæ, rostratæ & exterius versus dentatæ, quasi denticulis humanis, & ita aptè sibi invicem quadrantes complicatæ, quasi quis rostrum dentatum clauderet, in una tenacula forcipis, quæ movetur seorsim, in medio etiam est dens albicans. Color totius cancri vivi saturate rubens, ut pruna nostratia majora esse solent, in medio corporis saturatio, reliquis partibus dilutior: extremitas tencularum ruffi cum brunno mixti, ut cerasa nigra tingere solent. Coctus retinet colorem.

Guaia Apara.



Guaia

alia

species.



Cumoria.

Guaia

alia.



Circio Panama.



Voa Voa.



Guaia Mari.



Carara Voa.



Guaratumi.

Aracha de Aracha pinima



Cori

Apos.



Maracani.



Pohiquayaxe



Guaricaru



Pohiquya.



Pannacore.







## CAPVT II.

*De Guaia Miri, Carara Vna, Cunuru, & Ciccie Ete.*

**G**VAIA MIRI, cancetculus in salis fluuiis degens, nunquam excedit pruni magnitudinem; *testa* est ellyptica, anteriore parte in multos angulos desinente: *Ocelli* parvi, breues: *brachia* duo, dextrum paulo minus sinistro: *crura* octo, quatuor internodiis constantia, & brevibus pilis hirta: color *testæ* ferrugineus: brachiorum & crurum obscurè violaceo-purpureus. Pili crurum pallidi, inferius forcipum latus albicat.

**CARARA VNA** Cancet parvus, cuius corpus quadratum testet, cuius singuli anguli transversim abscissi, cæterum compressum, magnitudine semi digiti. *Oculi* prominuli, haud longi, nigri, in angulis abscissis consistentes. *Brachia* brevia, forcipibus obrotundis crassiusculis: *crura* octo haud crassa, sed compressa. *Testa* cum cruribus epatici coloris, seu instar hepatis testis: *brachia* itidem r forcipes brunni coloris, qualis succus cerasotum nigrorum: *Crura* minutulis pilis hic inde vestita, eiusdem cum cruribus coloris.

**CUNURU**, formella est *Vca una*, figura & colore conveniens, solum magnitudine corporis & brachiorum differt, minot enim est, quam mas, & brachia habet parva, brachio maris sinistro vix æqualia, sinistrumque paulo grandius dextro; raros quoque habet pilos, cum *Vca una* tota sit hirsuta.

**CICCIE ETE** Brasiliensibus: *Crangversinho des Manges* Lusitanis: corpus ad quadratam figuram accedit, & totum vix superat maioris avellanæ magnitudinem: *Oculi* prominentes longiusculi quos recon-

dere potest. *Crura* octo: brachium sinistrum ipsi maximum, non tamen crassum, forcipis tenacula tenuia & longa, æqualia, sine dentibus: dextrum brachium tenuissimum. *Testa* coloris hepatici: reliquum totum corpus cum cruribus obscurè flavum ex pallido.

Eduis est: & Brasiliani illo curant morbum, quem vocant *Mia*.

## CAPVT III.

*De Ciri Apoa, Vca Una, Guanhumu, & Aratu Pinima.*

**CIRI APOA** Brasiliensibus. Cancet marinus, *testa* quasi ellyptica testus, quæ in medietatis anterioris ora dentata, & in quolibet latere in acutum desinit angulum, mediocritis magnitudinis. *Brachia* habet duo mediocritia, itidem dentata: *Sex crura* & septimi & octavi loco posterius duos remiges planos, quatuor internodiis, circum circa pilos, quibus utitur natans. *Oculi* longè à se invicem distantes, parvuli, cylindracei, crassiusculi, non tamen longi & ad quemlibet cirrhulus eminet instar pili. Totius *testæ* color fuscus, seu nigricans, in qua diverso fusco cordis figura, alixque depictæ. *Brachia* fusca, forcipes ex cærulescente albescent. *Crura* ad medietatem internam viridi & albo mixta: medietates exteriores cæruleæ: remigum extrema pars, quæ lata est, cærulea, reliqua viridis & albo mixta. *Corpus* interius etiam cærulescit. Boni sunt saporis. *Ciri* ordinariè in fundo aquæ salis ambulant, interdum tamen ad littora prodeunt cum decremento maris, sed rarius. Capiuntur maris refluxu.

**VCA VNA** Cancet in palustribus degens, corpus eius ellypticum, superius convexum, juglandis cum suo cortice magnitudinem æquans

e vel

vel etiam superans. *Crura* habet octo, quatuor juncturis: anteriora lon-iora, posteriora breviora: *Oculus* haud longè distans, cylindraceos, haud longos, quos erigit & recondit, coloris pallidè flavescentis, pupilla hyalina. *Brachium* dextrum ipsi maximum, interius multis tuberculis acuminatis præditum, ut & foriceps: sinistrum parvum. Color *testa* superius olivaceus, flavo in extremitate intermixto. *Corpus* interius pallidè flavescit. Omnia crura & brachia castanei sunt coloris, forcipes etiam superius, cætera pallidè flavescentia una cum tenaculis. Crura omnia inferius vestita sunt copiosis pilis longiusculis obscurè castanei coloris. Carne sunt bona.

GVANHYMI. Cancet terrestris: corpus illi rotundum, sed paulum compressum, magnitudine Auriaci mali.

*Pedes* habet octo, quinque digitos longos, quatuor internodiis: *crura* longis pilis vestita: os magnum & ad latera oris utrimque latitudine unius digiti hirsutum, ut & corpus: *Brachia* duo, dextrum magnum, sinistrum parvum, magnum longum octo digitos, latum plus duobus: parvum vix quartam partem illius æquat.

*Oculi* bini, quos instar parvæ pilæ erigit, & iterum in longa cavitate abscondit: circa os quasi duo brachiola quæ recondere potest, & iterum depromere, & usque ad oculos deducere.

Celeritè curret, & quidem transversim, ita ut oculos ad latus convertat & brachium maius elevatum gestet. Maximo numero in silvis paludosis oberrant. Carnem habet bonam.

ARATV & ARATV PINIMA. Cancet terrestris, quadratæ figuræ, corpore haud magno, *testa* multiplici colore picta, brunno, cæruleo, albo, rubro punctatim variè intermixtis.

*Oculi* prominentes longè distantes, nigri, in angulis ostii positi.

*Crura* octo, quatuor internodiis, compressa, ruffa, ac per totum maculis purpureis, nigris ac albis distincta. *Chela* duæ non ita magnæ, æquales, ruffæ, in extremitate ex albo flavescentes. In ventre etiam flavescit. Crura raris pilis nigris vestiuntur.

## CAPUT IV.

De Maracoani, Potiqui-  
quiya, & Tamaru  
Guacu.

MARACOANI, cancel parvus, in locis ambulans, quæ refluxu maris sicca evadunt, alio enim tempore è latibulo suo non prodit. *Corpus* est ferè quadrato, digitum longo & lato, antetius tamen paulò latiori: *Oculi* prope sibi invicem apppositi, longi plus semidigito, tennes instar aciculæ crassioris, quos erigere & aptè in rima recondere potest.

*Os* habet amplum & maius quam cæteri canceli: *crura* octo, quatuor internodiis. *Brachium* dextrum illi maximum, tres digitos longitudine superans, satis crassum, & se totum post illud potest abscondere: foriceps autem brachii latior, haud crassus, referens forcipem sartorum, extuberantiis haud acutis loco dentium præditus, superficies brachii etiam parva tubercula habet: *brachium* sinistrum minimum, minus uno è pedibus, forcipula minima instar scorpionis.

*Crura* ratos habent pilos fuscos. Coloris est in *testa* fulvi, ut & in pedibus & minore forcipe, atque in inferiori corpore: extremitate pedum magis rufescunt. *Brachium* dextrum è fulvo obscurè rufescit. Est edulis.

POTIQUIYIVA Brasiliensibus. Locusta marina, Belgis Zeevrees. Longitudo corporis à fronte ad extor-  
tum

ortum caudæ septem digitorum, *cauda* sex: latitudo *testis* dorsi septem, *ventris* duorum & semis: totius corporis ambitus novem digitorum & semis: *cauda* ambitus quinque, quæ constat sex tabellis, septem juncturis sibi invicem appositis: & habet cauda ad quodlibet latus inferius quatuor pinnas, sesquidigitum longas, unam latas: extremitates laterales cuiusque tabellæ desinunt in cornu acutum: in quolibet latere quinque habet crura, quinque internodiis distantia, primum par crurum sex digitos longum, alterum novem, tertium pedem, quartum septem digitos, quintum quinque: Quodlibet autem unguem habet incurvum, acutum, pilis multis flavescens hirtum, instar penicilli pictorum: crus anterior crassitie digitum æquat, reliqua graciliora.

*Testis* corporis variè tuberculata, frequentibus eminentiis instar corniculorum rectorum, acutorum, anteriorum feret.

*Oculi* prominentes cylindracei, & post eos duo cornua surrecta anteriorum inclinata, digitum longa, ante oculos supra os quatuor cirrhi exortum sumunt, primo duo magni pollicis humani crassitie in exortu, ubi quatuor internodiis constat, longi sesquipedem & undique spinosi, inter hos duo minores, quatuor internodiis, teretes sine spinis, ac ultra medietatem bisecti, decem in totum digitos singuli longi.

*TAMARU GVACU*, Brasiliensibus: *Camaron de Salgado* Lusitanis. Locustæ marinæ species, novem digitos longa, velpaulo plus. *Capitis* longitudo duorum digitorum: versus caput magis magisque angustatur.

*Corpus* autem habet undecim quasi juncturas, quemadmodum cauda in Gammaris: in postica parte corporis ad quodlibet latus duos habet processus subhirsutos.

Totum corpus testum est crusta cancrina, albicante, splendente in-

star cornu politi, ad juncturas autem subnigricat aut purpurascit: pedes in quolibet latere tres, nimirum ad tertiam, quartam & quintam juncturam à collo numerando: exilia, duos circiter digitos longa.

*Caput* triangulate, olivæ magnitudine sub testa albicante splendida latet, duos digitos longa. Pone caput ad quodlibet latus habet brachium unum, septem digitos longum, quatuor juncturis constans, estque extrema pars brachii ab ultima junctura incurvata instar talcis maioris, & novem dentibus acutissimis prædita: his brachiis ferit, & qui vulnerati sunt, ægrè sanantur.

*Oculus* habet prominentes, oblongos: barbam cancerinam octuplam: prope oculos duas prominentias retractorum versas, digitum longas, læves, at in extremitatibus hirsutas: infra caput adhuc octo prominentias, duos digitos longas, quæ in extremo tuberculaverunt. Versus posticam corporis partem inferius multas latas quasi pinnas habet, quæ natationi haud dubio inserviunt, & quasi folia complicata ventri inferius adjaacent. Non comeditur.

## CAPUT V.

## De Paranacare &amp; Guari

## CIRRI.

**PARANACARE**: *Gammarus* in concha degens, haud edulis, tres digitos longus: brachia habet duorum forcipibus, crura quatuor longissima, nimirum tres digitos longa, & post hæc quatuor planè brevia: caudam sesquidigitum longam instar aliorum Gammarorum: oculos longos & prominulos: duos cirrhos pro barba.

Corpus tegitur testa obscurè castanei coloris: eiusdem coloris est

& cauda, nigris striis secundum longitudinem variegata, corpus infetius & exortus crurum & brachiorum interius cærulefcunt, uti & oculi & barba; per totum corpus habet pilos ochræ coloris.

Concha quam inhabitat fermè quatuor digitos longa, turbinata coloris pallide (subflavescentis).

Varix autem magnitudinis reperiuntur, planè parvulus, magnitudine minoris pruni, turbinaræ & variis tuberculis acuminatis præditæ, pallidæ, rufescentes, nigre, ad littus prope fluvium Paraiiba.

*GVARICVRV Brasilienſibus, GEMMATIVV vulgo GEMMATON ; quatuor digitos longus : erura habet ſex, tribus internodiis conſtans, cum unguiculo in extremitate : anterus pat crutum quaſi ſuras habet, craſſius reliquis & vicem brachiorum lungens ; paulo plus duobus digitis longum, ultimum paulo plus uno, omnia aculeata ſeu ſpinofa.*

*Cirrhos prope os prodeuntes habet sex; duos longissimos, nimirum tres digitos fingulos, versus posteriora relictos; duos unum digitum, & duos semidigitum: sub ore parva tenacula quatuor erassiuscula, & quatuor tenuiora, quibus cibum tenet. Oculi similes reliquis. Color totius fuscus. Cocti eduntur.*

[illegible]

HISTORIÆ  
NATVRALIS

*De Exanguibus Aquaticis.*

LIBER III

*De Testaceis.*

TITVLVS L

*De Testaceis in genere.*

**E**stacea quæ vulgò dicuntur, ea alii Testata, Horat.  
Testas testas, Cicero, belluas  
nativus testis adhaerentes,  
Palladius clausa maris animalia, Al-  
bertus testudines, plurimi Conchas,  
& Conchilia dixerè. Græci ὀστρεοὶ  
dignæ, ac si dicas testaceæ cutis ani-  
malia, ὀστρακα, quod apud Philosophum  
invenies ὀστρεα, ut Atheniens testatur,  
ἡ ὀστρεὸς ἐν τοῖς ἀνθρώποις καὶ τὰ ζώοντα, & Strabo  
scribit, οὐκ ὅτι ἐν τοῖς ἀνθρώποις, quod Em-  
pedocli tribuitur, ὀστρεὸς γάρ ἐστι, ὁ ὀστρεακός,  
ἐκ τοῦ ὀστρεὸς ὀστρεακός seu testaceos pilces,  
quod apud Suidam, ut illud apud Op-  
pianum legimus, ἡ ὀστρεὸς Ἡελύχιος &  
Varinus, αὐτὸν φερέτωσαν idem, ap-  
pellavere.

Partes corporis si spectemus, Omnis Deferi-  
bus testa intrus levis æqualisque ha- pua.  
beret, Caritatem quam Græce spon-  
dylum, Latine callû dici Hermodas  
author est, quam Lunæ incremento  
augeri prodidere quidam. Terenti-  
us illud quod continet & conservet for-  
is est, hoc calorem leviculum, quia  
sanguine carent, tanquam furnulus  
fovet & conservat, & testa dicitur.  
Non mutant eam, tum quod non mo-  
veatur, tum quod non siccetur. Oculi  
habere negat Aristoteles, Plinius  
Arifl. N. A.  
movere etiam scribit. Dentes ipsi pri- h. c. g.  
mores, & carnosius illud quod propor- Pim. Appl.  
tionatur ad sentiendû cibum caput o- 136.  
mnib. infra, plantar. modo. Stomachus  
ori cõtinuò jungitur, isq. p. portione  
magnit.

magitudoinis exiguus. Hunc excipit *venter*, in quo & *papaver* dicimus, (*μ. α. α.*) situm. Mox intestinum continuum tendit simplex, originem à papavere illo ducens. Excrementū illud quod papaver dicimus, continenturbinata omnia sua clavícula, univalvia fundo, bivalvia qua nodo ligantur. Laborant omnia per frigus, & æstum arque exuperantiam temporis pari nequeunt. *Nutrientur* more plantarum per poros, & quidē humore dulci, si Aristoteli credimus. Idcō eis anni pluvij profunt, Purpuræ si excipias. Movenitur omnia parte dextra, non ad vertiginem sive claviculam, sed in adversum.

*Differantia* quod spectat, mira in ipsis naturæ ludentis varietas. Tor color, differantia, rot figuræ, planis & concavis, longis, lunaris, in orbem circumactis, dimidio orbe cæcis, in dorsum elatis, lævibus, rugatis, denticulatis, striatis, vertice muricatum intorto, margine in mucronem emissis, foris effuso, intus replicato, jam distinctio virgulata, crinita, crispata, cuniculata, pectinata, imbricata, undata, cancellata, reticulata, in obliquum, in rectum expansa, prædensara, porrecta, sinuata, brevi modo ligatis, toto latere connexis, ad plausum apertis, ad buccinum incurvis. Rondelieri eas brevissimè complexus est. Alia ab aliis testæ duritia superætur, ut pulmones, Holothuria, Echini, longè minus dura testa conteguntur, quàm Purpuræ & Buccina. Alii undique circumtegiuntur, ut nihil interioris corporis habent, aliter parti testæ loco est scopuli pars cui hæret. Chamæ & Dactyli sive Solenes utriq; extremis non integuntur, per quæ caput & posteriorcm partem exerunt. Eorum quæ undique integuntur: alia turbinata sunt, ut Purpura, Buccinum, alia turbinata non sunt, ut conchæ, quæ a Gallis Porcellainos vocantur. Alia unica cōcha cōstāt, ut Lepades. Alia duabus, & Mytili. Testar. alia læves, ut Unguiv, Mytilorū. Aliæ asperæ, ut

Purpurarum, Buccinorum, Ostreorum, quarum rursus testarum, permagna est in asperitate varietas, quæ in singulis declarabitur, &c. Nos ea brevissimè in Turbinata, Turbines, Bivalvia & Univalvia distinguimus. *Locus* ipsis mare, quod ita amant, ut apud Ægyptios maris symbola conchyliis haberentur. In mari rubromira quadam magnitudine augentur. Bibacta iisdem referre est, ut & maris Ægei & Laconici littora. In montibus & remotis procul à mari locis reperiri, nullum dubium. Causas alibi inquiremus. Ad *Temperiem* spectat, quod plurima eorum algore & æstu lacerant. Limacis hyeme, Purpuræ & Buccinæ canis exortu tricenos circiter dies eonduntur. *Æstate* ramen potius plures vigent, Piressem Euripum si exceperis, in quo non minus hyeme probantur, quod tum, piscibus alio migrantibus pabulentur ubetius.

De ipsorum *Generatione* accuratissimè Aristoteles in libris generationum egit, eoq; res redit, ut omne genus testatum sponte otiri pronunciet. — Apertum, inquit, id hinc est, quod navigiis putrescentibus, læce spumosa adnascuntur, & locis multis ubi nihil tale aderat ante, post per inopiam humoris facto cœno, Ostrea prodire: ut apud Rhodum insulam, eū classis appheussit, & sic illa proieccta essent, in mare, repore post cœno obducto testis. Ostrea in eis reperiebantur. Nihil autem partis genitalis emitti ab eis, argumentum est, quod cum Chii quidam ex Pyrrha Lesbii insulæ Ostreas vivas portassent, & in loca quædam maris reciproci ætus, & luto similia dimississent, plures nihilo fucere temporis spacio, quâquam incremento corporis plurimum profecerunt. Quæ autem ova vocantur, nihil ad generationem confertunt, sed indicium suot nutritionis melioris, quale in sanguineis pingue est: quamobrem sapore per id tempus præstant, ciboque laudatur. Quæ de Conehis Elianus scribit, in speciali historia adfateamur.

Generatio.

Arist. Gen.

A. 1. c. 11.

Arist. H. A.

L. 5. c. 14.

Statg.

Videtur.

Arist. H. A.

L. 5. c. 1.

Arist. H. A.

L. 5. c. 20.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Sensus.

Sensus eis Plinius adimit, tribuit Aristoteles. Purpuris escas putidas Purpurarii emoli. acceduntq; odore sine dubio illectæ ad ipsas. Ungues ad strepitum se subtrahunt, inscriusque subsidere cernuntur, quoties ferramentum sentiont admove-ri. Exiguo namque extant, reliquo autem toto corpore periode ac in cubili occiduntur. Nariæ qui capiunt non adverso, sed secundo flato adeunt, quoties escam persequuntur, nec voce ulla sed silentio agunt.

Antipa-  
thia.

*Antipathiam* cum tonitru habere creduntur, & adhærescentis tempestatis signa sunt.

Vfus.

Adeo olim in *Cibis* adhibebantur, ut inde conformatum sit adagium, coochylia viduarum cupedias, & Plinius, luxuriz matrem Conchylia-  
orum, precia margaritis propemodum æquale, quæritur. Commune omoibus salum quodam in sua caroe succum habere, quo al-  
vum ciero nata sunt: quod si probè assentur, maximè tum salsa evadunt, ut quæ sucum jam habeant ab igoe veluti succentum, & propè dixerim, absumptum. Mollitie tamen & duritie operationis variatur eventus. Venerem invirare certum, unde eam Concha Cyprium vestam quidam, aliæ concha oatam voluerunt. In *Medicina* quoque locum invenisse in specialibus dicemus.



## TITULUS II

De Testaceis in specie, & primo de Turbinatis in genere.



UPERIORE titulo Testaceorum omne genus, in Turbinata, Turbines, coochylia bivalvia seu *dyvya*, & *mondyva* seu univalvia distingimus: Turbinata vel in genere, vel in specie considerantur. In genere della Turbinata sunt illa, quæ cumque in volutas

& canfractus seu spiras, quales in prælis & torcularibus visuntur, Testas suas quoquo modo ressestunt. Græci *sephalæda* vocant, Gæsteras *dyvya* quoque dici posse putat, quod *dyvya* voceot, quas diximus, volutas. At Rō-  
deletio *sephalæda* in genere pto omnibus Turbinatis sumitur, Turbo autem est id quod ex amplo & lato paulatim in mucroem definit, cuius si urz est & Turbo lusorius. Proprium illis est testam habere continuam totam & unicam. Si externa spectemos, si interna considerentur, quodammodo similem naturam nata sunt omnia, magnitudine autem distant & aliis affectibus qui excessu comparantur. Quædam enim quæ maiora sunt suas quoque partes conspectiores habent: mioora autem minus: sic etiam duriora & molliora, & ejusmodi alia alii. Nam quæ caro summa à testæ ostio exorta est, eam quædam firmiorem quædam solutiorem habent. Ex eius medio caput est & cornicula bina: in majoribus proceriora, in minoribus minima. Eximendi capitis eadem omnium ratio, & perterrefactis contrahendi. Habent quædam os & dentes, minutas, tenues. Quædam etiam muscarum more habent *proboscidem* linguæ specie. Hæc dura est buccionis & purpuris. Nam quemadmodum Tabani & asilus tergora quadrupedum percundunt: ita his tanta est duritia, ut escarum testas perforent. Subest ori statim venter similis avium ingluvie, qualis est etiam umbilicis. Infra duo candida quædam, firma, specie *mammillars*, qualia in sepiis inveniuntur: sed hæc solidiora. A ventre gula duplex longa ac papaver usq; quod in fundo est. Quæ omnia perspicui possunt, in sinu vorticoso testarum. Quod gula jungitur *intestinum* est, à qua, continuo tractu settur totum simplex usq; ad exitum, iocipi eas à vorticoso sinu quo papaver continetur, atque inde laxiorum. Est autem papaveris magna pars quasi excrementum in omnibus ostraceis. Inde intestinum reciprocans rursum ascendit ad carnosas partes, atq; circiter caput





*Polypos.*

*Nautilus.*



*Testa Nautili.*

*Nautili Structura.*



*Purpura.*



*Purpura.*



*Testa Nautili.*




*Buccina.*



*Cochlea rugosa.*



*Murex aculeatus.*



*Strombus magnus.*



caput terminatur, quæ emittitur excrementum omnibus turbinatis tam terrenis quam marinis. Hucusq; Aristoteles. *Crescere* ut vermes, scilicet anfratribus, qui subinde accrescentes plures efficiuntur in partem priorem, quod caput vocatur, expetentia docuit. *Serpunt* parte dextra non ad claviculas, sed in aduersum. De *Congressu* in speciebus dicitur.



## TITVLVIII.

## De Turbinatis in specie.

## CAPUT I.

## De Turbinatis in anfractum tortis.

## ARTICULUS I.

## De Nautilo.

TAB. X.  
Aldrov. l.  
3. c. 3.

Arist. H. A.  
l. 4. c. 2.

Differen-  
tia.



**N**UUM sunt Turbinata apud Aristotelem generum, velenim *Nautilus* habent, vel sunt *Conchopoda* seu in globum circumacta. Ex illis sunt *Nautilus*, *Purpura*, *Buccinum*, & *Conchylum*.

*Nautilus*, quem Suidas *ναυτελος* alii *ναυτελος* & *ναυτελος* vocant, vulgo *Nautilus* dicitur, & cum *Nautilus Athenas* idem esse videtur. A modernis Græcis *ναυτελος* *ναυτελος* vocari Robertus Constantinus auctor est.

Arist. H. A.  
l. 4. c. 2.

Duo ipsius apud Aristotelem habemus genera. *Primum* est, cuius testa pedunculo similis est, cava, neque ei connexa natura. Is prope terram pascitur sæpe numero: quate à fluctibus eiicitur in aridam, ubi delapsus de concha, aut capitur aut in humo perit. Hoc genus pusillum est & simile bolitænis: quæ Polypi spe-

cies est. *Alterum* in testa tanquam limax est. Is ex ea nunquam exit: sed interdum brachia exerit. Illud respicit Plinius cum dicit. Inter præcipua miracula qui vocatur *Nautilus*, ab aliis, *Pompilos* (potius *polypodis ovum*) *Scipinus* (verius *pronus*) in summa æquorum, pervenit, ita se paulatim subrigens, ut emissa omni per fistulâ aqua, velut exoneratus sentina, facile naviget. Postea prima duo brachia retorquens (potius attollens ex *Athenæo*) membranâ inter illa mixæ tenuitatis extendit. Quæ velificante in aura cæteris subremigans brachiis, media cauda, ut gubernaculo se regit. Ita vadit alto, *Liburnicar*. ludens imagine, & si quid pavoris interveniat, hausta se metens aqua. Eundem exactissimè *Bellonius descripsit*. Concha, inquit, tribus fragmentis constare videtur (carina scilicet & lateribus, cum tamen una & simplex sit) quarum latera utrinque cæu carinæ iunctæ apparent, ea ut plurimum magnitudine, quam ambæ manus amplecti possent: latitudine autem quantum pollex cum indice comprehendat. Omnes autem non excedunt crassitudinem membranæ pergamenz, striilq; in oblongum ductis, adoras crenis laciniaz sunt, in formam rotundam abeuntes: foratam autem per quod *Nautilus* alit atque exit de *Concha*, magnum est. Fragilis hæc lætæ coloris, lucida, admodum polita, omnino navis rotundæ effigiem referens. Navigat enim per maris summa, elatus de imo gurgite offereque se testa inversa, ut facilius ascendere posset, & inani scapha enaviget, atque ubi inde emerterit, tum concham invertit. Cæterum *Nautili* brachiis interjacet membranula, qualis est inter palmipedum digitos, sed hæc magis est tenuis, in telæ aranæ modum, robusta tamen, quæ etiam aura inspirante velificat. *Cirra* quos utrinque multos habet, pro gubernaculis utitur, atque ubi metuit, tum concham protinus marino humore oppletam demergit.

*Alterum*

Plin. H. N.  
l. 9. c. 29.

*Alerum* Nautilum, Cochleam margaritiferam Bellonius vocat, & videtur eam Fauconerius describere, cum in Epistola ad Gesnerum ait, suum Nautilum, testā habere interna parte ita nirentem, ut cum unionibus preciosissimis de coloris amœnitare certare posset, Bellonius enim suæ illius cochleæ concham, in magno apud artifices Gallos, ad vasa ditioribus abacis accommodata conficienda, precio esse, & *Porcellanam* ob id vocat scribit. Fauconerius multa in sui Nautili testæ carinata tabulata, eodem amœno colore nitentia, fuisse prodit. Hinc facile colligas eundem cum eo esse, quem à Grecis *Πολύθαλαμ* vocant, id est, polythalamū dici scripsimus. Plin. cū de Nautilo paulō ante dixisset, mox tanquā de altera eius specie. Navigeram similitudinem, inquit, & aliam in Proponitide visum sibi prodidit Mutianus. Concham esse acatii modo carinaram, inflexa puppe, protra rostrata: in hanc condi Nauplium animal Septæ simile, ludendi societate sola: duobus hoc fieri generibus. Tranquillo enim, vectorem demissis palmulis ferire ut remis: si verò status invitent, eosdem in usu gubernaculi, pandique concharum sinus aure. Huius voluptatem esse, ut ferat, illius, ut regat: simulque eam descendere in duo sensu carentia: nisi fortè tristi (id enim constat) omne navigantium humana calamitas in causa est. Cardanus quoque cuiusdam cochleæ meminit, quam India mittit. Est, inquit, forma triremis cum alta puppi, in qua vasculum aliud, diceres poculum à natura excogitatum. Nam & magnitudo tanta eius quam vidi, ut cotylam capiat.

Res profectò usus elegantissimi & pulcherrimæ formæ.



## ARTICVLVS II.

## De Purpura.

**P**urpura Græcis *μαργαρίτις*, Plinio a Tab. X. liquando Pelagium, Politiano echa Merculea, quod tinetur Hercules author credatur: Serapioni Pulpia, Brasavolo Antale dicitur. Qui cum Conchylio confundunt, à Plinio refutantur. Distinguit enim iste, & expresse apud eum legimus. Conchyliæ & purpuræ omnis ora attecit, quibus eadem mater luxuria paria penè etiam margaritis fecit. Nec minus illi, qui Conchylium idè cum Buccino ponunt, quod Plinius cum duo tantū genera Turbinator. continentium florem illum tingentis vestibus adeo expetitur poluerit, alterum Purpuram, alterū Buccinum esse, necesse videatur. Eodem enim libro hæc verba extant. In Conchyliata veste cætera sine Buccino, præterque iustemperaturæ aqua pro inviso potus humani excitemento. Concham ex Turbinatorum genere esse Aristoteles prodidit, & aliquot ipsarum genera agnovit, ut circa finem dicemus.

*Descriptionem* si spectes, sæpe ovi est magnitudine, aliquando major, nisi elevata & aculeis munita esset, & capulo, nālè ad latus qua linguam exerit haberet. Rugata eadem, aspera, cinerea, aliquando flavescentes, aliquando ex viridi cinerea, intus luteo colore. Rostro est longotubuli modo excavato: Cornua Limacum more attolit, atque eodem modo serpit, usdem cornibus iter sibi præterendit. Linguam ex tubulo illo canaliculato in latere procurrentem habet, quæ callosæ huic parti adhærescit, cui caro ipsi testæ adiungitur. Est autem earo, musculus quidem fortis ac candidus, mediæ testæ alligatus, quo Purpura tanquam congenito quodā operculo, carni patulæ opposito, diutissimè extra aquam vivit. Marinam enim aquam haustam asservat, quæ pluribus diebus refoveatur ac sustentatur. Caput illi cartilagineum ac durum.

Plin. H. N. l. 9. c. 30.

Tab. X. s. 6. et. Nomen.

Plin. H. N. l. 9. c. 35.

Plin. H. N. l. 9. c. 36.

Plin. H. N. l. 9. c. 36. Descrip.

durum. Or in ea parte quas copulis  
hæret, rotundo foramine pervium,  
quo lapides arredit, & in stomachum  
exugens demittit. Hæret quoque habet  
viscidum, tenaci quodam lentore  
præditum, ut penè viscum esse ap-  
pareat. Sed hoc quod de hepate, brâ-  
chiis, & corde, Bellonius scripsit, pro  
fabulosis censet Rondeletius.

Et hæc quidem recentior. Descriptio est. Ut vero & veteres videamus, Clavaram Plinius facit Purpurinam Turbinem usque, aculeis in orbem septenis ferè, qui non sunt buccino. Testam intortam curculatim in crepidinem desinere, apud Aristotelem extat. *Partes* illæ quæ Diofcoridi secundum Hermolaum *anthon*, aliis *idron*, quod violam significat, partes sunt interni Purpure corporis medix, fibratæ, torosæ, & firmæ, circa quas testæ volumina capreolorum ritu circumvolvi incipiunt secundum Diofcoridē: vel quibus hæret vena illa vel membrana illa florea Purpurar. continens, inter *papaver* nempe quod turbinata omnia sua clavicula continent, quod est inferiore loco, & cervicula seu collum superiore loco.

De eo flore seu succo ita breviter Aristoteles. Inter papaver & collum florem continet, textura densa, colore candida membranæ, qua ablata & compressa manus flore tingitur. Hoc ipse flos videtur esse: reliqua concretio, quasi alumni. Id Plinius florem in mediis faucibus habere dixit, liquoris eum esse minimi in candida vena, unde pretiosus ille bibitur, nigrantis rosæ colore sublucent, reliquū corpus sterile. Rondel. partem succum continentem, cordi proportionē respondere existimat, florem, sanguinis loco esse. *Cere* earū penitus includitur, nec ulla ex parte, excepto capite conspicitur, ut apud Aristotelem habemus: Testa sua adhæret. *Lingam* durum habere, eamque testas eicarum perforare, non tantum ab Aristotele, sed & Plinio, qui longitudine digitali facit, & Æliano proditur: Rondeletius promiscuis muscarum que inter cornu

comparat, & firmam, torofam, quæque  
exeri possit, concedit: sed tam durâ  
esse ut testas perforet negat, rostro  
id fieri verifimilius addens. Qui  
*quædam*, seu *quædam* *viscositas* apud Ga- *Galen. l. 1.*  
lenum, pro tomento purpurarum, *de Medic.*  
pro depexo & confuso in medicame- *secund. loc.*  
ntes veteres uterunt, sumunt, vehe-  
menter fallūt. Lanx n. purpura tin-  
ctæ crassior & minus curata pars est,  
cuius & Dioscorides meminit. *Opera-*  
*culum* varia apud authores sortitū est  
nomina. Plinius purpurarum cavum  
dixit, Aristoteles *καύωμα*, *σπινθώωμα*, Ga-  
lenus *μύμη* vocavit. Alii *βυζάντιον*, *βυζάντιον*  
vel *βυζάντιον*, à Byzantio vel Byzantio  
Africa nominant, & longè verius  
quàm illi, quid nomen ori narium  
purpuræ adscribunt, quas non habet,  
vel qui blattas Byzantias buccinorum  
& Conchyliorum permixta opera-  
cula appellant. Galenus Indici  
conchili testam inter ostraca & tes-  
tas purpurarum & muricum genera-  
tim comprehendit. Nec negandum  
fortè est, Conchylii, buccinæ & pur-  
puræ opercula, nec subslantia, nec vi-  
ribus differe, nisi forte unguis odora-  
tus differentiâ supponat. Nam blatta  
Byzantia dū uritur ingrati est odo-  
ris, & castoreum redolet: unguis ve-  
rò, suavè odorem spirat. Potest tamè  
& id quod *μαύρη*, Græcis dicitur, gra-  
vis apud Latinos odoris esse, & in  
quibusdā locis ungues odoratos, te-  
tidos in aliis reperiri. Ut ut sit, Car-  
ni hæret operculum purpurarum ut  
unguis noster. Ex filis seu fibris co-  
agmentatur, & quia pinguedinis ali-  
quid in se habet, fumum cornu mo-  
do accensum emittit. Et hæc qui-  
dem de partibus sufficient.

*Flori, qui & succus Plinio, in aethiopia*  
*maficis, Græcis, varia indita sunt no-*  
*mina. Vitruvius ostrum dixit. Sori & i-*  
*regia, cui Virgilius Sarrani epithetō,*  
*à Sar urbe Phœniciz, quæ postea Ty-*  
*rus, unde purpureus color & Sarrani*  
*addidit. Nec tamen omnis Purpura*  
*ostrum, ut tradit Gellius, quamvis o-*  
*mne ostrum purpura sit, quod exu-*  
*berantiam splendoremq; ruboris ha-*  
*bet, hoc est, illustratur splendore, quo*

*Flor. Pur-*  
*puræ.*  
*Vitru. l. 7.*

Phy. H. N.

49.5.26.

Alan, 2

A.7.6.4

minutæ oriuntur atq; concreſcunt, quæ bērentes purpuris capiuntur, aliquot etiam inchoatæ tantū. Quod ſi ante partus tempus capiuntur, in iſtis ſtoreis non tenerē pariunt, ſed in eundem locum conventu factō quēadmodum etiam in mari: Unde per cratium anguſtias quaſi racemī prodeant. Celerrime inter teſtacea creſcūt.

Ætas.

Sex annos vivunt, & ſingulis annis incrementum earum per orbem patet, quibus totidem quot annos habent, teſta claviculæ in intorta in crepidinem deſinit. Parum progrediuntur, & ad eſcas à longo accedunt, quòd odoratu valeant. *Tinctura* ratio alio ſpectat. *ſum in Cibus* præſtant, & hoc cum oſtracodermis communes habent, quæ ſaltem ſuccum continent, eodemq; alvum ſubducant, carne autem ſunt dura. Athenæus ex Hicelio papaver copioſius alere ſcripſit, magis tamen Scillam ſapere. Colla ægrè confici & difficulter ſecedere excrementum facile, partes extremas aptiſſimas eſſe, & ſeu elixas ſeu aſſas humori ori gratum & ſtomacho ac modū emittere, Xenocrates prodidit. Peculiare eſt eis quòd coctæ iuſculis ſpiſſent. Nec à *Medicina* excluduntur. Contra venena prodeſſe, docuit Plinius, contra Doryenion Nicander. Saliva recentia vulneca agglutinātur. Callus pro ſe operiuntur tuſos glutinat nervos præciſos, Teſtæ cinis puſtulas, verendorum è melle diſcutit, ad dentiſſicia cum roſis & caryophyllis uſurpatur, Cū pulvere glycyrrhizæ, papaveriſq; ſemine, cremore hordei pauco vino albo pulmonib; auxiliantur, & fluxiones ſiſter. In pollinē redacta ulcerib; malignis cōperit. Cum melle illita, pilos attenuat. Filum è purpura quo vipera cervici circūpoſita ſuffocata fuit, collo circūdatum tonſillat. affectus tollit. Aëtius verò purpuram hircinio ſelle madafactam & mulieri umbilico diebus ſeptem impoſitam conceptum juvare tradit, ſi deinde creſcente luna cum viro congregiatur.

Uſus in  
Medicina  
Plin. H. N.  
l. 32. c. 6.

Plin. H. N.  
l. 32. c. 10.

Differe-  
ntia.

*Differentia ſeu genera*, ſi quas, ſunt *Magna*, quæ ad Sigæum & Loctū Idæ promontoria giuntur, *Parva*, quas

Euripus fert & Catia. *Pelagia* quæ magnæ & ſcabræ, quarumq; ſtos magna ex parte niger, ſed nonnullis puſillum rubidus. Nonnullæ ad prætiū minx evaſiſſe, prodidit Ariſtotel. *Littorales* quæ parvæ, & ſtore ſunt rubro. *Echinata*, quæ vel pluribus ſpinis maximè in poſtica parte horrent: vel rarioribus, minoribus, & brevioribus. Illæ extra modò ſaveſcunt, modò cādicantintus, modò violacei ſicut coloris modò rubicundi. Iſtorum tota turbinata pars rubicundo colore conſpicitur, dorſum verò partim rubet, partim viſceſcit. Anterior mucro acutus non eſt, ſed notabili latitudine ſpectabilis. Intus colore ferrugineo, ſaveſcente ac eleganti cæruleo variant. Sunt & *Rubra*, ut in Auſtrimis partibus. *Nigra*, in Aquiloniſ; *Livida*, in Occidentalibus & Orientalibus. Marmoreæ qualiſ eſt illa longis undiq; tuberibus, ubiq; ſerme duplicibus at minimè acutis ſed obtuſis plena, labro latiſſimo, quaſi canaliculato, binx enim id foveæ percurrunt, tota ſerè marmoreæ duritie, undiq; candida, præterquam in extremis foraminis oris, quæ purpuraſcūt. Ad hanc pertinet tota ex cinerem candida, minor quàm priores omnes labro ſubtus ſpinofa, cum alioquin nullè in toto corpore ſpinæ dentur. Vêtro eſt plene ſeſſili, ſeu non turbinato. *Pentadactylū* deniq; qualiſ eſt illa quæ ſuperius deſcripſimus. Geſneri quæ ex Adriatico mari accepit.

## ARTICULVS III.

## De Buccino.

**B**uccinum à ſimilitudine potius <sup>TAB. X.</sup> buccini quo ſonus editur, rotunditate oris in margine incifa, ut Plin. viſum dicitur. quàm quod vel buccis admodum ſonos muſicos edat, vel buccas inflare tubicines rogat, ut Bellonius voluit, Gillius maſculino genere extulit, quidam etiam dentale buccinū interpretantur. Græcis hodiernnis *ginn* dici Geſn. autor eſt: nonnullis *giphet* & *giphetæ* idè ſignificant. Cōmuniter *nipet*, fortè à cera, quam mucro ſimilem mutuo attritu ſalvant, q; Græcis eſt *vacina* vocatur quod

plin. H. N. quod vocabulum ex antiquis Græcis nonnulli pro purpura sumpserunt: Plinius nonnunquam muricem trāstulit Athenæus purpuræ filium nominat.

Descriptio.  
† Arist. H. A. 4. 4.

Testa regitur scabra, eaque congenita promuscicidibus, ut musca instruitur, quod membrum linguz effigiem præ se fert. Venteros protinus excipit, similis in umbilicis ingluviæ avium. Infra duo candida quædam firma specie mammillati, qualia in sepiis inveniuntur: sed hæc solidiora. A ventre gula duplex longa ad papaver usque, quod papaver in fundo est: quæ omnia perspicui possunt in sinu verticoso restatum. Quod gulæ jungitur intestinum est, à qua continuo tractu ferrur totum simplex usque ad exitum, incipiens à verticoso sinu quo papaver continetur, arque indelaxior. Papaver verò pars eius ima esculentaque est. Inter hoc & cervicem flos est, sed, ut Plinius dicit, dilutior & minus floridus. E hæc de Buccino veteres. Bellonius Buccini concham ut plurimum minimi ovi magnitudinem non excedere, strias in tergore quinas habere, ut nerita, plerisque in gyrum tuberculis obtusis, brevibusque obseptas, multo quam in purpura frequentioribus, sed ubi in claviculum desinunt, unicum tantum eam comitari testatur. Interna parte incisam oris magnitudinem habet turbinum modo, & canalem ad latus, per quem linguam exerit, purpurarum modo: eodemque operculo contegitur, qua etiam turbinata omnia, ne in testas contracta ab externis offendantur. Color testæ intus lacteus foris fulvus, tantaque magnitudine aliquando crescit, ut ad Carream purpuræ & buccinæ decacotyli, id est, decem eotylorum capaces reperiantur.

Locus. Locum si species, petris adherent, circaque scopulos leguntur. Canis exortu circiter tricenos dies latere scripsit Aristoteles, quod Plinius de muricibus accepit. Annos circiter sex vivere, idem tradidit.

Generatio. Idem ipsi *Gignendi* modus qui purpuris. Semen ad generationem

nullum habent. Favificate in more eispositum. Ova sub lapide prona parte oblonga albaque, deinceps pendentia disponunt, quæ ita disposita favi nomen habeat ab apum similitudine. Supini autem sub lapide stabulantur, cum favificant: quo verò tempore favos exstruunt, si incoquantur & abscondantur, ova intra continere comperientur: quæ salverio lentore lapidibus & cautibus fertuminant, ut inde decidere non possint: quod tam magno artificio constituunt, ut nihil coacervatum esse videatur.

De earum in *Cibum* uso, hæc scripsit Xenocrates. Buccinæ sunt duriores purpuræ & magnitudine ac loco differunt, triplicemque vires habent, testæ, colli, & excrementi in testa contenti. Nam scabra substantia piscis alvum sistit, ac præcipue si assetur: contra magis facit elixa.

Collum earum alvum sistit, difficulterque concoquitur: idcirco ex sinapi vel aceto, aut liquore, aut pipere corrigere ipsum debeat, qui eodem vescuntur. Aqua denique quæ ex eis manat, calefacta, ventrem subducit: Cum eo verò excremento quod testa continetur, cocta, magis gilva fit, & piscis qualitatem præfert. Si verò totæ decoquantur, maiorem sistendi vim habebunt, & sicim offerent. Quidam verò eas elixas lævigant, & æquæ ac urticas condiunt, huncque origratæ. Luna exoriente plenæ, & æstate graciles. Eadem apud Dioscoridem, Galenum & Diphilum invenite licet.

Habent & in *Medicina* usum. Cardialgia laborantibus in cibis præscribit Trallianus, purulentis etiam, si falsus humor est. Ad alopeciam, usta, trita, & in oleo veteri subacta, & ad glutinis crassitudinem redacta à Myrepho vehementer commendantur.

Galenus ad ophelidas & lenticulas, in furno assæ & ex melle trita commendat. Andetnacus ex succo limonium detrita ad genus mulierum deal-

Vsin  
Medicina.

de albandas deprædicat, præsertim si aliquid argenti vivi sublimati, in eodem inieceris. In Belgio contra tussim inanam inprimis & puerorum, potus ex buccino propinatus.

Differen-  
tiaz.

*Differentias* quod spectat, Rondeletius duo reperiri scribit, parvum, nempe, lineis frequentibus aspersum, & alterum ei simile, nisi quod lineas prominētiore habeat, & transversas, ut stitiatum merito dici possit. Est & testa spissiore durioreque, nec non genus magnum coloris violacei, sed cuius orbes flavescent, & in ore candicant. Gesnerus se & aliud vidisse scribit, purpureæ similis, figura & magnitudine propius, tuberculis undique dispositis, deinceps rotundis scite omnino eleganterque *exilis* elevatum; nec in mucronem adeo expositum, sed capite obtusiore brevius. Mistā & Aldrovando peregrina, colore & duntaxat marmoris, circulis rosas æmulantibus.

## ARTICVLVS IV.

## De Murice.

TAB. X. & XI. **M**urex modò Buccinum, modò Purpuram significat, taceo colorem purpureum, cui Muricis nomen imponitur. Hic pro testaceo sumitur, quod & turbinatum & longos firmosque aculeos habet, nomenque ab asperitate muror. fortitum est. Perotus inter ostrea enumerat, propter scabritiem corticis. Sed alia in Ostreis asperitas, alia in Muricibus. Illa per totam superficiem sese repandit: hæc, aculeis quibusdam per intervalla eminentibus constat, usque longis & firmis, quod Plinius quoque firmare videtur dum ait. Firmioris jam testæ murices & Conchar. genera. Valerius Flaccus dum intortum vocat, de buccino fumen- dus est.

Descri-  
ptio.

Usus in  
Cibis.

*Usus in Cibis* quoque habent, sed illaudatis. Xenocrates enim falsos virosos esse, & ventrem turbare, urinam ciere, ori ingratos, concoctum difficiles, pituitam gignere, &c. scribit. Scribonius Largus tamen & Cel-

sus inter Cibus stomacho gratos recensent. Apud Mactobium etiam cum aliis conchis in epulo apponuntur, quo die Lentulus flamen inauguratus est.

Largus  
Compos.  
104.

*Usus in Medicina* si attendimus, Vfus in Medicina Carnes appositæ pilos in mammis tollunt: Testæ. cinis cum oleo tumores aufert; panis resistit; Capitis ulceribus cum melle illinitur; maculas in facie mulierum purgat, & parotides tollit. Habetur & pro dentifricio. Carbunculos de viceris exterminare, Marcellus Empiricus prodidit.

Quantum ad *Differentias* & Genera, est Murex *Marmoreus*, *Triangularis*, *Latissemus*, *Purpureus*, *Orthocentrus*, *Coracoides*, & *Aporrhæus*. *Marmoreus* à candore & duritia nomen sumit. Rondeletii parte interna ex albo purpurea. Testa gravis est, densa, solida, aculeis multis horrens, figura inter buccinum & conchylum media, ampla, ut merito *Hexagonus* dici possit. Vritur facili, & in cinerem abit, acrimoniaque ob empyremum acquirit, Ambustis medetur, cicatricemque pulchram inducit, postquā abluta, & cum oleo rosato in unguentum redacta fuerit. Gesneriani marmorei muris color forinsecus pallefcit, intrinsecus cum pulcherrimo splendore ex albo rosus est. Labrum exterius protendit se & dilatat in marginem: mucrones infra caput seu conum testæ duo magni, sed obtusi prominent. In ipso cono parvi admodum & subrotundi, per spiras deinceps non aculei sed tumores visuntur. Huic accedit *Aldrovandus*, turbine acutissimo atque longo & exili, undique strictus aut potius undatus.

*Triangularis*, altera parte est planus, altera ferè rotundus, sed ita, ut utrinque sint duo latera, tertium, plane pars afficiat, à qua figura, quæ huic propria est, nomen sumit. Aculeos habet breves & firmos, vario est colore, foramen duplex habet rugosum, quo ob testæ amplitudinem & brevitate sonus editur gravis & tristis. Operculum cum utitur fumum

f 3

emittit.

emittit. Pinguedinis aliquid habere, testè inde colligas. Quare in oleo amygdalino decoctum in aurium doloribus utiliter usurpatur. *Lacteo* color nomen imposuit. Obtusior est turbine aliquando quam exteri, aliquando Exochas potius & tubercula habet quam clavos. Triplicis effigies invenies apud Aldrovandum. *Purpureus Orthocentrus* totus forinsecus & intrinsecus rubet, turbine candicat. Mucrones habet duodecim rectos & robustos, sex consistat volutis quæ exiguis & obtusis tuberculis resparguntur. *Corycoides* Rondeletio ab infirmis & rostris corvorum similibus aculeis dicitur.

*Aporrhaides* quidam inter Lepades, quod ut istæ faxis adhæcant, ponunt, sed malè. Faciunt enim & *Nentæ* idem, quæ tamen toto genere ab istâ differunt. Adde lepades parte altera detecta & carnem ostentante affixas; *Aporrhaides* verò acclinato tegmine, quod iis operculum est, ad laxa agglutinantur. Quid si illius *Muricum* generis sint, quæ Græci Plinio prodente *Colytia*, & *Corythia* vocant, turbinata æquè sed minora multo, efficaciora etiam, & oris halitum custodientia. Ut sit, quem Aldrovandus expressit, marmorea est duritia, intus & extra candicans, septem aculeis, ab uno tantum latere, usque canaliculatus instructus.

Plin. H. N.  
L. 32.

## ARTICVLVS VI.

### De Conchylis.

*Aldrov. L. 3.*  
*615.* **C**ONCHYLII nomen ut ut uniuerso testaceorum generi imponatur, prout tamen pro unica specie accipitur. Sic apud Plinium invenimus, cum in Ponto conchylia non esse cum ostrea abundent, scribit: sic apud Philostratum in vita Apollonii, eum, in Biblio maxima conchylia & murices eximie magnitudinis nasci, dicit. Sumi & pro colore, apud Plinium in primis, tam certum est, ut demonstratione non indigeat.

Qui pro Ostracio sumunt, nomen partis toti acecommodant. Est autem ea parte latius qua in turbinem deficit, sine aculeis tuberculisve ullis. Foramen quo caro intetior ostenditur, non rotundum, ut in purpura & buccino, sed longum. Operculum blattam Byzantiam Serapionis esse, quæ eadem, quod avium unguem æmuletur, cum ungue Dioscoridis, opinatur Rondeletius. Nec *lucida* vocabulum obest. Nec enim hoc semper gratus innuitur odori sæpe etiam gravis. Ideo expressè Dioscorides, *απὸ τῆς αἰσθητικῆς τοῦ οὐδὲν ἰσχυρῆς*. At caustoreum fœtet, & utrumque, tam operculum, quam hæc blatta Byzantia ad suffocationes urærinæ adhibetur. Quod autem, in Indiæ nardiferis Iacubus unguis inveniri, & nardi pabulo vesci dicitur, cum conchylium marinum sit, id ex aliorum potius quam sua sententiâ à Dioscotide scriptum opinatur Rondeletius. Similis purpuræ tegumento dicitur, non figura, sed usu potius & substantia.

Laudatissimus est qui à mari rubro *Vfus* adfertur, candicans, pinguis. *Baby-*  
*lonicus* nigrescit atque minor con-  
*spicitur*, succum ipsius & quidem pur-  
*pureum* inesse testatur Plinius. *Pares*  
*eius omnes in medicamentis u-*  
*surpantur*. Crematum idem efficit  
quod purpura & buccinum. Caro in-  
terna medicamenti aurium dolores  
sedentibus à Galeno admiscetur.

## CAPVT II.

### De Turbinatis in orbem circumactis.

## ARTICVLVS I.

### De Turbinibus.

**T**ANCUM de *gypsioides* seu Turbinatis, & in anfractum tortis, sequuntur Turbinata, quæ in orbem circumaguntur, *Turbines* nempe, *Trachi*, *Nerisæ*, *Cochlea*, *Echini*, & *Cochylia*. *Turbinæ* haud spectanda sunt genera. Est

Tab. II.

Fig. 13  
Fig. 14

Est



*Murex marmoreus* Rondel.

*Murex Orontalis*

*Aporrhus. Tab. XI.*

*Concha Longa* Rondel.

*Murex Coracoides.*

*Concha altera.*

*Turbinex.*

*Concha Indica polita. Concha echinata cruda.*

*Trochus magnus.*

*Trochus Pyramidalis.*

*Trochi.*

*Turbo magnus.*


*Verrita* Rond.

*Turbo Longus.*

*Nerites.*

*Nerites.*





Descri-  
ptio.

Est turben magnus, auritus, tuberosus, angulosus, muricatus, pentedactylus: sunt & turbines in spongiis nascentes. Magnus multis voluminibus constat, margine spisso & aspero, testa alba, lineis tuberculisque multis scabra & aspera. Foramen habet rotundum, & rimam qua excrementa excernuntur. Saxis hæret turbine sursum verso. *Auriti*, tres icones habemus, quorum primus perelegantem & in mari Gallico rarum exhibet, alter, intus & in tegore ferrugineum cætera croceum, concha tuberosa, pronè & supinè pictum; tertius, tuberculosum, testa superius leucophaea, infernè crocea. *Tuberoso* tubercula nomen indidere. Varii est generis, longus, tenuis, acutior, lævis, albus, niger, varius. Aldrovandus quatuordecim Icones exhibet, ex quibus secundus, est striatus, è monte erutus, *Angulosus* exinde nomen sortitus est, quod testæ volumina ita à se discreta sint, ut in medio angulos efficiant. *Ustis* dentificiis conficiendis utilissimus est. *Muricatus*, tubercula brevia & obtusa nomen impoñere, testa est intus purpurea, foris alba, & quasi calce illita. *Pentedactylus* dicitur, quod quinque appendices longas & acutas, si extremum turbinis annumeres habeat. *Spongiis* qua delectantur, multorum sunt generum, quæ omnia apud Aldrovandum videri possunt. *Conchula*, quæ lactea vocatur, in succo pomi Citrii, cum aqua vitæ dissoluta, mulieres ad faciem fucandam utuntur.

## ARTICVLVS II.

## De Trochis &amp; Nerite.

TAB.  
X.  
Aldrov. l. 3.  
c. 35.

**T**rochi à similitudine instrumenti, quo pueri ludent, appellantur. Omnes sunt leves & varii. Testa veluti crustis duabus constare videtur; externa minus niter: quæ subjacet unionum est splendore. Alii sunt parvi, alii oblongi. Icones exhibent *Magnos*, *Pyramidales*, *Niloticos albos & maculosos*, *Nerita* seu ut Scaliger legit *Narita*, Græcis

νερις, νερις, & νερις apud Athenæzum, Hefychio νερις, dicitur. Nomen à Nereo Deo marino sortitus videtur, quod is fortè tali concha tanquam elegantiore buccinæ loco, usus esse fingatur: sicut & Triton, quem visum auditumque in quodam specu Olyssiponensis oræ conchacantem Plinius refert. Ab illis qui Adriaticum sinum accolunt etiam nunc veteri nomine appellatur. Testa est levi, si Aristotelis descriptionem sequimur, ampla & rotunda, forma buccinis proxima, papaver tamen non nigrum ut buccina, sed rubrum habet. Corpus medium testæ firmiter annectitur. Tranquillis diebus soluti pascuntur: coartatis ventis recipiunt se ad saxa cancelli, atque ibi quietem agitant. Neritæ autem adhærent more patellarum, & earum quas *senjaldæ* Græci vocant, & cætera horum genera omnia. Hærent enim saxi reclinato tegumento, quod quasi regum enrum esse videantur. Quem enim usum ambæ valvæ biforis, hunc præstat altera tandem pars turbinatis. Intus pulpa carnea, inque ea os. In rimis cavernisq; saxorum generantur, celerique incremento augescunt. Et olfaciunt, & audiunt. Ideo silentium servant necesse est, quæ eos capiunt.

De *Notatione* eorum ita Plinius. *Notatione* ex his Neritæ, præbentes que concavam sui partem, & alteram auræ oppositas, per summa æquorum vellicant. *Ælianus* & *Beillonius* diversos ab Aristotelis Nerite proponunt. *Illius* est magnitudine exigua, pulchritudine eximia, & in mari ubi sordium nihil, & tranquillitas viget inque saxi ad imam maris sedem adhærescentibus nascitur. *Huius*, testam in anfractum intortam habet, qua penitus inclusa, nulla ex parte præterquam capite conspicua est. Apud *Arenoricos* tanta huius testacei frequentia, ut abscedente æstu, magnos acervos de saxi collis, ant, & coquant. Quia papaver rubrum habet, pulmenta ex eo confecta, ac si minio tincta essent, conspiciuntur.

Arist. H. A.  
l. 4. c. 4.Motus.  
Pbm. H. N.  
l. 9. c. 33.

Græci

Græci crudas eius carnes edunt, quòd appetentiam excitare, inprimis cum capis comestæ, credantur. Icones plurimas apud Aldrovandum vide. Nobis aliquot duntaxat exhibere visum.

## ARTICVLVS III.

## De Cochleis.

Nomen.  
Aldrov. l. 3.  
c. 39.

Descrip-  
tio.

**C**ochlex, Aristotele *καχληξ* & *καχλη*, quòd *πρὸς ἑσπεραν καχληξ* *μη* habeant, Spartanis *εἰμυλὸς* & *εἰμυλὸς*, Hefychio & Varino *εὐλάσι*, aliis *πυρρανίσι* ab operculo, *φρίστου* & *φρίστου*, seu domiporta, *καχληξ* & *καχληξ*, *καχληξ* & *καχληξ*, &c. dicuntur: quorum tamen nominum quædam tertestribus potius convenire videntur.

*Descriptionem* si attendas, Teucer animal esse sine pedibus, sine spinis, sine ossibus, testaceum, oculos nunc exerens, nunc retrahens, ad exemplum quæstionis ludicræ scribit. Silico, claviculatum intorto tegmine clauditur, quod vulgus testam, & volutam, Cochlearem testam Budæus, Cochleam syneedochicè Celsus, domum Sammonicæ & Statiæ, calicem Plinius, *καλὴ* Dioscorides, *ἑσπερος* Galenus vocant. Sic eam detraxeris hebetescere atque exspirare quidam aiunt, negant illi, qui circa initium Augusti exire, & novis super induci prodidere. *Capitis* figura carere, apud Albertum M. legimus. At Plinius equotum capitibus assimilavit, Massarius bovini pæ se ferre figuram scripsit. *Cornua* quidam bina attribuere, ut Plinius; quatuor nos, id est, magna duo quæ posteriora sunt, & minora totidem ferè in fronte, habere videmus. An *Oculi* dati sint disquiritur. Pro visu tentamenta proportionem puncti atrioris in summo corniculorum accepisse, tradit Scaliger. Carereis, & corniculis in quibus arenaea durities, prætentare iter, Plinius. Habere in summitate cornuum, & cum appropinquant, oculos in cornua tetrahere, cornua in capur, & capur in corpus, Albertus. *Oris* eis inest. *Dentes*, acuti, tenues præ-

duri, eiusque indicium, derosam à Plin. H. N. l. 11. c. 37. minimis earum vitem, dentibus carnosum quid interiacet. *Promuscidem* etiam inter aculeum & linguam habent, & ori jungitur quasi ingluviæ avium; à qua stomachus est, quem excipit venter, in quo situm est, quod papaver vocatur, mox intestinum continuum tendit simplex, originem à papavere illo ducens. *Saliva* quæ punctis aëu vel stylo carnibus manat, myxa Græcis dicitur.

Quantum ad *Locum*, reperiuntur in mari, fluviis, & terra, quarum istæ sylvas & confita atboribus loca potissimum amant. Hyeme propter frigus nimium, æstate quod fervidum tempus reformident, in occulto delitescunt, suoque succo vivunt, nisi quid roris de cælo deciderit. Ideo Varro. Locusis (pro cochleis) melior, quem & non concoquit sol, & tangitros. Locum mutare Ælianus prodidit, ad Propontidem calidam hycmare, ad Ægialum æstatem insumere scribens.

Rore *vissitare* dixi, sed non solo. Sub noctem sæpissimè ad pastum exeunt, & tum post pluvias æstivas & autumnales accenso lumine à rusticis capiuntur. Plinius mirè caulem asphodeli in Campania prosequi & sugendo arefacere scribit. Theophrastus easdem inter ficosum genera recenser. Saginabantur apud veteres in vivariis. Instituit ea Fulvius Hirpinus in Tarquentinis paulò ante civile bellum, quod cum Pompeio M. gestum est, distinctis quidem generibus earum: quia & saginam commentus est, sapa & sarre aliisque generibus, ut cochlex quoque altiles ganeam implerent: cuius artis gloria in eam magnitudinè perduçta sunt, ut octoginta quadrantes caperent singularum calices. Mactobii seculo hæc saginandi ratio ignorabatur.

*Inimicitias* cum lacertis gerere apud Plinium legimus, cum laris avibus apud Ælianum. Massarius ubi limax sit, neque suum esse, neque perdicem ait. Sale super limacem, pectro, totè ferè liquecete, & in aqua viscosum converti, Albertus M. prodidit.

De

Scalig. in  
Arist. l. 1. de  
plant.  
Plin. H. N.  
l. 11. c. 37.

Macro-  
bius.  
l. 2. c. 13.  
Plin. H. N.  
l. 9. c. 56.

Macro-  
bius.  
l. 2. c. 13.  
Plin. H. N.  
l. 9. c. 56.

*Cochlea carinata.*

*Cochlea rugosa et umbilicata.*



*Cochlea Sarmatica.*

*Cochlea carinata cum suo operculo.*



*Cochlea cylindroides alter.*

*Cochlea olearia.*

*Cochlea echinostoma Rend.*

*Cochlea cylindroides prior.*



*Cochlea operculum.*

*Cochlea operculum.*


*Limax marinus.*

*Cochlea depressa.*

*Echinus syriacus et suis spinis.*

*Echinus Spatagus, et Brissus*





Genera-  
tio.  
Aristot. l. 3  
de Gener.  
liti.

De *Oria* non convenit inter autho-  
tes. Solas ex omnibus testaceis in coi-  
tu coherentes videri, & vetes ac autu-  
mno prægnantes apparere, ex Aristoteli  
habemus. Gellnerus quoque Li-  
maces coire, & ova parere candida,  
magnitudine oculorum lucii piscis,  
hisque incubantes mense Maio ali-  
quando inveniri, audivisse scribit.  
Albertus, & Porta ex limo, & putre-  
fcentibus aquis vel rore oriri, & ideo  
breviore vita frui. Hyeme tantum o-  
riri, quod Plinius placuit, vix verisimi-  
le, cum easdem lactucis in nasci teste-  
tur, nos vicinæ sciamus. Testa detracta  
hebetescere, & processu temporis in  
aureliam transire, ut eruca, atque im-  
mobilem vivere, sed quidnam ex eo  
animalis pennati oriatur, compertum  
nondum esse, Massarii fide addimus.  
Terrestres contractione & concus-  
sione corporis moventur.

Vfus.

De *Vfu* earum in Cibis apud Ro-  
manos constat, ex superioribus. An  
verò boni vel mali sint succi, inter  
scriptores non convenit. Celsus bo-  
ni succi esse prodit, nec intus vitia-  
ri; Galenus, etsi Græcis in mensa  
frequentes, sed concoqui pertina-  
ces, crassiores succi, & quæ ventri-  
culo diutissimè immorentur, soli-  
dus alimentum præstare, sed tardius  
& paulatim concoqui. Archigenes  
inter *adipos* nutritia, & syncopricis  
exhibenda reponit: sed mendum,  
cum Mercuriali suspicor, quod Aet-  
tius, qui ad verbum transtulit coch-  
leas omiserit.

Galen. l. 3  
de Alim.  
facult. c. 2.

Mercur.  
Ver. lib.  
l. 1. c. 5.

Plinius nec veteres, nec recentes  
ori gratas esse reliquit. Fluviales  
& albas virus habere, ut & sylvestres,  
Alexandrinis ideo frequentiore  
elephantiasin, quod crebro falsi-  
menta, limaces, quidam & aluminas  
carnes comedunt, si Cælio Rhodi-  
gino, & Galeno credimus. Mathiolo  
quæ in apricis degunt locis, & odo-  
ratis visitant herbis, iis quæ in opa-  
cis & palustribus degunt, præstant.  
Dioscoridis terrestres stomacho u-  
tiles esse, nec facile corruptiscri-  
bit. Optimas Sardonicas, Africa-  
nas, Astypaleicas, & quæque in Si-  
cilia ac Chio gignuntur, quæque in

Dioscor. M.  
M. l. 2. c. 8.

Liguriz Alpibus, pomatiæ, cogno-  
minantur. Marinas facile excerni:  
fluviales virus olere, quæ vepribus  
frutetisque glutinatæ coherant,  
quas scilicos vocant, ventrem & sto-  
machum turbare, addit.

Marcellus earum usum penitus  
improbat. Apud Apilium lacte &  
pulte pastas invenies. In Medicina  
frequens earum usus. In capitis do-  
lore, caput præcisum de collo su-  
spenditur. Earundem pinguedi-  
ne capilli multiplicantur. Integræ  
pro febris amuleto, de collo suspen-  
sæ commendantur. Oculis caligan-  
tibus Africanas combustas & tri-  
ras. Marcellus Empiricus commen-  
dat: auribus dolentibus, cum oleo  
nardino aut rosaceo fervefactas As-  
clepiades; cum hordeo decoctas  
Villanovanus. Cartilagines, car-  
nem earum, glutinare, Hollerius  
prodidit; nervos Dioscorides. Ta-  
gautius emplastro ad maturanda æ-  
demata adhibet. Sanguinis è naribus  
fluxum concise ex aceto sistunt.  
Cum melle & felle bovis mixtæ,  
anthraces maturant & rumpunt.  
Tritæ cum suis volutis hydropico-  
rum aquas exsugunt.

Aqua ex Cochleis destillata, he-  
cticam febrem ad uncias sex sumpta  
tollit; maculas oculorum, cum fimo  
lacerti, coralliorum, & saccharo de-  
stillata, abolet: clavos & verrucas,  
resectas, mense Maio vel Octobri  
detracta & inkillata sanat. Pol-  
len de testis limacum inanibus con-  
trititis fissuras manuum pedumque  
inpersus tollit, &c. Plura vide in Al-  
drovando.

Iam de *Differentiis* dicendum Differen-  
tiæ est. Multiplex autem ipsarum est  
varietas, magnitudinem, figuram,  
colorem, regionem, victum, vitam,  
& alia, inspicemus, sunt nigra, al-  
ba, ruffa, varinæ, nudæ, rectæ. Ad-  
herent fico, lauro, alphodelo, car-  
dus, aut foliis gregatim.

In mari rubro, maximam, testa  
purpurea, cum spira in medio, mira  
colorum varietate, inveniri, scribit  
Ælianus. Sertum, inquit, dicens, *Ælian. H.*  
summo artificio & ornatu contex-  
tum,

g tum,

rum, è floribus multiugis, viridibus, aureis, rubicundis, per æqua intervalla digestis. Gyllius ranæ se unam magnitudinis vidisse asserit, ut tantum vini caperet, quantum piscator exficcare uno prandio posset. In Ægypti Nilo grandissimæ feruntur, vocales, ululantium expressæ similitudine.

In agro Romano sunt quædam lupinis paulò maiores, quæ autumnò quorundam carduorum caulibus accervatim adhærescunt, si Marhiolo credimus. Minutæ fortè Plinio. Sunt & *Echinophora* oblongæ, quibus rubæ loco utuntur rubicines, *Pematis*, quæ cancellum qui testas ingreditur, raditur, rariò excedunt, & in Tridenrinis montibus, è Terra, hyeme, & frutetis, uncis quibusdam ferreis, propè fruticum radices, terra circumfossa, eruantur, præstantissimæque censentur.

*Seseli*, quæ sylvestribus frutetis & sentibus adhærent: & ex quibus quædam opere vermiculato à natura elaboratæ conspiciuntur: *Cavanica* in Balzaribus insulis quæ non prorepunt è terræ cavernis, neque herba vivunt, sed vix modo inter se cohærent. Minus denique *umgares*, quæ adhærente opereulo eiudem restæ sese operiunt, & semper terra obruuntur. Circa maritimas Alpes quondam effodiebantur, fortè & hodiè. *A regionibus* sunt *Illyrica*, quibus magnitudo præcipua; *Africana* quibus fecunditas; *Solitana*, quibus nobilitas; *Sicula*, quæ modicæ, quoniam magnitudo duras, facit, & sine succo, *Astypalaica*, quæ laudatissimæ; *Linusie*, ab agro cui nomen lina est, ita dictæ, juxta Pyriuntem, medio inter Priariam coloniam & Priapum spacio; *Germana*, quas Vegetius in porzione equi prophylactica, admiscet. *Acerata*, quæ latæ & multifariam nascuntur. Et hæ quidem Terrestres sunt. Marinis accensentur, *Sarmatica*, *Calata*, *Olearia*, *Depressa*, *Rugosa*, *umbilicata*, *Echinophora*, *Cylindroides*, & *levis turbine obusio*, addi his *umbilici* possunt.

*Sarmatica*, in mari Sarmarico in-

venitur. *Dolium* corporis mole æquat, cornibus arboreis cervum. Exrema cornua in orbiculos rotundantur, unionum instar splendentes. Cervicæ est crassa, oculis accensæ candelæ modo micantibus; nasobrotundo, & pilis felium ad instar obvestito; rictuoris magno, sub quo pendet prominerque carnea moles, aspectu subhorrida. Quatuor nititur cruribus totidem latis & aduncis palmis.

In Dania se vidisse, fortè mentitur Thevetus. *Calata*, Caragolo de Aldrov. l. 3. mat, seu Scaragolo Hispanis, testa 6. 31. est turbinata & satis longa, cælaruris inæqualis & scabra, intus lævi. Operculo superiore parte est non aspero, intus tuberoso, inæquali, & rubei coloris. Suceum salsum gignit, & venerem stimulat. Testa in aceto macerata, superiore veluti cute vel crusta spoliatur, redditurque cochleæ margaritifæræ modo splendens, nitida & unionis modo colorata. Huic similis est Cochlea maculis viridibus Aldrovandi, nec non ea, quæ inrer Turbinem & cochleam cælatam mediam naturam habere videtur. Quæ hic exprimitur, operculo est miniatæ, miniatæ ruberculis, turbine violaceo infra, supernè ferrugineo. Cavitas inter turbines, viridi est colore.

*Olearia* nomen à Plinio inditum quodea oleum decapularent, vel in usus quotidianos haurirent. Rotunda est, intorta, & adeò magna ut aque quatuor libras capiat. Huiusmodi aurifices, additis anis & basi in urceose efformant. Aldrov. l. 3. 6. 32.

*Depressa*, est altera parte plana, altera excavata in voluminibus, quæ initio parva paulatim crescunt ad fotamen usque. *Rugosa*, rugas per transversum ductas, ita claras habet, ut & striata dici possit. Valde est intus albos foris flavescēte, colore fragili. *umbilicata*, & quidem in medio, in faris insignem magnitudinem excrescunt. Aliæ nigricant, aliæ corneo sunt colore, aliæ maculosæ. Ad cochlearum terrestrium quæ conglomeratæ feculi crassioribus caulibus adhærent, Aldrov. l. 3. 6. 34. 35. 37. 38.





*Echini marinus ferrugineus.*

*Echinometra anathopini coloris.*

Tab. XIII.

*Echini quardum genus*  
Rend.

*Echini species oblonga aperta.*

*Echinometra Alaba.*

*Coruba* *Margaritifera.*

*Coruba intricata* Rend.

*Coruba Echinata.*

*Pica magna.*

*Coruba Indulcor.*

*Coruba squarrosa.*

*Coruba Picturata.*

*Coruba corallina.*

*Coruba rugata.*

*Coruba fasciata.*

*Coruba Longa.*

*Coruba tenuis testis.*

*Coruba uva cum annulis.*



rent, formam quam proximè accedunt. *Echinophora* aculei quibus tota conferta est, nomen indidit. O-  
perculo, succo, substantia, à parvo  
buccino non differt. *Cylindroides* py-  
ramidem refert, pyri modo turbina-  
ta, magnitudine pugni, & punctis  
vitiis lufcaneis notatur. *Levem*  
*turbina obtuso*, politam admodum  
Rondeletius facit. Testa est crassio-  
re, carne minus dura. Frequentissi-  
mè circa Levinum insulam capitur.  
Hisce adde *Limachii marini* inolen-  
tem speciem, nec non Cochleam  
matinam aliam tuberosam, quorum  
Icones damus. *Umbilicum marinum*  
Bellonius lapidi rubro perfimili re-  
gumento rugoso & scabro occloidi  
scribit, quodque solum inter Gal-  
lici Oceani turbinata politiem ad-  
mittat. Rotundiori hiat ore, edu-  
lisque est. Clavicula earum herba-  
rum mote, quæ sese arboribus alligant  
dextra ad sinistram invertitur.  
Papaver in clavicula testæ continetur.  
Rondeletio *Umbilici* vocantur,  
quod præter foramen illud quo co-  
chleæ faxis inhzrent, quoque exerunt,  
alterum habeant umbilico ad-  
modum simile, quod profundum  
convolutionum veluti centrum est,  
vel circa quod anfractus Cochleæ  
convolvuntur, veluti circa *Umbilici*

*Duo* in primis apud Rondeletium habemus; quorum prior, superiore parte latior, mox in turbinem declinans, nigris, rubris, & albis tuberculis, cotallorum omnium colorem & naturam referentibus, distinguuntur alter ciceris magnitudine, qui in spōgis reperitur, veluti granulis rubi coralli æmulis conspersus est. In cet umbilico & foramen quo corpus exierit, testam incisam habet, incisuræ operculi vice sunt.

*ἰσχυρὸν τὸν ἀλγὲς τοῖς ἀνθρώποις*: ὁ ἴδιος δ' α'- Nomen  
καταστρεφ., quod teneri ob aculeos  
non possit, dicitur. Quidam Car- Descri-  
dum marinum, nec non Erina- ptio.  
ceum vocant. Spinofus ergo est pi-  
scis. Mirum est quod deis Aristote-  
lesteliquit. Eotum scilicet corpo-  
ris partes dissectas coite rursus &  
redintegrari. Idem apud Ælianum  
& Philen invenies. Spinzæ ipsæ pro  
pedibus sunt : his ingreditur &  
volvuntur in orbem. Hinc eos sæ-  
pe detritis aculeis invenias, quod  
Aristoteles & Plinius prodidit. A-  
gilus & celerius moveri qui sunt  
cibo idonei, vel exinde colligas,  
quod semper aliquid algæ suis im-  
plexum spinis gerant. Imminen-  
te tempestate sese affigere aut ha-  
rena sabutrare, ne à fluctibus excu-  
terentur, inde procellarum nautis  
præfagia, ab Oppiano, Plutarcho  
& Plinio creditum : at Bello-  
nius frustra hoc credi prodidit,  
quòd multis promuscidisbus in-  
structi, à fluctibus volutati non pos-  
sint.

Suht ex illis quidam <sup>αἰώνιος</sup>, seu Vfus cibo inepti : sunt tamen quotum & in *Edulsi* usus est. Nullo enim tempore ovls catent, ut Aristoteles prodidit : maximè tamen pleniluniis diebusque tepidis pleniores tedduunt, eos si exicipias, quos Pyrrhæus fert Euripus, qui hybernis mensibus melliores censentur. Exiguum illudque humidum nutrimentum præbet, Mnesitheo auctore, sed quod Galenus stomacho commodum esse existimat. Ventrem deliicete, omnes ferè scriptores annotarunt : magis eos qui circa Cephaleniam, Icariam, & Hadriem nascuntur, quia amatescunt, minus, rubicundos, melinos, crassiores, & qui com radunur, lætèum quiddam emittunt. Plinius secundus jus eorum multis verbis commendat, quo vocabulo aquam internam esse intelligendam, Gesnerus putat. Laco apud Athenæum unum in os immisum una com testa dentibus comminuit: nostri, inquit, Dalechampius lapide, testam frangunt, & flavam

#### ARTICVLVS IV.

*De Echimis.*

**TAB.**  
**XIII.**  
*Albany, N. Y.*  
*L. 40.*

TABLE  
XIII.  
*Alloy.*  
E.40.

sive croceam partem, id est, ova, edunt, de quibus ita Perottus. Scinditur Echinus levi percussu, hirta testudo in duas partes dividitur: abjicitur altera, altera verò leviter aqua abluitur. Decidunt sordes, quæ in iis pro visceribus sunt: remanent quinque partita ova, subruffa, ad stellæ imaginem formata. Hæc cruda sumuntur, sapore non injucundo, quamvis nescio quid amaritudinis habeant. Cōditos mense Decembriolim, Palladius author est.

Plutarch. l.  
de virtut.  
Mulier.  
Dioscor. l.  
2. c. 1.

Quantum ad usum Medicum, venenatos quidam prodidere, Arcefilaumque Barti Eudemonis F. cum in lethalem morbum incidisset, marino Echino in potionem à Learcho sumpto, mortem obiisse, apud Plutarchum legimus: quod tamen apud nullum alium invenies. Testis cremaræ cinis, Dioscoride teste, *sordida ulcera* expurgat. Eadem contusæ & ex aqua illuxæ *luxuriantem carnem* comprimant, & incipientibus *panis* resistunt. Ad *capitis manantia ulcera* valere, Rondeletius author est. Ad abortum eundem prodesse Aëtius prodidit.

Contra *urina sibilidium* valere Paulus Iovius reliquit. Quippe, inquit, qui frigiditate maris præalti, in quo degunt, (sexaginta enim aut etiam amplius passuum gurgite oriuntur) ipsi quidem exigui sunt, sed aculeos grandes duosque gerunt. Causa magnitudinis est, quod incrementum corporis in ipsos convertitur. Cum enim parum caloris obtineant, neque concoquere possint, multum ob eam rem habent excrementi: aculei autem & pili, & reliqua generis eiusdem excremento nascuntur. Duri verò & rigidi penè lapidis constant propter frigus. Ad

Hippocr. l. 3.  
de morb.  
mulier.

Differen-  
tia.

*Differentia* Echinorum sunt variaz. Sunt *Toronenses*, qui circa Toronem nascuntur. Candidi sunt, & spinis & testa, & ore, augenturque forma productione quam ceteri, est-

que iis spina parva, nec rigida, sed mollior. *Euphratenfes*, quos Eratosthenes, ut est apud Strabonem, *Strabo* in insulis apud Euphratem, *mixta* magnitudinis esse prodit, alios pileis maiores, alios *domum* In mari Indico facile congiunt capiunt, si *Æliano* adhibenda fides. *Balthici*, qui instar magni mali sunt, & in mari Balthico inveniuntur. Duros esse, puniceis ferè coloris, & spiculis ademptis maculosos, Gesnerus prodidit. Circa Daniam quoque & Norvegiam habentur. *Flaviatiles*, ut Hermolaus & Massarius ex Paulo Agineta prodidere. *Purpurei* mixto virore, quales in scopulis quibusdam maris mediterraneæ aqua contextis, apud Antii reliquias, & juxta Baias, reperi scribit Perotus, tam grata oculis varietate, ut, si colores durent, nulla esset cum gemmis comparatio, sed mortuo pileo colores tabescunt. *Agiles*, qui velocius moventur, nec sunt edules. *Ægæum* inde dicuntur. Calidiores quidem sunt, sed quia voraces iidem, & præ copia ingestorum crudelitatem colligunt, ideo in cibos non veniunt. Bellonio si credimus, maiores aculeos habent, sed crassitie minores sunt, vixque grandis gallinæ ovum magnitudine excedunt. Diverfa in eis colorum varietas. Sunt omnino nigri, albi, vitrei, rufi, flavi, cyanei. Quidam purpura splendent, subinde circumagentibus se igniculis, micantibus ad aculeos scintillæ modo. *Ovarium*, ut Hermolaus vocat, quem Rondeletius ita descripsit. Forma eius in rotunditatem conglobata est, dempta una parte parum compressa, in qua est rotundum, quinque *dentibus* incurvis, intus cavis, & in idem punctum coeuntibus munitum: ii quinque maxillis internis connexi sunt, quæ ab ore intus erectæ, ex acuto in latum tendentes, & ambienti calyci non contrinuz. Inter dentes interna *carnicula* quædam est, quæ linguæ vice est; mox iungitur *gula*, quæ in *intestinum* desinit longum, per restam stellatim dispositam, cuius tenuibus fibris

bris suspensum, tandem in parvum foramen terminatur. Hoc foramen ad egerenda intestina destinatum est, ex adverso oris situm, ita ut os in terram versum sit, excremen- ti foramen supra habeat, Partus enim ex imopetitur, unde fit ut os ad partum sit versum, excrementum vero superius parte prona testæ contineatur. *Excrementa* rotunda sunt exiguum pillularum instat. Qualis intestinum talis ovorum ordo est. Nam inter nigrum id quod carnis vice est, & intestinum ova flava cer- nuntur quæ sola eduntur cruda.

*Testa* tota intrinsecus foramini- bus parvis plena est, per quæ mo- vendi facultatem *nervi* aculeis sup- pedirant: Extrinsecus in exigua tu- bercula eriguntur aculeorum cory- lem excipientia, vinculo, membra- nula, scilicet, obligata, ut in orbem moveri possint. Talis radii cum bea- chio articulatio. Aculeorum igitur caput cavum est, & in aculeum illi desinunt. His in gyrum move- tur.

*Spatagus & Brissus* prout à Ronde- letio describitur, vix à cordis figu- ra recedit, aculeis parvis & raris se- ptus. Os dentibus caret, verum maxilla inferior superiore promi- nentior est, ad haucichdum aquam arenamq; accommodata. His enim & Into vescitur. In interiore testa intestinum est convolutum, aqua & arena plenum, neque ova, neque ni- grum illud continet, quod carnis lo- co est. Rari sunt.

*Echinometra*, quam cum Plinio, spinas longissimas calycem mini- mum habere Gillius putavit, cum Aristotele Rondeletius & Bellon. calycis potius magnitudine alios sin- perare, crediderunt. Ille eius ma- gitudinis exhibet, ut ambabus ma- nibus quaque versum extensis vix capipotuerit. Hic in Insulis mari *Ægæi* ita profecisse vidit, ut ad duo- rum pugnorum crassitudinem exte- berarent. De cætero, pelagiz sunt, minimis aculeis prædita, brevibus & obrusis interceptis spiculis, colore ad extrema albicantibus, ad radices

liventibus, & ex purpureo nitentib; Parte prona planæ, supina rotundæ visuntur.

Aldrovandus quatuor exhibet, *Prima* est aculeis non admodum lon- gis, coloris tota ferruginei. *Alter*a spinis denudata, extrinsecus scabro- sa, coloris eiusdem. *Tertia*, magnis longisque aculeis insignita, coloris tota amethystini. *Quarta*, omnium maxima, quæ in Thyrræno & Adria- co mari nascitur, tantæ capacitatis, ut quinque aquæ libras capiat, in su- periore parte gibba & rotunda, infe- riore plana. Circumferentia erat duorum dodrantum & palmi. Calyx evidenter in parte anteriore appare- bat albus, in quinque ceu ventres, ut in Melopeponibus divisus, quorum singuli tres habebant tæniæ, quarum media erat tanquam futura, quæ partes separaret, & facillimè aperitur, a- perta figuram terræ refert. Binæ illæ aliæ tæniæ sunt colore quasi castaneo, crebris foraminibus pertu- sæ, quæ tamen nisi expositæ aëri, non apparent, quintuplo majores casu- rura. Dentes habebat qui nos, con- cavos, figura triangulari, &c.

Est tandem *Echinus minimus* pe- lagius, spinis grandibus, longis, & præduris, modo penè lapidis. Ple- rumq; un Judeo talis vocatur, quod perpetuo nigrescat & sordescat. Te- stam juglande majorem non promit, estque reliquis omnibus vividior. Nā si supinum ponas, mox suas spinas de- primit, & se in pronam partem con- vertit. Gignitur in alto gurgite. Bel- lonius ita hoc genus descripsit. Plu- res habet quàm alii proboscides: id- circo citius repit, firmitusque hæret. Ova non fert, sed sanguineum quid- dam nigrum saniei simile, quo ma- nus cruentat. Dentes verticillimo- do habet quinos, circulari ordine dispositos, quibus algas, saxa, & con- chyliflorum testas arrodit. In inter- na eius parte multos nervos annexos cernas: ex quo indigenæ coacerva- tam denarium congeriem; ita cum nervis exsiccati sinunt, ut annuli vice ad signandum panem utantur. Refert enim quinquefolium, vel

quippiam simile affabre delineatum. Ventrem in quinque partes distinctum habent, quæ ab oris verticillo testæ appendæ, ad foramen excrementi coeunt, sed distinctæ sunt, & quasi intervallum liminū discriminantur. Totidē promuscides habet Echini, quod in testis foraminulis pertusis apparent. Sunt enim ultra sex milia in quolibet.

Ad hunc refertur potest, ille qui in rubri maris littore semipedem latus, pronaparte planis, superiore gibbus, paucioribus ac minis frequentibus spiculis præditus à Bellonio visus est: nec non ille maris rubri aculeis longissimis ferrugineis, ad rubrum vergentibus, cuius pictura Castellero Genuensi debetur.

Quem in quinto genere *Rondeletium* repoluit, saxo inhaerentem, calyce quoque est parvo, spinis pro corporis ratione longis & duris, quo ad urinæ destillationes felicissimè idem usus est. Idem est cum Echino Aristotelis, quem in Historia Animalium describit.

Arist. H. A.  
l. 4. c. 3.

#### ARTICVLVS V.

### De Conchyliis, & quidem Bivalvibus.

#### PUNCTUM I.

#### De Conchis.

TAB.  
XIII.

**H**Adenus de Echinis, sequuntur Conchyliæ, quæ vel sunt *Bivalvia* seu *dyæ*, vel *Univalvia*. Ad illa pertinent, *Concha*, *Chama*, *Ostrea*, *Pectines*, *Musculi*, *Mysuli*, *Tellina*, *Balan*, *Pholades*, *Solenes*, *Pinna* & *Concha anatifera*. *Concharum* plura sunt genera, quæ ad *Asperas* seu striatas rugosæque & *Levestedigi* possunt.

Aldr. l. 3. c.  
41.

Ex *Asperis* est 1. *Margaritifera* quæ & *Indica* quod apud Indos; apud quos *βίγγε*, dicitur, plurima nascitur, & *Mater perlarum* dicitur. Androsthenes apud Athenæum in Indiæ navigatione ita describit. Ostreum aspectu pectini simile, concha non striata sed plana, spissu, (hirsutam Echunorum modò malè Plinius red-

Athen. l. 3.

didit) non utrinque atria, pectinis modo, sed una tantum parte. In eius carne gemina concrevit, ut in suilla grando: modò colore adeò similis auro, ut cum eo collata non facillè internoscatur, modò argentei coloris, modò omninò alba, & piscium oculis similis.

Multa earum genera Plinius recenset, cuiusmodi sunt, *Pentadactylia*, *melicembates*, *echinophoræ*, &c. <sup>Plin. H. N. l. 32. c. 12.</sup> Interdum tam grandes in India reperiuntur, ut referant inventam in mari insulæ Borneo, cuius caro pondus septem & quadraginta librarum pendeat. Sunt quædam totæ argenteæ: quædam colore rubicundo flammeo micant.

Carnes ab Indis quandoque crudæ, quandoque assæ comeduntur. Ex testis varia, ut cistæ, pocula, cochlearia, scipiones mulierum, & rabulæ luforiæ formantur. Indæ mulieres armillas & monilla ex illis gestant.

Vfus.

De *Margaritis* in *Historia Naturali fossilium ægemus*.

2. *Imbricata*, seu imbricatim undata, sic dicta, quod testa ad undarum sese attollentium similitudinem distincta est. Græcotum vulgus *Aganon*, Calojeri Arabiæ *Tridacnem* vocant.

Descriptio.

Est dura, carne concoctu difficili. Quæ *Tridacna* Plinio dicitur, est pedalis longitudinis. Utraque testæ libras medicas quindecim pendeat. Eo loco quo sibi invicem cōnectebatur, singulæ duos digitos per transversum crassæ erant. Allata erat Aldrovando ex rubro mari. *Tridacna* dicitur, quod non nisi tribus vicibus deglutiri possit.

3. *Striata* cui striæ percurrentes nomen dedere. Varia harū sunt genera. Albæ sunt, nigricant, flavescunt, per ginglymum colligantur. Est quædam *longa*, ovi figura, restis multum cavis, canaliculis parum profundis. Est & *pectiniformis* tota ex cinereo lutescens, fasciis tribus ochreis ornata. Est & extra ferruginea, incus albo, & purpureo violaceo varia, in qua animans luteo, caruleo, & rubro varium.

Est &

*Chama aspera* Bellon.

*Chama laevis* Rond. Tab. XIII.

*Chama rugosa* Rond.



*Chama glaucocincta*.

*Chama thloria*.



*Ostrea murina*.

*Ostrea murina* Rond.

*Ostrea glaucocincta* Rond.

*Ostrea glaucocincta* velle.



*Spondylus thloria*.

*Spondylus thloria*.



*Pecten*.

*Pecten*.

*Pecten*.



*Pecten*.

*Pecten*.

*Pecten*.







Est & *Candida* ac admodum lucida: fasciam in medio habens latam castanei coloris, cuius medium percurrit linea castanei coloris valde saturati.

argentei, quæ per ginglymum articulantur. Exiis Sphærulæ præcum & dentiscalpia conficiuntur.

Ad hanc pertinet *Conchula rugata Rondeletii*, quæ à latere ad latus multas veluti rugas sparsim & sine ordine habet, Testæ sunt depressæ, colore vario. Labra testarum crassa & tam arctè cōnexa, ut sine vi non aperiantur. Diphilus carnem copiosum bonumque succum gignere tradit.

10. *Rhomboides*, quæ veteribus ignota videtur, quod testa sit musculorū marinorum testæ simili, *musculi stratum*, Rondeletius vocavit. Tota concha nigricat. Rara est, quia in alto mari degit, duramque carnem habet. Bellonius Balanum Græcis dici putat, sed falsò ut apud Rondeletium videre est.

Ex *Lavibus* est *Concha Galades, Nigra, Aldr. l. 3. c. Fasciata, Crassa testa, & Tenuis testa. Ga. 55. 54. 55. 56. & 57.* *Galades* sunt maximæ & lævissimæ, intus verò candidissimæ, non admodum concavæ, caro ipsa alba, dura, concoctu difficilis, succum crassum gignens. Satis rarò capiuntur. *Nigra*, hiæce est similis, nisi quod intus & foris nigricat. *Fasciata*, testa est admodum lævi, dura, & marmorea. Nomē hoc obtinuit, quod quinq; veluti fascias latas à latere ad latus ductas habeat. Harum plures Aldrovandus exhibet. *Crassa testa*, à galadibus & Chamis asperis, non tantum testarum crassitudine, sed fasciarum ratione, quæ in illis rariores & latiores sunt, & in his plures & unica tantum linea constantes. Aldrovandus aliquot earum icones exhibet, interque has clathratam maiorem & minorem. Ex ustis & in cinerem redactis præstantissimum antispodium fieri scribit Rondeletius. *Tenuis testa*, conchæ, extra sunt colore fædo, lutulento cinereo, intus argenti modo resplendent,



Aldrov. l. 3. c. 45.

4. *Echinata*, quæ peccini similis est, testis admodum concavis, striatis, in ambitu incis. In striis sive exochis eminent aculei frequentes, incurvi, certis intervallis à se distiti. Uniones in ea reperiri testatur Plinius. Nam & luba tradit, Arabicis esse cōcham similem peccini insecto, hirsutam Echinorum modo, ipsam unionem in carne ipsa esse grandinæ similem.

Plin. H. N. l. 9. c. 35.

5. *Squammosa*, quæ striis seu lineis femicircularibus, squammarum in modum est exornata.

Aldrov. l. 3. c. 47.

6. *Longa*, cuius duas species Rondeletius ponit. Unam colore vatio, in medio albescente, intus cum lævitate cādido: Alteram, testa alba, aspera, lineis multis distincta, quam Plinii longam esse putat. At Aldrovandus veram Plinii longam se exhibere credit, colore extra albo fuscoque variam, intus vero rosam, animante suo prægnantem. Idem aliam exhibet, parte quæ replicatur, foramina multa, ordine disposita habentem, quæ à natura fortè, ut aer ingrediatur facta sunt.

Aldrov. l. 3. c. 48.

7. *Piliferum*, quæ idèò ita vocabitur, quod testæ eius pro conficiendis coloribus raderentur. Crassitudine plurimum excedit, & florem foris habet. Reperitur maximè circa Cariam. Aldrovandus unam exhibet ex Rondeletio colore Cinnabaris, aut Sandarachæ, figura Spondylorum aut minorum Ostreorum.

Aldr. l. c. 49.

8. *Corallina*, quæ quod Corallum colore imitetur ita dicitur. Externa testarum parte peccinem refert: sed lineis est aspera, tuberculis rubris inæqualis, intus lævissima, candidi marmoris colore. Carnem habet duram, odore viroso, sapore salso. Post diutinos Austri flatus, & canicula exortum in litus ejicitur.

Aldr. l. 3. c. 50. & 51.

9. *Rugata*, quæ lineis multis & e-latis, per transversum ductis rugata est: testis valde spissis, coloris intus

## PUNCTUM II.

## De Chamis.

**TAB. XIV.**  
*Aldrov. l. 3. c. 58.*  
 Nomen.

**C**hamarum nomen à verbo χαῖν, ut Gesnero placet, derivatur, indicumque huic concharum generi, seu quod hient, seu à capacitare. χαῖμα Varino est χαῖμα, id est, oscitatio, unde Plinius, Conchas Margaritarum pandere se dixit quadam oscitatione. Galli flammæ & flammæ vocant, Itali Peverazas, non tamen quod sapore sunt piper redolente, quam quoddam pipere condiantur. Spartianus Ostreas & Lithostreas cum dixit in Heliogabalo Chamas tracheas & Chamas leas intellexisse Hermolao creditur. Quidam Hiarulas dixere, Galenus verò Concham pro Chama usurpavit. In genere eas suspēctes, vix in tanta varietate constat, quomodo à conchis & quibus notis differant, hoc unico excepto quod Chama id peculiare habent, quod plerumque in littore hiantes inveniuntur, unde earum nomen Ion Chius

*Ælian. H. N. l. 15. c. 22.*  
 Ion δὲ χαῖμα derivat. De extero ita Ælianus de iis. Chamæ marinæ & varix & multiplices sunt: alix asperæ, alix levēs: quædam digitotum compressu confringuntur, alix vel saxo ægræ conteruntur. Quædam ipsarum nigerrimæ sunt, nonnullæ argentei coloris similitudinem gerere videntur, alix utroque colore mixto insignes. Ac quemadmodum earum est varium & multiplex genus, sic multas & diversas sedes habent. Quædam enim in littoribus dispersæ jacent in arena, vel in limo quiescunt: nonnullæ sub algam subjiciuntur, alix saxis mordicus adherent.

**Locus.** Æstivo tempore cum incipit messis, in Istrico mari gregatim natant, & leviter teruntur, cum ante id tempus sua sibi mole graves effectui non possint. Contra, ex tranquillo mari mirifica voluprate afficiuntur, & Favonii mollibus auris afflari gaudent: eamque ob rem in latebras abdunt,

& in suis conniventes testis, eum à tempestatibus mare conquisceere sentiunt, & Favonium flare, tum relictis sedibus, ad summum maris narrant, & apertis testis eminent, & quiescentes ventum expectant placidum ac secundum: quisi contigerit, alteram concham substermentes, alteram erigentes, hæc pro velo, illa pro navia navigandum utuntur, ut si eas procul videas, sic per tranquillum mare nantes, classem navium existimes: Quod si navem ad se accedere sentiunt, aut bellum impetu, aut valentioris piscis metu percussæ, contractis uno impetu testis, subito delabuntur, Carnem album & urinam ciere Athenæus scribit: at Dioscorides urinæ non meminit. *Dispersuntur in Lavet, & Asperæ, Aldrov. l. 3. c. 65.*  
*Aspera χαῖμα asperæ Græcis nomen c. 65.*  
 à testarum externa parte, qualineas multas obliquas & cavas, ideoque musco oppletas habent traxere. Belonius valvas tornatas & orbiculari ferè rotunditate habere dixit, Testas tam duras urnon nisi valido ictu confringi possint. Labra haud quaquam in gyrum denticulata, sed Mytolorum more lævia. Movetur ut limax, & quia fortibus spondyliis constat, iis testas movendo per arenam lumbricorum more, conscendunt. In arena circa littora reperiuntur. Carnem ipsorum Icesius duriusculam, mali succi, parum nutrire, facili excerni, marisq; sanguinem referre pronunciat. Diphilus stomacho gratam esse addidit.

*Lavet Chama, Chameleæ Græcis Aldr. l. 3. c. 59.*  
 dictæ, testa duplici constant, quæ tamē digitorum compressu facile frangitur. Conchis lævibus, quæ Galades dicuntur similes sunt: ut tantam in Oceano magnitudinem adipiscuntur, ut quaternorum digitorum latitudinem, senorum verò longitudinem exsuperent. Intus & foris eandem similitudinem sunt, Caro quoque intus candida, inque ea duo foramina cernuntur: alterum os est, alterum excrementi meatus, utrumque sinuosum, ut dilatari & confringi possit: hoc ad attrahendum

# DE EXANGU. AQUAT.

hendumaquam, illud ad reiiciendū  
excrementum. Habent & *pelorides*, ut  
conchæ extera. Latenter magis  
procuterahte semper hiant. Facile  
à calido tanguntur: quomobrem  
mox hiantes sua labra pandunt, &  
facilius exanimantur, si longius se-  
cesserint à mari. In arena cum Tel-  
linis capiuntur. Moveri à se, & sedes  
in littore mutare compèctit, quæ  
in vasa aqua pleno immerferit, quod  
Veneti ut minus exanimis seruent  
faciunt. Non elotæ propter are-  
nam respuuntur: recentes elotæ &  
adhuc vivæ Tellinis non sunt post-  
habendæ. Differentias earum varias  
Aldrovandus posuit, quem in Ico-  
nibus vide.

Aldrov. l. 3. c. 60.

Sub Lævi comprehenduntur, *Pipe-  
rata*, *Nigra Bellonii*, *Nigra Rondeletii*,  
*Glycymeris* eisdem, & *Peloris*.

*Piperata* Bellonii *Diverone* quibus-  
dam talis dicitur, non tam quod ob  
pipæris saporem sitim exciet, quàm  
quod perpetuò bibat, neque diu sine  
aqua servari possit, atque in forum  
allata & aquæ immeria geminam  
arque oblongam exerat liulam, ut  
cochleæ modò perpetuò sitiens mo-  
veri percipiatur. In eceno degit, &  
usque adeò tenues testas habet ut  
transpareant. Cardinibus non jun-  
guntur invicem infatilis, sed nervo  
ut ostrea. Labra habent lævia magis-  
que in rotunditatis ambitum circin-  
nantur quàm Tellinæ.

Aldrov. l. 3. c. 61.

*Nigra Bellonii* robore testæ eum a-  
spæra facile certat: nec ærenas ita  
profundas in labris habet. Pelotide  
quoque maior est & dulcior. Ideò  
glycymeridem putat.

*Nigra Rondeletii* est testis oblongis,  
lævibus, duris, spissisque ac veluti  
marmoreis. *Glycymeris* sapor carnis  
dulcis nomen imposuit, facitque ea-  
rum Maerobius mentionem. Sunt  
maiores quàm Pelorides, testa oblò-  
ga mytilorū fluviatiliū testæ modo,  
sed durior & spissior, rugosa, non  
ramen ob id aspera, ex albo rufes-  
cente, carne & succi bonitate Pe-  
loridi similes. Sunt qui Glycy-  
maridas vocant. Aldrovandus Pe-

lorides maiores Athenæi esse cre-  
dit. Frustra verò Corycia in Pi-  
nio ad Chamas glycymeridas refe-  
tas. Macedones enim teste Ægesan-  
do, conchas asperas *pelorides* ut Athe-  
nienses *pelorides* id est, arietinas vocant.  
Maerobius in ecena adyciali Lentuli  
appositas fuisse dixit.

Maerob.  
Saturn. l. 5.  
Aldrov. l. 3. c. 64.

*Pelorides* non tam à luto, (scribi de-  
beret *pelorides*) quam vel à magnitu-  
dine: *pelorides* live *pelorides* significat  
*pelorides* id est magnus, id est magnus &  
prodigiosus, vel à Peloro Siciliæ  
promontorio, juxta quod optimæ re-  
periuntur, nomen sortitæ sunt. A-  
thenæus eas uno loco ex sententia  
fortasse Philidi à Chamarum genere  
segregasse videtur. Duabus conchis  
constant, ut Rondeletius reliquit,  
quæ nunquam ita iunguntur, quin  
semper hiant seu vivo seu mortuo a-  
nimali, etiam sine calidi contactu.  
Ex oblongæ sunt & læves, ex albo  
putrescentes, in medio connexæ.  
Cato intus alba est, quæ etiam con-  
tracta, tota testa vix capi potest, ex-  
terna longior multo est, rotunda,  
spissa, pudendo virili non abòmilia,  
digni mediæ crassitudine. In extre-  
mo altero foramina duo apparent,  
alterum oris est rotundum, alterum  
excrementi. Bellonius à calcinel-  
lis differe scribit, quòd tubinatio-  
ri & grandiori corpore consistit. Cal-  
cinellæ enim, inquit, compressi-  
sunt forma testa trās lueida, ac mul-  
to quam Chemzloij teneriores. Me-  
dia autem est inter asperam lævem  
constitutione & natura. Non enim  
ita horret ut aspera, neq; ita glabre-  
scit ut lævis, albo præterea ac fulvo  
emblemate distinguitur.

Bellon. de  
Pysch. l. 2.

Eius caro durior est, quam Tellin-  
narum. Diphilus eo piofius bonūque  
sucum gignere tradit. Labra earum,  
addit idem, sunt crassiuscula, & tam  
ardè connexa, ut nisi vi aperiantur,  
& sæpe etiam rumpantur, prius-  
quam os aperiant. Hue-  
usq; Bello-  
nius.

Vfin.

Aldrov. l. 3. c. 62.

## Ринстим III.

*De Ostreis.*

TABLE  
XIV.  
NOTES.

**T**estaceum quod Latini Ostreum  
& Ostream dicunt, Græci vete-  
res ὀστρεον, ὀστρεον, vel ὀστρίν ὀστρεον; vel  
quasi ὀστρεον quod testa velut ossa rega-  
tur; moderni ὀστρεον, Pellus ὀστρεον,  
Helychius ὀστρεον, vocant. Invenies  
tamen ὀστρεον pro toto testaceorum  
genere sumi. Unde Suidas Echium  
ὀστρεον sumi ut ὀστρεον tradit.

	Descri- ptio.	Mor. J. 3. c. 66.
1870	...	...
1871	...	...
1872	...	...
1873	...	...
1874	...	...
1875	...	...
1876	...	...
1877	...	...
1878	...	...
1879	...	...
1880	...	...
1881	...	...
1882	...	...
1883	...	...
1884	...	...
1885	...	...
1886	...	...
1887	...	...
1888	...	...
1889	...	...
1890	...	...
1891	...	...
1892	...	...
1893	...	...
1894	...	...
1895	...	...
1896	...	...
1897	...	...
1898	...	...
1899	...	...
1900	...	...

*Formam* quod spectat ita de iis Aldrovandus. Quod ad formam Ostreorum attinet, Bellonius inter bivalvium genera hoc peculiari ait esse ostreae, & pedini, ut partem habcant pronam & supinam, quarum altera sit turbinata ac praeputumida, altera vero plana, Plinius alibi originem atque genituram conchae, quae Margaritae fert, esse ait, haud multum Ostreorum conchis differentem.

Alibi quoque Thethya ostrea familia esse scripsit. Et Hegefandera-  
pud Athenarum hepatum piscem in  
capite duos lapides habere, colore  
splendoreque ostreis similes. *Capita*  
ostreorum generi nulla eodem Plin-  
io. Galenus ostreis pilos esse negat,  
sed melius Plinius oculis carere os-  
trea omnes dixit. Eidem præterea  
ostreorum præcipua *spondyle* (caro  
hinc interior) brevisunt, atque non  
carneo, nec fibris laciniosis, ac tota  
in alvo. Perotus spondylum in Os-  
trea esse scribit, callosum illud ro-  
tundum, albicans, quod intus habe-  
at in medio, à similitudine spon-  
dyli, q. nos verriculum dicimus appositū  
fusus, ut melius nendo vertantur. Nā  
reliqua caro circumspersa *Lacinia* di-  
citur. Quod *Ovum* vocat. Wottonus  
non semper, sed vere habere os-  
trea asserit: moxque procedente  
tempore minui demumque totum  
ferè aboleri.

Atistoteles illud in altera tantum parte eis fieri voluit, idemque esse quod Echinos habere alias dixerat.

Eodem autore Ostrea meatum habent, quo excrementum secedat parte superiore. Idem Aristoteles *refert* eis tribuit scabras, alibi etiam labra crassa. Et Plinius quædam silium duritia tegi, ut ostrea & conchæ dixit.

Quantum ad Generationem nullum  
eis sexus discrimen, ut Plinius & Op-  
pianus prodiderit: ideo putrescente  
limo proveniunt, aut spuma circa  
navigia diutius stante, defixos-  
que palos, & lignum maximè: sed  
& in cavernosis & petrosi aquarum  
dulcium adventu gignuntur. Obi-  
nere tamè ex putri producta aliquid  
prolificum quamvis non coeant, a-  
pud Aristotelem habemus, Hinc &  
Plinius. Nuper comperrum in Os-  
treatis humorem ostreis foeticum  
lactis modo effluere, & Petrus Gyl-  
lius, Bizanrinos ostrea ferere & co-  
tum quasi lac teminare: à spectata  
fidei se accepisse scribit. Grandescunt  
syderis ratione maximè, sed priva-  
rum citra initia æstatis multo lacte  
prægnantia, arque ubi Sol penetrat in  
vada. Sydus illud Luna est, quæ plena  
corpora humentiora reddit, adeò ut  
nec prædites Chirurgi trepan otum  
aperiunt, quia rursus cerebrum magis di-  
fundi, & totam cranii capacitatem im-  
pleri est. Nulli eis sensum inesse a-  
pud Plinium legimus. Auditum esse  
non est verisimile, inquit idè, sed ad  
sonum se mergere solent, ideo & si-  
lentium in maripiscantibus. Tactus  
tamen omnibus. Caret & motu A-  
ristoteles prodidit. Aqua marina &  
limo pascuntur, quin & rore, quare  
tenet Ostrea, id est, rosida, Oppia-  
nus dixit.

De *Loco* in differentiis agitur: hoc *Locus* tamen addere placet, non tantum in pelago, dulcibusque aquis, & ubi plurimum inbuunt amnes reperiti: sed & in petrosis, carentibusque aquarum dulcium adventu, sicut circa Grynium & Myrinam, quod apud Plinium legimus. Mirum verò quod apud Arhenzum habetur, postea quâ Appameam Phrygiæ urbem, Mithridatuci bellis temporibus à motu terra disces-

d'ceffisset, lacus, qui ante ibi nulli comparuissent, repente extitisse, fluuioque & fontes novos ex eisdem locis terræ motu excitatos fuisse, veteresque multos exaruisse, ac nimirum plurimam aquam rum dulcem, tum salfam, tametsi ab eis locis mare longè abesset, ex visceribus terræ sic emanasse, ut tractum uniuersum illud tum ostreis, tum aliis piscibus marinis referretur.

*In festis sibi Cancros marinos & stellas marinas ostrea habent. De illis author de natura rerum ita. Cum testas aperit ostrea ut clementioris auræ deliciis gloriatur, cæcer insidias ei repentinas prærendit, & lapidè inter eius testas proticit, ne illas cōiungere possit, & si carnes ostrea comedit.*

*Vius. Vsum in Cibis habere nemo non novit, erudas, elixas, assas, omniumque testarum nobilissimas, Bellonius prodidit. Legimus tamen apud Galenum, carnem ipsarum humidiores & ronaiores esse, est crassi succi, humoremque crassum, crudum, & frigidum genere. Crudæ salsum humorem de se fundunt, ideò alvum movent, & turgentem excitant, Elixæ, humore suo destituta, murmura excitant, secundum Iovium, secundum Iulium Alexandrinum, ob multam carnis molitiem concoctu faciliores sunt, ac pituitam potius quàm crudum humorem procreant. Assæ, (assantur autem in craticula addito aromate multo ac salis momento, sed testis suis non avulsa) minimè noxia sunt. Plinius erudas stomachum unice reficere, fastidiis mederi, ac leviter alvum mollite scribit. In pontificali cena apponebatur, teste Macrobio, echini initio & ostrea cruda. Qui modò edere eo volet, Lunæ motum obferret; hoc est, ea decrefcente, ea edas: senefcente longè sunt deteriora.*

*In Medicina invenere quoque locum. Adhibentur ex mulso & pipere cocta conera tenasum. Gariopontus hydropicis dedit. Usta ad labiorum ulcera & alia prodesse, apud*

Myrepsum habemus. Cinis dentes splendidiore efficit. Trita & optime lavigata ulcera rebellia exsiccat, quod Galeno debemus. Cinerem veteri urinx misceri adversus eruptiones in corpore humano & ulcera manantia Plinius reliquit. Marcus Empiricus eundem, si in morem salis pane colligatur & voretur, statim ad removendam narium gravitatem proficere scribit. Rondeletius denique experientia comperit, ex testarum cinere factam aquam lixivam, ad minuendos tumores in quatuordecim pedum & genuum plurimum cōferre. Exsiccat, enim, inquit, multum digerit, & calefacit, si post ultionem cinis non lavetur.

*Differentia Ostreorum sunt varix, quæ a loco & colore sumuntur. Locum si spectes, sunt 1. *ἀμύγμα* ut Aristoteles vocat, quæ in stagnis marinis nascuntur. Rondeletius ea ex duabus testis componi ait modicè concavis, & parum in dorsum elatis, foris inæqualibus & asperis, in tenues laminas facile sectilibus, intus lævibus & candidis. Testas parvas esse carnem mollem, suavem, concoctu facilem.*

*2. Littoralia, quæ in littoribus (περίωρον) inveniuntur: nec non saxis limi & aquæ dulcis expertibus. Parva sunt, dura & acris.*

*3. Pelagia, seu marina, quæ in mari nascuntur, parva & rara. Grande sunt quidem syderis ratione maxime: sed privatim circa initia zistatis multo læte prægnantia, atque ubi sol penetrat in vada. Hæc videri causa, quare minora in aliis locis reperiantur. Opacitas enim prohibet incrementum, & tristitia minus appetunt cibos. Sunt aliquando in Mediterraneo multa simul connexa, & supra se posita. Inter hæc repunt Scolopendrix, & vermes in canaliculis inclusi vivunt. Testæ foris sordidæ & luto obductæ, & ex crustis multis sive laminis constantes, intus læves & albæ. Caro mollis: circa eam fibræ multæ veluti simbram constituentes, eam aliquando ambiente*

*Differentia.*

*Plin. H. N. l. 32. c. 6.*

*Inimicitia.*

*Vius.*

*Gal. l. de boni & mali succi h. 3.*

*Macr. Sat. l. 9. c. 6.*

*h. 2 pur.*

purpureo crine, quæ præstantiæ nota est auctore Plinio, qui Calliclephara dixit.

Inv. Satyr.

4.

4. *Britannica*, quæ omnibus præferuntur, quæque Massarius post Lucrina inventa fuisse, & Ruputina luviali dici putat.

5. *Santonica*, quæ magis salia & acris judicantur.

Horat. Sat.

17. 4.

6. *Burdigalensis*, inter quæ Medokina ab oppido vicino Medoc, dicta, capite nigra, suavitate præcellunt.

7. *Circæa*, quæ ab Horatio commendantur.

8. *Abydens*, quæ olim à ganeonibus celebrari solita, Clemens Alexandrinus in Pædagogio prodit.

9. *Lucrina*, à Lucrino Campaniæ lacu, in sinu Bayano, prope Puteolos ita dicta, de quibus ut & de Britannicis ita Plinius. Nondum Britannica serviebant littora, cum Orata Lucrina scilicet littora nobilitabat: postea visum tanti in extrema Italia petere Brundisium ostreas: ac ne lis esset inter duos sapores, nuper excogitarum, famem longæ advectionis à Brundisio compascere in Lucrino.

10. *Brundisina*, de quibus ita idem. Gaudent peregrinatione transferri, in ignotas regiones. Atque ita Brundisina in Averno compasta, & suum retinere succum, & à Lucrino adoptari creduntur.

11. *Cumana*, quæ Strabo præstantissima facit. Nihil interim de suburbanis circa Venetias & Adriaticis, quibus Bombusteste Calcagnino palmam dedit, dicemus. Plinius paucis meminit, dum inquit. Dicemus & de nationibus, ne fraudentur gloria sua littora, sed dicemus aliena lingua, quæque peritissima huius censuræ in nostro ævo fuit. Sunt ergo Mutiani verba quæ subiiciam: Cyzicena maiora Lucrinis, dulciora Britannicis, suaviora Gerulicis, acriora Lepicis, pleniora Lucensibus, siciora Coryphantenis, teneriora Ilistricis, candidiora Citicensibus.

Quantum ad Colores ruffa sunt in Hispania, fusca in Illytico, nigra & carne & testa Circæis, quibus pal-

ma mensarum diu tributa est. In mari rubro flammæis illustrantur Zonis, ea ut diceret variis coloris temperatione ad colorem iridis accedere: adeo lineis perpetuo ductu inter se distantibus distinguuntur. *Meliora* ita descripsit Plinius. Præcipua habentur in quacunque gente spissa, nec saliva sua lubrica, crassitudine potius spectanda, quam latitudine, neque in luto capta, etsi ea Veneti cæteris antecellere opinentur, neque in arenosis sed solido vado, spondylo brevi atque non carnosos, nec fibris laciniolos, ac tota in alvo. Addunt peritiores notam, ambiente purpureo crine fibras, eoque argumenta generosa interpretantur, calliclephara appellantes. Iovius maxime probari tradit, quæ magnarum navium carinis adhaerent, & ab urinatoribus de manu colliguntur. Præter hæc sunt adhuc *Ostrea Sylvestria* & *Gaiderepoda*. Illa vulgus in Provincia Scandebec vocat, propterea quod sapore sunt acris, & id eo delicatiorum labra calefaciunt & urunt. Testa sunt pellucida, partibus quibusdam flavescente, alias purpurascente, foris crinita & crispa, intrus splendida, levissima, cædidissima. Carnem habent parvam, salisam, subamaram, & insuavem.

Facit horum Athenæus mentio. *Athen. Dip.* nem, multiq; alimenti esse dicit, sed virus olenria, & ori ingrata. Reperiuntur in mari mediterraneo. Testa in fucis mulierum lapidis specularis vice usurpari potest, & exsiccantibus pulveribus utiliter admisceeri. *Gaiderepoda* quasi pes asini dicitur apud Græcos, qui daideton hodie asinum vocant. *Testa* eius, describente Bello, eximio naturæ artificio, superior inferiori infarsa est, ut quibusdam veluti cardinibus annexa, nigroque nervo in eius medio inter tubercula & sinus coaptato, vincula ac conficta esse videatur. *Athen. Dip.*

*Tubercula* quoque superiora duobus acerbulis inferioribus bene correspondent, ut & inferiora superioribus. Proinde apertas Gaiderepodas, si quis



Tab. XV.

*Musculus Mytil.*

*Mytilus Rend.*

*Murex Alton.*



*Balanus pulvis*

*Balanus alius*

*Balanus marina - Murex Eydou.*

*Tellina congerius*

*Tellina congerius*

*Tellina*

*Tellina*

*Tellina con denabibus*

*Mytilus eger con Mytilus*

*Mytilus oblongus*





si quis attentè intuebitur, in his branchias, (hoc certè ridiculum est, nulum enim ex testaceis habet) & stomachum & reliquas partes nutritorias contemplantur: imò etiam aurículas fungi crispæ figuram referentes, magnitudine grandioris acetabuli, polypi, quæ dilatari ac contrahi soleat: umbilicum vulgus esse putat. Rondeletius hæc pro spondylis, qui Athenæo *περὶ τῶν ἀνθράκων*, *ἀνθράκων* *περὶ τῶν ἀνθράκων* id est, ab alperitate dicuntur. Meminit eorum Plinius & Galenus, interque ostracoderma recenset; Macrobius etiam, qui inter cœnz Pontificalis prima fercula numerat; sed & Columella, qui inter testacea reponit. Duplici spondylus, secundum Rondeletium *testa* constat, intus cava & lævi: foris scabra, ad ungulæ asini formam forundata, latiore parte, quæ & inferior dici potest, tenuior est, & multò minus densa, minus concava, arcta valdè & firma articulatione connexa: utriusque enim testæ binæ apophyses sunt, sive tubercula, quæ binis acetabulis vicissim recipiunt & recipiuntur: vinculo medio nigro & valido cohærent. *Cere* interna ostreor. carni similis est: circa hanc fimbriata membrana. Intus caro, sed durior, & viridis olens. Adnascuntur faxis, & ita hærent, ut non nisi malleo, aut fracta faxi parte capiantur. Rondeletius idem, in faxis Fresconis Agathensis sinus parvos reperit. Reperiuntur in eis cancri parvi. Aldrovandus aliquot spondylorum genera exhibet, interque illa elegans quoddam, plurimis extra tuberculis obtusis præditum, ab uno latere rubicundis, ab altera inter viridem & cæruleum ambigentibus, quibus tamen rubra etiam permiscuntur tubercula: summum caput seu vertex candidat. Intus circulus satis conspicuus colore viridescente totam ferè concham propè extremitatem ambit: dein color sequitur castaneorum, dein albus & subviridis. In medio velut umbilicus est, addito luteo constants.

## PUNCTVM IV.

## De Pectinibus.

PECTINES, si Gyllium sequimur, à rugis seu imbricaturis illis quibus signati sunt ita dicuntur. Plinius all. Nomen quando à pectunculis distinguit, nunquam utrumque promiscuè nominat. Græci *κρίναι* nominant, ob manuum & pedum similitudinem, ut Nicandri interpreti placet.

*Descriptiones* exactas in differentiis describimus, hic dicere sufficiat bivalves & clausiles esse, ut apud Aristotelem legimus, seque concludendo tueri pectinatim eis divisas testas; idè Athenæo *ἰσθμῶν*, & *παρυρῶν* dici: utraque parte auritas, easdemque referatiles esse. Nam ab altero latere nodo ligantur, ovum dictum altera tantum parte eis fieri: Athenæus eis ostrea in quibus nascuntur margaritæ contulit. Sponte in arenosis & limosis locis proveniunt: in sinu verò Aquitanico & Normannia capiuntur frequentissimè. Anno autem perficiuntur. Temporibus pluviosis proveniunt plurimi, quod & ab his testatis accidit. Nam squallore pectines magis trahunt rufum colorem. Iamque in Pyrrheo Euripo pectines aliquando defuerunt, non modò propter ferramentum, quo piscatores abradendo ubertim caperent, verum etiam propter siccitates. Quæ autem ova in iis appellantur, quamvis verè iis insint, moxque procedente tempore minuuntur aboleanturque, tamen nihil ad generationem conferunt, sed indicium sunt nutritionis melioris, quale in sanguineis pingue est. Oculi ut ostreis nulli, Conchis dubii, sic pectines si quis digitos ad vertus hiantes moveat, contrahuntur ut videntes. Volare sfigitæ, modo, nisi fortè hoc ad Lolliginem pertineat, Plinius prodidit: sed & stridere sentiuntur, quoties per summam huiusmodi nitibundi feruntur. Massarius per aëra volare negat. Cum enim, inquit, callo illo interiori ambæ testæ connexæ sint, ut difficile dis-

velli queant, non possunt ita liberè appetiri, ut volare valeant &c. Tanta ramen velocitate dehiscunt: ut ex vehementi percussione saliant, & superiaciant, ut quasi volare videantur.

Ufus.

*Vsum in Cibi* quod attinet, fucæ olim apud antiquos celebres, nec in Cotyis convivio omissi. Celsus & Archigenes stomacho aptos faciunt. Galenus succum alvum ducere non aliter ac serum lactis scribit. Xenocrati dulces sunt ac facilius ostreis concoquuntur. Magis assari, secundum eundem, minus succi habent & difficulter excernuntur: in testis suis si assentur, minus huius incommodi habent, facilius alunt, & valentiores sunt. Nativam autem dulcedinem in muria conservant & urinam movent: ac candidi quidem & lati sunt dulciores atque albi duri: rufi virosi & urigam cient: varii autem medii sunt, & eorum aliqui fucis similes, qui per se dari difficulter concoquuntur, & tamen urinam movent. Diphilo candidi molliores sunt.

Locor. varietas bonitatis differentiam invexit. Methymnos à plerisque gulæ amatoribus suis temporibus expeditos Clemens Alexandrinus testatur. Varro peştunculum Chlum, inter cancrum ciborumque exquisitas delicias comprehendit. Horatius Tarentinos laudat, idem in eorundem numismatib. frequenter occurrunt. De reliquis ita Xenocrates. Peştines, inquit, optimi sunt, qui ad justam magnitudinem pervenerunt, cavi, colore nigriore: præstant autem vere ac æstate, siquidem eo tempore ad Lunæ incrementum optimè augentur. Omnibus autem antecellunt Mytilenæ, magnitudine, natura, humoris bonitate. His similis Ionium mare juxta Illyrida, Hætruriam, Salonas, & Latium producit. Iam verò & Chios & vicinæ insulæ, item Alexandria ejusmodi pisces ferunt. Pontus quidem etiam multos fert, sed minutos & qui ægrè augeantur.

*Vsum in Medicina* si spectes, Trallianus in colico affectu dari jubet. Pli-

nus urinam ciere, & quæ in vesica sunt moderatè detergere scribit. Ad Venerem excitandam non minus valent quàm ostrea.

*Differentia* peştinum sunt variz: Differentia sunt magni, quibus altera valvular. latior veluti regmen superposita est; sunt & rufi, candidi, versicolores, candidi & lati: sunt utraque parte auriti, alterutra tantum, nulla, si Bel-

lonio fides est. Ex auritis, quidam utramque aurem habent magnitudine; alii minores aures habent quàm caput testæ: quidam tam magnas, ut ab una aure ad alteram ducta linea, caput testæ non tangat, sed potius emineant aures; alii denique una aure minores. Duos Rondeletius descripsit: *Priori*, testæ est qua parte aurita, strictior, deinde amplificata in orbem circumagitur, altera modicè cavæ & in dorsum elata, altera veluti alterius operculum. Intus carnis multum habet, quæ circa medium etiam carnosum, longum, tenerum, alligata apparet. Inest in carne particula luteum ovor. colorem referens. Spectantur, *junior*, & os tubæ modo factum, atque intestinum tenue luteo plenum. Tota caro in ambitu membranam habet veluti fimbriam versicolorem, ex qua fila & multa & tenuia dependent. Huic similem Aldrovandus ponit, testa ferrugineis diluti coloris, fasciisque ferrugineis. *Alter* superiore est toto corpore longior & strictior, amplioribus auribus, utraque testæ peştuncolorum Butdigalensium modo concava. Aldrovandus plurimas earundem figuras, auriculis & colore differentes exhibuit, interque eos versicolorem, castaneum eburneum, & croceum qui auriculam unam habet satis latam proportionem animalis, rudimentumque alterius. *Eburneus* in summitate macula quadam rubra condecoratur, cui alia lutei coloris insidet. Est & *asper* colore fusco, cuius Iconem adjiciamus.

Clemens  
Pædag. l. 2.  
Varro in  
Satyra.

## PUNCTUM V.

## De Musculis.

TAB.  
XV.  
Aldrov. l. 3.  
c. 70.  
Nomen.

**T**ESTACEA, quæ vulgariter Musculi vocantur, Plinius quædoque myas, aliquando myscas, nonnunquam myscos, sæpè musculos appellat. Athenæus *myas*, Aristoteles *myas*, vocant, moderni Græci *myas*, id est, parvum musculum dicunt: nos musculos simpliciter minores appellamus. Rondeletius ita eos describit. Sunt ex ostracodermorum genere, quæ tenui testa & duplici conteguntur, circa saxa aut ligna nascuntur pilis, & veltri lana alligantur. Testa foris nigra, ferè semper vel musco vel lanugine obdita: intus lævis & splendens, ex albo cærulea, parte acutiorè crassior & spissior, reliquo ambitu rotundo tenuior. Caro intus pallida, cum non cruda est, cocta vitellis ovorum similis, in ambitu simbriata, in eo foramen est evidens ad attrahendam aquam, neque enim per villos trahit: in media carne est particula carnosa linguæ similis: inest & mutis, & pituita quædam glutinosa, callo albo adhæret. Reperiuntur & in mari & in aqua dulci stagnante: nunquam verò ferè in rapidis fluminibus.

Vfus.

Ubique ferè in Cibus cedunt, sed optimi sunt Ephesi. Marini commodum præstant nutrimentum: qui in aqua sunt dulci, carne sunt dura, concoctu difficili, pravi succi. Laudatissimi qui in inferiore Germania ex Oceano Germanico capiuntur. Medicinam suspēctes, ad ciendam & urinas multum præstare vult Athenæus, cui Celsus adstipulatur. Marinum tritum ex oleo vetere talorum tumoribus & dolotibus impositum mederi, Marcellus Empiricus reliquit. Aquatiles ad nebulas oculorum in jumentis adhiberi, testis est Gesnerus. Uruntur super carbonibus, & corium externum detrahatur usque ad medium, quod albi apparet: additur Zingiber, & chal-

canthi partibus portionibus, & ex his mistis, pollen in oculis equi infatur.

## PUNCTUM V.

## De Mytilis.

**M**Ytilorum nomen à Græcis mutavere Latini, *mytilos* eos illi vocant. Dioscorides testam ipsam *mytilos* dixit: animalia Oribasius *mytilos* cas: Athenæus *mytilos*, quod scyllam quidam ex his respiciant; Aristoteles *mytilos*, non soliatos à figura, ut Gaza vertit, nec latioris & amplioris conchæ, ut Niphus, sed in imo maris, seu gurgite nascentes, ut Rondeletius, nisi fortè *mytilos*, quod in limosis producantur dici debeant, ut Gesnerus innuere videtur. Iovius cum Tellinis eosdem esse censet, sed falsò, ut in sequentibus apparebit. Dioscorides sanè, Galenus, & Ægineta distinxere, ideo separatim de utrisque agunt.

*Descriptionem* inrer Differentias quære. Spontè naturæ in arenosis proveniunt: quod ante Plinium Aristoteles prodidit: prodire tamen & aliqua ab ipsis emissæ facultate, (buccinæ & purpuræ, quæ favare dicuntur, id est quasi à seminali natura humores quosdam mucosos emittere) vel potius sobole: quippe minores subinde juxta principium adnascuntur, Massario ex ipso Anstotele visum.

Reperere & in Cibus locum, tam elixi quàm assii. Crudi virus & scyllam respiciunt. Elix, & acrioribus quibusdam, ut sinapi, nasturtiove conditi, illud deponunt. Assi, sitim vehementer excitant. Deteriores sunt qui in locis arenosis, aut inter restas siglinas proveniunt, quàm qui in algosis gignuntur. Autumno & ubi multa dulcis aqua miscetur mari, bonitatem servant, procedente tempore amaritudinem trahunt, & colorem rubrum. Optimi quoque mytili, quando illa sic vocata ova continent. Ius corpus augere Plinius reliquit: eodem sues, teste Lemnio, pinguescunt.

Maio.

TAB.

XV.

Aldrov. l. 3.

c. 71.

Nomen.

Descriptio.

Generatio.

Arctot. de

gen. II. 4.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

l. 3. c. 71.

Maiores duci sunt, idèd concoctu difficiles: sanguinem procreant crassum, succumque non adeò bonum: copiosè tamen alunt, & ventrem urinamque crient.

In *Medicina*, eafdem cum Musculis facultates habet. Carnes ad canis morsum valere scribit Dioscorides, sed repugnat Galenus. Iurimultum Plinius tribuit. Myacum jus, inquit, traditur alvum & vesicas exinanire, & in teranea distringere, omnia adaperire, tenes purgare, sanguinem adipemque minuere. Itaque iulissimi sunt hydropicis, mulierum purgationibus, morbo regio, articulari, inflationibus &c. Concha ad excipiendum oleum loco cochlearis utuntur.

*Differen-  
tia.*

*Differentia* aliquot apud auctores invenias. Sunt enim, si locum spectes, alii *Marini*, alii *Fluvialles*. Hi marini sunt similes, in eo tamen differunt, q̃ minores sunt, subrecti apparent, atque huius pinnæ modo infigantur. Sedem nò murat, grandi hiatus suas testas pandunt, easque referatiles & clusiles, tenues, intrus glabras, pictorum coloribus accommodatissimas habent. Gustus sunt ingrati. *Marini*, ut Bellonius habet, villos extrorsum habent more pinnæ, ab ea testæ parte quas scopulis hærent, per quos alimentum exfugunt, atque arenas & marina dejectamenta attrahunt. Caucrum pinnæ modo in concha nutrit, orbicularem, parvum, suis sic membris absolutum, ut & incedat & alatur, & ova excludat grandi lente multò maiora & crassiora: humi accumbant, cum tamen glandes sive muscioli adhærendo pendeant. Differunt & magnitudine, rotunditate, & gustu. In maioribus cancelli, ut dixi, nascuntur cancelli. Salem vitæque respiciunt quidam. In eo verò à cæteris ostracodermis differunt, teste Aristotele, quod tenuia labra habeant. De magnitudine trium vel quatuor heminarum, quod apud Plinium legitur, nil dico. Videretur hoc Phocæ vel Lepori marino competere, vel in genere conchis debere describi.

*Plin. H. N.  
L. 32. c. 9.*

*Arist. H. A.  
L. 4. c. 4.*

Aldrovandus plura earum genera cum Iconibus exhibuit, inter quæ est, Castaneus, Niger cum tuberculo adnato, alter cum striis flavis. Fluvialium alium maiorem, alium minorem dedit.

PUNCTUM VI.

### De Tellinis.

**T**ellinatum nomen Athenæus Latiorum mytilis tribuit, Plinius pectunculis illa, quæ Tellinis à Dioscoride adscripta sunt. Noshic illas intelligimus, quas moderni Græci *ὀψίονες*, Lesbi incolæ Chinades, Galli Narbonenses & Romani Tellinas, ὀψίονες γίνονται τὴν καί, quod ocyssimè perficiantur, Veneti Capparazole, sive Capparole, à capparis similitudine, appellant.

*Descriptio* inter differentias quaratur. Non tantum in mari, & portibus undis agitatibus degunt, sed & fluvius. Locis verò atenosis maximè delectantur.

In *Cibis* laudem præ cæteris testatis meruere. Plus succi habet earum caro, quæ etiam reliquarum carne mollior. Recentes, secundum Dioscoridem, stomacho sunt utiles, sed maximè jus earum. Elixas, dulces esse, earumque jus alvum solvere Oribasius prodidit. Venetiis, Genus, & Romæ rustici in faccis per urbem circumferunt, quas modiolis divendunt. Cum enim exiguo corpore (verba sunt Bellonii) consent, nec facillè aperiuntur, gustique gratæ sint, mirum in modum ob id expecti bellatiorumque loco assumi solent, inprimis, si ab arena optimè, repurgatæ fuerint. Marinarum inprimis, & in his renuiores, quæ Athenæo Basilicæ commendantur: & quod Castor Durantès ventriculo noxias esse scribit, de fluvialibus fortè fumendum est. Sitim certè istæ excitant, calculosque gignunt: Oribasius tamen maiores esse, & plus succi habere, Ægyptias inprimis, scribit. Clausæ sale sparguntur, & per testas humorem trahunt.

*Tab.  
XV.  
Aldrov. l. 3.  
c. 72.  
Nomen.*

*Descri-  
tio.*

*Vnus.*

*Oribas. l.  
Col.*

*Durant. in  
Theophr.  
scop.*

In

In Medicina uſtz cinerem reliquũt cauſticum, adeo , ut is cum cedria myrtus & inſtillatus, euulſos radicibus palpebrarum pilos renaſci prohibeat. Arotæzus in Iliaco affectu ius iſpſarum propinari iubet. Pueris ad ſonum tubæ imitandum uſui eſſe, Athenæus prodidit. Sopater etiam in Comœdia quæ inſcribitur Eubulotheombrosus ſcribit. At teſiſte, è Tellina repente ad meas aures ſuauiſ quidam ſonus illapſus eſt.

Galen. de  
ſimpl. med.  
11. 38.

Athen. Dip.  
1. 3.

Differen-  
tiæ.

Quantum ad *Differentias & Genera*, Athenæus alias marinas, alias Fluviales, ſeu quæ in fluviorum oſtiis reperiuntur, ſccit, & addit, in Canopico oſtio & Nili aſcenſu multas eſſe. Illarum *laſtiæ*, ſeu tenuiores Baſilicas idem vocat, & alvum ſubducere, beneque nutrire ait. Hæ, quia majores, Baſilicarum nomen mererentur, niſi expreſſa Athenæi in contrarium verba eſſent. Bellonius Baſilicas ita deſcribit. Lævis eſt Tellinarũ teſta, candida, nequaquam ſtriata, crenulæ tenuiſſimis denticulata, in longitudine diſtufa & anguſta mediocriter fortis & quodammodo teres. Rondeletius duas etiã ſpecies ponit, quarũ una duplici teſta conſtat, utraq; ſimili, lævi, valida, & ſatis ſpiſſa, in ambitu ferrata, qua de cauſa ad unguen conjunctæ ſunt, intus levitet cavæ; altera, in oſtio Araris fluminis invenitur, in ſuũ Agathenſi, ſuperiori ſimilis, niſi quod teſta ſit maiore, minusque ſpiſſa, & ex rubro ſaveſcenti parte, qua teſta colligantur, in acutiorẽ angulum deſinente. Addit & Terriam, colore candido, teſta pellucida, ex additamentis multis conſtata, intus læviſſima. Tenuis admodum, & ambitu magis rotundo. Aldrovandus plures apoſſuit, inter quas ſunt nonnullæ cum dentalibus, una etiam teſta diaphana & fragili, alia cinerea, lineis purpureis

transverſalibus.



## PUNCTVM VII.

## De Balanis, &amp; Pholade.

Tab.

XV.

Aldrov. 1. 3.

c. 3. 73.

Nomen.

Deſcri-  
tio.

Balani ſeu glandes, à glandium ſimilitudine nomẽ obrinuere Pollicipedes Bellonius vocat, quia vulgo pouſſepieds dicuntur, quod pollicum in pedibus ſimilitudinem habeant.

Deſcripſi ea ſita Rondeletius. Id genus glandem eſſe colligimus, quod illi cum glandibus magna ſit ſimilitudo. Nam ut glandis quercus vel llicis pars prior levis eſt, & in acutum tendit, poſterior aſpera; ſic hæc, quæ ſaxo exhibemus aſſixa, poſteriore parte, qua ſaxis hæret, rugoſa ſunt, & aſpera, glandiumq; caliculis, poſteriotem earum partem arctè retinentibus ſimili. Plura ex una radice pendent è ſanorum rimis. Ex teſtaceorum genere ſunt. Pars enim prior, longa, rotunda, ex duabus teſtis componitur, colore & lævitate unguium, in medio rima eſt, ex qua capillamenta quædam veluti plumæ rubefcentes prodeunt. Concha una veluti ex multis acutis unguibus conſtat, tota in quinque digitorum longitudinem accreſcit. Crassiſſitudine ſunt pollicis in Hiſpania; in Britannia Arcmorica minores. Pars poſterior quæ ſaxo alligatur, corio duro aſperoque potius quam teſta conſtat, ex nigro ſaveſcit. Plura in Differentiis vide.

De *Laco* non eſt quod multa addamus. In Hiſpaniæ parte ea quo Oceano alluitur, in Normannia & Britannia frequentiffimi ſunt, perque vicinas urbes & pagos divenduntur. Racematim Oceani caudibus adherent.

Locus.

Laudantur in cibis, tanquam optimi ſaporis ab Epicharmo, & qui tum in modũ ſtupidia ſtomachi ſublevant, & mulierum malaciis accommodentur. In convivio quo Lentulus ſtamen Martialis inauguratus eſt nigros & albos apoſſitos eſſe, Macrobius teſtatur. Elix ex aqua ſalfa

falsa pulpam habent duriusculam, quam auferunt, sinistra tenentes radicem, ad quam alligatur, dextra vero caput arripientes: quod postea quam contorserint, pulpam à theca extrahunt, ut ambiens corpus relinquatur vacuum calami modo. Pulpam autem quæ inde egressa est, lumbrici modo oblonga, rubra, teres, acetopiperato maceratur ac manditur, Archigenes quoque apud Galenum stomachicis conuenire scribit.

Differen-  
tial

*Differentia & Genera eorum recensentur aliquot. Sunt 1. Majores, quos ex Rondeletio superiores delcipimus. 2. Minores, qui nascuntur iu-  
laxi & rimis navium, quæ diutius immotæ uno in loco manserint. Ad-  
nascuntur etiam mytilis. Striatæ sunt, foramen habent, è quo veluti frondem emittunt, multæ simul nascuntur. Inrus parum carnis continent, & parvæ semper manent. 3. *Ægyptii*, quia Nili ostia capiuntur, & sunt, teste Athenæo, dulciss. teneri, origati, copiosi nutrimenti, multæ fucis, diuretici, & solvunt alvum. Aldrovandus etiam quosdam exhibuit, interque hos, multos modicè rubescentes, simul adnatos, a Gigante sibi communicatos, eosq. striatos. Ostraceum quoddam, quod m. rito polyceps dici possit, quoniam v. l. rici ex multis Balanis compactum est, læve rubescens, balanum denique sessilem, qui in parte inferna ubi insidet, maximum habet foramen.*

Alt. l. 34.  
34.

*Pholades* non tū quāvis & quāvis, quod in cavernis & latibulis condantur, suum obtinere nomen. Et redde ita in saxis latent, ut isdemque undiq; contegantur, pect foramen verò exiguum & senfui vix patens aqua nutriantur. Miffum est, inquit Ronder. ad me alio ex littore faxū, in quo nullæ timæ, nullæ cavernæ, sed foramina tantum apparebant tam exigua, ut vix aciem admitterent. Eo igitur iōibus multis confra&to, cavitates internæ nullæ erant vario situ, & diversæ magnitudinis, in quibus conchas istas reperi. T estis constant

duab. lōgis, non in latū extēsis my-  
tūlorum modo, sed rotundis. Intus  
eadem ferē ē caro quā in mytilis.  
In saxorum cavernulis, vel vi vel na-  
tura factis, aquae marinae apfūllū  
procreantur, atque in concham ver-  
tuntur, quae cavitatis seu foraminis  
figuram fērvat. In portu Veneris  
multae occurrunt.

Nullus earum præter Athenæum  
meminit, qui eandem palato suaves,  
sed malisucci & virosas facit.

Virus.

## Р у н с т у м VIII

*De Solene.*

**S**olen Eustathii *ὁ καὶ τῶν ὑαλῶν ὁ σωλῶν* & pet crasin *σωλῶν*, dicitur, Græcis vocatur *σωλῶν*, à canalis five rubei similitudine, *δ' ὁ σωλῶν*, à figura arundinis crasse, concava, quæ Cypria arundo Dioscoridis *Daδύλων*, ab humanorum unguum similitudine; *ὁ σωλῶν* denique seu unguis, à extremitate, tenuitate & figura unguibus simili, vel à testæ colore & substantia unguibus nostris non dissimili. Veneti Cappam longam nominant, Bononienses pisicem canellam. In *Cibis* à pauperibus adhibentur. Galenus dura carne esse dicit, & ob id difficulter concoqui, propiumque hac ijs & Purpuris, ut refert Nicefius quod cum in jussulo coquuntur, id crassius reddunt. In ore mandentium relucere Plinius scitpium reliquit. His natura, inquit, in tenebris remotolimine, alio fulgore clares, & quanto magis humorem habeant, lucere in ore mandentium, lucere in manibus, atque in solo arque veste, decidentibus guttis, ut procul dubio pateat, succi illam naturam esse, quæ etiam mirum in corpore. Splendoris causam glutinoso Solenis succo adscribit Rôdeletius, hi quidem quæ tenacia & veluti glutino compacta sunt, ea lævia, æqualia, ac æc perpolita esse solent, atque ob id relucetia. *Difficilius in Mari & Feminæ. Illos*

## Plus

TABLE  
XV.  
Nomen.

*Perna magna Rond*

*Perna turris minor*

*Perna alba*



*Perna alba*

*Perna parva Rond*

*Perna j. Perna minor*

*Perna aculeata Aldrov*



*Pistula diverja*

*Perna alba cum tuberculo alato*



*Pistula Albou*







Plinius Solenes, Aulas & Donacas vocat, has Onyches. *Mais* secundum Rondelerium, ex Concharum longarum est genere: dupli constans tellis, laxi, tenui, altera tantum parte colligata ni to vineulo, etiam si aliter scribat Aristoteles. Cum enim *de qu* alia sunt altera parte li ata, altera soluta, ut claudi & aperiri possint; altera utroque late e connexa, in his postremis Solenas numerat, cum contra semper altera parte solutos videas. Dodrantali sunt longitudine, pollicis crassitudine, harundinis modo cavi, extremis duobus semper petris: anteriore caput exierit, & retrahit restudinis ritu, secundum testis longitudinem catenam prorensam habet. Testa cæruleo est colore, lineas evidentes habet per transversum ductas, qua parte colligatur: crassior est, aliis partibus in tenuem substantiam definit, ut myruli. Aqua & arena vivit. Carni facultatem utinæ sciendæ inesse Plinio scriptum: sed quia glutinati succi est, metuo ne erret. Dissert ab isto *Mas Rondelerii*. Est enim lineis miniaceis, per transversum variegatus; in altera quoque Conchæ extremitate, linea lutea apparet. De *Fammaria* item Rondelerius. Onychas appellat Plinius Solenes fœminas, quæ colore, sapore, magnitudine, à maribus differunt, in aliis omnino similis. Testa lineis cæruleis distincta non est, ob id Plinio unicolores dicuntur.

Caro dulcior est: sed vix comedi potest nisi ab arena repurgata. Sumuntur frixx & elixx, melioresque in prunis tostæ, quoadhient. Rondelerius deteriores existimat, quod sint ex succæ, duriore, & sicciore. In arena stare Bellonius et adidit, sed cum omnia silent iussu è profundissimo foramine emergere, & in id seles postea abdere, unde postea nisi palla ferrea in transversum supposita, & profundissimè impacta avelli possunt, id quod & Plinius, & ante cum Aristoteles vidit.

## CAPUT IX.

## De Pinnis.

Pinna, Græcis *πιννα* & *πιννα*, quod *Tan*, semper sordibus obducta sit, dicitur *XVI*. Hetmolaus Concham Ægyptia cognomine Paralios, à Democrito Pinnam vocari scribit. Aquibuldam Agnus castus vocatur. Neapolitani Pernam, Veneti Astutam, vocant.

*Descriptiones in Differentiis* vide. Describitur Ex duabus testis componuntur, & à pino. myrulorum figura non admodum differunt. Cancro etiam in illis hospitantur. Rondelerius tantam Romæ se vidisse scribit, ut ad cubiti magnitudinem accederet.

*Locus si spectes*, in Acarnania Pinna oriri & uniones gignere Plinius testatum reliquit. In mari an sint ambigit Bellonius, & Rondelerius in locis in quibus mare fluit ac refluit, vix repetiti scribit. Venetiis non visitur: sed in Propontide ad latera eius sinus, qui Nicomediam fertur, qua terram pertingunt, frequentia magna existit. In ruinis Nicomedie civitatis reperiri, Bellonius author est.

*In Cibo* comparando, Cancellum Naruta, semper aut Squillam comitem habent, sua sede non dimoventur quin peteant; nisi iterum eodem statu humi defigantur. Nam cum eis naturaliter insit, ut rectas stare, & per villos arenulam attrahere necesse sit, jacentis vivere non possunt. Naturam eius optimè versibus Philis explessit, in cuius testa & uniones & byssum repetiri testatur.

*Usum in Cibo* quod attinet, Athenæus eas urinam pellere, difficileque concoqui & distribui dixit. Ovum, quod secundum Aristotelem continent, pro lunari potestate, aliquando minus, non ad generationem confert, sed melioris nutritionis indicium est.

De carnis dotibus ita Wottinus. Pinnæ, inquit, optimæ sunt, renellæ, i 2 plenæ,

Aristot.  
H. Aul. 4.  
c. 4.

Viss.

Plenz, carnosæve, quæ in limosis (maribus) vadis gignuntur; & ubi mari dulcis aqua miscetur, & locis tranquillis, ac ventis carentibus: teneriores enim hinc nascuntur, quam ubi fluctibus agitantur. Grandioribus parvæ: & quæ vere & ætate capiuntur, aliis præstant. Sunt enim & suaviores & pleniores. Quæ magnitudine mediæ sunt, carnem quidem habent mollem, candidam, ac dulcem: collum durum, concoctu difficile, corruptionique renitens, Collonamque corpus reliquum facilius corrumpitur: elixis assæ duriores evadunt, præsertim si vino fuerint aspersæ. Earum quæ in vino mace- ratæ sunt caro, mollior est, sed statum generat.

*Differen-  
tiz.* *Quantum ad Differentias*, Rondeletius tres differentias agnovit, Bellonius duas, Aldrovandus quatuor posuit.

Rondeletii *prima* est Minima, mytilis similis, nisi quod strictiorem partem multo magis acutam & longam habet. Testa foris aspera est, colore fusco, intus viridi, & argentei splendoris, si in arena vixerit Pinna; si in cœno, colore est magis flavescente, & minus splendens. Ab inferiore & strictiore parte in amplam latitudinem extenditur: illic arctissime clauduntur testæ, hic faciliè discluduntur. Intus multum est carnis, cuius omnes ferè partes indifferetæ. *Asteram* Petnam Plinio vocari scribit. Petnæ, inquit isti, Concharum generis, circa Pontias insulas frequentissime stant, velut suillo crure longo in arena defixæ, hiantesque qua limpidudo est, pedali non minus spacio.

Cibum venantur. Dentes in circuitu marginum habent pectinatum spissatos. Intus pro spondylo (spondylus seu callus caro durior & interior ostrearum est.) Eius generis hanc esse in qua unius nascuntur, ex Theophrasto Athenæus tradit.

In Gallico mari inveniri, & in

cauniones parvos author est Rondeletius. *Tertia* minor est, & eo differt, quòd antequam acuta & stricta parte in amplitudinem extendatur, excavata sit.

In cœnolis & arenosis locis vivit defixa: & carnem intus duram habet quæ virus relipit.

Bellonio altera *Major* est, altera *Minor*. Hæc foris magis albicat, intus ad cæruleum accedit. Mollibus in gyrum spiculis obtusis hirta est, valvasque continuè cardine cotolateræ annexas claudit ac refert, quæ parte planior esse constat quæ autem se in latum expandit, eadem byssum est veluti capillamentum quoddam coacervatum prædurum ac nigrum quod lapillis attingitur, lumumque ac spurcicias inde ad stomachum attrahit. Illam Petnam vocat, quæ pelagia est, rigis profundis caret, durior testâ contegitur, & bipedalis sæpissime invenitur. Pinnophylacem, ut minor, alit: uliginoso ac palustri tractu nascitur: profundiore gurgite immetgitur, & multum ingrati saporis habet.

Ex *Aldrovandi* pinnis *prima* est aculeata, coloris rubei: *Alter* *pinnæ* parvæ *Rondeletii* similis cum capillamentis: *Tertia* pinnæ *Petnæ* genus. *Quarta*, parte interna & externa depicta, testa foris fusca, rubra, & asperfa: intus sanguinei, & cærulei coloris. Datur & *quinta* cum cubere verrucoso intus adnata.

Pinnis adde *Conchas anatisferas*, diversi generis. *Prima* tribus partibus constat cum umbilico annexo. *Alter* quinque partibus cum umbilico. *Tertia*, aperta est, eique umbilicus inseritur. *Quarta*, hiulca est ea parte qua primum plumulæ prorumpunt. *Quinta*, forum intra vulvas suum ostendit. *Sexta*, factum imperfectum è valvis exemptum. *Septima*, Berniclamavem adultam, ex ejus cernomodi Concham.



*Patella Gyprina maior non striata. n.* *Patella Gyprina maior striata. n.*

Tab. XVII

*Lepas, sive Patella Ballo.*



*Concha Venerea.*

*Concha Venerea Zographi.*

*Patella ferre sive Aures marinae.*



*Concha Ven. Rond.*



*Concharum Venetianum Speciebus.*



*Concha Persea maior.*

*Concha Persea minor.*

*Tubuli in quibus Vermes.*



*Peniculus alius.*

*Peniculus Morbendi.*



*Vermes in Tubulis.*

*Tubuli ab ipso.*



## ARTICULUS VI.

## De Conchylijs Univalvibus.

## PUNCTUM I.

## De Lepade seu Patella.

**TAB. XVI. & XVII.** **HA**ctenus de Bivalvibus dictum: Univalvia sunt, *Lepas, Concha Venera, Concha Persica, & Penicillus*. Ad priorem *Auris marina* pertinet. *Lepades*, Plauto nisi mendum subest *Lopades*, quibusdam Græcis *καυαδες*, modernis Petagides, ve quod sint petra: um in mari quasi *καυαδες*, id est, squammæ quædam; vel quod petrae cum eis spoliantur veluti *καυαδες*, hoc est, desquamari videantur, dicuntur. Gaza Patellas, à vasiscarii similitudine, ut Rondeletius autumat, exponit. Inter *καυαδες* censeferi debere, nullum dubium. Saxis testa in dorsum data adherent: ideo Aristoteles alteram partem superficiei detectam, carnem ostendere dixit. Os ipsius vestis terram, & excrementorum exitus superius habetur: Papaver quoque in imo, sive in suo fundo habent. Bellonius scribit tanta esse magnitudine, quanta extrema ovi putaminis pars abscessa esse potest. Colorem testarum livere vel cinereum esse cornuæque limacis instat exerere, & os, & caput habere huic persimile. Plura in Differentia vide.

**Locus.** *Locum* si quaeris, in saxis lictoris Aquitanici & Britannici, nec non Massiliensis & Agathensis sinu scopulis inveniuntur. Circa Lepadusas insulas tam frequentes, ut nomen iisdem dederint, si Athenæo credimus. A saxis solvi, pastus quaerendi gratiâ Aristoteles author est, cui & Bellonius, dum cochlearium more serpere ait, subscribit. Ad Rondeletius id negat, Nullis enim, inquit, ad natandum partibus prædita est, nisi

temerè huc & illuc undis jactata feratur; neque victus illi quaerendus, nam maris si uma & aqua vescitur, quâ alluuntur saxa. Quod si aquâ allui saxa desinant, ea quæ in testa relicta est absumpta, contabescete & emori tandem necesse est. Tam se fortiter attachæ faxis applicant, ut ne Milonis quidem digitis, avelli possint. Cultero igitur aut aculeato ferro opus est, inter ipsas & saxa immisso, quod ad oras Oceani Aremoricorum pueri facere solent, prodente Bellonio.

In Cibus crudæ à piscatoribus & maresaccolis usurpantur. Coctæ facilius concoquantur, modò non nimium decoquantur. Jus alvum ciet. Usus earum & ad capiendos cibos esse, ex hoc Tarentini videre licet. Obsonii *καυαδες* dicti, præparatio in mari cuius vi in unum locum statim omnes pisces conveniunt.

Ex mari *patellas* accipito, earum scilicet, quæ circa saxa nascuntur: quarum quidem contundens carnem, exprimesque ex ea in testa aliqua inscribito, quæ sequuntur: subitoque non sine magna admiratione videbis pisces in unum locum fluere confertum. Sunt verò ipsa non in *καυαδες*, quibus sanè ichthyophagi utuntur.

*Dividitur in magnam, Maris rubri parvam, & feram. Major Rondeletii testam* habet non exquisiti rotundam, sed inæqualem, intus lævem, foris parum asperam, cui aliquando mucus innascitur, gibbam in ambitu livescentem & striatâ, intus cavam. Carnosam quoque simbriam in corporis ambitu quam expandit quum hæret, soluta contrahit. Interius subest caro dura, quâ maximè saxo hæret, quæ scuti picti formam refert. Os superiore in loco manifestum est, inferiore ori adverso, excrementi meatus, non in testa, ut in ea quæ *αγαρα* dicitur. Os venter sequitur, in eo est *μύκων*, in imo ventre etiam pars, quæ ovum dicitur. *Maris Rubri* *lepas* Bellonii, tabellis, quas in tergo gerit, corneis numero ostionis,

i j trans-

transversis, locicæ modo contegitur, atque undequaque cartilagine obsepta est, multis spinulis horrida, his persimilibus quæ in stellis marinis videntur: sesquidigitum lata est, ternos verò longa. Caro rubrilimacis colorem ac naturam habet, est utque co-

Aldrov. l. 3.  
c. 81.

*Fera*, ἀμετάγωγη, & αὐτὴ *marina*, θαλάσσιος; ob magnam cum aure nostra similitudinem, testam habet cavam, argenti vel unionum colote: foris gybbam, lineis multis depictam: parte unâ, cochleatum modo claviculatim contectam, à qua foramina incipiunt, initio parva, quæ deinde magis ac magis augmentur. Differt à majore excrementi meatu, quod ut annotavit Aristoteles, parte ima testæ excrementum egeratur, quâ foramen habetur. Bellonius majorem vocat. Quia testâ pellucida & perpolita est, ideo ab aurifabris in tenues laminas dissecatur, ut inde elegantissima vasa incrustentur. Aldrovandi Cypria major striata & non striatâ ad majorem Rondeletii referri potest.

## PUNCTUM II.

### De Concha Venerea.

TAB.  
XVII.  
Nomen.

Aldrov. l. 3.  
c. 82.

Martial.  
l. 14.

**C**oncha Venerea nomen fortè ex eo invenit, quòd non modò Veneri grata, sed & ob communem originem mari cognata, credere: turcelebrisque esset eius Dex effigies, atque haud suo an ex hoc genere, ut Gelenii verbis utar, pede premens. Martialis Conchâ simplicitet vocat. Nyle Poëtria Conchâ Erythræam, sine dubio, quòd circa materubrum frequens sit. Bellonius in vico nomine Tor viginti camelos his conchiliis rotundis onustos se confexisse prodit, & Cairi incolæ ad lævigandam papyrum, & telas colorib<sup>9</sup> permixto gummi con-

factas uti. Ideò eisdè Lævigatoria dicitur. An Belliculi marini, ὀφθαλμοὶ ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ Myræψι, seu ut quidam vettit, Umbilici marini rectè à Pharmicopæis nonnullis dicantur, dubito.

Putat enim interpretes lapides intelligi exiguos & candidos, in litore maris repertos, umbilicum hominis referentes abstergendi facultate præditos, quos alii fabas marinas dicunt. Cordus Dentalium nominavit. Ennius fortè, citante Apulejo, *Matriculas* Mutianus apud Plinium *Muricem*. Nec aliud quid sibi χυρίαις Gæ. l. 9. c. 25. cotum volunt, quamvis eas Aristoteles præterierit. Expresse enim, eas Conchas marinas, quibus utebantur Athenis ante calculorum usum inductum, Scholiastes Aristophanis vocat: ne dicam, Pollucem quoque idem attestari. Galli *Porcellanas* appellavere, seu à quadam oris suilli specie, ut Gesnero placet, quam partem suam inter labra denticulata dehiscente, vel potius altero extremo testæ, nempe acutioris & eminentioris, rostri suilli instat, quodammodo referunt: ἡ δὲ τῆς τοῦ μαστοῦ γυναικὸς τῆς αἰτίας, τῆς ποτὲ τῶν χυρίαις γίνεσθαι: καὶ τῆς ἰσχυρῆς καὶ ἐπὶ τῇ ποτὲ. Sane nutritæ apud Varronem maximè naturam quæ feminæ sunt, appellantur Porcum, & Græci, eadem significatione Chæron sive Delphaca. Uterinos etiam calculos, qui hoc genere minores sunt, vulgus Germanorum appellat. Minimam aliqui Corvinam aut Corviolam dixere.

*Descriptio* si attendatur, Latior est, secundum Mutianum purpura, neque aspeto, neque rotundo ore, neque in angulos prodeunte rostro, sed simplice concha, utroque se latere colligente. Testam omnibus admodum duram esse vel inde agnoscas, quod nunquam eam atrosam comperias. Tota intus candida est, foris colorum varietate insignis, in divolis conchis, poltrissima & æquabilis. Os ipsi est in ambitu denticulatum, inque eius lateribus canales breves, per quos linguam exeret. Plura in Differentiis.

*F. sum*

*Vsum* in quibusdam concha sola invenit. In pillulis de bdellio adalvum stringendam repetitur: quamvis Monachi Mesues interpretes matrem petlar. supponi jubeant. Turcæ & Cairi incolæ quomodo eis utantur, superius diximus. Galli ad suspendendas claves & conficienda cochlearia utuntur. Æthiopibus loco monetæ inservit. Ideo in tanto apud eos precio, & sæpe aurum pro ea permittunt, sæpe filios suos vendant. In Concha maiore faciem sculptam & pulchrè expressam se vidisse, Gesnerus testatur.

**Differen-**  
**tia.** *Differentia* Concharum plurimas apud Rondeletium, Gesnerum & Aldrovandum invenies. Rondeletius quatuor habet.

*Prior* ovi est figura, in testæ extremo utroque foramen habens, alterum cibi gratia parum prominens, alterum ad excrementa rejicienda. Remoram Mutiani esse credit.

*Secunda*, testa est tenuiore & magis perspicua, varia quoque, & pro maculis inspersis lineolas habente, Concha simplice utrinque sese colligente.

*Tertia* patte plana compressa magis est, maculis rotundis notata, durior secundo, colore candido.

*Quarta*, parte altera est in tumorem elata, in qua circulus aurei coloris. Alioqui rota foris est candida, intus cærulea.

*Gesneri* ruffa maior & minor non multum à Rondeletii abeunt. Illa nusquam inniti potest nisi parte plana quæ candida est, ut intus quoque gibba, quæ hæmisphærium constituit, ruffa, maculis nigris distincta. Lævitate ita resplendet, ut imagines reddat, sed obscurè. Minoris dorsum in summo varium est, albis, pallidis, & glaucis maculis. Pars interna candicat.

Aldrovandus, tredecim species, si non plures ponit, ex quibus una tota ex ruffo candicat, & maculis per totum dorsum oblongis & ferrugineis aspergitur: alia lurescebat primo

& maculis purpureis ornabatur, in humido detenta pallidior evasit, postquam superioris corticis cuticulam exuisset. *Tertia* maculis per dorsum a terimis rotundis & inæqualibus tingeatur. *Quarta* subpurpureis, amethystinis & cæruleis. *Reliquas* ibidem vide. Nos hic tres depingi curavimus. Quam Lusitani & Æthiopes Buzios dicunt, undique alba est, nisi quod in dorso lineæ binæ flavent, in ovalem ferè speciem coniunctæ, & dorsum ipsum inæquale quàm cæteris & gibbosum, ita ut illi quoque testa incumbere possit, sed obliquè. Pars intetior è roseo ad cæruleum redit.

Huc *Concham Persicam* & *Penicillos* refero. Illa à loco nomen sumit. Est maiore sui parte rubicunda, cætera candida. Margaritas proferte proditur. Minor tota cinericii coloris est. Tubulos testaceos *Penicillos* recentiorum nonnulli vocaverunt. *Molli* quidam & laxa substantia saxis alligantur, ita ut aquarum undis cedat & agitur. Cum id carnosum, quod nimirum intus latet, se exerit, frondem expandit, sunt & in quibus vermes delitescunt, quorum sex leones hic damus.



HISTO-






*Veruca centro-*



*Veruca major-*



*Veruca parva Rosal.*




*Veruca Rosal.*



*Veruca minor-*



*Veruca rubra Rosal.*




*Succinea lutea*



*Veruca minor-*



*Veruca marina alba trochilei aspectu.*




*Veruca rubra Rosal.*

*Leporello marino.*




*Conchium*



*Veruca Conchium Albu.*





nus. Cum aceto scyllirico pilothrum constituit.

Differentia. *Differentia* varias apud authores invenias. Aristoteli alix sunt corpore parvo, quæ cibo aptiores: alix maiusculo duroque. Alix sinuosis adhærent quæ nunquam à saxis absolvuntur: alix plana littora amant, quæ suis abiuncta sedibus vagantur. Idem

Athen. L. 3. apud Athenæum habetur. Secundum Rondeletium, Alix saxis vel cuilibet rei alteri adhærent: alix minimè. Rursus earum quæ saxis vel alteri rei hærent, alia perpetua stabilique sede illædunt, quæ sunt Urtica parva in rimis saxorum latitans: quæ Purpuris & Buccinis adnascitur: quæ cinerea est, longisque cirris confans: Alix sedes mutant, & liberè per mare feruntur natantque, ut, purpureaurrica. Semper solutæ sunt, quas vulgò Potes appellant. Parva, juglandis magnitudinem vix superat. Tora carnosa est, cirros breves habet, contracta recti intestini extremum refert, colore vario est. Quædam enim cærulea, alia viridis, alia subnigra, sed punctis aliquot cæruleis vel flavis vel rubris notata. Græcis *ῥαβδωτά* dicitur. Cineream à colore nomen sortita est. Tenuis est admodum, quia frondem magnam, id est, cirros multos habet, carnis parum. In Saxorum rimis vivit: comam semper explicatam habet, nec unquam contrahit.

Utraque scopulis littoralibus, & sis potissimum marinis tractibus qui ventorum impetum minus sentiunt, tam pertinaciter inhæret, ut nisi primo impetu divellatur, vix postea nisi in frusta concisa dirimi possit, adeò suas trichas arctissimè contrahit. *Purpurea*, seu Phœnicea, Rosa quibusdam, aliis Posterol, quòd contracta recti intestini extremum cum musculo sphinctere seu podicem referat, est primæ similis, nisi quòd frondem & longiorem & copiosorem habet.

*Purpuris & buccinis adnascens*, partem exteriorem habet duram & rigidiusculam, spissioremq; quàm in aliis urticis, cirros brevissimos in

ambitu. In exterioribus eius partibus filum longum deducitur purpureo colore, tam jucundo tamque fluido infectum, ut cum precioso illo Purpuræ succo certet. Ideò hanc à cane Hercules demorsam fuisse Rondeletius credit. Datur & in *Lepade nata*, de qua Ferrantes Imperatus ira scripsit. In dorso esse sex rimas stellatæ æmulantes: in medio dorsi foveam parvam cum figura quadam inclusa Conchæ rhomboidi simili, sustinerique à lateribus lepadis mediante membrana continua, & cavitatem, quæ est in animali non habere aliud intermedium quàm membranam. A parte anteriore conspici fructum Lepadis instar penicilli pictoris in se revoluti.

Ad priores illas refertur *Belloni* possum, quarum quædam rubro colore suffusa est, altera magis cærulea, granulis in gyrum circumfessa. Utraque marinum tubæ contractæ refert, explicata Cæsarlem totum corpus rotundum ambientem: nam infinitis cirris, antennarum papilionibus, aut scarabæi crassitudine constat.

Hæc etiam spectat Aldrovandi *Contracta*, *Cinerea Rondeletii* congener, quæ etiam saxis adnascitur, cutis tenuibus: *pilæ ferè forma*, colore tota coccineo, excepta summitate, quæ est viridis, cum nigra rotundaque macula: & quæ ex *leporis marini* genere, coloris partim purpurei, partim albi.

*Urtica soluta*, seu *Pota marina* vul. Aldrov. L. 4. 2. gi, quòd speciem quandam mulieris vulvæ repræsentet: Græcis *Mongi*, inhonesto etiam vocabulo, quòd, ut scribit Bellonius, partibus verendis admotæ, pruritum ac Venerem, imò etiam ampullas excitet, dicitur. Cum jacet, omalo similis est: cum erigitur, pulmo videtur, & adeò tanquam vitrea & lucida est, ut sine sectione interiora omnia videre possis. Suspensa, quandam Polypi imaginem gerit, nisi quod brachia tenuissima & crassissima habent. In partibus unde pedes oriuntur, quoddam meatus arenarum plenos Gyllius vidit. Formam supernè rotundam, infernè

k conca-

Differen-  
tiæ.

concavam refert Maſſarius, ut Con-  
chæ videri poſſint: Cirros ex imo e-  
mittere ad modum Polypti.

Duo huius apud Rondeletium  
genera. Primum ita deſcribit. Pars  
una veluti fungoſa quædam maſſa,  
rotunda, cava, in medio perforata,  
purpurea veluti faſciola ambiente,  
pileum planè refert: altera parte Po-  
lyporum pedibus ſimilis eſt. Oſſo  
enim pedes habet craſſiuſculos, ex-  
tremis partibus quadratos, in acu-  
tum deſinentes, nullas interiores  
partes diſtinctas habet. Corpore eſt  
adeò pellucido & ſplendido, ut ocu-  
los offundat. Ad eam magnitudi-  
nem accreſcunt, ut pileos, quibus  
viarores uti ſolent, ſuperent.

Alterum, quatuor duntaxat pe-  
des ſeu frondes habet, qui foliis a-  
canthi comparari poſſunt: in altera  
parte lineæ ſtellarim diſponuntur.  
Huius generis illa quoque videtur,  
quam *Bellonius* ita deſcripſit. Mollis  
quidem & albus corpore cartilagi-  
neo, ac cryſtalli in morem pellucido,  
quod in mucorem facile reſolvitur.  
Gibbâ habet inſtar dimidiatæ ſphæ-  
ræ figuram, glabram, pollicis craſſitu-  
dine: cuius pars interna nevis rectis  
à medio incipientibus, quaſi ſtris  
ſulvi coloris in gyrum radiatur, qui-  
bus ſe diſſundit & conſtingit: qua  
corporis commotione aquam con-  
cutit, & nunc in prorum, nunc in ſu-  
pinum eſſectur. Pinnarum vice pin-  
nis renuibz & ægrè conſpicuis in  
orbem communitur, ut *Lepus mari-  
nus*. Cruciformes quoque cirros,  
ſtriatos, craſſos, in modum ſtellæ ra-  
diatos, numero quaternas, parte in-  
terna natationi accommodatos ha-  
bet: quas ut exactè conſpicias, erit  
in lebetem aquæ ſyncerioris conji-  
ciendus: qui ſi ſupinus devolvatur,  
multas fiſſuras in radice cirrorum o-  
ſtendet.

Os quoque habet parte prona ſi-  
tium, quo ea quæ venatur abſorbet,  
in quem uſum quatuor citri ad eius  
latera ſubiacent, coloris ſynopidis,  
quaſi eius branchiæ eſſent, vel inte-  
ſtina. Hinc fit, ut inuentibus pul-  
monem in mari pabulandi gratia di-

vagantem, grandis videatur quaſi pi-  
tuitæ globus, qui unicum tantum co-  
lorem reſertet, niſi rubris illis qua-  
tuor circulis ſigillaretur, & ea cruce,  
qua interna pars ſtriata eſt, diſtin-  
guetur.

Ad primum genus referenda eſt  
*Præca ſoluta Maſſioſi*, quam hic da-  
mus. In fruſta diviſa, ac in mare con-  
iecta, vivit nihilominus ac movetur:  
extra mate exanimis apparet. Emor-  
rua in alto mari, ac in littus eiecta,  
transpatentis glaciæ ſimilis eſt. Om-  
nes pruritum in pudendis & ure-  
dinem in manibus movent, & acrimo-  
nia ſua Venereæ extinctam & ſopi-  
tam excitant.

## CAPUT II.

*De Pulmone marino, & Ho-  
lothurus.*

Inter Teſtacea quidem Pulmonem Tab.  
marinum poſuiſſe Ariſtoteles vi-XIX. &  
detur: Plinius tamen inrer Zoophy-XX.  
ra tecenſuit, quem nos ſequimur. Aldrov. L. 4.  
*Pulmo marinus* dicitur ita vel à pulmo-  
num noſtorum figura, vel ab eorum  
dem ſubſtantia laxa, & molli, fora-  
minulisque plena. Kiranidis inter-  
ptes Cunnum marinum exponit, &  
ſic pro *Vrtica ſoluta*, ſed falſo, ſume-  
re videtur. *Arſt. H. N. L. 4. 15.*

Sane decoctum pulmonis com-  
mendant Medici: at *Vrticæ* ſubſtan-  
tia eſt nimis mollis, & pituitæ con-  
cretæ ſimilis, qua in aqua mabit: &  
nec in cinerem tedi, nec in aqua  
decoqui, corpore aliquo ſuperſtite  
poteſt.

*Deſcriptionem* eius vix ex antiquis  
obtincaſi: Plinius per mare ferri ubi  
imminet tempeſtas, plurimumque die-  
rum hyemem portendere ſcripſit:  
*Epheliuſ* verò non adhærete, ſed ab-  
ſoluta eſſe, addidit. Commendantur  
ad pyloſe vellendos. In aceto putre-  
facto & mento aſperſæ carnes, fugam  
illorum facere dicuntur. Cinis alli-  
gatus egregiè profluviâ purgat. De-  
coctus verò in aqua, calculiſis me-  
detur.

Deſcri-  
ptio.  
*Plin. H. N.*  
*L. 8. c. 35.*



*Pulmo maris Mathuch.*



*Pulmo maris  
et figura parte.*



*Pulmo marinus Rond.*



*Heliostaurus Rond.*

*Heliostaurus Rond.*



*Thalassurus.*



*Spuria.*

*Varia.*





*Thysanura fex sparin Aldrov.*

Tab. XX.



*Medula Marina Rand.*



*Eppitum.*

*Medula Marina.*



*Malum in frum Marina Rand.*

*Vna marina.*



*Prima Marina Rand.*



*Marine marina.  
Mar. hand.*

*Mar. fedr.*

*Prima Marina alia.*

*Cucuma marinus. Mar. Cucumbr.*



*Malum*

*grimalum.*


*Pyrum marinus Zoophyhton.*



*Fungus*

*marinus  
Zoophyhton.*







Plin. H. N. datur. Lignum si eo confricetur, ar-  
t. 32. c. 10. dere videbitur, ut sua luce faculam  
quoque vincat. Rondeletius inve-  
nit substantiam quandam saxis hæ-  
rentem, corio duro & nigro inte-  
ctam, intus mollem fungulam & fi-  
stulosam aplysiarum modo. Vel in-  
quit pulvis marinus dici potest, cor-  
pus quoddam rotundum, pilæ mari-  
næ modo, virescens, foris substantia  
fistulo simile, intus totum fistulosum,  
veluti spongia aplysia. In mari aqua  
plenum est & grave: extra mare in se  
concidit, & flaccescit: in faxorum ri-  
mis delitescit & inter algas.

*Aldrov. l. 4. c. 4.* *Holothuriarum* nomen unde veniat,  
nescimus. Pauca etiam de iis vete-  
res. Saxis soluta esse, sed immobilia,  
asperoque corio teggi. Rondele-  
tius duas nobis *icanes* exhibuit, cum  
his descriptionibus. Id genus, in-  
quit, quod hic proponimus, altero  
extremo obtusum est & planum, in  
quo rostris sculptam imaginem dicas,  
circa quam sunt acerbula. Inde  
parva appendix & mollis dependet.  
Pisculeatum odorem respicit, nec mi-  
nus ingratum & insuavem ac lepus  
marinus: altero extremo tenuius est  
intus, partes omnes sunt indiscretæ.  
Altero extremo caput habere vide-  
tur rotundum, os in medio rotun-  
dum, rugosum, quod aliquando di-  
latatur, aliquando constringitur.  
Sequitur corpus crassius, aculeis  
multis rigens: videtur in caudam de-  
ficere, ex cuius utraque parte duæ  
sunt appendices pedum pinnarum-  
ve loco, sed differentes. Superior  
enim strictior est, in ambitu incisa, in  
acutum desinens, adquam à cervice  
producta est linea; altera latior ubi-  
que. Harum beneficio motum ha-  
bere videtur, cuius prorsus expers  
est primum genus: quod aliquan-  
do acetabulis suis saxis  
hæret, sed solvi-  
tur.

## CAPUT III.

## De Tethyis.

**T**ethyia seu ut Plinius vult, Te-  
thys, veteribus Græcis *τῆτις*, & XIX. &  
*τῆτις*, modernis Sphærododes, à *τῆτις* XX.  
ra sine dubio; Adriatici sinus acco-  
Nomen.  
lis spongiæ, quia cum premuntur,  
spongiarum instar, aquam foramini-  
bus reddant: Tarentinis, propter for-  
mam & parvos quosdam anfractus  
vert cilla: aliis à colore & tumore,  
seu quod nullis fibris, ut Tuber ter-  
rena niti crediderint, Tubera: qui-  
buldam, quod callosa materia teg-  
gatur Calli nonnullis, sed falsò, id-  
que ex comparatione patere potest,  
Urticæ vocantur. Gaza cum Holo-  
thuriis confundit, Eustathius & Ho-  
meri scholiastes *τῆτις* ab Ostreis  
non distinguunt. Nicander *τῆτις*  
patellas feræ explicat.

Aristoteles ita eas descripsit. Quæ Descri-  
Tethya sive callos speciali nomine à *τῆτις*.  
tegminis qualitate appellamus, na-  
turam inter hæc genera (Testato-  
rum) peculiarem fortiri notum est.  
lis enim solis corpus toto tegumento  
includitur, cuius durities inter tes-  
tam & corium est: quamobrem mo-  
re præduri bubuli tergoris secatur.  
Adhæret id genus saxis sua testa.  
Duo à se invicem distantia foramina  
habet, admodum exigua, & visum  
vix patientia, quibus humorem acci-  
pit & reddit. Excrementum enim  
nullum in eo spectatur, quale in cæ-  
teris Ostreis, vel Echinzum, vel  
quod papaver vocatur. Dissecanti  
ea tibi primum occurret membra-  
na nervosa Carnaceo corpori ob-  
ducta.

Hæc enim, corpulentum tethyi  
continentur: idque à cæteris omni-  
bus dissimile; suo in genere omnibus  
similis eiusmodi caro. Hæret hoc  
duobus locis & membranæ & corio  
ab latere: quaque hæret utraque  
parte pressus est: quibus partibus  
tendit ad meatus ipsos, qui proti-  
nus

nus pet ipsum calicē extorſum ducunt: atque hac emittit, atque exigit tum cibum, tum humorem, perinde atque ſi hic os ſit, ille autem exitus excrementi. Atque horum alter craſſior eſt, alter tenuior. Intus autem in parte utraque ſinus diſſepti, continua te poſſilla quadam. In eorum altero humor ineſt. Cæterarum partium, quæ vel inſtrumentum nomine vel officio ſenſuum, ac ne excrementa quidem cuiuſquam modi qualia in aliis ſunt, quicquam habent. Et hæc quidem Ariſtoteles. His addit Rondeletius, non ſolum petris, ſed & Oſteorum teſtis affixa eſſe, & in illis veluti duros tumores cerni. Ovi, addit, figura ſunt aliquantō longiora. Teſta extra fuſca, inæqualis, rigida, intus argentea, lævis. Tethyor. caro membrana alia alba involuta ventriculi formam teſert, rotundam ſcilicet & oblongam, meatus craſſior & amplior gulæ proportionem reſpondet: alter minor podice. Colore uterque eſt rutilo vel ruſſo, reliquum corpus cæceum.

**Locus.** In Ægypto nulla inveniuntur. In Smyrna præſtantiffima. In Oceano ad Gallicum littus ſunt frequentia, Pariſiſque in foro piſcario sæpe Oſteor. teſtis adhærentia viſuntur. Signantur etiam in cavernis faxatum: maximè verò in cæno & littoribus, quæ phyco algæ matina abundant. Inveniuntur & in muſco marino, aut aliis in herbis foliisve marinis. Unde Plinius. Tethæ inveniuntur ſugentes in foliis marinis, ſeu potius ſcopulis. Hinc Euſtathius dicta conjicit à verbo *θη*, quod ſignificat *μαλιν* quod & pro lactare & ſugere accipitur. Fungorum verius ſunt generis quàm piſcium: & quia nullum viſcus intus habent ſed carnem unitotrem, nihil de animalis natura habere videtur.

**Motus.** Motum & ſenſum qui illis ineſt ab intetno provenire, cum multa Conchylia & Cruſtacea intus habeant, à quibus motus provenit, Plinius auctor eſt.

**Vitæ.** Rubra cibo ſunt idonea: pallida

verò aut ſublutea amarulenta Maſtarius prodidit. Xenocrates plurimum dare alimenti tradit, coriaque maximè eorum non confici.

*Medicinam* ſi attendamus, torminibus & inflationibus ſuccurrere, & tenefſmum diſſolvere renunquæ vitia; in cibo ſumpto lateris dolores lenire, apud Plinium habemus. Conſerunt etiam iſchiadicis ventricque ſuperiori una cum ruta: item cachecticis, quorum corpus macie conſiſtitur cum ruta & melle.

Quantum ad *Differentias* & ſpec. Differentias quatuor Aldrovandus poſuit. viz.

*Prima* parte extetno & interno py. Aldrov. l. 4. ri formam æmulatur, & colore eſt cinereo: ablataque cuticula ſubſtantia apparet denſa poris exiguis, vixque viſibilibus reſerta, per quos aqua attrahitur, & per univerſum corpus diſtribuitur. Duo grandiora habet foramina, unum oblongum; alterum rotundum; hoc alvo, illud ori reſpondere videtur. In his quandoque conſpiciuntur Scyllari, Cancelli, & alia cruſtacea: item ttochi, turbines & Oſtacoderma.

*Alterra* eſt figura mali, foraminibus duobus; rotundo, quod maius eſt; oblongo, quod minus. In eo Scyllarus continebatur, quæ totum ferè illius foraminis continebat interval- lum. Cauda erat revoluta.

*Tertia* figura eſt inæquali, tubetofa: foramine uno oblongo maiore, quod in oppoſita erat parte minore. In eo continebatur Purpura, proportionem magnitudinis Tethyi, ut etiam exterius cotium penetraret.

*Quarta*, figura eſt rotunda ſed inferius compreſſa: foramen habet tam exiguum, ut vix conſpici poſſit.

Intus, cruſtaceum aliquod, utiæ partis ſuperioris foramine conſpicietur.

¶

## CAPUT IV.

## De Mentula marina.

**TAB. XX.** **M**entula marina Numenio vocatur, fortè *mentula* à *mentis*; aliis Aldr. l. 4. c. fortè Holothurium, à *holos* & *thura* libidini operam date, *thura* genituram significat: hinc Rondelenius altera Holothuriorum species virilis generalis speciem profert: quibusdam Halesurion, quasi à *hale* & *surion*, marina cauda, Apuleio veretillum dicitur. Albertus cuiusdam ostrei meminit, cuius species una virgam, altera vulvam præ se ferret. Moderni Græci Pfoli vocat.

Descrip-  
tio.

A Bellonio ita describitur. Exanguæ maris purgamentum est: solum vagatur. Sed ea eius natura, ut à piscibus aliis minimè tenetur, neque à quoquam in cibo expectatur. Littorale est neque alibi reperitur, quàm ubi Patellæ, Ricini, & vertibula degunt. Genitale ex hoc dicitur, quod teres sit, pedem longum, & mediocris brachii crassitudine: Distendit se & contrahit hirudinis in morem. Unde ei & nomen inditum est. Quin etiam rufi coloris est, lners, nec nisi serpendo incedit, aspectu toroso, Nymphææ radices similitudine. Semper ad ima fidit: nunquam naeat: cōtractarumque in seipsum contrahitur, ac cornu duritiem habet, vixque acuta cuspide pertundi potest: alioqui petmolle dum sua spōte moveretur, suas promuscides quādo vult, exeret, atque ita constingit, ut ex pedali longitudine vix lex digitos longum appareant. Acetabulis quæ in promuscibus habet, lapidibus hæret: in quibus plufquam quatuor millia nonnunquam annumeres. Ex anteriore autem capitis parte rursus cinitas emittit, veluti arbutulas acetabulis plenas; quibus quicquid palpat, ad os adducit, quod tam amplum aperit, ut vel integram conchulam admittat: vescitur enim o-

mni conchyliorum genere. Eius recrementa viscida sunt ac lenta, albissima, copiosa, quæ tandem induratur, ut cum fidibus de duritia nervæ certare possint. Os in gyrum officulis, dentatum habet, præterea nullis ossibus alibi præditum. Ab ore gula in stomachum differtur, quomodo in Erinaceo marino dictum est: reliqua ut intestina circumponuntur in gyrum, quæ vix observari possunt.

Rondelenius duas species facit. Differt una coria duro constat. Dum vivit intumescit & distenditur: flaccescit post mortem. Parres internæ indiscrētæ sunt. Altera ex testa spissa, dura, cartilaginea, perspicua & rugosa constat.

Gesnerus duas quoque à Sittardo accepit. Prior massa quædam informis erat, retrorsum ubi crassior altiorque veluti cornu parvum, tugosum, extendebatur: opposita pars humilior, in glande, foramen rubicundi coloris ostendit. Altera Epipetrum dictum, informis quoque, inæqualis, & ruberosa, multis acetabulis compacta, colore partim nigris, partim rubescens & albicans alicubi erat.

## CAPUT V.

De Malo Granato, Fungo,  
Pyro, Penna marina, Uva  
marina, Cucumere marino,  
Malo insano, & Ma-  
nu marina.

**M**alum granatum, Fungus marinus, TAB. **XX.**  
& Pyrum à figura nomen sortita sunt. Illud eiusdem est cum Punico coloris. Ille cærulei, hoc eiusdem ferè.

Penna marina est pennis magnis quæ in pileis gestare solent, perquā similis. Piscatores Itali ob extremitatis alterius similitudinem *Mentula*

k 3 alatum

*alatum* vocant. Est enim ea pars præputio, id est, glandis similis, altera vero parte pennam refert. Pars illa crassior, quæ glandis specie est, rimas aliquor habet, quales sunt branchiarum rimæ in galeis. Quæ pennam representat, scistucis tenuibus constat, quæ alumini scissili similes sunt: iis, substantia alia quadam tenera innititur. Noctu maximè splendet, stellæ modo, ob candorem & levorem. Pénam marinam *aliam* rubentem, lineam per medium caulem albam, fronde simili ferè, sed parte altera, quæ fronde caret longiore, simplici; nulla cum glande dissimilitudine.

*Fœæ marina* facit & Plinius mentionem dum scribit. Rerum quidem

non solum animalium simulachra marinesse, licet intelligere intuentibus, Uvam, Gladium, Serras. Est autem oblonga quædam & informis massa, ex uno pediculo dependens. Partes internæ indiscrætæ sunt, inter quas aliquando repertiuntur glandulæ parvæ. In vino putrefacta vini tædium adfert, ut Plinius prodidit.

*Malum insinum marinum*, & *Manus marina*, à similitudine quoque nomē obtinuerunt.

*Cucumis*, digitus est crassitudine & longitudine, tuberculis aliquot asperis veluti in Cucumere terrestri parvo. Partes internas indiscrætas habet.

F I N I S.





# I N D E X,

Quibus paginis Tabulæ piscium sunt  
subjungendæ.

## *n Historia de Piscibus & & Cetis.*

TABULA I.	pagina
II	8
III	11
IV	16
V	20
VI	21
VII	26
VIII	26
IX	30
X	37
XI	37
XII	37
XIII	42
XIV	46
XV	52
XVI	52
XVII	60
XVIII	68
XIX	74
XX	82
XXI	92
XXII	98
XXIII	106
XXIV	114
XXV	114
XXVI	130
XXVII	146
XXVIII	146
XXIX	146
XXX	172
XXXI	176
XXXII	178
XXXIII	184
XXXIV	190
XXXV	194
XXXVI	200
XXXVII	202
XXXVIII	204

XXXIX	208
XL	208
XI	216
XLII	216
XLIII	218
XLIV	220
XLV	226
XLVI	226
XLVII	226

N. Tabulæ tres posteriores superaddita sunt, ut  
iconisimus piscium exhiberetur plenarius. Ni-  
mirum, quia prioribus absoluti in auctorum  
pervolutione, hi in Clasio, Salviano atq; Schen-  
feldio occurrerunt à prioribus illis differentes,  
peculiariter eos subiungere visum fuit.

## *In Historia de Exanguiibus Aquaticis.*

TABULA I	pagina
II	15
III	18
IV	20
V	24
VI	27
VII	30
VIII	32
IX	32
X	39
XI	46
XII	48
XIII	51
XIV	56
XV	66
XVI	69
XVII	69
XVIII	72
XIX	74
XX	75





# I N D E X IN HISTORIAM DE PISCIBVS ET CETIS, IVXTA SERIEM ALPHABETICAM

dispositus, in quo litera P. paginam descriptionis, T.  
tabulam denotat.

A.	P.	T.	P.	T.	
 Baratuia	202.	37	<i>Alphestes</i>	49.	15
Acacana	226		<i>Ambia</i>	211.	
Acara	194.	34	<i>Amia</i>	14.	3
Acaraia	191.	34	<i>Anilott</i>	212.	
Acaramucu	202.	37	<i>Ammocatus, vide Exocatus</i>		
Acarnan	68.	18	<i>Amore Guacu</i>	190.	34
Acara Pinima	182.	31	<i>Amore Pixuma</i>	194.	35
Acara pitamba	184.	33	<i>Amore Tinga</i>	194.	
Acarapucu	178.		<i>Anguilla</i>	120.	24
Acarauna	178.	32	alia		24
Acipenser Zelandicus		23	<i>Anthias Rondelet.</i>	53.	16
Acipenser 1	111.	23	<i>Anthias asellus conformis Rond.</i>		16
2		23	<i>Anchusa primus</i>		16
3		23	secundus		16
		23	tertius		16
Aculeatus <i>varius</i> maior		47	quartus		16
Acui maior Oppiani	157.	15	<i>Anthias Conger</i>		16
Minor Bellonij	58.	15	<i>Antacrus Rondel.</i>	147.	25
Alia species	56.	15	stellatus	147.	28
Acui Aristotelis	56.	15	<i>Antroponorphos</i>	222.	40
alia species	56.	15	<i>Aper</i>	10.	1
Adoni exocatus Bellonii	60.	15	<i>Aphya Cobites</i>	77.	19
Agonus Italicus	175.	30	<i>Aphya Membras</i>	77.	19
Germanicus	136.	26	<i>Aphya Phalerica</i>	77.	19
Aiereba	205.	38	<i>Apua</i>	76.	19
<i>Alunda</i> cristata	59.	17	<i>Apua vera</i>	77.	19
non cristata	68.	18	<i>Aquila</i>	31.	9
<i>Albula cerulea</i>	173.	30	<i>Aramaca</i>	198.	36
<i>Albula leuareus</i>	171.	30	<i>Arameni maior</i> seu draco-marinus		
<i>Albula lacustris</i> <i>Breola</i> dicta	172.	30	maior	91.	21
<i>Albula minima</i>	173.	30	minor	91.	21
<i>Albula nobilis</i>		46	<i>Asellus</i>	7	1
<i>Albula parva</i> <i>Gacineri</i>	171.	30	<i>Asellus minor</i> seu Callarias	7	1.2
<i>Albula</i>		45	niger	8	2
<i>Alburnus albus Saluiani</i>	174.	30	<i>Asellus alter</i> seu Merluccius	8	1
<i>Alburnus Ausonij</i>	152.	29	<i>Asellus mollis</i>	8	2
<i>Alsa</i>	105.	27	<i>Asellus alius</i>		2
<i>Alsa</i> seu Clupea	101.	27	<i>Asellus viridescens</i>		46

# I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
<i>Astellus varius</i>		46	<i>Carpio Benaci</i>		3
<i>Affer</i> <i>lyficulus</i>	141.	26	<i>Catan</i>	117.	14
<i>Danubianus</i>	141.	26	<i>Cataphraclius</i>	114.	46
<i>Attagenus leprae</i>	44	13	<i>alius</i>		46
<i>altus</i>		13	<i>Idem supinus</i>		46
<i>Atberina</i>	79.	17.19	<i>Catulus maior</i>	15.	8
<i>Attilus Padi</i>	146.	23	<i>Catulus seu Canicula Aristot.</i>	15.	8
<i>Aurata</i>	70.	19	<i>Chalcis altera Randel.</i>		3
<i>Axotote</i>	211.		<i>Chame biatula</i>	47.	14
			<i>Chame</i>		14
B.			<i>Chramis</i>	69.	17
<b>B</b> <i>Agre</i>	204	38	<i>Crizupira</i>	186.	33
<i>Species alia</i>		38	<i>Centrine</i>	28.	7
<i>alia</i>		38	<i>Cepala</i>	75.	15
<i>alia</i>		38	<i>Cete</i>	213.	
<i>alia</i>		38	<i>Cete admirabilis forma</i>		45
<i>Balana genera</i>	215.	41	<i>Citharus</i>	89.	20
<i>Balana vulgi</i>	216.	41	<i>Citharus flavus sive asper</i>	89.	20
<i>Balana</i> <i>Co. pedum longitudine &amp;</i>			<i>Clavatus Cyprinus</i>	174.	30
<i>41. altitudine</i>		42	<i>Cabites aculeata</i>	142.	26
<i>Ballerus</i>	166.	26	<i>barbatula</i>	143.	26
<i>Barbo</i>	130.	26	<i>Cobites flaviatus Randel.</i>	142.	26
<i>Barbota Gallorum</i>	150.	27	<i>Cobites</i>		26
<i>Barbus Salviani</i>		31	<i>Colia sive lacertus</i>	97.	
<i>Bezola</i>	172.	30	<i>Conger</i>	18.	4
<i>Blennius</i>	75.	19	<i>Coracinus</i>	50.	15
<i>Blennius Bellonii</i>		19	<i>minar</i>	50.	15
<i>Blica seu ballerus</i>	166.	27	<i>niger</i>	50.	15
<i>Boops</i>	84.	20	<i>Carax Randel.</i>	98.	22
<i>Boops peregrinus</i>		20	<i>Caracoro</i>	195.	35
<i>Boops Rondeletii</i>	99.	12	<i>Corvulus</i>		2
<i>Bubuka Bellonii</i>	145.		<i>alius</i>		2
C.			<i>Corvus Niloticus</i>	138.	26
<b>C</b> <i>Amaripugnax</i>	196.40.35		<i>Cottus Gesner.</i>	140.	29
<i>Camurs</i>	186.		<i>Cuculus</i>	65.	17
<i>Canadella</i>	47.	14	<i>Cucupugnax</i>	192.	34
<i>Canicula seu Galeus Canis</i>	25.	8	<i>Cucuri</i>		39
<i>Canis Carcharias</i>	24.	6	<i>Curema</i>	197.	
<i>alia species</i>		6	<i>Curimata</i>	184.	33
<i>Canis Carcharias alius</i>		6	<i>Curruca</i>	181.	
<i>Canis Carcharia dentium series</i>		7	<i>Curvata Pinima</i>	201.	36
<i>Canis marinus</i>		8	<i>Cynadus alphestus</i>	49.	15
<i>Cantharus</i>	73.	19	<i>Cyprinus</i>	161.	27
<i>Caper sive Caprifiscus</i>	110.	23	<i>latus Rand.</i>	165.	29
<i>Capcuna</i>	183.	33	<i>alius</i>	165.	29
<i>Capito anadramus</i>	109.	23	<i>monstruosus</i>	163.	17
<i>Capito luscus seu Squalus veterum</i>	132.	26	<i>Salviani</i>		3
<i>Capito flaviatus seu squalus minari</i>	133.	26			
<i>flaviatus rapax Gesneri</i>	134.	26	D.		
<i>Catapa</i>	193.	34	<b>D</b> <i>Elphinus prior</i>	218.	43
<i>Caviana</i>	181.	32	<i>alter</i>		43
<i>Carpio</i>	171.	29	<i>Dentex sive synodon</i>	60.	18
			<i>Doncella seu Iulia Salviani</i>		19



# I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
<i>Dryas marinus maior</i>	91.	21	<i>Guarapicu</i>	106.	19
<i>minor</i>	91.	21	<i>Guara Tereba</i>	194.	35
<i>Dracunculus</i>	91.	21	<i>Guarerva</i>	106.	35
			<i>Guarugara</i>	192.	34
			<i>Guatucupa tuba</i>	181.	32
			<i>Guebucu</i>	203.	32
E.					
<i>Encepholus</i>	78.	19			
<i>Eperlanus fluvialis</i>	159.	23			
<i>Eperlanus</i>	116.	24	H.		
<i>Erythrinus</i>	67.	18	<i>Harengus</i>	2.	1
<i>Exocoete Ichthyocolla</i>	148.	16	<i>Hepatus</i>	48.	14
<i>Exocoete</i>	51.	15	<i>Hephetus</i>	79.	19
			<i>Hippurus</i>	11.	1
F.			<i>Hirundo</i>	64.	17
<i>Faber</i>	58.	17	<i>Hirundo Plinij</i>	66.	18
<i>marinus</i>		17	<i>Histrix</i>		45
<i>Fario seu Trutta</i>	125.	16	<i>Holoacan Bellonii sive Ostracion Nilu</i>	113.	25
<i>altera</i>	127.	16	<i>Huso</i>	115.	25
<i>Farra</i>	174.	19	<i>Huso seu Antacani Stellaria</i>		25
<i>alii generis</i>		19	<i>Huso seu Antacani Rondel.</i>		25
<i>Frater Hugo</i>		19			
<i>Fratola seu Fratola</i>	74.	12	L.		
<i>Fuga seu Phycis</i>	46.	14			
<i>Fundulus</i>	119.	29			
G.			<i>I Abebirete</i>	106.	38
<i>Aliigenus</i>	45.		<i>Iaguacaguare</i>	184.	33
<i>Galeria</i>	40.		<i>Iaguara</i>	180.	32
<i>Galeus Acathinus seu Mustelus spi</i>	27.	8	<i>Ichthyocolla</i>	148.	29
<i>nax</i>			<i>Iperuquiba</i>	109.	39
<i>Asterias</i>	26.	7	<i>Iulta</i>		19
<i>Galeus canis</i>	25.	8	<i>Iulu</i>	45.	14
<i>Galeus glaucus</i>	26.	8	<i>Iuruncapcha sive Itiara</i>	186.	32
<i>Galeus Levis seu mustelus</i>	26.	8			
<i>Galeus sive glaucus Aelianus</i>	26.	18. 26	L.		
<i>Galeus Rhodius</i>	113.	24	<i>Lacertus</i>	27.	21
<i>Gladius</i>	15.	4	<i>peregrinus vel rubri maris</i>	27.	21
<i>Glanis</i>	148.	27	<i>Lamia</i>	40.	14
<i>Glaucus Bellonij</i>	52.	15	<i>Lampreta</i>	117.	14
<i>Glaucus veterum</i>	11.	1	<i>fluvialis</i>	154.	28
<i>Gobio Batiavia Salviani</i>		11	<i>Latus</i>	104.	47
<i>Gobio caput aius</i>	140.	26. 29	<i>Lavaretus</i>	171.	30
<i>Gobio fluvialis non capitatus</i>	139.	26	<i>Lavaronus Bellonii</i>	80.	
<i>Gobius maior Gesn.</i>	54.	15	<i>Leo marinus</i>		40.
<i>minor Gesn.</i>	54.	15	<i>Lepru</i>	43.	12
<i>Guacari</i>	190.	34	<i>Leucifus</i>	136.	16
<i>Guacucha</i>	207.	39	<i>Rondel.</i>	138.	16
<i>Guarufa</i>	195.	35	<i>Liparis</i>	10.	117
<i>Guaibi Coara</i>	188.	34	<i>Lota Gallorum</i>	168.	29
<i>Guamaianu Ape</i>	198.	16	<i>Lucius</i>	159.	29
<i>Guamaianu Attinga</i>	208.	39	<i>Lumpus Anglorum</i>	42.	11
<i>Guamaianu Guara</i>	207.	32	<i>Lupus</i>	103.	23
<i>Guaperna</i>	188. 200. 36	32	<i>Lupus marinus Schonfeld.</i>		47
<i>Guarapema</i>	187.	33	<i>Lycosthonus Balchicus</i>		47
			<i>Lyra</i>	66.	24
					Malba

# I N D E X

				P.	T.
M.	<b>M</b> <i>Alia</i>				
	<i>Manati Indorum</i>	27.			
	<i>Mandibula Tanis marini</i>	223.			
	<i>Marzapanus</i>	44.	2		
	<i>Matruaque</i>	191.	34.		
	<i>Melanderinus</i>		14.		
	<i>Melanurus</i>	49.	14.		
	<i>Membras</i>	76.	19.		
	<i>Merula</i>	44.	2		
	<i>Mesoro vel Blennius Salviani</i>		31.		
	<i>Micropidius</i>	211.			
	<i>Misvipira vel Pirabebe</i>	187.	23.		
	<i>Milvus</i>	65.	11.		
	<i>Milvus Rondeletii</i>	98.	22.		
	<i>Molva</i>	8.	1.		
	<i>Mola</i>	29.	9.		
	<i>Mola peregrina</i>		2		
	<i>Mana</i>	21.	20.		
	<i>Monoceros</i>	10.	1		
	<i>Mormyrus</i>	72.	19.		
	<i>Mucu</i>	202.	37.		
N.	<b>M</b> <i>ugil</i>	106.	23.		
	<i>Mullus maior</i>	61.	17.		
	<i>minor</i>	61.	17.		
	<i>imberbis</i>	64.	18.		
	<i>Murena mafi.</i>	20.	5		
	<i>famina</i>	22.	5		
	<i>Muscula</i>	9.	128.		
	<i>barbata</i>	151.	28.		
	<i>fluvialis</i>	151.	28.		
	<i>fossilis</i>	154.	28.		
	<i>lacustris</i>	151.			
	<i>Musculus levis</i>	26.	7		
	<i>spinax</i>	27.	7		
	<i>Muscula marina Vivipara</i>		46.		
	<i>Myrus alter sive Serpens rubescens</i>	22.	5		
	<i>Mylicetus</i>	17.	4		
O.	<b>N</b> <i>Hemidia</i>	199.	36.		
	<i>Nhaquunda</i>	194.	35.		
	<i>Narinari</i>	208.	37.		
	<i>Nasus</i>	139.	26.		
	<i>Nisqui</i>	206.	37.		
P.	<b>O</b> <i>Bris</i>	140.	31.		
	<i>Ophidian Plinii</i>	19.	5		
	<i>Oreymus</i>	12.	3		
	<i>Orbis piscis</i>	123.	24.		
	<i>britannicus</i>	124.	24.		
T.	<i>eckinaus</i>			124.	24
	<i>Gefneri</i>			123.	24
	<i>Scutatus Rondel.</i>			123.	25
	<i>stellatus</i>			124.	24
	<i>Kana rillo</i>				45
	<i>Spinofus</i>				45
	<i>oblongus testudinis capite</i>				45
	<i>Orca</i>			1172.	
	<i>Orfus Germanorum</i>			131.	26
	<i>Orphas</i>			68.	18
P.	<b>P</b> <i>Arati</i>			198.	16
	<i>Peru</i>			177.	12
	<i>Passer levis</i>			92.	22
	<i>squamosus</i>			93.	20
	<i>Pastinaca</i>			198.	34
	<i>Pavo Salviani</i>			41.	13
	<i>Pecten</i>			76.	27
	<i>Pelamy carulea</i>			12.	3
	<i>Perca marina prima</i>			46.	12
	<i>secunda</i>			47.	14
T.	<b>P</b> <i>erca marina tertia</i>			47.	13
	<i>fluvialis maior</i>			156.	28
	<i>minor</i>			177.	28
	<i>Petimbaba</i>			199.	16
	<i>Phagrus</i>			67.	17
	<i>Phocæna</i>			220.	41
	<i>Phoca</i>			221.	42
	<i>Pholis</i>			60.	12
	<i>Phoxinus squamosus maior</i>			144.	27
	<i>minor</i>			144.	27
P.	<b>P</b> <i>hycis</i>			155.	23
	<i>Physeter</i>			46.	12
	<i>Piaba</i>			217.	
	<i>Piaba</i>			193.	33
	<i>Piabucu</i>			124.	35
	<i>Pigu</i>			174.	10
	<i>Piquitinga</i>			186.	
	<i>Piraca</i>				39
	<i>Piraca Acangata</i>			172.	
	<i>Piracoaba</i>			195.	35
P.	<b>P</b> <i>iracetara</i>				10
	<i>Pira jurumtibera</i>			181.	
	<i>Pirancha</i>			189.	8

## I N D E X

	P.	I.	P.	
<i>Piracema</i>	178.		<i>Reversus Indi in Angulo forma</i>	2
<i>Pirapixanga</i>	182.	32	<i>Indicus squamosus</i>	3
<i>Piraputiba</i>	209.	39	<i>Rhomboides Rondel.</i>	10
<i>Piratiapia</i>	185.	33	<i>Rhombus</i>	22
<i>Piratia Pua</i>	197.	36	<i>Rhombus aculeatus</i>	12
<i>Piraumbu</i>	198.	34	<i>lævis verus</i>	22
<i>Piraya</i>	189.	34	<i>Rotmarus</i>	227
<i>Piscis Anthropomorphus</i>	1-9.	40	<i>Intencus</i>	43
<i>Gibbosus</i>	40.	13	<i>Ficus</i>	43
<i>Gocfis</i>	48.	13	<i>Rubellus Salviani</i>	11
<i>Gutturatus</i>	214.		<i>Rutilus flaviventris</i>	145-126
<i>Innominatus</i>	202.	36		
<i>Piscis Indicus</i>	211.			
<i>mularis</i>	211.			
<i>Remorans</i>	209.			
<i>Tauriformis</i>	213.			
<i>Triangularis</i>				
<i>Pompius</i>	14.	41	<i>Alar</i>	22
<i>Porcus supinus Salviani</i>		31	<i>Salmo</i>	101-43
<i>Pracamo Bras</i>		40	<i>Salmo Salviani</i>	31
<i>Pudiano Vermelho</i>	179.	32	<i>Salmefascu Salema</i>	40
<i>Verde</i>	179.	32	<i>Salmefriscu seu Salmiro</i>	155-28
<i>Pungam</i>	203.	37	<i>Salpa</i>	73-19
<i>Pungitum</i>	159.	28	<i>Sandil Anglorum</i>	20-21
<i>Puraque</i>	201.	36	<i>Sarachus</i>	175-10
<i>Pusta</i>	211.		<i>Sarda</i>	10-20
<i>Pustis</i>	217.		<i>Sarda Flandrica maior</i>	11-20
			<i>minor</i>	11-20
			<i>Sargus</i>	71-12
			<i>Sargus Aldrovandi</i>	45
			<i>Saurus</i>	97-24
			<i>Scaurionias</i>	40-33
			<i>varius</i>	40-33
			<i>Cretensis</i>	45
			<i>Sciana five Umbra</i>	51-15
			<i>Scolopax</i>	10-1
			<i>Scolopendra Cetacea</i>	221-44
			<i>Scomber</i>	95-21
			<i>Scombrus alius</i>	95-21
			<i>Scorpio maior</i>	74-19
			<i>minor</i>	74-19
			<i>Scorpena</i>	75-18
			<i>Scorpio marinus alter</i>	47
			<i>Idem supinus</i>	47
			<i>Schelus</i>	175-10
			<i>Schellus</i>	158-18
			<i>Serpens marinus verus</i>	18-4
			<i>marinus</i>	18-4
			<i>marinus Norvegicus</i>	18-5
			<i>Siluri vera effigies</i>	37
			<i>Simia marina</i>	10-7
			<i>marina Dabica</i>	29-7
			<i>Smaris</i>	11-20
			<i>alba</i>	11-20
			<i>peregrina</i>	11-20
			<i>Solca</i>	87-25
			<i>lingulata</i>	87-25
			<i>oculata</i>	87-25

# I N D E X

	P.	T
<i>Spirus</i>	72.	18
<i>Sphyrana</i> sive <i>Sudus</i>	55.	18
<i>Spirinchus</i>		47
<i>Squatina</i>	39.	11.12
<i>Squatino-rata</i>	39.	11.12
<i>Stromateus</i>	74.	19
<i>Sturio</i>	111.	23
<i>Synagrus</i>	69.	40.18
<i>Synodon</i>	69.	18

T

<b>T</b> <i>Amoata</i>	182.	31
<i>Tania</i>	22.	6
<i>altera</i>	23.	6
<i>Tania Belloni</i>	23.	6
<i>cornuta</i>		46
<i>falcata Imperati</i>	21.	6
<i>Tabac pype</i>		40
<i>Taiafca</i>	177.	12
<i>Tamoata</i>	182	32
<i>Tarcira de Alto</i>	185.	12
<i>de Rio</i>	185.	12
<i>Thymallus</i>	188.	26
<i>Thymus Salviani</i>		31
<i>Tiburonus</i>	209.	19
<i>Timucu</i>	203.	37
<i>Tinca marina</i>	2.	1
<i>Tinca</i>	166.	29
<i>Torpedo</i>	30.	2
<i>maculosa</i>	31.	2
<i>Trachurus</i>	94.	21
<i>Trutta fluviatilis</i>	125.	26
<i>altera</i>	127.	26
<i>Lacustris</i>	170.	30
<i>Thunpus</i>	12.	3
<i>Turdus</i>	42.	13
<i>civis species</i>	42.	13

V.

<b>V</b> <i>Arius seu Phoxinus levis</i>	155.	28
<i>Vitulus marinus</i>	221.	43
<i>Vmbia maior</i>	169.	30
<i>minor</i>	169.	30
<i>Vmbra</i>	11.	15
<i>fluviatilis</i>	133.	26
<i>Vranoscopus</i>	91.	21
<i>Vribaco</i>	196.	35
<i>Vtila piscu serratam ad instar Prijsu habens</i>		43
<i>Vubarana</i>	183.	32
<i>Vulpecula marina</i>	27.	7
<b>Z</b> <i>Iga</i>	106.	2
<i>Zygana</i>	29.	2
<i>Zygana seu libella altera</i>	29.	2

## INDEX IN HISTORIAM DE Exanguibibus Aquaticis.

A.

	P.	T
<b>A</b> <i>Rasu pinima</i>	12.	2
<i>Aflacus fluviatilis</i>	18.	2. 4
<i>marinus communis</i>	17.	2
<i>maior</i>	12.	3
<i>minor</i>	12.	3
<i>Aflacus parvus marinus Rondel.</i>	18.	2
<i>supinus</i>		3

B.

<b>B</b> <i>Alani</i>	69.	18
<i>Buccinum</i>	43.	10

C

<b>C</b> <i>Ammarus seu aflacus fluviatilis</i>	12.	2. 3
<i>Cancer in genere</i>	24.	33
<i>specie</i>	27.	36. 3
<i>Cancer marinus</i>	25.	3. 5
<i>Majas</i>	26.	8
<i>Fiques</i>	28.	8
<i>Cordia figura</i>	29.	7
<i>flavus undulatus Rondel.</i>	28.	6
<i>fluviatilis</i>	29.	16. 2
<i>Leo seu Elephas Planus</i>		
<i>ditius</i>	18.	2
<i>Cancer brachycheles</i>	19.	6
<i>Macrochylas</i>	20.	6
<i>Cancer maximus Guaja Apara</i>	22.	9
<i>Congener brachycheles</i>	29.	6
<i>Cancer parvus</i>	20.	7
<i>Cancellus</i>	21.	
<i>Chama</i>	56.	14
<i>Carara Vna</i>	33.	0
<i>Ciecie Ele</i>	12.	2
<i>Ciri Apoa</i>	22.	9.
<i>Cochlea</i>	12.	10.
<i>Conchylum</i>	12.	11. 13
<i>Comcha</i>	22.	4
<i>Concha Venerea</i>	22.	7
<i>Persica</i>	22.	10
<i>Crustata</i>	2.	
<i>Cucumis marinus</i>	7.	20
<i>Cunaru</i>	3.	12

# I N D E X.

	P.	T.		P.	T.
<b>E</b> <i>Chinus marinus</i>	51.	13	<b>P</b> <i>Agurus</i>	27.	5 & 6
			<i>Paranacare</i>	35.	9
			<i>Patella</i>	69. 16 & 17	
<b>F</b> <i>Vnguis marinus</i>	77.	20	<i>Pellicines</i>	61.	14
			<i>Pencilis</i>	76.	17
			<i>Penna marina</i>	77.	20
<b>G</b> <i>Vasa Aparacancer maximus</i>	32.	9	<i>Pholades</i>	66.	15
<i>Guaja alia species</i>	32.	9	<i>Pinna</i>	67.	16
<i>alia species</i>	32.	9	<i>Polypus</i>	5.	1
<i>Guaricutu</i>	36.	9	<i>Potiquiquya</i>	34.	9
			<i>Pulmo marinus</i>	74.	19
<b>H</b> <i>Olethurius</i>	75.	19	<i>Purpura</i>	40.	10
			<i>Pyrum</i>	77.	20
<b>L</b> <i>Eosfen Elephantis Plinij</i>	18. 2	4	<b>S</b> <i>Epia</i>	9.	1
<i>Lepas</i>	69. 16 & 17		<i>Scpiola</i>		1
<i>Lepus marinus</i>	12.	1	<i>Solen masf.</i>	66.	15
<i>Lecusta</i>	15.	2	<i>femina</i>	66.	15
<i>Loligo maior</i>	10.	1	<i>Squilla in genere</i>	20.	4
<i>minor</i>	10.	1	<i>specie</i>	21.	4
			<i>Squilla lata</i>	21.	4
<b>M</b> <i>Alum Granatum</i>	77.	20	<i>gibbafen Crangone</i>	22.	4
<i>Infantum niatinum</i>	78.	20	<i>parva</i>	22.	4
<i>Manus marina</i>	78.	20	<i>Mantir</i>	23.	4
<i>Maracoani</i>	34.	9			
<i>Mentula marina</i>	77.	2	<b>T</b> <i>Amarugacu</i>	35.	
<i>Mollusca</i>	3.		<i>Tellina</i>	64.	15
<i>Murex</i>	45. 10. & 11		<i>Testacea</i>	36.	
<i>Musculi</i>	63.	15	<i>Tethya</i>	75.	19
	63.	15	<i>Trochi</i>	47.	18
			<i>Turbines</i>	46.	11
<b>N</b> <i>Antilus</i>	39.	10			
<i>Nerita</i>	47.	11	<b>V</b> <i>Caena</i>	31.	9
			<i>Prtica</i>	72.	18
			<i>Vva marina</i>	78.	20
<b>O</b> <i>Strea</i>	58.	14	<b>Z</b> <i>uophyta</i>	72.	18
<i>Ova Sepiarum</i>		1			





Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta.
p. 113. a. plandem	paludem	p. 155. b. Porca Mater	Porca maior	edem	enudem
p. 114. a. buius	buius	quos	quis	p. 219. a. neili	q. teili
b. recipit	resipit	p. 157. b. utu.	utu	b. relinere	relinere
aculet	audet	semiffus	semiffus	p. 220. a. motum	factum
p. 115. b. Coro	Corio	esse	esse	b. fortitudo	fortitudo
p. 116. a. non ut	quoad	qui	quis	p. 222. a. for	fortitudo
similem	similes	p. 159. a. refina	refina	p. 222. a. ammissie	ammissie
Belgicum	Belgium	p. 160. b. dno	dno	b. raste	herti
p. 117. a. gemculo	panniculo	p. 161. a. fanate	fanate	p. 123. a. Coru	herti
p. 118. b. ferram	ferram	p. 163. a. impotentis	impotentis	b. raste	herti
p. 119. b. dispenfatio	dispenfatio	p. 164. b. distimant.	distimant	p. 125. b. autem latu	unquam latu
p. 120. a. fapi	sefe	ob aliquo	ob aliquo	p. 126. a. tranfverfi	in tranfverfi
b. minutum	minutum	p. 165. a. obre quoniam	obre quoniam	reficatum	reficatum
p. 121. a. immutabatur	immutabatur	b. leuiter em	leuiter em	p. 127. a. Myffia	myffia
tur	tur	q. latior em	latior	b. praepebantur.	percipiebantur.
p. 122. a. venitu	venitu	p. 171. a. differe	differe		
p. 124. b. arduu	in erdem	b. contabescere	Contabescere	Reliqua, Benevolu Leffor, corri-	
Nilem	Nilem	p. 172. b. fignatur	fignatur	getis occurrerit. In Græcis	
p. 125. a. mortui	mortui	p. 173. b. fapi	fapi	interdum invenire est, ut pro	
portione	ratione	p. 174. a. Capro	Capro	est, ut pro	
b. offa	offa	b. Capri	Capri	quidam pro	
p. 126. b. hic	hic	p. 176. a. litu	litu	quidam pro	
humat	humat	pena	pena		
p. 127. a. alrifiime	alrifiime	fignatur	fignatur		
p. 128. a. nifiatu	in fluvio	p. 177. b. dicit	dicit		
b. pulchre	pulchre	p. 178. a. pennatu	pennatu		
undata	undata	b. Prænema	Prænema		
p. 119. a. fift ac	ifficac	Caprius	Caprius		
b. facile	facile	color	color		
p. 132. a. idem	enudem	p. 181. a. Intuacapeba	Intuacapeba		
p. 133. a. altero Gerafa	altero quada	Grata in b	Grata in b		
	Cerafa	p. 182. a. a. tinea	tinea		
	aliquis	p. 184. a. brachiu	brachiu		
	vafsi	lato	lato		
p. 134. a. argenteo	argenteo	p. 185. a. fenfui	fenfui		
p. 136. b. putrefu	putrefu	b. triangular.	triangularem		
ferbat	ferbat	p. 186. a. nifiatu	nifiatu		
p. 138. a. vici cavis	viciat	Capit.	Capit.		
p. 140. a. Rb.	Rheu	Parabatu	Parabatu		
p. 141. a. impeditu	impeditu	p. 187. a. albu	albu		
Coila	Coila	b. at	at		
b. Cognominatum	cognomen	p. 188. a. fufciferent	fufciferent		
p. 142. a. fluit	fluit	p. 190. a. fpetu	fpetu		
b. parvum	parvum	p. 198. a. buciu	buciu		
p. 143. b. dices	dices	p. 203. b. diftilla	diftilla		
lebo	lebo	p. 205. b. bula	bula		
p. 144. b. lefo	lefo	p. 206. a. fuprior	fuprior		
p. 145. b. minutu	minutu	p. 208. a. fufcifer	fufcifer		
p. 147. a. portione	ratione	b. triangulo	triangulo		
b. Cartilagineu	cartilagineu	p. 212. b. fed	fed		
p. 148. b. polam	polam	p. 213. a. hie	hie		
p. 149. a. velle	velle	p. 215. a. magnitudo	magnitudinu		
b. quid	quid	falfamentatio	falfamentatio		
p. 151. b. radi	radi	p. 216. a. bora	bora		
maximu	maximu	andri	andri		
p. 153. a. i Celos	celos	p. 217. a. mofu	mofu		
p. 154. b. mofu	mofu	maximu me	maximu me		
quis	quis	quis	quis		

### Errata super Exan- guium historiam.

p. 3. a. meliata.	melitata.
p. 4. a. hic.	hic.
p. 5. a. brevis et vo. brevis & roian.	brevis & roian.
p. 6. a. appetit.	appetit.
p. 7. a. ambulatorio.	ambulatorio.
p. 8. a. fphicatu.	fphicatu
p. 9. a. aquo	atcu.
p. 10. a. fubi fuit ut.	fubi fuit ut.
p. 11. a. aquo.	inquat.
p. 12. a. partit.	partit.
p. 13. b. promittentes.	promittentes.
p. 14. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 15. a. datam.	datam.
p. 16. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 17. a. datam.	datam.
p. 18. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 19. a. datam.	datam.
p. 20. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 21. a. datam.	datam.
p. 22. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 23. a. datam.	datam.
p. 24. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 25. a. datam.	datam.
p. 26. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 27. a. datam.	datam.
p. 28. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 29. a. datam.	datam.
p. 30. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 31. a. datam.	datam.
p. 32. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 33. a. datam.	datam.
p. 34. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 35. a. datam.	datam.
p. 36. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 37. a. datam.	datam.
p. 38. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 39. a. datam.	datam.
p. 40. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 41. a. datam.	datam.
p. 42. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 43. a. datam.	datam.
p. 44. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 45. a. datam.	datam.
p. 46. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 47. a. datam.	datam.
p. 48. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 49. a. datam.	datam.
p. 50. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 51. a. datam.	datam.
p. 52. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 53. a. datam.	datam.
p. 54. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 55. a. datam.	datam.
p. 56. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 57. a. datam.	datam.
p. 58. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 59. a. datam.	datam.
p. 60. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 61. a. datam.	datam.
p. 62. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 63. a. datam.	datam.
p. 64. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 65. a. datam.	datam.
p. 66. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 67. a. datam.	datam.
p. 68. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 69. a. datam.	datam.
p. 70. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 71. a. datam.	datam.
p. 72. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 73. a. datam.	datam.
p. 74. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 75. a. datam.	datam.
p. 76. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 77. a. datam.	datam.
p. 78. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 79. a. datam.	datam.
p. 80. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 81. a. datam.	datam.
p. 82. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 83. a. datam.	datam.
p. 84. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 85. a. datam.	datam.
p. 86. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 87. a. datam.	datam.
p. 88. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 89. a. datam.	datam.
p. 90. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 91. a. datam.	datam.
p. 92. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 93. a. datam.	datam.
p. 94. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 95. a. datam.	datam.
p. 96. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 97. a. datam.	datam.
p. 98. a. fuprapeta	fuprapeta.
p. 99. a. datam.	datam.
p. 100. a. fuprapeta	fuprapeta.

Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta.	Errata.	Correcta.
p. 11. a. color.	color.	p. 19. b. foramen.	foramen.	p. 52. a. lapides constant.	constant.
c. meatu.	ea.	p. 40. b. quod plenum.	quod plenum.	p. 54. a. plenum.	plenum.
utring. latus.	utring. ad latus.	cum.	cum.	gillu.	gillu.
Laborace.	Laborace.	p. 41. a. altem floreant.	idam floreant.	p. 55. a. qua.	qua.
b. Cortegine.	sartagine.	Testa sua.	Testa sua.	p. 56. b. confendunt.	Conferunt.
Hi pinna.	bu.	b. pro deice.	quo.	ut.	et.
p. 12. b. rimum.	vinone.	u. u. u.	u. u. u.	p. 57. a. latenter.	latere.
ut iam.	et iam.	disser.	disser.	vas.	vas.
p. 13. a. Icon.	Nuñ apponunt.	id. d. d.	id. d. d.	Glyceriolum.	Glyceriolum.
Preguedent.	Preguedent.	p. 42. a. sanguina.	cannere.	b. adprici.	adprici.
Spreuippe.	Spreuippe.	p. 43. a. uonimunt.	commune.	me. g. o. u.	me. g. o. u.
b. cabelle.	cabelle.	que.	quod.	affertam letem.	et letem.
canitatum.	canitatum.	jusulu.	jusula.	p. 58. a. eodem.	eodem.
p. 24. a. sine.	bunt.	pro.	quo.	bac.	bac.
b. apertica.	aprica.	operiuntur.	operiunt.	b. fidei se.	fidei vero se.
tracitatione.	tracitione.	tusit.	tusit.	implerit.	est necesse.
p. 25. a. transeunt.	transeunt.	p. 43. a. siflet.	siflunt.	p. 59. a. b.	sic.
b. Et mater.	sunt et mater.	compert.	compertunt.	p. 60. b. deinde ropoda.	ganderopoda.
plenam.	plena.	b. Nonnulla.	Nonnulla.	p. 61. a. nascuntur.	nascuntur pices.
pilot.	pilot.	sicut.	sunt.	cicndam.	cicndam albrum.
p. 26. a. qua.	qua.	ex Cimerem.	ex Cimeria.	p. 65. a. Aretum.	Aretum.
p. 27. b. De.	De.	pleni.	pleni.	b. sanorum.	sanorum.
et in lati.	et lati.	p. 44. a. cotylorum.	Cotylorum.	p. 66. a. manifest.	manifest.
vididiorum.	vididior.	b. supina.	supina.	b. Enflatus.	Enflatus.
descripte.	descriptis.	asserent.	asserent.	simili.	similibus.
p. 28. b. aqua.	aquatum.	epbelidus.	epbelidus.	bac.	bac.
p. 29. a. inuicem.	cum se inuicem.	asse.	asse.	b. quidem.	quidem.
p. 30. b. sifit in alu.	isifit in alu.	geniu.	manu.	p. 68. a. uniu.	uniones.
seruent vitam.	tritum.	p. 45. b. empyremum.	empyremum.	p. 69. b. mater.	matu.
p. 31. a. sine.	sinn.	manu.	manu.	Contandenti.	contundes.
p. 31. b. Civada.	Civada dicitur.	p. 46. a. Triplici.	Triplici.	ex ea.	ex ea.
p. 37. a. alu.	Alu.	Cum.	dum.	p. 70. a. gual. a. fimo.	gual. a. fimo.
Teuna.	Teuna.	b. ipse.	ipse.	b. aud suo.	aud suo.
Eorum qua.	Eorum alia qua.	etm.	Conchyli.	p. 71. a. ut fape.	et fape.
et Mytili.	et Mytili.	sedentibus.	sedentibus.	p. 72. a. ferit quam.	ferit quam.
b. Biballa.	pone ad marginem Plu.	ex. p. b. d. m.	tantum.	p. 73. a. Cimerem.	Cimeria.
p. 38. a. euoli.	euoluntur.	u. x. x. x. x. x. x.	Arrium.	p. 74. a. albu.	alba.
u. u. u. u. u. u.	u. u. u. u. u. u.	p. 49. b. Apulum.	dicere.	p. 75. b. reddunt.	reddunt.
b. uniam. si. an. uniam. si. externa.	uniam. si. an. uniam. si. externa.	p. 50. a. adit.	vacu.	Continentur.	Continentur.
terne et. spelleum. Si inter na.	terne et. spelleum. Si inter na.	lima.	Limo.	p. 76. b. q. t. a.	q. t. a.
minutai.	minutai.	b. de mar.	de mar.		











